

**28.07.2023.**

**Pismo zdravstvenim radnicima s podsjetnikom na ograničenu primjenu fluorohinolonskih antibiotika zbog dugotrajnih, onesposobljavajućih i potencijalno irreverzibilnih nuspojava**

Nosioci dozvola za stavljanje u promet fluorohinolonskih antibiotika, u dogovoru s Agencijom za lijekove i medicinska sredstva BiH (ALMBIH) i Evropskom agencijom za lijekove (EMA), uputili su pismo zdravstvenim radnicima s podsjetnikom na ograničenu primjenu fluorohinolonskih antibiotika zbog dugotrajnih, onesposobljavajućih i potencijalno irreverzibilnih nuspojava.

***Sažetak***

- Podaci iz nedavno provedenog ispitivanja upućuju na to da se fluorohinoloni i dalje propisuju izvan preporučenih indikacija.
- Fluorohinoloni za sistemsku i inhalacijsku primjenu NE smiju se propisivati za:
  - bolesnike koji su prethodno imali ozbiljna neželjena dejstva prilikom primjene hinolonskih ili fluorohinolonskih antibiotika;
  - lakše ili samoograničavajuće infekcije (kao što su faringitis, tonzilitis i akutni bronhitis);
  - blage do umjerene infekcije (uključujući nekomplikovani cistitis, akutnu egzacerbaciju hroničnog bronhitala i hroničnu opstruktivnu plućnu bolest (HOPB), akutni bakterijski rinosinusitis i akutnu upalu srednjeg uha), osim ako se drugi antibiotici koji se obično preporučuju za te infekcije smatraju neodgovarajućima;
  - nebakterijske infekcije, npr. nebakterijski (hronični) prostatitis;
  - sprječavanje putničkog proljeva ili ponavljajućih infekcija donjih dijelova mokraćnog sistema.
- Fluorohinoloni za sistemsku i inhalacijsku primjenu povezuju se s vrlo rijetkim, ozbiljnim, onesposobljavajućim, dugotrajnim i potencijalno irreverzibilnim nuspojavama. Te lijekove treba propisivati samo za odobrene indikacije i nakon pažljive procjene koristi i rizika u pojedinog bolesnika.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati [ovdje](#).

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obavezni prijaviti ALMBIH-u svako neželjeno dejstvo lijeka kao i neispravnost u kvalitetu lijeka. Pacijenti koji su razvili neko od neželjenih dejstava trebaju se obratiti svom ljekaru ili apotekaru radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.