

**AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
BOSNE I HERCEGOVINE**

**REGISTAR LIJEKOVA
BOSNE I HERCEGOVINE**

2026

almbih.gov.ba

**Agencija za lijekove i medicinska sredstva
Bosne i Hercegovine**

**REGISTAR LIJEKOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
2026**

VI

mart 2026.

**REGISTAR LIJEKOVA BOSNE I HERCEGOVINE
2026**

Izdavač:

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
BOSNE I HERCEGOVINE
www.almbih.gov.ba

Za izdavača:

Prim. mr ph. Nataša Grubiša, spec.

Priređivači:

mr ph. Tijana Spasojević-Došen, spec.

mr ph. Jovana Vojvodić Šipka

dr sc. Biljana Tubić, mr ph. spec.

Tehnička obrada:

dr sc. Boris Kovačić

dipl.inf. Dragana Tešić

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, Бања Лука

615.2(497.6)(083.81)"2026"

РЕГИСТАР лијекова Босне и Херцеговине

Registar lijekova Bosne i Hercegovine. VI : 2026 [Elektronski izvor] /
[priređivači Tijana Spasojević-Došen, Jovana Vojvodić Šipka, Biljana
Tubić]. - Onlajn izd. - Banja Luka : Agencija za lijekove i medicinska
sredstva Bosne i Hercegovine, 2026

Način pristupa (URL): Način pristupa (URL):

https://almbih.gov.ba/wp-content/uploads/publikacije/Registar_lijekova2026.pdf. - Ел.
публикација у ПДФ формату опсега 672 стр. - Насл. са насловног
екрана. - Опис извора дана 17.03.2026.

ISBN 978-99976-169-4-4

COBISS.RS-ID 144145921

POŠTOVANE KOLEGICE I KOLEGE,

Pred nama je sedamnaesto izdanje Registra lijekova Bosne i Hercegovine, koje pruža osnovne informacije o lijekovima za koje je Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBiH) izdala dozvole za stavljanje u promet, kao i za lijekove za koje su podnijeti zahtjevi za obnovu dozvole za promet zaključno sa 31.12.2025, a tokom godine zdravstveni stručnjaci će biti obaviješteni o promjenama u vezi registracije lijekova putem zvanične web-prezentacije, www.almbih.gov.ba (<http://www.almbih.gov.ba/lijekovi/>).

Registar lijekova je od bitnog uticaja na implementaciju politike i strategije lijekova u svakoj zemlji, kojim se zdravstveni radnici i stručnjaci, ustanove i javnost, kroz kodifikovan, sveobuhvatan akt, informišu o lijekovima koji se mogu naći na našem tržištu. Lijek na tržište BiH dolazi nakon sprovedenog postupka ocjene kvaliteta/efikasnosti/bezbjednosti prema propisanim i važećim evropskim standardima, i dobijene pozitivne ocjene odnosa korist/rizik, odnosno, nakon dobijanja dozvole za stavljanje lijeka u promet u BiH.

Polazna osnova za izradu Registra lijekova Bosne i Hercegovine je baza lijekova ALMBiH, zasnovana na dokumentaciji proizvođača/nosioca dozvole za lijek. Izdavač je uložio napor da na osnovu relevantnih izvora podataka, prije svega na osnovu regulatorne dokumentacije i indeksiranih priručnika, iznese tačne podatke i informacije u skladu sa savremenim saznanjima iz oblasti lijekova. Budući da su farmakoterapija i uvođenje novih lijekova u praksu veoma dinamične oblasti, koje se svakodnevno mijenjaju i unapređuju, izdavač savjetuje korisnicima konsultovanje i drugih naučnih i stručnih izvora informacija iz oblasti lijekova, jer je moguće da su neki podaci u međuvremenu promijenjeni. Takođe, ALMBiH posjeduje informacioni sistem, koji omogućava prisustvo poslednjih odobrenih informacija o lijeku (Sažetak glavnih karakteristika lijeka, SmPC i Uputstva za pacijenta, PIL) na internetskim stranicama zvanične web-prezentacije, www.almbih.gov.ba (<http://www.almbih.gov.ba/lijekovi/>).

Registar sadrži osnovne podatke o lijeku, kao i informacije o doziranju lijeka, dok je svrstavanje urađeno po aktuelnom izdanju ATC-klasifikacije lijekova sa težištem na internacionalnim nezaštićenim nazivima (INN), što je koncept klasifikacije koji je podržan od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), a za koji se opredjeljuju evropske zemlje, te se isti koristi u relevantnim međunarodnim istraživanjima o potrošnji

lijekova. Ovakav pristup omogućava sljedljivost podataka i informacija u oblasti poslovanja zdravstvenih ustanova i fondova, praćenje potrošnje lijekova, planiranje potreba i praćenje ostalih indikatora za unapređenje nacionalne politike lijekova.

Ovogodišnji Registar lijekova sadrži i Listu zabranjenih sredstava za 2026. godinu, koju po jedanaesti put objavljujemo u saradnji sa Agencijim za antidoping kontrolu BiH.

Registar lijekova će kao i prethodnih osam godina, biti dostupan samo u on-line izdanju, koje se može preuzeti na stranicama naše Agencije (<http://www.almbih.gov.ba/dokumenti/publikacije/>).

Nadamo se da će i ovaj Registar lijekova Bosne i Hercegovine predstavljati odgovarajuću stručnu pomoć u radu kako ljekarima, tako i farmaceutima i time doprinijeti ukupnoj zdravstvenoj zaštiti građana BiH.

AGENCIJA ZA LIJEKOVE
I MEDICINSKA SREDSTVA BIH

SADRŽAJ

Predgovor.....	3
Sadržaj.....	5
Režimi izdavanja i posebne oznake.....	6
Najčešće skraćenice.....	7
INDEKS.....	9
REGISTROVANI LIJEKOVI PREMA ATC-KLASIFIKACIJI	
Grupa A (Alimentarni trakt i metabolizam)	81
Grupa B (Krv i krvotvorni organi).....	133
Grupa C (Kardiovaskularni sistem).....	179
Grupa D (Koža i potkožno tkivo).....	247
Grupa G (Genitourinarni sistem i polni hormoni).....	263
Grupa H (Hormonski preparati za sistemsku primjenu, isključujući polne hormone i insuline).....	283
Grupa J (Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu).....	295
Grupa L (Antineoplastici i imunomodulatori).....	349
Grupa M (Mišićno-koštani sistem).....	411
Grupa N (Nervni sistem).....	433
Grupa P (Antiparazitici, insekticidi i repelenti).....	501
Grupa R (Respiratorni sistem).....	503
Grupa S (Senzorni organi).....	543
Grupa V (Ostalo).....	557
DODACI	
Homeopatski lijekovi – abecedni spisak.....	573
Spisak proizvođača i njihovih zastupnika sa lijekovima za koje su nosioci dozvole.....	575
Lista zabranjenih sredstava za 2026. god.....	663
Obrazac za prijavu sumnje na neželjenu reakciju lijeka.....	673

REŽIMI IZDAVANJA I POSEBNE OZNAKE*

BRp Lijek se izdaje bez recepta.

Rp Lijek se izdaje na recept.

ZU Lijek se izdaje na recept i primjenjuje se samo u zdravstvenoj ustanovi prilikom pružanja zdravstvenih usluga od strane zdravstvenog radnika.

ZU/Rp lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi prilikom pružanja zdravstvenih usluga od strane zdravstvenog radnika samo na početku liječenja, a u nastavku liječenja se može primjenjivati od strane korisnika lijeka ili njegovatelja/staratelja istog.

§ Opojna droga
 Psihotropna supstanca

Δ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (pažnja prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama).

▲ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama).

***Pravilnik o načinu i postupku razvrstavanja lijekova („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br.50/25)**

NAJČEŠĆE SKRAĆENICE

i.v.	intravenozno (intravenski)
i.m.	intramuskularno
s.c.	subkutano
inf.	infuzija
INN	internacionalni nezaštićeni naziv
ATC-klasifikacija	anatomsko-terapijsko-hemijska klasifikacija
DDD	definisana dnevna doza
SZO (WHO)	Svjetska zdravstvena organizacija
NSAIL	nesteroidni antiinflamatorni lijekovi
CNS	centralni nervni sistem
mg	miligram
g	gram
µg (mcg)	mikrogram
mmol	milimol
ml (mL)	mililitar
l (L)	litar
i.j.	internacionalna jedinica
A.j.	Armourova jedinica
HER2	Humani epidermalni faktor rasta – receptor 2
ER	Estrogen receptor

SKRAĆENICE ZA VAKCINE

DT	Toksoid difterije i toksoid tetanusa, adsorbovani (djeca)
Td	Toksoid difterije i toksoid tetanusa, adsorbovani (odrasli)
DTaP	Toksoid difterije i toksoid tetanusa i acelularni pertussis, adsorbovani
DTP	Toksoid difterije i toksoid tetanusa i cijela ćelija pertussis-a
DTP-Hib	Toksoid difterije i toksoid tetanusa i cijela ćelija pertussis-a i Haemophilus influenza tip b konjugovana vakcina
Tdap	Toksoid tetanusa, redukovani toksoid difterije i acelularni pertussis, adsorbovani
TT	Toksoid tetanusa
DTaP/Hib	Toksoid difterije i toksoid tetanusa i acelularni pertussis adsorbovani i Haemophilus influenza tip b konjugovana vakcina

Indeks

DTaP-HepB-IPV	Toksoid difterije i toksoid tetanusa i acelularni pertussis adsorbovani, hepatitis B i inaktivisani poliovirus
DTaP-IPV	Toksoid difterije i toksoid tetanusa i acelularni pertussis i inaktivisani poliovirus
DTaP-IPV/Hib	Toksoid difterije i toksoid tetanusa i acelularni pertussis adsorbovani, inaktivisani poliovirus i Haemophilus influenza tip b konjugovana vakcina
Hib	Haemophilus influenza tip b konjugovana vakcina
Hib-HepB	Haemophilus influenza tip b konjugovana i hepatitis B vakcina
HepA	Hepatitis A vakcina
HepB	Hepatitis B vakcina
HepA-HepB	Hepatitis A inaktivisani i Hepatitis B vakcina
HPV4	Humani papillomavirus vakcina (četvorovalentna)
HPV2	Humani papillomavirus vakcina (dvovalentna)
TIV	Trivalentna inaktivisana vakcina influence
LAIV	Živa atenuisana vakcina influence
M	Vakcina protiv rubeole (Measles)
MR	Vakcina protiv rubeole (Measles) i rubele (Rubella)
MMR	Vakcina protiv rubeole (Measles), zaušnjaka (Mumps) i rubele (Rubella)
MMRV	Vakcina protiv rubeole (Measles), zaušnjaka (Mumps), rubele (Rubella) i varičele (Varicella)
MCV4	Meningokokna konjugovana vakcina (četvorovalentna)
MPSV4	Meningokokna polisaharidna vakcina (četvorovalentna)
P	Pertussis
PCV7	Pneumokokna konjugovana vakcina (sedmovalentna)
PCV13	Pneumokokna konjugovana vakcina (trinaestovalentna)
IPV	Poliovirus vakcina (inaktivisana)
OPV	Poliovirus vakcina (živa)
R	Rubella vakcina
RV1	Rotavirus vakcina (monovalentna)
RV5	Rotavirus vakcina (petovalentna)
VAR	Varičela vakcina

Indeks

2,4-dihlorbenzil alkohol, amilmetakrezol, 512
 2,4-dihlorbenzil alkohol, amilmetakrezol, askorbinska kiselina, 513
 2,4-dihlorbenzil alkohol, amilmetakrezol, levomentol, 513
 2,4-dihlorbenzil alkohol, amilmetakrezol, lidokain, 512
 abakavir, dolutegravir, lamivudin, 336
 abakavir, lamivudin, 336
 ABASAGLAR - ELI LILLY EXPORT S.A., 108
 ABATIXENT - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 147
 ABELCET LIPID COMPLEX - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 328
 abemaciclib, 365
 ABEMOT - MEDOCHEMIE LTD, 100
 ABESINE - HETERO EUROPE S.L., 389
 ABEVMI - BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED, 377
 abirateron, 389
 ABIRATERON SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 389
 ABIRATERON STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG, 389
 ABIRATERONE ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O., 389
 ABIRATERONE PHARMASCIENCE - PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED, 389
 ABIREX - LABORATORIOS LICONSA S.A., 390
 ABIZOL - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 475
 ABOXOMA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 147
 abrocitinib, 260
 ABUXAR - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 429
 ACCOFIL - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O, 390
 ACEDOL - QUALIX PHARMA S.L., 414
 aceklofenak, 414
 acemetacin, 413
 acenokumarol, 133
 ACENOKUMAROL REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE, 133
 acetil salicilna kiselina, pseudoefedrin, 509
 acetilcistein, 530
 acetilsalicilna kiselina, 138, 442
 acetilsalicilna kiselina, askorbinska kiselina, 443
 acetilsalicilna kiselina, atorvastatin, ramipril, 243
 acetilsalicilna kiselina, klopidoogrel, 142
 acetilsalicilna kiselina, kofein, paracetamol, 442
 acetilsalicilna kiselina, rosuvastatin, 242
 ACICLOVIR ALTAN - ALTAN PHARMACEUTICALS S.A., 333
 aciklovir, 252, 332, 544
 ACIKLOVIR ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 544
 ACIKLOVIS - BALKANPHARMA-RAZGRAD AD, 544
 ACIPAN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 86
 ACLEXA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 421
 ACOPAIR - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 524
 ACTEMRA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 400
 ACTILYSE - BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO.KG, 142
 ACTINE - MSN LABS EUROPE LIMITED, 540

Indeks

ACTRAPID FLEXPEN - NOVO NORDISK A/S, 106
ACURMIL - LISAPHARMA SPA, 427
adalimumab, 397
adapalen, 259
adapalen, benzoil-peroksid, 259
ADCETRIS - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, 378
ADDAMO - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO, 276
ADENURIC 120 - BERLIN-CHEMIE AG, 429
ADENURIC 80 - BERLIN-CHEMIE AG, 429
adrenalin, 182
adrenalin (epinefrin), artikain, 437
adrenalin (epinefrin), lidokain, 437
ADRENALIN BRAWN - BRAWN LABORATORIES LIMITED, 182
ADVAGRAF 0,5 MG - ASTELLAS IRELAND CO. LTD, 403
ADVAGRAF 1 MG - ASTELLAS IRELAND CO. LTD, 403
ADVAGRAF 3 MG - ASTELLAS IRELAND CO. LTD, 403
ADVAGRAF 5 MG - ASTELLAS IRELAND CO. LTD, 403
AEROGAL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 539
aflibercept, 382, 553
AFLODERM - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 254
AFORBE - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 519
agalzidaza alfa, 129
agalzidaza beta, 129
AGILLAS - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 464
AGLIKEM - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 110
AGLIKEM XR - STADA ARZNEIMITTEL AG, 110
AGNIS - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 118
AIMAFIX - KEDRION S.P.A., 155
AIRBUFO FORSPIRO - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 519
AIRFLUSAL FORSPIRO - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 517
AJOVY - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 450
akalabrutinib, 367
AKINETON - LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T., 461
aklidinijum, 524
aklidinijum bromid, formoterol, 521
AKNET - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 259
AKNET DUO - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 259
AKSEF - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 305
aksitinib, 366
AKSITINIB TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 366
aktivni medicinski ugaj, 102
alanin, arginin, cistein, fenilalanin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin,
prolin, serin, treonin, triptofan, valin, 165
alanin, arginin, fenilalanin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin,
serin, taurin, tirozin, treonin, triptofan, valin, 165
alantoin, heparin, vodeni ekstrakt luka, 250
albumin, 164
ALBUMIN-BIOPHARMA - BIOPHARMA PLASMA LLC, 164
ALBUNORM 20% - OCTAPHARMA AG, 164
ALBUNORM 5% - OCTAPHARMA AG, 164
ALBUTEIN 200 G/L - INSTITUTO GRIFOLS S.A., 164
ALBUTEIN 50 G/L - INSTITUTO GRIFOLS S.A., 164

ALDACTONE - KERN PHARMA S.L., 191, 192
 ALDARA - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 253
 ALDIZEM - ALKALOID AD SKOPJE, 208
 ALDURAZYME - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 130
 ALECAST - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 527
 ALECENSA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 363
 alektinib, 363
 alemtuzumab, 406
 alendronska kiselina, 430
 alendronska kiselina, holekalciferol, 431
 ALERIX - BOSNALIJEK D.D., 538
 alfa pinen, anetol, beta pinen, borneol, cineol, fenhon, kamfen, 274
 alfa pinen, beta pinen, borneol, cineol, levomentol, kamfen, menton, 97
 ALFADOX - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 187
 ALFAZAN - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 131
 alglukozidaza alfa, 130
 alirokumab, 239
 ALKAFORMIN - ALKALOID AD SKOPJE, 110
 alklometazon, 254
 ALLEGRA - SANOFI-AVENTIS GROUPE, 538
 ALLERGODIL - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 505, 552
 ALMACIN - ALKALOID AD SKOPJE, 297
 ALMIK - SYNTHON B.V., 278
 alogliptin, 118
 alogliptin, metformin, 116
 alopurinol, 429
 ALOPURINOL BOSNALIJEK - BOSNALIJEK D.D., 429
 ALOPURINOL FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 429
 alpelisib, 367
 ALPINOL - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 205
 ALPINOL PLUS - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 219
 alprazolam, 479
 ALPROLIX - SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL), 154
 ALRINAST - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 539
 alteplaza, 142
 ALTIOKS - BOSNALIJEK D.D., 131
 ALTUXERIN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 117
 ALTUXERIN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 117
 ALTUXERIN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 116
 ALTUXERIN PLUS - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 114
 aluminijum magnezijum silikat, 82
 aluminijum-hidroksid, magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid, 83
 ALUNBRIG - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, 363
 ALVOBAC - XELLIA PHARMACEUTICALS APS, 325
 ALVODRONIC - PHARMATHEN S.A., 430
 ALVOLAMID T - PHARMATHEN S.A., 321
 ALYMSYS - GH GENHELIX S.A., 377
 ALZAM - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 480
 amantadin, 462
 AMARYL - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 113
 ambroksol, 532
 AMBROSAN - PRO.MED.CS PRAHA A.S., 532

Indeks

amfotericin B, 328
AMGEVITA - AMGEN (EUROPE) GMBH, 398
amikacin, 318
AMIKACIN GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 319
AMIKACIN SOPHARMA - SOPHARMA AD, 319
AMIKAN - ANFARM HELLAS S.A., 319
amilorid, hidrohlorotiazid, 194
aminofilin, 526
AMINOFILIN ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 526
AMINOFILIN BRAWN - BRAWN LABORATORIES LIMITED, 526
AMINOFILIN UNION - UNION-MEDIC DOO NOVI SAD, 526
aminokiseline, 166
aminokiseline, elektroliti, 168
aminokiseline, masti, glukoza, 167
AMINOL - BOSNALIJEK D.D., 200
AMINOPLASMAL B.BRAUN 10 % E - B.BRAUN MELSUNGEN AG, 168
AMINOSOL 10% - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 166
AMINOSOL 15% - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 166
AMINOSTERIL N-HEPA 8% - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 165
AMINOVEN 10% - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 165
amiodaron, 180
AMIODARON FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 181
AMIODARONE CLORIDRATO BIOINDUSTRIA LIM - BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P. A., 181
AMIOKORDIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 181
amitriptilin, 484
AMLESSA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 220
AMLESSANEO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 220
AMLEWEL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 222
AMLEWELNEO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 222
AMLODIL - BOSNALIJEK D.D., 205
amlodipin, 205
AMLODIPIN ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 205
AMLODIPIN FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 205
amlodipin, atorvastatin, 242
amlodipin, atorvastatin, perindopril, 244
amlodipin, bisoprolol, 204
amlodipin, hidrohlorotiazid, olmesartan medoksomil, 232
amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan, 232
amlodipin, indapamid, perindopril, 222
amlodipin, lizinopril, 219
amlodipin, olmesartan medoksomil, 231
amlodipin, perindopril, 219
amlodipin, perindopril, rosuvastatin, 244
amlodipin, ramipril, 221
amlodipin, valsartan, 231
AMLOPIN 10 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 205
AMLOPIN 5 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 205
AMLOPIN COMBO - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 221
AMLOPRESSIN - BOSNALIJEK D.D., 220
AMLOPRESSIN PLUS - BOSNALIJEK D.D., 222

AMOKLAVIN-BID - DEVA HOLDING A.S., 300
 AMOKLAVIN-BID 400/57 MG FORTE - DEVA HOLDING A.S., 300
 amoksicilin, 296
 AMOKSICILIN HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 297
 amoksicilin, klavulanska kiselina, 300
 AMOKSICILIN/KLAVULANSKA KISELINA APTAPharma - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O., 300
 AMOKSIKLAV SANDOZ 2X - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 301
 AMORA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 221
 amorolfin, 248
 AMOXIBOS - BOSNALIJEK D.D., 297
 AMOXICILLIN REMEDICA - REMEDICA LIMITED, 297
 AMOXIPLUS 1,2 G - ANTIBIOTICE S.A., 301
 AMPHOTERICIN B BHARAT - BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD., 328
 ampicilin, 296
 AMPICILIN ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 296
 ampicilin, sulbaktam, 299
 AMPICILIN/SULBAKTAM APTAPharma - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O., 300
 AMPICILLIN ANTIBIOTICE - ANTIBIOTICE S.A., 296
 AMPRIL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 213
 AMPRIL HD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 218
 AMPRIL HL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 218
 AMYZOL - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 484
 anagrelid, 382
 ANALGIN - ALKALOID AD SKOPJE, 443
 ANASTRAZE - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 388
 anastrozol, 388
 ANAXAL - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 480
 ANBOL CARDIO - FARMALIDER S.A., 138
 ANBOL CARDIO - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 138
 ANDESART - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 227
 ANDOL - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 442
 ANDOL 100 - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 138
 ANDOL C - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 443
 ANDOL GR 100 - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 138
 ANDOL GR 75 - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 138
 ANDROCUR - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 274
 ANGAL - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 511
 ANGAL S - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 511
 ANGINAL - BOSNALIJEK D.D., 183
 ANTARZA - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 473
 ANTAX - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 559
 anti-D (Rho) imunoglobulin, humani, 339
 ANTIZOLID - COOPER S.A., 327
 ANTROLIN - BIONIKA PHARMACEUTICALS D.O.O. SKOPLJE, 195
 ANZIBEL PASTILE SA OKUSOM MEDA I LIMUNA - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.S., 510
 ANZIBEL PASTILE SA OKUSOM MENTOLA - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.S., 510
 apalutamid, 387

Indeks

APPAURIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 477
APERTO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 279
APEXYR - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 147
APIDRA SOLOSTAR - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 107
apiksaban, 147
APIKSABAN ZADA - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 148
APIXA - BOSNALIJEK D.D., 148
APRAZOL - BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 89
APRIXA - SANECA PHARMACEUTICALS, 540
AQUA AD INIECTABILIA ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 563
AQUA BIDESE., 563
AQUIPTA - ABBVIE INC., 451
ARANESP - AMGEN (EUROPE) GMBH, 163
ARAVA - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 407
ARCHIFAR - MEDOCHEMIE LTD, 311
ARCOXIA - N.V. ORGANON, 422
AREMED - REMEDICA LIMITED, 388
ARGEDIN - BOSNALIJEK D.D., 252
aripiprazol, 474
ARIPREXA - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O., 475
ARIPRIZOL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 475
ARISTIN-C - ANFARM HELLAS S.A., 320
ARIXTRA - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 150
ARLEVERT - HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, 499
ARMISARTE - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 351
AROMASIN - PFIZER INC., 389
ARTEFLUMID - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 407
ARVIND - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 455
ARYTMIL - SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE `BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL
PHARMACEUTICAL PLANT` PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY, 181
ARYZALERA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 475
ASA ZADA - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 138
asciminib, 361
ASENTRA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 486
asfotaza alfa, 130
ASIRAX - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 333
ASKA PRO - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 138
askorbinska kiselina, 127
askorbinska kiselina, bakar, cijanokobalamin, cink, folna kiselina, fosfor, gvozdje
(II)-fumarat, holekalciferol, kalcijum-hidrogenfosfat, kalcijum-pantotenat,
magnezijum, mangan, molibden, nikotinamid, piridoksin, retinol, riboflavin,
tiamin, vitamin E, 123
askorbinska kiselina, deksantenol, holekalciferol, nikotinamid, piridoksin, retinol,
tiamin, vitamin B12, vitamin B2, 123
askorbinska kiselina, dekstrometorfan, paracetamol, pseudoefedrin, 509
askorbinska kiselina, fenilefrin, paracetamol, 509
askorbinska kiselina, feniramin, paracetamol, 535
askorbinska kiselina, folna kiselina, fosfor, holekalciferol, kalcijum-hidrogenfosfat,
kalcijum-pantotenat, nikotinamid, piridoksin, retinol, riboflavin, tiamin, vitamin
B12, 122
askorbinska kiselina, hlifenamin, kofein, paracetamol, 535
askorbinska kiselina, hlifenamin, paracetamol, 447

askorbinska kiselina, kalijum-hlorid, makrogol, natrijum sulfat, natrijum-askorbat, natrijum-hlorid, 99
 askorbinska kiselina, paracetamol, 446
 askorbinska kiselina, paracetamol, pseudoefedrin, 507
 askorbinska kiselina, tečni ekstrakt lista bokvice i cvijeta crnog sljeza, 533
 ASPIRIN - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 442
 ASPIRIN COMPLEX - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 509
 ASPIRIN PLUS C - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 443
 ASPIRIN PLUS C FORTE - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 443
 ASPIRIN PLUS C SA OKUSOM NARANČE - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 443
 ASPIRIN PROTECT 100 - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 138
 ATAXIL - DEVA HOLDING A.S., 355
 ATECTURA BREEZHALER - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 521
 atenolol, 200
 ATENOLOL REMEDICA - REMEDICA LIMITED, 200
 ATENZIO - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 225
 ATENZIO PLUS - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 229
 ATEROZ - BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 235
 atezolizumab, 376
 ATIXARSO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 141
 atogepant, 451
 ATOLIP - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 235
 ATORIS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 235
 ATORIS COMBI - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 240
 atorvastatin, 234
 ATORVASTATIN REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE, 235
 atorvastatin, ezetimib, 240
 ATORVOX - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 235
 ATORVOX - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 235
 atosiban, 267
 ATOSIBAN - BIONIKA PHARMACEUTICALS D.O.O. SKOPLJE, 267
 ATOSIBAN - BIONIKA PHARMACEUTICALS D.O.O. SKOPLJE, 267
 ATRACURIUM KALCEKS - AS KALCEKS, 427
 atrakurijum besilat, 427
 ATRASYL - PHARMADA ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 427
 ATREMIA - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 382
 atropin, 93
 ATROPIN SOPHARMA - SOPHARMA AD, 93
 atropin sulfuricum trit. D5, kalium bichromicum trit. D4, hepar sulfuris trit. D3, silicea trit. D2, mercurius bijodatus trit. D8, 574
 ATROPINA SOLFATO BIOINDUSTRIA L.I.M. 1 MG/ML - BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P A., 94
 ATROVENT - BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO.KG, 523
 ATRUS ARVOHALER - ARVEN ILAC SAN. VE TIC.A.S., 524
 ATTERA - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO, 137
 AUBAGIO - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 407
 AUGMENTIN - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 301
 AVADIL - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 527
 AVAMYS - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 506
 AVARICON - PHARMANOVA D.O.O., 197
 AVASTA - ALKALOID AD SKOPJE, 235
 AVASTA PLUS - ALKALOID AD SKOPJE, 241

Indeks

AVASTIN - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 377
avelumab, 376
avibaktam, ceftazidim, 310
AVIOMARIN - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 536
AVODART - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 281
AVOMIT - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 388
AVONEX - BIOGEN INTERNATIONAL GMBH, 391
AXEBAN - MSN LABS EUROPE LIMITED, 148
AXITINIB STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG, 366
AXONIN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 557
azacitidin, 353
AZACITIDIN MYLAN - MYLAN GERMANY GMBH, 353
AZACITIDIN STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG, 353
AZACITIDINE ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O., 353
AZARAN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 308
AZARGA - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG,, 550
azatioprin, 407
AZAX - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 316
azelastin, 505, 552
azelastin, flutikazon, 506
AZIBIOT - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 316
AZID - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 316
AZINOCIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 316
AZITRO - DEVA HOLDING A.S., 316
azitromicin, 315
AZOMEX - BOSNALIJEK D.D., 316
AZOMICIN - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 316
AZOPT - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 548
azot suboksid, 434
AZOT SUBOKSID MESSER - MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD, 435
bacitracin, neomicin, 251, 543
BACTRIM - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 313
BAGEDA - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ş., 393
bakar-glukonat, gvožđe-glukonat hidrat, mangan-glukonat, 160
baklofen, 428
BALANCE 1,5 % GLUKOZE 1,25 MMOL/L KALCIJA - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, 174
BALANCE 1,5 % GLUKOZE 1,75 MMOL/L KALCIJA - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, 174
BALANCE 2,3 % GLUKOZE 1,25 MMOL/L KALCIJA - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, 174
BALANCE 2,3% GLUKOZE 1,75 MMOL/L KALCIJA - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, 174
BALANCE 4,25 % GLUKOZE 1,25 MMOL/L KALCIJA - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, 174
baloksavir marboksil, 337
BANEOCIN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 251
BANXIOL - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 148
BARCA SR - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 413
BARIOS - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 202

BAVENCIO - MERCK HEALTHCARE KGAA, 376
 BAZETHAM - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 279
 BCG vakcina, 392
 B-COMPLEX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 126
 BEDOXIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 127
 beklometazon, 522
 beklometazon, formoterol, 519
 beklometazon, formoterol, glikopironijum bromid, 521
 BELEPTIC - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 459
 BELODERM - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 254
 BELODIN - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 538
 BELOGENT - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 255
 BELOSALIC - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 256
 bendamustin, 350
 BENEFIT - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 236
 BENEFIX - PFIZER INC., 155
 benfotiamin, piridoksin, 126
 BENSEDIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 478
 benzerazid, levodopa, 461
 benzydamin, 81, 423, 515
 benzydamin, cetilpiridin, 511, 514
 benzil-nikotinat, kamfor, mentol, metil-salicilat, 425
 benzilpenicilin-kalijum, benzilpenicilin-prokain, 298
 benzilpenicilin-natrijum, benzilpenicilin-prokain, 299
 benzoil-peroksid, klindamicin, 259
 benzokain, enoksolon, hlorkheksidin, 510
 BEOVU - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 553
 BEPANTHEN PLUS - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 257
 BERLITHION - BERLIN-CHEMIE AG, 131
 BERLITHION 600 ED - BERLIN-CHEMIE AG, 131
 berotralstat, 177
 BETADINE - ALKALOID AD SKOPJE, 258, 265, 511
 BETAFFERON - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 392
 betahistin, 498
 BETAKLAV - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 301
 betaksolol, 549
 betametazon, 254, 286
 betametazon, gentamicin, 255
 betametazon, gentamicin, klotrimazol, 256
 betametazon, salicilna kiselina, 256
 BETASERC - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 498
 BETAZON - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 254
 BETHAGEN - BOSNALIJEK D.D., 256
 BETHANAT - BOSNALIJEK D.D., 254
 BETHASAL - BOSNALIJEK D.D., 256
 BETIDEN GEL - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 250
 BETOPTIC S - IMMEDICA PHARMA AB, 549
 BETRION - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 252
 bevacizumab, 377
 BEVIPLEX - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 127
 BEZIDIN - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 81
 BICAPROST - SYNTHON B.V., 387

Indeks

bifonazol, 248
bikalutamid, 387
BIKALUTAMID PLIVA 50 MG - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 387
BIKALUTAMID SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 387
bilastin, 540
BILEXIN - BOSNALIJEK D.D., 97
BILOBIL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 495
BILOBIL FORTE - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 495
BILOBIL INTENSE 120 MG - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 495
BIMANOX - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 548
BINOCRIT - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 162
BIOCETAM - BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., 491
BIOVEN - BIOPHARMA PLASMA LLC, 339
BIOVEN MONO - BIOPHARMA PLASMA LLC, 339
biperiden, 460
BIPRESSO - ALKALOID AD SKOPJE, 200
bisakodil, 98
BISOCOR - KWIZDA PHARMA GMBH, 200
BISOLEX - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 531
BISOLEX F - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 532
BISOLVON - SANOFI-AVENTIS GROUPE, 532
bisoprolol, 200
BISOPROLOL GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 201
BISOPROLOL HF - STADA ARZNEIMITTEL AG, 201
bisoprolol, perindopril, 223
bisoprolol, ramipril, 223
BIVACYN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 251
bizmut subcitrat, 91
BLASTOMAT - EIRGEN PHARMA LIMITED, 350
BLISSERIGO - ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., 277
BLOCETTA - PHARMAS D.O.O., 519
BLOCOR - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 201
BLOKMAX - ALKALOID AD SKOPJE, 415, 424
BLOKMAX DUO - ALKALOID AD SKOPJE, 446
BLOKMAX FORTE - ALKALOID AD SKOPJE, 416
BLOKMAX FORTE ZA DJECU - ALKALOID AD SKOPJE, 416
BLOKMAX RAPID - ALKALOID AD SKOPJE, 416
BLOKMAX ZA DJECU - ALKALOID AD SKOPJE, 416
BLOXAN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 199
BOCOUTURE - MERZ PHARMACEUTICALS GMBH, 428
BOLEX - BOSNALIJEK D.D., 419
BOLEX FORTE - BOSNALIJEK D.D., 419
BONDRONAT - ATNAHS PHARMA DENMARK APS, 430
BONVIVA - ATNAHS PHARMA DENMARK APS, 430
BORTEGAZ - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 381
bortezomib, 381
BORTEZOMIB ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O., 381
BORTEZOMIB PHARMAS - SYNTHON B.V., 381
BORTEZOMIB PLIVA - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 381
BORTEZOMIB STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG, 381
BORTEZOMIB VENUS - VENUS PHARMA GMBH, 381
BOSAUIN - BOSNALIJEK D.D., 478
bosentan, 188

BOSENTAN PHARMASCIENCE - PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED, 188
BOSNYL - BOSNALIJEK D.D., 472
BOSPYRIN - BOSNALIJEK D.D., 138
BOSPYRIN PROTECT - BOSNALIJEK D.D., 139
BOSTROMBIN - BOSNALIJEK D.D., 196
BOSULIF - PFIZER INC., 360
bosutinib, 360, 380
BOSUTINIB MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED, 380
BOSUTINIB TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 361
botulinski toksin, 427
BRALTUS - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 524
BRAMITOB - CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH, 318
brentuksimab vedotin, 378
BREQUAL - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 517
BRETARIS GENUAIR - BERLIN-CHEMIE AG, 524
brigatinib, 363
BRIMICA GENUAIR - BERLIN-CHEMIE AG, 521
brimonidin, 547
brimonidin, brinzolamid, 548
brinzolamid, 548
brinzolamid, timolol, 550
BRINZOVIS - PHARMAVISION EUROPE LTD., 548
BRINZUNO - PHARMATHEN S.A., 548
brivaracetam, 460
BRIVAX - STADA ARZNEIMITTEL AG, 460
brolucizumab, 553
bromazepam, 479
BROMAZEPAM HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 479
bromheksin, 531
bromokriptin, 266, 462
BROMOKRIPTIN ZDRAVLJE - ZDRAVLJE AD LESKOVAC, 267, 462
BRONCHOBOS - BOSNALIJEK D.D., 532
BRONCHOSTOP PASTILE PROTIV KAŠLJA - KWIZDA PHARMA GMBH, 529
BRONCHOSTOP SINE SIRUP PROTIV KAŠLJA - KWIZDA PHARMA GMBH, 529
BRONCHOSTOP SIRUP PROTIV KAŠLJA - KWIZDA PHARMA GMBH, 529
BRONCHOSTOP SPREJ ZA USNU SLUZNICU - KWIZDA PHARMA GMBH, 82
BRONHOKLIR SIRUPI BRŠLJAN - HEMOFARM A.D. VRŠAC, HEMOFARM A.D. VRŠAC, OGRANAK POGON ŠABAC, HAJDUK VELJKOVA BB, 15000 ŠABAC, 530
BRONLES - ALKALOID AD SKOPJE, 532
BRONTIO - DEVA HOLDING A.S., 524
BRUFEN - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 416
BRUFEN EFFECT - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 416
BRUFEN EFFECT DUO - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 446
BRUFEN EFFECT RAPID - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 416
BRUFEN SR - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 416
bryonia trit. D2, gelsemium trit. D3, aconitum trit. D3, ipecacuanha trit. D3, eupatorium perfoliatum trit. D1, phosporus trit. D5, 573
BUDEKORT - STADA ARZNEIMITTEL AG, 522
BUDELIN NOVOLIZER - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 522
budesonid, 102, 522
budesonid, formoterol, 519

Indeks

BUDOSAN - DR FALK PHARMA GMBH, 103
BULAREN 250 MG - ABELA PHARM D.O.O. BEOGRAD, 105
BULNEXO - ALKALOID AD SKOPJE, 498
buprenorfin, 439, 497
BUPRENORFIN / NALOKSON MYLAN - MYLAN GERMANY GMBH, 498
BUPRENORFIN ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 497
buprenorfin, nalokson, 498
bupropion, 488
burosumab, 431
BUSCOLYSIN - SOPHARMA AD, 94
BUSCOPAN - SANOFI-AVENTIS GROUPE, 94
busulfan, 350
BUSULFAN FRESENIUS KABI - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 350
butamirat, 534
butilskopolamin, 94
butilskopolamin, paracetamol, 94
BYOL - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 201
CABAZITAXEL MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED, 356
CAFFEBOL - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 446
CAFFETIN - ALKALOID AD SKOPJE, 448
CAFFETIN COLD - ALKALOID AD SKOPJE, 509
CAFFETIN COLDMAX - ALKALOID AD SKOPJE, 510
CAFFETIN MENSTRUAL - ALKALOID AD SKOPJE, 416
CALGEL - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 437
CALIXTA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 488
CALMESAN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 536
CALQUENCE - ASTRAZENECA AB, 367
CANESPOR - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 248
CANESTEN - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 247
CANESTEN 1 - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 264
CANESTEN 3 - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 264
CAPD/DPCA 3 STAY SAFE - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, 174
CAPD/DPCA 17 STAY SAFE - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, 174
CAPD/DPCA 19 STAY SAFE - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, 174
CAPD/DPCA 2 SLEEP SAFE - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, 174
CAPD/DPCA 2 STAY SAFE - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, 174
CAPD/DPCA 4 SLEEP SAFE - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, 175
CAPD/DPCA 4 STAY SAFE - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, 175
CAPECITABINE ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O, 352
CARBAMAZEPINE REMEDICA RETARD - REMEDICA LIMITED, 452
CARBOMED - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 102
CARBONATIN - NANO FANAVARAN DAROUEI ALVAND (NANOALVAND), 379
CARBOPLASIN - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 380
CARBOPLATIN ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O, 380
CARBOPLATIN PFIZER - PFIZER INC., 380
CARDIOL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 201

CARDIOPIRIN GR - ICN POLFA RZESZOW S.A., 139
cardiospermum, galfimia glauca dil. D3, luffa operculata D4 trit., 573
CARSIL - SOPHARMA AD, 98
CARVELOL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 203
CASPOFUNGIN ANFARM - ANFARM HELLAS S.A., 332
CEBOPIM - SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE `BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL PHARMACEUTICAL PLANT` PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY, 310
CEFACLOR ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 306
cefaklor, 306
CEFAKS - DEVA HOLDING A.S., 305
cefaleksin, 303
CEFALEKSIN HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 303
CEFALEXIN ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 303
CEFALEXIN REMEDICA - REMEDICA LIMITED, 303
CEFAPAN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 308
cefazolin, 303
CEFAZOLIN QILU - QILU PHARMA SPAIN SL, 304
CEFAZOLIN REYOUNG - REYOUNG PHARMACEUTICAL CO. LTD., 304
CEFAZOLIN-BCPP - SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE `BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL PHARMACEUTICAL PLANT` PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY, 304
CEFDIA - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 308
cefepim, 310
CEFEPIM HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 310
CEFEPIM QILU - QILU PHARMA SPAIN SL, 310
cefiksim, 308
cefotaksim, 306
CEFOTAKSIM APTAPHARMA - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O., 306
CEFOTAKSIM APTAPHARMA - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O., 306
cefopodoksim, 309
CEFPODOXIM SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 309
CEFRIDEM - PHARMADA ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 308
ceftazidim, 306
CEFTAZIDIM APTAPHARMA - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O., 307
ceftolozan, tazobaktam, 313
ceftriakson, 307
CEFTRIAKSON APTAPHARMA - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O., 308
CEFTRIAKSON PONTUS - VENUS PHARMA GMBH, 308
CEFTRIAXONE QILU - QILU PHARMA SPAIN SL, 308
CEFTRIAXONE-BCPP - SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE `BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL PHARMACEUTICAL PLANT` PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY, 308
cefuroksim, 304
CEFUROKSIM APTAPHARMA - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O., 305
CEFUROXIME-BCPP - SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE `BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL PHARMACEUTICAL PLANT` PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY, 305
CEJEMLY - MANUFACTURING PACKAGING FARMACA (MPF) B.V., 377
celekoksib, 421
CENOMAR - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 322
CEREBROLYSIN - EVER NEURO PHARMA GMBH, 499

Indeks

CEREBRYL - KWIZDA PHARMA GMBH, 492
CERENORM - BIOFARM SP. Z.O.O., 492
CEREZYME - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 129
CERSON - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 481
cetilpiridin, 514
cetilpiridin, lidokain, 436
cetilpiridin, lidokain, lizozim, 510
cetilpiridin, lizozim, 510
cetirizin, 537
CETRAXAL - LABORATORIOS SALVAT, S.A., 554
CETRAXAL PLUS - LABORATORIOS SALVAT, S.A., 554
cetoreliks, 286
CETROTIDE - MERCK HEALTHCARE KGAA, 286
cetuksimab, 375
CHLORAMPHENICOL ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 543
CHLORAMPHENICOL GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 543
CHLORPROMAZINE REMEDICA - REMEDICA LIMITED, 465
CHOLIPAM - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 234
CIALIS - ELI LILLY EXPORT S.A., 277
CIBINQO - PFIZER INC., 261
CIFLOX - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 320
CIFLOXINAL - PRO.MED.CS PRAHA A.S., 320
cijanokobalamin, 160
cijanokobalamin, kalcijum-pantotenat, nikotinamid, piridoksin, riboflavin, tiamin, 126
cijanokobalamin, kalcijum-pantotenat, nikotinamid, piridoksin, tiamin, vitamini B-kompleksa, 127
cijanokobalamin, lidokain, piridoksin, tiamin, 125
cijanokobalamin, piridoksin, tiamin, 126
ciklofosfamid, 349
ciklosporin, 402, 554
cilastatin, imipenem, 312
cilastatin, imipenem, relebaktam, 312
CILOSTA - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 140
cilostazol, 140
CINACALCET ACCORDPHARMA - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O., 292
cinarizin, 499
cinarizin, piracetam, 491
CINEDIL - ALKALOID AD SKOPJE, 499
cineol, 530
cinhokain, polikrezulen, 195
cinnabaris trit. D3, Echinacea trit. D1, hydrastis trit. D3, kalium bichromaticum trit. D3, 574
CINNABSIN - DR. GUSTAV KLEIN GMBH&CO. KG, 574
CIPRINOL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 320
ciprofloksacin, 319, 544, 554, 555
CIPROFLOKSACIN REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE, 320
ciprofloksacin, fluocinolon acetamid, 554
CIPROFLOXACIN BIOFARMA - BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., 320
CIPROFLOXACINA BIOINDUSTRIA L.I.M. - BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P A., 320
CIPROL - BOSNALIJEK D.D., 320
ciproteron, 273

ciproteron, etinilestradiol, 274
 CIPROZAD - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 320
 cisplatin, 379
 CISPLATIN SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 379
 CISPLATINUM ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O., 379
 CITALEA - BOSNALIJEK D.D., 487
 CITERAL - ALKALOID AD SKOPJE, 320, 555
 CITRALES - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
 BANJA LUKA, 487
 CITRAM - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 487
 CLARISCAN - GE HEALTHCARE AS, 568
 CLEXANE - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 135
 CLINDAMYCIN ANFARM - ANFARM HELLAS S.A., 317
 CLODIL - BOSNALIJEK D.D., 137
 CLOPIGAL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 137
 CLOZAPIN SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 469
 CLOZAPINE REMEDICA - REMEDICA LIMITED, 469
 CODEINI PHOSPHATIS ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 534
 CO-DIOVAN - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 229
 CO-IRDA - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., 229
 COLISTIN ALTAN - ALTAN PHARMACEUTICALS S.A., 325
 COLISTIN ALTAN - ALTAN PHARMACEUTICALS S.A., 325
 COLOSPA RETARD - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 92
 COLUMVI - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 379
 COMBIVIR - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 336
 COMBOGESIC - AFT PHARMACEUTICALS LIMITED, 446
 CONCOR - MERCK HEALTHCARE KGAA, 201
 CONCOR COR - MERCK HEALTHCARE KGAA, 201
 CONTRACTUBEX - MERZ PHARMACEUTICALS GMBH, 250
 CONTRALOC - TAKEDA GMBH, 86
 COPAXONE - TEVA PHARMACEUTICAL EUROPE B.V., 392
 CORDARONE - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 181
 CORIVA - ABDI İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 524
 CORNELIN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
 BANJA LUKA, 207
 CORNEPRIL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
 BANJA LUKA, 219
 CORNILAT - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 183
 CORONIS - BILIM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., 203
 CORRIGO - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 202
 CORTAIR - VEM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 522
 CORTEF - PFIZER INC., 290
 CORTIAZEM RETARD - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 208
 CORTIMENT MMX - COSMO S.P.A., 103
 CORVITOL 100 - BERLIN-CHEMIE AG, 199
 CORVITOL 50 - BERLIN-CHEMIE AG, 199
 CORYOL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 203
 COSENTYX - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 401
 COSOPT - SANTEN OY, 549
 COSYREL - LES LABORATOIRES SERVIER, 223
 COTELLIC - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 364
 CRESEMBA - PFIZER INC., 331

Indeks

CRICEA - ALKALOID AD SKOPJE, 268
CRINONE - MERCK HEALTHCARE KGAA, 270
crizotinib, 362
CRUSIA 10000 IU (100 MG)/1 ML RASTVOR ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ ŠPRICI
- ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A., 135
CRUSIA 2000 IU (20 MG)/0,2 ML RASTVOR ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ ŠPRICI
- ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A., 135
CRUSIA 4000 IU (40 MG)/0,4 ML RASTVOR ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ ŠPRICI
- ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A., 135
CRUSIA 6000 IU (60 MG)/0,6 ML RASTVOR ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ ŠPRICI
- ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A., 135
CRUSIA 8000 IU (80 MG)/0,8 ML RASTVORA ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ ŠPRICI
- ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A., 135
CRYPINEO - ALKALOID AD SKOPJE, 268
CRYSVITA - KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V., 432
CULENTO - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ş., 527
CUROSURF - CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH, 541
CUTAQUIG - OCTAPHARMA AG, 338
CUTIBEL - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 255
dabigatran eteksilat, 143
DABIGATRAN MYLAN - MYLAN GERMANY GMBH, 143
dabrafenib, 362
DAFEN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 416
DAFORBIS - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 120
DAGRAFORS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 120
DAKTANOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 81, 101, 247
DALACIN C - PFIZER LUXEMBOURG SARL, 317
DALERON - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 444
DALSÝ - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 416
dalteparin, 134
DAMAR - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 461
DAMATON - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 194
damoktokog alfa pegol, 152
dapagliflozin, 120
dapagliflozin, metformin, 116
DAPALIF - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 121
daratumumab, 373
darbepoetin alfa, 163
DAROB MITE - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 199
darolutamid, 387
DARSTIN - SEID.S.A., 270
DARZALEX - JANSSEN-CILAG KFT., 373
dasatinib, 358
DASSELTA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 539
DATUST - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 281
DATUST DUO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 280
DECAPEPTYL - FERRING PHARMACEUTICALS BV, 386
DECAPEPTYL DEPOT - FERRING PHARMACEUTICALS BV, 386
DEEP HEAT RUB - THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED, 425
DEEP RELIEF - THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED, 426
deferasiroks, 557

DEFERASIROKS PLIVA - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 558
 DEFEVIX - BERLIN-CHEMIE AG, 125
 DEFRINOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 507
 DEFRINOL DUO - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 507
 DEFRINOL FORTE - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 507
 DEGASTROL - DEVA HOLDING A.S., 89
 DEKENOR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 420
 DEKSALGIN - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 420, 425
 deksametazon, 287, 545
 deksametazon, neomicin, 546, 556
 deksametazon, neomicin, polimiksin B, 547
 deksametazon, neomicin, polimiksin B sulfat, 546
 deksametazon, tobramicin, 547
 deksketoprofen, 420, 425
 deksketoprofen, tramadol, 441
 deksmedetomidin, 483
 DEKSMEDETOMIDIN EVER PHARMA - EVER VALINJECT GMBH, 484
 DEKSMEDETOMIDIN PHARMIDEA - PHARMIDEA SIA, 484
 DEKSMEDETOMIDINE KALCEKS - AS KALCEKS, 484
 dekspantenol, 250
 dekspantenol, dimetilsulfoksid, heparin, 196
 dekspantenol, heparin, 196
 dekspantenol, hlorheksidin, 257
 dekspantenol, ksilometazolin, 505
 dekstrometorfan, hlorfenamin, paracetamol, pseudoefedrin, 508
 DELOR - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 539
 DELSTRIGO - MERCK SHARP & DOHME BV., 337
 DEMAX - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 494
 DEMEPRAZOL - DEVA HOLDING A.S., 85
 DEMOXIF 0,5% - DEVA HOLDING A.S., 544
 DEMROSE - PHARMADA ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 159, 160
 denosumab, 431
 DENTASTAZIN - LABORATORIOS NORMON S.A., 437
 DENZIL - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 493
 DEPAKINE - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 453
 DEPAKINE CHRONO 300 - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 454
 DEPAKINE CHRONO 500 - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 454
 DEPO MEDROL - PFIZER INC., 288
 DEPORES 0.05% - DEVA HOLDING A.S., 554
 DERMIFIN - FARMA-TEK ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 249
 DERMOVATE - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 255
 desloratadin, 539
 destilat mješavine pročišćenih eteričnih ulja eukaliptusa, slatke naranče, mirte i limuna, 528
 DETRALEX - LES LABORATOIRES SERVIER, 198
 DEVAPEN - DEVA HOLDING A.S., 299
 DEVIT-3 - DEVA HOLDING A.S., 124
 DEVOXICAM - DEVA HOLDING A.S., 414
 DEXAMETHASON KRKA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 287
 DEXAMETHASON-NEOMYCIN GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 556
 DEXASON - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 288
 DEXIREN - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 420

Indeks

DEXKETOPROFEN KALCEKS - AS KALCEKS, 420
DEXOMEN 25 - BERLIN-CHEMIE AG, 420
DEXOMEN INJECT - BERLIN-CHEMIE AG, 420
dezmopresin, 284
DIABOS - BOSNALIJEK D.D., 112
DIAMELL - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 113
DIAMOND - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 188
DIANE 35 - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 274
DIANEAL PD4 - VANTIVE GMBH, 175
DIASEV - SYNTHON HISPANIA S.L., 559
diazepam, 477
DIAZEPAM ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 478
DIAZEPAM HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA
D.O.O. BANJA LUKA, 478
DIBASE 1.000 I.J. - ABIOTEN PHARMA S.P.A., 124
DIBASE 2.000 I.J. - ABIOTEN PHARMA S.P.A., 124
DIBASE 25.000 I.J. - ABIOTEN PHARMA S.P.A., 124
DIBASE 6.000 I.J. - ABIOTEN PHARMA S.P.A., 124
DICLAC 5% - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 424
DICLOFENAC PHARMASWISS - PHARMASWISS D.O.O., 412
DICLORAPID - PHARMASWISS D.O.O., 412
DICYNONE - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 157
DIDERMAL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 256
didrogesteron, 270
dienogest, estradiol, 268
DIFEN - BOSNALIJEK D.D., 412, 424
DIFLUCAN - PFIZER LUXEMBOURG SARL, 329
diflukortolon, izokonazol, 248
digoksin, 179
DIGOXIN SOPHARMA - SOPHARMA AD, 179
DIKLOFEN - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 412, 424
diklofenak, 411, 424, 545
DIKLOFENAK HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA
D.O.O. BANJA LUKA, 412
diklofenak, orfenadrin, 414
DIKLORON - DEVA HOLDING A.S., 412, 424
DIKLOVIS - S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L., 546
DILATREND - BOSNALIJEK D.D., 203
DILCORAN 80 - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 183
diltiazem, 208
DILVAS - NOUCOR HEALTH, S.A., 140
dimenhidrinat, 499, 536
DIMETEX - ADALVO LIMITED, 410
DIMETEX - ADALVO LIMITED, 410
dimetil fumarat, 410
DIMETILFUMARAT MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED, 410
DIMETILFUMARAT TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 410
DIMETILFUMARAT TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 410
dimetinden, 250, 536
DIMIGAL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 536
DIMTRUZIC - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 410
DINAMICO - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 276
dinoproston, 266

diosmin, 197
diosmin, hesperidin, 197
DIOVAN - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 225
dipiridamol, 139
DIPRESAN - BOSNALIJEK D.D., 485
DIPROGENTA - N.V. ORGANON, 256
DIUNORM - SLAVIAMED D.O.O. BEOGRAD, 189
dobutamin, 182
DOBUTAMINE PANPHARMA - PANPHARMA S.A., 182
DOCEKAR-80 - SAKAR HEALTHCARE LTD, 355
docetaksel, 355
DOCETAXEL ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O, 355
DOCETAXEL SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 356
DOCETAXEL VENUS - VENUS PHARMA GMBH, 356
doksazosin, 187
doksiciklin, 295
DOKSICIKLIN HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA
D.O.O. BANJA LUKA, 295
doksilamin, 536
doksorubicin, 357
DOLAP - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 215
DOLGIT GEL - DOLORGIET GMBH & CO. KG, 424
DOLGIT KREMA - DOLORGIET GMBH & CO. KG, 424
DOLISTA - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 117
DOLISTA DUO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA
D.O.O. BANJA LUKA, 114
DOLNADA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 439
DOLOKAIN GEL - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 436
DOLOREX - BOSNALIJEK D.D., 420, 425
DOLOXIB - ZENTIVA, K.S., 422
DOLPIRINN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 419
dolutegravir, 335
dolutegravir, lamivudin, 337
domperidon, 95
donepezil, 492
donepezil, memantin, 493
dopamin, 181
DOPAMINE S.A.L.F. - S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO, 181
doravirin, 334
doravirin, lamivudin, tenofovir disoproksil, 337
DORETA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 440
dornaza alfa, 533
DORTIMOL - DEVA HOLDING A.S., 550
DORZOL - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 548
dorzolamid, 548
dorzolamid, timolol, 549
DORZOVIS COMBO - PHARMAVISION EUROPE LTD., 550
DOTAGRAF - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT, 568
DOTAREM - GUERBET, 568
DOTRAX - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO, 440

Indeks

DOVATO - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 337
DOVICIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 295
DOXAT - BOSNALIJEK D.D., 187
DOXORUBICIN PLIVA 2 MG/ML - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 357
DOXORUBICIN SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 357
DOXTADIN - DEVA HOLDING A.S., 539
DOXYCYCLINE REMEDICA - REMEDICA LIMITED, 295
DOZYL EASY - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 493
DRAMINA - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 536
DROKSIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 493
drospirenon, etinilestradiol, 267
dulaglutid, 119
DULCOLAX - SANOFI-AVENTIS GROUPE, 99
duloksetin, 489
DULSEVIA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 490
DUOCLAV - BOSNALIJEK D.D., 301
DUODART - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 280
DUONASE - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 506
DUOPLAVIN - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 142
DUORESP SPIROMAX - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 519
DUOTIN - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 490
DUOTRAV - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 550
DUOVIT - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 123
DUPHASTON - THERAMEX HQ UK LIMITED, 271
DUROGESIC - JANSSEN-CILAG KFT., 439
durvalumab, 376
DUSKONAL - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ş., 92
DUSTER - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 281
DUSTER DUO - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 280
DUTAMERA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 280
DUTAPROST - LABORATORIOS LEON FARMA S.A., 281
DUTAPROST COMBO - LABORATORIOS LEON FARMA S.A., 280
dutasterid, 281
dutasterid, tamsulosin, 280
DUTRYS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 281
DUXET - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 490
DYMISTA - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 506
EBETREXAT - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 351
ECANSYA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 353
EDEMID - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 190
EDEMID FORTE - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 190
EDICIN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 323
edoksaban, 148
EFLORAN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 326
efmoroktokog alfa, 151
eftrenonakog alfa, 154
EGLONYL - ALKALOID AD SKOPJE, 472
EGLONYL FORTE - ALKALOID AD SKOPJE, 472
EKSABAN - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 149
eksemestan, 388
ekstrakt ploda testeraste palme, 282
ELANIX - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 239
ELANIX COMBO - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 241

ELAPRASE - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, IRELAND
 BRANCH, 130
 ELICEA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 487
 ELIDEL - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 260
 ELIGARD - RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA & FARMACEUTICA S.P.A, 384
 ELIQUIS - PFIZER INC., 148
 ELISKARDIA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 140
 ELLAONE - LABORATOIRE HRA PHARMA, 268
 ELMASTAN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
 BANJA LUKA, 144
 ELMOPAG - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 158
 ELOCOM - N.V. ORGANON, 255
 ELOCTA - SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL), 151
 elranatamab, 379
 ELREXFIO - PFIZER INC., 379
 eltrombopag, 157
 ELTROMBOPAG MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED, 158
 ELYES - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 148
 EMANERA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 90
 EMFER - BIEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 160
 emicizumab, 158
 EMOCLOT - KEDRION S.P.A., 153
 empagliflozin, 121
 EMRAD - BIEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 564
 emtricitabin, rilipirin, tenofovir disoproksil, 336
 emtricitabin, tenofovir disoproksil, 336
 ENAGAL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 390
 enalapril, 209
 ENALAPRIL HCT SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 215
 ENALAPRIL SANDOZ 10 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 209
 ENALAPRIL SANDOZ 20 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 209
 enalapril, hidrohlorotiazid, 215
 enalapril, lerkandipin, 219
 ENAP - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 209
 ENAP-H - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 215
 ENAP-HL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 216
 ENAP-HL 20 - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 216
 ENAZIL 10 MG - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 210
 ENAZIL 20 MG - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 210
 ENAZIL 5 MG - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 210
 ENBECIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 544
 ENBREL - PFIZER INC., 396
 ENDOXAN - BAXTER AG, 349
 ENERZAIR BREEZHALER - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 522
 ENGERIX B ZA DJECU - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 344
 ENGERIX B ZA ODRASLE - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 344
 ENKORTEN - BOSNALIJEK D.D., 392
 enoksaparin, 134
 ENOX - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 213
 ENOXAPARIN LEDRAXEN - VENIPHARM S.A.S., 135
 ENSPRYNG - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 402
 entekavir, 334

Indeks

ENTEROFURYL - BOSNALIJEK D.D., 101
ENTEROFURYL STOP - BOSNALIJEK D.D., 101
ENTEROL - BIOCOCODEX, 105
ENTEVIEM - REMEDICA LIMITED, 334
ENTIX - LABORATORIOS BASI-INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., 190
entrectinib, 371
ENTYVIO - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, 406
enzalutamid, 387
ENZALUTAMID STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG, 387
ENZULID - ADALVO LIMITED, 387
EPCLUSA - GILEAD SCIENCES IRELAND UC, 335
EPILEM - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 457
EPIRON - BOSNALIJEK D.D., 459
epirubicin, 357
EPIRUBICIN SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 358
EPIXX - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 457
EPIXX - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 457
EPLECOR - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO, 193
eplerenon, 193
epoetin alfa, 162
epoetin beta, 162
EPREX - JANSSEN-CILAG KFT., 163
EPROSTA - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO, 281
eptakog alfa, 156
ERBITUX - MERCK HEALTHCARE KGAA, 375
ergokalciferol, vitamin A, 123
ergotamin, kamilofin, kofein, mekloksamin, propifenazon, 449
ERGOTROMB - SYNTHON B.V., 158
ERITHROMYCIN REMEDICA - REMEDICA LIMITED, 314
eritromicin, 314
ERITROMICIN FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 314
ERITROMICIN HEMOFARM - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSIKH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 314
ERLEADA - JANSSEN-CILAG KFT., 387
erlotinib, 361
ERLOTINIB TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.*, 361
ertapenem, 312
ERTAPENEM APTAPHARMA - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O., 312
ERTAZNA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 312
ERTINOBO - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 361
ERYNORM - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 224
ESBESUL - BOSNALIJEK D.D., 313
escin, esencijalni fosfolipidi, heparin, 196
ESCITA - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO, 487
escitalopram, 486
ESCONTRAL - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 539
ESCONTRAL DIREKT - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 539
esencijalni fosfolipidi, 540
esketamin, 435
ESKETAMIN KALCEKS - AS KALCEKS, 435
ESOM I.V. - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 90
esomeprazol, 90
ESOMEPRAZOL FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 91

- ESONOR - LABORATORIOS NORMON S.A.**, 91
ESPEROCT - NOVO NORDISK A/S, 152
ESPUMISAN - BERLIN-CHEMIE AG, 93
ESPUMISAN LX - BERLIN-CHEMIE AG, 93
ESRAM - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 487
ESSO - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 91
estradiol, 269
ESTRELA - BLUEPHARMA-INDUSTRIA FARMACEUTICA, S.A., 393
etamsilat, 157
etanercept, 395
eterično ulje ružmarina, 426
etinilestradiol, gestoden, 267
etinilestradiol, levonorgestrel, 267
etodolak, 413
etofenamat, 423
ETOL FORT - NOBEL İLAC SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., 413
ETOL SR - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 413
ETOPOSID SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 354
etopozid, 354
etorikoksib, 422
ETOXIB - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 422
ETRAGA - STADA ARZNEIMITTEL AG, 353
EUCREAS - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 115
EUTHYROX - MERCK HEALTHCARE KGAA, 290
EUVAX B - LG CHEM LTD, 344
everolimus, 365
EVEROLIMUS KRKA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 365
EVEROLIMUS MYLAN - MYLAN GERMANY GMBH, 365
EVIPLERA - GILEAD SCIENCES IRELAND UC, 336
EVRYSDI - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 432
EXABEL - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 558
EXATRON - REMEDICA LIMITED, 336
EXEDRAL - REMEDICA LIMITED, 389
EXELON - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 493
EXMAL - BOSNALIJEK D.D., 453
EXODERIL - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 249
EXTRANEAL - BAXTER AG, 172
EYLEA - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 553
ezetimib, 239
ezetimib, rosuvastatin, 241
EZOLETA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 239
EZRUSTA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 241
FABRAZYME - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 129
faktor koagulacije II, humani, faktor koagulacije IX, faktor koagulacije VII, humani, faktor koagulacije X, humani, protein c, protein s, 151
faktor koagulacije IX, 155
faktor koagulacije VIII, humani, 153, 155
faktor koagulacije VIII, humani, von Willebrand-ov faktor, 156
FAKTU - ORIFARM GENERICS A/S, 195
famotidin, 84
FAMOTIDIN HF - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 84
FANHDI 100 I.J. FVIII/120 I.J. VWF PO ML - INSTITUTO GRIFOLS S.A., 155

Indeks

FANHDI 25 I.J. FVIII/30 I.J. VWF - INSTITUTO GRIFOLS S.A., 156
FANHDI 50 I.J. FVIII/60 I.J. VWF - INSTITUTO GRIFOLS S.A., 156
FANISAN - PRO.MED.CS PRAHA A.S., 84
FANISAN FORTE - PRO.MED.CS PRAHA A.S., 84
faricimab, 553
FARIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 133
FASINDOR - ALKALOID AD SKOPJE, 368
FASTUM - BERLIN-CHEMIE AG, 423
FAVISTAN - BOSNALIJEK D.D., 291
FDG-RMC - RUĐER MEDICOL CIKLOTRON D.O.O., 570
FEBRICET - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 444
febukostat, 429
feksofenadin, 538
FELKARID - ALKALOID AD SKOPJE, 180
FEMARA - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 388
fenilefrin, gvaifenezin, paracetamol, 445, 535
fenilefrin, hlordenamin, paracetamol, 447, 509
fenilefrin, ibuprofen, 421
fenilefrin, paracetamol, 510
FENISTIL 1MG/ML ORALNE KAPI - HALEON HUNGARY KFT, 536
FENISTIL GEL - HALEON HUNGARY KFT, 250
FENIX - BOSNALIJEK D.D., 86
FENIX NEO - BOSNALIJEK D.D., 87
fenobarbiton, 451
fenofibrat, 239
fenoksietanol, oktenidin, 258
fenoksimetilpenicilin, 297
fentanil, 433, 439
FENTANIL CITRAT KALCEKS - AS KALCEKS, 434
FENTANYL PANPHARMA - PANPHARMA S.A., 434
fentikonazol, 265
FERAPPLIC - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 159
FERRUM SANDOZ 100 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 159
FEZEA - MAKPHARM D.O.O., 428
FIASP FLEXTOUCH - NOVO NORDISK A/S, 106
fibrinogen humani, 151
FIBRYGA - OCTAPHARMA AG, 151
FILEX - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 487
filgrastim, 390
finasterid, 281
FINASTERID HEMOFARM - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH
PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 281
finerenone, 193
fingolimod, 393, 404
FINGOLIMOD MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED, 393
FINGOLIMOD TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.*, 393
FINGOLIMOD ZENTIVA - ZENTIVA S.A., 404
FINPROS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 281
FIRAZYR - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, IRELAND
BRANCH, 177
FIRSSAMO - MSN LABS EUROPE LIMITED, 464
FITAXYL - RONTIS HELLAS S.A., 429
FLAMIX - BOSNALIJEK D.D., 323

FLAVAMED - BERLIN-CHEMIE AG, 532
 FLAVAMED FORTE - BERLIN-CHEMIE AG, 532
 FLAVAMED SIRUP - BERLIN-CHEMIE AG, 533
 FLAVOTHROMBIN FORTE - STADA ARZNEIMITTEL AG, 198
 FLEBAVEN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 197
 flekainid, 180
 FLENTY - ALKALOID AD SKOPJE, 250
 FLEVENOL - LABORATORIOS CINFA S.A., 197
 FLIRKANO - ALKALOID AD SKOPJE, 232
 FLIXON - DEVA HOLDING A.S., 523
 FLIXONASE - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 506
 FLIXOTIDE INHALER - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 523
 FLONIDAN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 538
 FLOSENSO - ALKALOID AD SKOPJE, 517
 FLOSIN - BERLIN-CHEMIE AG, 279
 FLOSTERON - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 287
 FLOTIC - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 321
 FLOXILEVO - DEVA HOLDING A.S., 322
 FLUCONAL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
 BANJA LUKA, 329
 FLUCONAZOLE-DARNYTSIA - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
 PHARMACEUTICAL FIRM DARNYTSIA, 329
 fludarabin, 352
 FLUDARABIN PLIVA - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 352
 fludeoksiglukoza (18F), 570
 flufenazin, 466
 FLUFETAN - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 507
 FLUIMUCIL 100 - ZAMBON S.P.A., 531
 FLUIMUCIL 200 - ZAMBON S.P.A., 531
 FLUIMUCIL 600 - ZAMBON S.P.A., 531
 FLUIMUKAN AKUT - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 531
 FLUIMUKAN PLUS - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 531
 FLUIMUKAN ZA DJECU - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 531
 flukonazol, 328
 FLUNISAN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
 BANJA LUKA, 485
 fluocinolon acetonid, 254
 fluocinolon acetonid, neomicin, 256
 fluoksetin, 484
 FLUOXETIN ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 485
 FLUOXETIN FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 485
 flurbiprofen, 514
 FLURBISEPT - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 514
 FLUSETIN - BOSNALIJEK D.D., 485
 FLUTEL - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.S., 506
 FLUTIFORM - MUNDIPHARMA DC B.V., 520
 flutikazon, 505, 506, 523
 flutikazon, formoterol, 520
 flutikazon, salmeterol, 517
 flutikazon, vilanterol, 520
 FOKLEROS - ALKALOID AD SKOPJE, 362
 FOKUSIN - ZENTIVA S.A., 279

Indeks

FOLACIN - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 161
FOLESSA - BOSNALIJEK D.D., 161
FOLIK - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 161
FOLINSKA KISELINA KALCEKS - AS KALCEKS, 560
folitropin alfa, 271
folitropin alfa, lutropin alfa, 273
folitropin delta, 272
folna kiselina, 161
FOLNA KISELINA REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE, 161
FOMELA - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 82
FOMICYT - INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH, 327
fondaparinuxs, 150
FORDEX - BOSNALIJEK D.D., 110
formoterol, 516
FOROBEC - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 519
FORTECA - COOPER PHARMACEUTICALS S.A., 322
FORTEVIR - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 334
FORXIGA - ASTRAZENECAB, 121
FOSAMAX T - N.V. ORGANON, 430
fosfomicin, 327
fosinopril, 214
fosinopril, hidrohlorotiazid, 219
FOSTER - CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH, 519
FOSTER 100 MG/6 MG - CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH, 520
FOSTER NEXTHALER - CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH, 520
FOSTRON - LABIANA PHARMACEUTICALS S.L.U., 327
FOTEROL - DEVA HOLDING A.S., 516
FOXERO - ALKALOID AD SKOPJE, 309
FRAGMIN - PFIZER INC., 134
FRAVEN - ARVEN ILAC SAN. VE TIC.A.S., 391
FRAXIPARINE - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 137
fremanezumab, 450
FROMILID - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 315
FROMILID UNO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 315
FRONTIENT - PHARMACARE PREMIUM LTD., 370
frukvintinib, 367
FRUZAQLA - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, 367
FUARTE - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 558
FULAIR - STADA ARZNEIMITTEL AG, 507
FULPHILA - BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED, 391
fulvestrant, 386
FULVESTRAINT PLIVA - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 386
FULVESTRAINT SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 386
FUNGILAC - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 249
FUNGISOL - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 249
FUNITRAL - WAVE PHARMA LIMITED, 326
FUNZOL - BOSNALIJEK D.D., 329
FUREXTIL - ALKALOID AD SKOPJE, 305
FUROMID - DEVA HOLDING A.S., 190
furosemid, 190
FUROSEMIDE REMEDICA - REMEDICA LIMITED, 190
FUROSEMIDE-DARNYTSIA - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
'PHARMACEUTICAL FIRM DARNYTSIA, 190

FURSEMED - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 190
FURSEMED FORTE - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 190
fusidinska kiselina, 251, 543
FUSIDIX 1% - DEVA HOLDING A.S., 543
gabapentin, 456
GABAPREG - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 459
GABINA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 448
gadobenat, 568
gadobutrol, 569
gadoksetinska kiselina, 569
gadoterična kiselina, 567
GADOVIST - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 569
GADOVIST 1,0 MMOL/ML OTOPINA ZA INJEKCIJU - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 569
GALIPEKS - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 143
GALITIFEN - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 538
GALOSART - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 224
GALOSART PLUS - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 228
GALVUS - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 118
GARAMYCIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 318
GARDASIL - MERCK SHARP & DOHME BV, 346
GARDASIL 9 - MERCK SHARP & DOHME BV, 346
GARTYZ - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 141
GASTAL - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 83
GASTROGUARD MENTOL TABLETE ZA ŽVAKANJE SA UKUSOM MENTOLA - ALKALOID AD SKOPJE, 82
GASTROPERIDON - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 95
GAZYVA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 373
gefitinib, 361
GELOMYRTOL FORTE - G. POHL BOSKAMP GMBH & CO.KG, SWISS CAPS AG, HUSENSTRASSE 35, KIRCHBERG, 528
GELTRO - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 158
gemcitabin, 352
GEMCITABIN SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 352
GEMCITABINE VENUS - VENUS PHARMA GMBH, 352
GENBUTROL 15 - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş., (SKRAĆENO GEN), 569
GENBUTROL 7,5 - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş., (SKRAĆENO GEN), 569
GENOTROPIN - PFIZER INC., 283
GENSULIN M30 - BIOTON S.A., 107
GENSULIN N - BIOTON S.A., 107
GENSULIN R - BIOTON S.A., 106
gentamicin, 251, 318, 555
GENTAMICIN BOSNALIJEK - BOSNALIJEK D.D., 251
GENTAMICIN GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 251, 318
GENTAMICIN HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 318
GENTOKULIN - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 555
GEONISTIN - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 263
ginkgo biloba, list, 495
GINO-DAKTANOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 264

Indeks

GITAS - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 117
GITAS PLUS - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 114
glatiramer acetat, 392
GLAUMAX - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 550
GLAUMOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 549
glekaprevir, pibrentasvir, 335
GLEROVA - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 114
GLIBEDAL - ALKALOID AD SKOPJE, 112
glibenklamid, 112
gliceril trinitrat, 182
glicin, kalcijum-hlorid, L-alanin, L-arginin, L-fenilalanin, L-histidin, L-izoleucin, L-leucin, L-lizin, L-metionin, L-prolin, L-serin, L-tirozin, L-treonin, L-triptofan, L-valin, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, 173
glicin, L-alanin, L-arginin, L-fenilalanin, L-histidin, L-izoleucin, L-leucin, L-lizin, L-metionin, L-prolin, L-serin, L-treonin, L-triptofan, L-valin, 165
GLICLADA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 113
GLICLADA SR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 113
GLIFOR - BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 110
gliklazid, 113
glikopironijum bromid, 525
glikopironijum bromid, indakaterol, 521
glikopironijum bromid, indakaterol, mometazon, 522
glimepirid, 113
GLIMEPIRID HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 113
GLIORAL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 113
glofitamab, 378
GLOFTRINID - ALKALOID AD SKOPJE, 381
GLUCAGEN HYPOKIT - NOVO NORDISK A/S, 292
GLUCONORM - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 110
GLUCOPHAGE - MERCK HEALTHCARE KGAA, 111
GLUCOPHAGE XR - MERCK HEALTHCARE KGAA, 111
GLUCOSI INFUNDIBILE 10% - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 166
GLUCOSI INFUNDIBILE 5% - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 167
GLUFORMIN 1000 MG - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 111
GLUFORMIN 850 MG - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 111
glukagon, 291
glukoza, 166
GLUKOZA 10% BRAUN - B.BRAUN MELSUNGEN AG, 167
GLUKOZA 10% DIACO - DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L., 167
GLUKOZA 40% B. BRAUN - B.BRAUN MELSUNGEN AG, 167
GLUKOZA 5 % DIACO - DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L., 167
GLUKOZA 5% BRAUN - B.BRAUN MELSUNGEN AG, 167
GLUKOZA 5% VIOSER - VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY, 167
GLUKOZA SA NATRIJ KLORIDOM DIACO - DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L., 171
glukoza, kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-hlorid, 176
glukoza, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum bikarbonat, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, 172
glukoza, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, 172

glukoza, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, 173
 glukoza, natrijum-hlorid, 171
 glukozamin, 422
 GLYPVIL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 118
 golimumab, 399
 GONAL-F - MERCK HEALTHCARE KGAA, 272
 GONAL-F 150 - MERCK HEALTHCARE KGAA, 272
 GOPTEN - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 215
 goserelin, 385
 granisetron, 96
 GRATRYL - PHARMADA ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 97
 GRIPPOSTAD C - STADA ARZNEIMITTEL AG, 535
 GRIPPOSTAD COMPLEX - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH
 PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 509
 GRIPPOSTAD TOPLI NAPITAK - STADA ARZNEIMITTEL AG, 444
 guselkumab, 401
 gusti ekstrakt islandskog lišaja, 533
 gvožđe, 159
 gvožđe (II)-fumarat, 158
 gvožđe (III) hidroksid-polimaltozni kompleks, 159
 gvožđe glukonat, folna kiselina, 160
 gvožđe, parenteralni preparati, 159
 HÄDENSA - MERZ PHARMA AUSTRIA GMBH, 195
 haloperidol, 466
 HALOPERIDOL KRKA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 468
 HALOPERIDOL KRKA DEPO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 468
 HALO-SWISS - SWISS PARENTERALS LIMITED., 468
 HARTMANOV RASTVOR - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH
 PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 170
 HEFEROL - ALKALOID AD SKOPJE, 159
 heksetidin, 81
 HELEX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 480
 HELEX SR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 480
 HEMLIBRA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 158
 HEMOMYCIN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
 BANJA LUKA, 316
 HEMOPRES - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
 BANJA LUKA, 194
 HEPALPAN - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 196
 HEPALPAN 1000 - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 196
 HEPAN GEL - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 196
 heparin, 133, 196
 HEPARIN GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 134
 HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA - PANPHARMA S.A., 134
 HEPARIN-INDAR - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY, 134
 HEPASOL 8% - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
 BANJA LUKA, 165
 HEPATHROMBIN - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 196
 hepatitis B imunoglobulin, humani, 340
 hepatitis B, prečišćeni antigen, 343
 HEPTANON - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 497
 HERBIFIT HEDERIN SIRUP - PHARMAMED D.O.O. TRAVNIK, 530

Indeks

HERBION BRŠLJAN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 530
HERBION ISLANDSKI LIŠAJ - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 533
HERBION SIRUP OD BOKVICE - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 533
HERBION SIRUP OD JAGORČEVINE - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 529
HERCEPTIN - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 374
HERNOVIR - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 252, 333
HERPLEX - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 252, 333
HERZUMA - CELLTRION INC., 374
HEXAXIM - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 348
HEXTEND - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 81
HIBIBOS G - BOSNALIJEK D.D., 257
HIBIBOS T - BOSNALIJEK D.D., 257
HICONCIL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 297
hidrohlorotiazid, 189
HIROHLOTIAZID ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 189
hidrohlorotiazid, irbesartan, 229
hidrohlorotiazid, lizinopril, 216
hidrohlorotiazid, losartan, 228
hidrohlorotiazid, nebivolol, 204
hidrohlorotiazid, olmesartan medoksomil, 230
hidrohlorotiazid, ramipril, 218
hidrohlorotiazid, telmisartan, 230
hidrohlorotiazid, valsartan, 228
hidrokortizon, 253, 289, 545
HIROKORTIZON HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 290
hidrokortizon, lidokain, 195
hidrokortizon, oksitettraciklin, 255
hidroksihlorohin, 502
hidroksikarbamid, 382
hidroksokobalamin, 161
hidromorfon, 438
HIROMORFON KALCEKS - AS KALCEKS, 438
hidrotalcit, 83
himekromon, 98
hioscin butilbromid, 94
histidin, ketoaminokiseline, lizin, tirozin, treonin, triptofan, 563
HISTINAX - BOSNALIJEK D.D., 498
HIVERAC - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 334
hloramfenikol, 543
hlorfenamin, natrijum-askorbat, paracetamol, 446
hlorfenamin, paracetamol, pseudoefedrin, 447, 508
hlorheksidin, 256
hlorheksidin, lidokain, 511
hloropiramin, 250, 537
hlorpromazin, 465
holekalciferol, 124
holekalciferol, kalcijum, 128
HOLLESTA - ALKALOID AD SKOPJE, 234
HOLOXAN - BAXTER AG, 349
horiogonadotropin alfa, 272

HUKYNDRA - STADA ARZNEIMITTEL AG, 398
 HULIO, OTOPINA ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ SPRICI, 40MG / 0,8ML - BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED, 398
 HULIO, OTOPINA ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOM PENU, 40MG / 0,8MG - BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED, 398
 HUMALOG - ELI LILLY EXPORT S.A., 106
 HUMALOG JUNIOR KWIKPEN - ELI LILLY EXPORT S.A., 106
 HUMALOG KWIKPEN - ELI LILLY EXPORT S.A., 106
 HUMALOG MIX 25 KWIKPEN - ELI LILLY EXPORT S.A., 108
 HUMALOG MIX 50 KWIKPEN - ELI LILLY EXPORT S.A., 108
 HUMAN ALBUMIN 200G/L TAKEDA - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, 164
 humani menopauzalni gonadotropin, 271
 HUMIRA - ABBVIE INC., 398
 HUMULIN M3 - ELI LILLY EXPORT S.A., 107
 HUMULIN N - ELI LILLY EXPORT S.A., 107
 HUMULIN R - ELI LILLY EXPORT S.A., 106
 HYDMOXIA - DEVA HOLDING A.S., 382
 HYDROCORTISON GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 253, 545
 HYDROCYCLIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 255
 HYPERIL - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 211
 HYPERIL PLUS - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 216
 HYPOLIP - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 235
 HYPRESSIN - BOSNALIJEK D.D., 212
 HYPRESSIN PLUS - BOSNALIJEK D.D., 217
 HYPRESSIN PLUS L - BOSNALIJEK D.D., 217
 HYRIMOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 398
 ibandronska kiselina, 430
 IBEROGAST - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 92
 IBRANCE - PFIZER INC., 364
 ibrutinib, 367
 IBUDIRECT - PHARMAMED D.O.O. TRAVNIK, 416
 IBUMAX 2% - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 417
 IBUMAX 4 % - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 417
 IBUMAX DIRECT - STADA ARZNEIMITTEL AG, 417
 IBUMAX DUO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 421
 IBUMENTHOL - ANTIBIOTIC-RAZGRAD AD,, 426
 ibuprofen, 415, 424
 IBUPROFEN ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 417
 IBUPROFEN B. BRAUN 4 MG/ML - B.BRAUN MELSUNGEN AG, 417
 IBUPROFEN B. BRAUN 6 MG/ML - B.BRAUN MELSUNGEN AG, 417
 IBUPROFEN FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 417
 IBUPROFEN HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 417
 IBUPROFEN KABI 400 MG OTOPINA ZA INFUZIJU - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 417
 IBUPROFEN REMEDICA - REMEDICA LIMITED, 417
 IBUPROFEN REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE, 418, 424
 ibuprofen, levomentol, 426
 ibuprofen, mentol, 426

Indeks

ibuprofen, paracetamol, 421, 445
ibuprofen, pseudoefedrin, 507
icatibant, 176
IDACIO - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 398
IDEOS - LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, 128
IDIKA - STADA ARZNEIMITTEL AG, 430
idursulfase, 130
IESPOR - MENARINI SAGLIK VE ILAC SANAYII TIC. A.S., 304
IFIRMACOMBI - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 230
ifosfamid, 349
IG VENA - KEDRION S.P.A., 339
IGZELYM - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 141
ihtamol, mentol, monohlorkarvakrol, 195
ikodekstrin, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, 171
iksazomib, 381
ILOMEDIN - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 139
iloprost, 139
imatinib, 358
IMATIS - DEVA HOLDING A.S., 358
IMBRUVICA - JANSSEN-CILAG KFT., 367
IMFINZI - ASTRAZENECA AB, 376
IMIBACID - SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE `BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL PHARMACEUTICAL PLANT` PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY, 312
imigluceraza, 129
IMIGRAN - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 450
imikvimod, 253
IMIPENEM CILASTATINE PANPHARMA - PANPHARMA S.A., 312
IMIPENEM/CILASTATIN APTAPHARMA - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O., 312
IMIPENEM/CILASTATIN KABI 500 MG/500 MG - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 312
IMMUNATE 1000 IU FVIII/750 IU VWF - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, 156
IMMUNATE 500 IU FVIII/375 IU VWF - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, 156
IMMUNOHBS - KEDRION S.P.A., 341
IMMUNORHO - KEDRION S.P.A., 340
IMOVAX DT ADULT - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 343
imunoglobulin, normalni humani za ekstravaskularnu primjenu, 338
imunoglobulin, normalni humani za intravaskularnu primjenu, 338
IMUPRIN - REMEDICA LIMITED, 407
IMURAN - ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, 407
indakaterol, 516
indakaterol, mometazon, 520
INDAP - PRO.MED.CS PRAHA A.S., 189
indapamid, 189
INDAPAMID LABORMED - LABORMED-PHARMA S.A., 189
indapamid, perindopril, 217
indapamid, perindopril, rosuvastatin, 244
indapamid, telmisartan, 230
indapamid, valsartan, 228
INDAPRES - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 189

INDIVIL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
 BANJA LUKA, 118
INDIVIL MET - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
 BANJA LUKA, 115
 indometacin, 411
INDOMETACIN FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 411
INFANRIX - IPV - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 347
INFANRIX HEXA - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 348
INFANRIX IPV + HIB - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 347
 infliksimab, 396
INFLUCID - DR. GUSTAV KLEIN GMBH & CO.KG, 573
 influenza, inaktivisana, fragmentisani virus ili površinski antigen, 343
INFLUVAC TETRA - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 343
INHIXA - SHENZHEN TECHDOW PHARMACEUTICAL CO. LTD., 136
 inklisiran, 240
INLYTA - PFIZER INC., 366
INNPOCETIN - COVEX S.A., 492
INNPOCETIN FORTE - COVEX S.A., 492
 inozin acedoben dimepranol, 337
INSPIRA - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 193
INSULATARD FLEXPEN - NOVO NORDISK A/S, 107
 insulin, 106, 107
 insulin aspart, 106, 108
 insulin aspart, insulin degludek, 108
 insulin degludek, 109
 insulin degludek, liraglutid, 109
 insulin detemir, 108
 insulin glargin, 108
 insulin glargin, liksisenatid, 109
 insulin glulisin, 107
 insulin lispro, 106, 107
 interferon beta-1a, 391
 interferon beta-1b, rekombinantni, 392
IODOPOL - NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH, 571
IOMERON - BRACCO IMAGING S.P.A., 566
IOPAMIRO 300 - BRACCO S.P.A., 565
IOPAMIRO 370 - BRACCO S.P.A., 565
 ipilimumab, 378
IPRATROPIJEV BROMID/SALBUTAMOL CIPLA - CIPLA EUROPE, 521
 ipratropijum bromid, 523
 ipratropijum bromid, salbutamol, 521
IRACOR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 226
IRBENIDA - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
 BANJA LUKA, 226
IRBENIDA H - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
 BANJA LUKA, 230
IRBENIDA HL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
 BANJA LUKA, 230
 irbesartan, 226
IRDA - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 226
IRINOTECAN ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O., 357
IRINOTECAN KABI - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 357

Indeks

irinotekan, 356
IRINOTEKAN QILU - QILU PHARMA SPAIN SL, 357
IRINOTESIN - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 357
IRUMED - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 211
IRUZID 10 - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 216
IRUZID 20 - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 216
IRUZID 20/25 - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 216
ISENTRESS - MERCK SHARP & DOHME BV, 335
ISOCOR - SOPHARMA AD, 208
ISOPRINOSINE - LUSOMEDICAMENTA-SOCIEDADE TECNICA FARMACEUTICA S.A., 337
ISOSKIN - GAP S.A., 260
ITOMED - PRO.MED.CS PRAHA A.S., 95
itoprid, 95
itrakonazol, 329
ivabradin, 185
IVABRADIN SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 185
izavukonazol, 331
IZOSEPT D - BOSNALIJEK D.D., 258
izosorbid dinitrat, 183
izosorbid mononitrat, 183
IZOTONIČNA OTOPIKA NATRIJ-KLORIDA 0,9% BRAUN - B.BRAUN MELSUNGEN AG, 169
izotretinoin, 260
JAGLIX - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 117
JAKAVI - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 366
JANUVIA - MERCK SHARP & DOHME BV, 117
JARAMERA - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 239
JARDIANCE - BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO.KG, 121
JAZETA NOVUM - ZENTIVA, K.S., 117
JEVTANA - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 356
JIVI 1000 IU - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 152
JIVI 2000 IU - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 152
JIVI 3000 IU - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 152
jobitridol, 567
jodiksanol, 566
JODOKOMP - ZOREX PHARMA D.O.O. ŠABAC, 258
joheksol, 564
jomeprol, 566
jopamidol, 564
jopromid, 565
joversol, 565
JUVE - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 423
kabazitaksel, 356
KABAZITAKSEL EVER PHARMA - EVER VALINJECT GMBH, 356
KABIVEN PERIPHERAL 1000 KCAL - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 167
KABIVEN PERIPHERAL 1400 KCAL - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 167
KABIVEN PERIPHERAL 1700 KCAL - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 167
KADCYLA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 375
KADRIL - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 210
KADRIL PLUS - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 216
KAFESIT - BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş., 491

kalcifediol, 125
 KALCIJ GLUKONAT 10% B. BRAUN - B.BRAUN MELSUNGEN AG, 169
 KALCIJEV FOLINAT PLIVA 10 MG/ML - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 560
 kalcijum glukonat, 169
 kalcijum karbonat, magnezijum karbonat, teški, 83
 kalcijum-folinat, 559
 kalcijum-fosfat, kalcijum-karbonat, kamilica, magnezijum-fosfat, željezo-fosfat, 562, 573
 kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-hlorid, 170
 kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, 170
 kalcijum-karbonat, 128
 kalcijum-karbonat, magnezijum-karbonat, 82
 kalcijum-pantotenat, 127
 kalcitriol, 124
 KALCIUM KARBONAT ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 128
 KALII CHLORIDI UFAR - UFAR D.O.O. BEOGRAD, 128
 KALIJ HLORID 7,45% B. BRAUN - B.BRAUN MELSUNGEN AG, 175
 KALIJ KLORID JADRAN - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 128
 KALIJEV KLORID NATURA PHARM - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 128
 kalijum-citrat, limunska kiselina, 129
 kalijum-hlorid, 128, 175
 KALINOR - LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T., 129
 KAMFART - BOSNALIJEK D.D., 425
 KAMIREN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 187
 KANAZOL - SLAVIAMED D.O.O. BEOGRAD, 330
 kandesartan, 226
 KANJINTI - AMGEN (EUROPE) GMBH, 374
 kapecitabin, 352
 kapivasertib, 371
 kaptopril, 208
 KAPTOPRIL KRKA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 209
 KAPTOPRIL REMEDICA - REMEDICA LIMITED, 209
 karbamazepin, 452
 KARBAPIN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 452
 karbidopa, levodopa, 461
 KARBIS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 227
 karbocistein, 532
 KARBOCISTEIN NATURA PHARM - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 532
 karboplatin, 379
 karvedilol, 203
 KARVEDILOL REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE, 203
 kaspofungin, 331
 KATHESIN - LABORMED-PHARMA S.A., 361
 KATOPIL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 209
 KEPPRA - UCB PHARMA S.A., 457
 KE-RELIEF - EAST AFRICAN INDIA OVERSEAS, 419
 KERENDIA - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 194
 KESIMPTA - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 406
 KETOBOS - BOSNALIJEK D.D., 419
 ketokonazol, 247
 KETONAL - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 419

Indeks

KETONAL DUO - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 420
KETONAL FORTE - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 420
KETONAL SPRINT - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 420
ketoprofen, 419, 423
KETOSTERIL - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 563
ketotifen, 538
KEYTRUDA - MERCK SHARP & DOHME BV, 376
kiseonik, 560
KISQALI - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 365
KIVEXA - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 336
KLACID - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 315
KLACID I.V. - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 315
KLACID SR - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 315
kladribin, 395
klaritromicin, 314
KLARITROMICIN REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE, 315
KLAVAMOX - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO, 301
KLAVOCIN BID - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 301
KLIMICIN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 317
klindamicin, 259, 263, 317
KLINDAVAG - VERISFIELD SINGLE MEMBER S.A., 263
klobetazol, 255
kloksacilin, 299
KLOMETOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 95
KLOMID - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 95
klonazepam, 451
KLONAZEPAM REMEDICA - REMEDICA LIMITED, 451
KLOPIDEX - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 137
klopidogrel, 137
klotrimazol, 247, 264
klozapin, 469
kobimetinib, 364
kodein, 534
kodein, kofein, paracetamol, 446
kodein, kofein, paracetamol, propifenazon, 448
KOFAN INSTANT - BOSNALIJEK D.D., 447
kofein, 491
KOFEIN CITRAT GEN 20 - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş., (SKRAĆENO GEN), 491
KOFEIN CITRAT GEN 60 - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş., (SKRAĆENO GEN), 491
kofein, paracetamol, 447
kofein, paracetamol, propifenazon, 447
KOLESTAN - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 236
kolistin, 325
kombinovana vakcina protiv morbila, parotitisa i rubeole, živa, atenuisana, 344
KONVERIL - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 210
KONVERIL PLUS - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 216
KOSELUGO - ASTRAZENECA AB, 364
KREON 10000 - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 105
KREON 25000 - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 105
KREON 35 000 - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 105
KSALOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 480

ksilometazolin, 503
ksilometazolin, lizozim, 504
KVENTIAX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 471
KVENTIAX SR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 471
KVEPIN - BOSNALIJEK D.D., 472
kvetiapin, 470
KYTRIL - ATNAHS PHARMA UK LTD, 97
lacidipin, 206
LACIPIL - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 206
LACOMDA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 459
lakoamid, 459
laktuloza, 99
LAKTULOZA HF - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 99
LAMAL - ALKALOID AD SKOPJE, 455
LAMICTAL - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 455
LAMISIL - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 249
lamivudin, 333
lamivudin, zidovudin, 336
lamotrigin, 454
lanadelumab, 177
LANIBOS - BOSNALIJEK D.D., 179
lansoprazol, 88
LANSOPROL - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 89
lantan karbonat, 559
LANTUS - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 108
LANZUL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 89
LAPPOXO - ALKALOID AD SKOPJE, 85
LARGOCILIN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 298
laronidaza, 129
LARTEXA - LABORATORIOS NORMON S.A., 407
latanoprost, 550
latanoprost, timolol, 549
LATANOX - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 550
LATASOPT - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ş., 550
LATRIGIL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 455
LAVRENA - STADA ARZNEIMITTEL AG, 537
LAXADIN - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 99
LAXID - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 101
LAXOPRID - COMBINO PHARM MALTA, LTD., 100
LEBEL - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 322
LECANID - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 180
LECTRUM - ERIOCHEM SA, 385
LEFISYO - ALKALOID AD SKOPJE, 498
LEFLOGAL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 322
leflunomid, 393, 407
LEKADOL - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 444
LEKADOL PLUS C - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 446
LEMOD-SOLU - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 288
LEMTRADA - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 406

Indeks

lenalidomid, 408
LENALIDOMID ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O., 409
LENALIDOMID ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 409
LENALIDOMID TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 409
LENALIDOMIDE GRINDEKS - AS GRINDEKS, KRUSTPILS IELA 53, RIGA, LV-1057, LETONIJA, 409
LENOCOR - BOSNALIJEK D.D., 207
LEPONEX - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 469
LEPTICA - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 458
LEQVIO - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 240
LERCANIL 10 - BERLIN-CHEMIE AG, 207
LERCANIL 20 - BERLIN-CHEMIE AG, 207
lerkanidipin, 206
LESCIT - STADA ARZNEIMITTEL AG, 476
LESTEDON - ALKALOID AD SKOPJE, 281
LETIZEN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 537
LETRASAN - DEVA HOLDING A.S., 388
LETROX 100 - BERLIN-CHEMIE AG, 291
LETROX 50 - BERLIN-CHEMIE AG, 291
letrozol, 388
leuprorelin, 383
LEUPROSTIN 3,6 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 385
LEUPROSTIN 5 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 385
LEVALOX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 322
LEVEMIR - NOVO NORDISK A/S, 109
levetiracetam, 457
LEVETIRACETAM FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 458
LEVETIRACETAM HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 458
LEVEX - BOSNALIJEK D.D., 458
levobupivakain, 436
LEVOBUPIVAKAIN KABI 5 MG/ML OTOPIKA ZA INJEKCIJU/INFUZIJU - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 436
levocetirizin, 537
levofloksacin, 321
LEVOFLOXACIN BIOINDUSTRIA L.I.M. - BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P A., 322
levomepromazin, 465
levometadon, 497
levonorgestrel, 266, 268
levotiroksin-natrijum, 290
LEXAURIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 479
LEXILIUM - ALKALOID AD SKOPJE, 479
LIBURADONE - PHARMACARE PREMIUM LTD., 370
LIDOCAINA CLORIDRATO BIOINDUSTRIA L.I.M. - BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P A., 179, 436
LIDOCAINE 2% S.A.L.F. - S.A.L.F.-S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO, 179, 436
LIDOCAINE KABI 20 MG/ML - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 436
LIDOFAST - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 437
lidokain, 179, 435
LIDOKAIN - HLORID GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 436
LIDOKAIN 2% - ADRENALIN GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 437
LIDOKAIN BELUPO SPREJ - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 436

lidokain, nifedipin, 195
 LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 1% - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 179, 436
 LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 2% - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 179, 436
 LIDOPROCT - BOSNALIJEK D.D., 195
 LIFTA - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 277
 linagliptin, 118
 linagliptin, metformin, 115
 LINATIN MET - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 116
 LINATIN - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 118
 LINATIN MET - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 116
 LINCOCIN - PFIZER INC., 318
 LINEDOR - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ, 327
 LINEX - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 105
 LINEX FORTE - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 105
 LINEZAN - ANFARM HELLAS S.A., 327
 linezolid, 327
 linkomicin, 317
 liofilizirana kultura *Saccharomyces boulardii*, 105
 LIOTON 1000 - BERLIN-CHEMIE AG, 196
 LIPERTANCE - LES LABORATOIRES SERVIER, 244
 LIPEX - N.V. ORGANON, 234
 LIPIDIL - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 239
 LIPOFEN SR - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 239
 LIPOSTAT - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 236
 LIPTIN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 236
 liraglutid, 119
 LIRTONEN - ALKALOID AD SKOPJE, 242
 LIRUX® - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 119
 LISETRA - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 486
 LIVERCOL - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 237
 LIVTENCITY - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, 337
 LIZERA - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 119
 lizinopril, 210
 lizozim, 253
 lizozim, piridoksin, 513
 LODIX - BOSNALIJEK D.D., 190
 LODIX FORTE - BOSNALIJEK D.D., 190
 LOGEST - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 267
 LOKOSOL, GEL, 10 MG / G - LABORATORIOS BASI-INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., 424
 LOMEXIN - RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA & FARMACEUTICA S.P.A., 265
 LONGACEPH - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 308
 LONSURF - LES LABORATOIRES SERVIER, 354
 loperamid, 102
 LOPERAMID ZDRAVLJE - ZDRAVLJE A.D.LESKOVAC, 102
 LOPRESS - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 205
 LOPRIDAM - ZENTIVA, K.S., 222
 LOPRIL - BOSNALIJEK D.D., 211
 LOPRIL H - BOSNALIJEK D.D., 217
 LOPRIL H PLUS - BOSNALIJEK D.D., 217
 LORAMIN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 538
 loratadin, 538

Indeks

lorazepam, 478

LORAZEPAM HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 479

LORDES - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 539

LORDIAR - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 102

LORISTA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 224

LORISTA H - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 228

LORISTA HD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 228

lorlatinib, 363

LORSILAN - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 479

LORTANDA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 388

LORVIQUA - PFIZER INC., 363

losartan, 224

LOSMORID - ALKALOID AD SKOPJE, 460

LOSTOP - BOSNALIJEK D.D., 538

LOTAR - ALKALOID AD SKOPJE, 225

LOVETROX - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 322

LUCENTIS - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 553

LUMINEL - BOSNALIJEK D.D., 475

LUNATA - ALKALOID AD SKOPJE, 482

LUNSUMIO - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 378

LUPOCET - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 444

LUPOCET FLU - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 447

LUPOCET FLU FORTE - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 446

LUPOCET TRIO - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 445

lutropin alfa, 272

LUVERIS - MERCK HEALTHCARE KGAA, 272

LYNPARZA - ASTRAZENECA AB, 382

LYRICA - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 449

LYSOBACT - BOSNALIJEK D.D., 513

LYSOBACT COMPLETE SPRAY S AROMOM PEPPERMINTA - BOSNALIJEK D.D., 510

LYSOBACT DUO - BOSNALIJEK D.D., 511

LYSOBACT P SPRAY S AROMOM BANANE - BOSNALIJEK D.D., 513

LYSOBACT SPRAY S AROMOM PEPPERMINTA - BOSNALIJEK D.D., 511

LYSODERM - BOSNALIJEK D.D., 253

LYVAM - ALKALOID AD SKOPJE, 458

MABTHERA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 372

macitentan, 188

MACMIROR COMPLEX - POLICHEM S.A., 263

MADOPAR - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 461

MALCOVIR - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 502

MANINIL 5 - BERLIN-CHEMIE AG, 112

manitol, 171

MANITOL HF 10% E - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 171

MANITOL HF 20% - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 171

manitol, natrijum-laktat, 171

MANNITOL 20% VIOSER - VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY, 171

MAPRAZAX - ALKALOID AD SKOPJE, 480

maribavir, 337

MAROCEN - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 544

MAROCEN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 321
MARPAD COMBO - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 116
MASARU - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 525
MASIPAH - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 188
MASSIDO - ALKALOID AD SKOPJE, 202
MATHADOR - BOSNALIJEK D.D., 199
MAVENCLAD - MERCK HEALTHCARE KGAA, 395
MAVIRET - ABBVIE INC., 335
MAXFLU - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 507
MAXIDEX - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 545
MAXIPENEM - MENARINI SAGLIK VE ILAC SANAYII TIC. A.S., 311
MAXITROL - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 547
MAYMETSI - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 114
MAYSIGLU - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 117
MAYZENT - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 404
MAZENID - ALKALOID AD SKOPJE, 424
MAZENID FORTE - ALKALOID AD SKOPJE, 424
MEAXIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 358
mebendazol, 502
mebeverin, 92
MEDAZOL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 264, 501
MEDICINSKI KISEONIK TGT - TGT A.D. LAKTAŠI, 560
MEDICINSKI KISEONIK KRAS - KRAS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
LAKTAŠI, 560, 561
MEDICINSKI KISEONIK TGT - TGT A.D. LAKTAŠI, 561
MEDICINSKI KISIK MESSER - MESSER TEHNOPLIN D.O.O., 562
MEDICINSKI KISIK MESSER - MESSER TEHNOPLIN D.O.O., 562
MEDROL - PFIZER INC., 288
megestrol, 383
MEGOXI - POLFARMEX S.A., 383
MEKINIST - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 364
MEKSENA - ALKALOID AD SKOPJE, 199
MELCAM - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 414
meldonium, 185
meloksikam, 414
MELOX - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 414
MELOX FORT - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 415
MELPAMID 1 MG - BOSNALIJEK D.D., 114
MELPAMID 2 MG - BOSNALIJEK D.D., 114
MELPAMID 3 MG - BOSNALIJEK D.D., 114
MEMALIS - ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A., 494
MEMANDO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 494
memantin, 494
MEMANTIN AMSAL - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO, 494
MEMANTIN PLIVA - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 494
MEMENTO - BOSNALIJEK D.D., 494
MEMORION - STADA ARZNEIMITTEL AG, 494
MEMOXA - ACONITUM PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY, 492
MENARTAN - BERLIN-CHEMIE AG, 227
MENDIAXON - ADAMED PHARMA SPOLKA AKCYJNA, 98
MENDILEX - ALKALOID AD SKOPJE, 461

Indeks

meningokokus A, C, Y, W-135, četverovalentni prečišćeni polisaharidni antigen konjugovani, 341
MENOPUR - FERRING GMBH, 271
mentol, metil-salicilat, terpentinsko ulje, ulje eukaliptusa, 425
MERALYS - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 503
MERALYS HA - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 503
MEROBOCID - SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE 'BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL PHARMACEUTICAL PLANT' PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY, 311
meropenem, 310
MEROPENEM APTAPHARMA - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O., 311
MEROPENEM PANPHARMA - PANPHARMA S.A., 311
MEROPENEM STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG, 311
MEROPENEM VENUS - VENUS PHARMA GMBH, 311
MEROT - BOSNALIJEK D.D., 191
mesalazin, 103
MESALAZIN REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE, 104
mesna, 559
MESTINON - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 496
metadon, 497
METADON ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 497
METALYSE - BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO.KG, 143
metamizol natrijum, 443
METASPON - LABORATORIO REIG JOF RE S.A., 422
metenkefalin, tridekaktid, 392
METFORIX - VEFA ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 111
metformin, 109
METFORMIN HF - STADA ARZNEIMITTEL AG, 111
METFORMIN ZENTIVA - ZENTIVA S.A., 112
metformin, sitagliptin, 114
metformin, vildagliptin, 115
METHOTREXAT SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 408
METHOTREXATE PFIZER - PFIZER INC., 351
METHYLDOPA HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 186
METHYLERGOMETRIN - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 265
metildopa, 186
metilergometrin, 265
metilprednizolon, 288
METILPREDNIZOLON NORMON - LABORATORIOS NORMON S.A., 288
METOCOR - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 200
metoklopramid, 94
metoksi polietilen glikol-epoetin beta, 163
metoprolol, 199
METOTEN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 466
metotreksat, 351, 408
METOTREKSAT REMEDICA - REMEDICA LIMITED, 408
metronidazol, 253, 264, 325, 501
METRONIDAZOL FRESENIUS - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 326
METRONIDAZOL VIOSER - VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY, 326
metronidazol, mikonazol, 265

METRONIDAZOLE-DARNYTSIA - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
 'PHARMACEUTICAL FIRM DARNYTSIA, 326
 METROZOL - BOSNALIJEK D.D., 501
 MEXIA - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 494
 MEZYM 10000 - BERLIN-CHEMIE AG, 106
 MEZYM 20000 - BERLIN-CHEMIE AG, 106
 MICROGYNON 30 - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 267
 midazolam, 481
 MIDAZOLAM HF - STADA ARZNEIMITTEL AG, 482
 MIDAZOLAM PANPHARMA - PANPHARMA S.A., 482
 MIDAZOLAM SERRA CLINIC - LABORATORIOS SERRA PAMIES S.A., 482
 MIDAZOLAM TROIKA - TROIKA PHARMACEUTICALS LIMITED, 482
 MIDOL PROTECT - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA
 D.O.O. BANJA LUKA, 139
 MIDOL PROTECT 75 - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA
 D.O.O. BANJA LUKA, 139
 MIDOLAM - PHARMADA İLAC SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 482
 mikofenolna kiselina, 393
 mikonazol, 81, 101, 247, 264
 MIKO-PENOTRAN - EXELTIS İLAC SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 265
 MIKOTEN - BOSNALIJEK D.D., 247
 MILENOL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
 BANJA LUKA, 204
 MILGAMMA 100 - WÖRWAG PHARMA GMBH & CO.KG, 126
 MILGAMMA N - WÖRWAG PHARMA GMBH & CO.KG, 126
 MINIRIN - FERRING INTERNATIONAL CENTER SA, 284
 MINIRIN MELT - FERRING GMBH, 284
 MINKONTI - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 276
 minoksidil, 261
 MIOZAC - FISIOPHARMA-S.R.L., 182
 mirabegron, 276
 MIRACALM - STADA ARZNEIMITTEL AG, 276
 MIRCERA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 163
 MIRENA - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 266
 mirikizumab, 402
 MIROBACT MAST - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 252
 mirtazapin, 488
 MIRZATEN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 488
 MISAR - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 480
 MISAR SR - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 480
 MISOL - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 486
 MISVENOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 368
 MIVUX - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 334
 MIXTARD 30 FLEXPEN - NOVO NORDISK A/S, 107
 mliječno kiselinske bakterije, 104
 M-M-RVAXPRO - MERCK SHARP & DOHME BV, 344
 MODITEN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 466
 MODITEN DEPO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 466
 MOKSACIN - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 545
 moksifloksacin, 322, 544, 545
 MOKSINE - DEVA HOLDING A.S., 323
 moksonidin, 186

Indeks

MOLOXIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 323
mometazon, 254, 506
MOMETAZON SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 506
MON.FDG (¹⁸F) - CURIUM NUKLEER TIP A.S., 570
MON.IYOT-131 - CURIUM NUKLEER TIP A.S., 570, 571
MON.TEK⁹⁹MO/^{99m}TC GENERATOR - CURIUM NUKLEER TIP A.S., 570
MONALIZ - DEVA HOLDING A.S., 506
MONIZOL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 183
MONKASTA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 527
MONLAST - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 527
MONOCLAR - BOSNALIJEK D.D., 315
MONOPIN - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 206
MONOPRIL - PHARMASWISS D.O.O., 214
MONOPRIL PLUS - PHARMASWISS D.O.O., 219
MONOSAN - PRO.MED.CS PRAHA A.S., 184
montelukast, 526
MONURAL - ZAMBON S.P.A., 327
morfin, 437
moroktokog alfa, 153
MORPHINI HYDROCHLORIDUM ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 438
MOSTRAFIN - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 281
mosunetuzumab, 378
MOTRIX - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 455
MOUNJARO - ELI LILLY EXPORT S.A., 121
MOUNJARO KWIKPEN - ELI LILLY EXPORT S.A., 122
MOVIPREP - NORGINE B.V., 99
MOVYMA - GEDEON RICHTER PLC., 292
MOXI - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 323
MOXIFLOX - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 323
MOXIFLOXACIN VIOSER - VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY, 323
MOXIFLOXACIN-DARNYTSIA - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
PHARMACEUTICAL FIRM DARNYTSIA, 323
MOXIRAL - ALKALOID AD SKOPJE, 323
MOXIVISION - PHARMAVISION EUROPE LTD., 544
MUCODYNE - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 532
MULTIBIC 2 MMOL/L KALIJA - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND
GMBH, 176
MULTIBIC 3 MMOL/L KALIJA - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND
GMBH, 176
MULTIHANCE - BRACCO S.P.A., 568
mupirocin, 252
MUSCOFLEX - BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 428
MYCOCUR - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., 249
MYCOCUR - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 248
MYCOSEB - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 248
MYFORTIC - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 393
MYLDROX - AS GRINDEKS, 186
MYOZYME - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 130
nadroparin, 136
NAFAZOL - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 504
nafazolin, 504, 551
naftifin, 249

NAKLOFEN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 412
 NAKLOFEN DUO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 412
 NAKOM - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 462
 NALGESIN FORTE - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 419
 NALGESIN S - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 419
 nalokson, oksikodon, 438
 naproksen, 418
 NAPROKSEN GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 419
 natalizumab, 405
 NATFORMIN - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 112
 NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH
 PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 176
 NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGER RASTVOR) - HEMOFARM
 PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 170
 NATRIJ HLORID 0,9% VIOSER - VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS
 INDUSTRY, 169
 NATRIJ HLORID POLIFLEKS 0,9% RASTVOR ZA INFUZIJU - POLIFARMA ILAC SAN
 VE TIC.A.S., 176
 NATRIJ KLORID DIACO - DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L., 176
 NATRIJUM JODID - NA131I KAPSULE ZA TERAPIJU - INSTITUT ZA NUKLEARNE
 NAUKE 'VINČA', INSTITUT OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU
 SRBIJU, UNIVERZITET U BEOGRADU, 571
 natrijum oksibat, 500
 natrijum-hidrogenkarbonat, 168
 natrijum-hlorid, 169, 175
 NATRIJUM-HLORID KABI - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 169
 natrijum-jodid (131 I), 570, 571
 natrijum-valproat, 453
 natrijum-valproat, valproinska kiselina, 453
 NAVARIN XR - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 453
 NAZOPASS - ALKALOID AD SKOPJE, 503
 NEBICOR - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO, 202
 NEBIGAL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 202
 NEBILET - BERLIN-CHEMIE AG, 203
 NEBILET PLUS 12,5 - BERLIN-CHEMIE AG, 204
 NEBILET PLUS 25 - BERLIN-CHEMIE AG, 204
 nebivolol, 202
 NEBREMEL - ALKALOID AD SKOPJE, 268
 NEIRATAX - AS KALCEKS, 125
 NEO-ANGIN - KLOSTERFRAU BERLIN GMBH, 513
 NEO-ANGIN BEZ ŠEĆERA - KLOSTERFRAU BERLIN GMBH, 513
 NEOCEF - LABORATÓRIOS ATRAL, S.A., 308
 NEODEKSACIN - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 546
 NEODOLPASSE - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 414
 NEOFEN - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 418
 NEOFEN COMBO - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 421
 NEOFEN FORTE - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 418
 NEOFEN PLUS - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 424
 NEOFEN RAPID - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 418
 neomicin, nistatin, polimiksin B sulfat, 263
 NEOMIDANTAN - JSC OLPHA, 462

Indeks

NEO-PENOTRAN FORTE - EXELTIS ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI,
265
NEOPERSEN - ADIPHARM EAD, 483
neostigmin, 495
NEOZAPIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 469
nepafenak, 546
NERIDE - SYNTHON B.V., 390
NEVANAC - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 546
NEVOTEK - BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., 322
NEXETIN - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 490
NEZALLIX - ADALVO LIMITED, 507
NGENLA - PFIZER INC., 283
NIBEL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 203
NICORETTE - MCNEIL AB, 496
NICORETTE FRESHMINT - MCNEIL AB, 496
NICORETTE INVISIPATCH - LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG, 496
nifedipin, 206
NIFEDIPINE-RETARD REMEDICA - REMEDICA LIMITED, 206
NIFURAN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 326
nifuratel, nistatin, 263
nifuroksazid, 101
NIFUROKSAZID ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 102
nikotin, 496
nilotinib, 359
NILOTINIB PHARMASCIENCE - PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED, 359
NILOTINIB STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG, 359
NILOTINIB TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 360
NILOTINIB ZENTIVA - PHAROS MT LTD., 359
NILOTINIB ZENTIVA - PHAROS MT LTD., 360
NIMENRIX - PFIZER INC., 341
nimesulid, 423, 425
nimodipin, 206
NIMOSAN - SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GMBH, 206
NIMULID - PANACEA BIOTEC PHARMA LIMITED, 423
NIMULID MD - PANACEA BIOTEC PHARMA LIMITED, 423
NIMULID TRANSGEL - PANACEA BIOTEC PHARMA LIMITED, 425
NINLARO - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, 382
nintedanib, 371
NINTEDANIB ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O, 371
NINTEDANIB ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O. TAMSOWA
7, 02-677 VARŠAVA POLJSKA, 371
NINTEDANIB PLIVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 371
NINTEDANIB TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 371
nirmatrelvir, ritonavir, 333
NIRVAX - BOSNALIJEK D.D., 456
nistatin, 100, 247, 263
nistatin, oksitetraciklin, 263
NITINAB - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 360
nitisinone, 131
nitrazepam, 481
nitrofurantoin, 326
NITROGLICERINA BIOINDUSTRIA L.I.M. - BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P A., 183
NITROGLICEROL - BOSNALIJEK D.D., 183

NITROLINGUAL SPREJ - G.POHL BOSKAMP GMBH & CO.KG, 183
nivolumab, 375
NIZON - BOSNALIJEK D.D., 289
NODRIGA - ALKALOID AD SKOPJE, 359
NOFLOX - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 321
NOLICIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 321
NOLPAZA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 87
NOLPAZA CONTROL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 87
NOMIGREN - BOSNALIJEK D.D., 449
nonakog alfa, 155
nonakog beta pegol, 154
noradrenalin (norepinefrin), 181
NORADRENALIN KALCEKS - AS KALCEKS, 181
noretisteron, 271
norfloksacin, 321
NORFLOXACIN REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE, 321
NORMATIN - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Š., 549
NORMAVIL - BOSNALIJEK D.D., 118
NORPREXANIL 10 MG/10 MG TABLETA - LES LABORATOIRES SERVIER, 220
NORPREXANIL 10 MG/5 MG TABLETA - LES LABORATOIRES SERVIER, 220
NORPREXANIL 5 MG/10 MG TABLETA - LES LABORATOIRES SERVIER, 220
NORPREXANIL 5 MG/5 MG TABLETA - LES LABORATOIRES SERVIER, 220
NORVASC - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 205
NOTUSS - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 534
NOVALGETOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 443
NOVOEIGHT - NOVO NORDISK A/S, 152
NOVOMIX 30 FLEXPEN - NOVO NORDISK A/S, 108
NOVORAPID FLEXPEN - NOVO NORDISK A/S, 106
NOVOSEVEN - NOVO NORDISK A/S, 156
NOZINAN - NEURAXPHARM PHARMACEUTICALS S.L., 465
NUBEQA - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 388
NUROFEN ZA DJECU JAGODA - RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED, 418
nusinersen, 432
NUTRINEAL PD4 1,1% - BAXTER AG, 173
NUWIQ - OCTAPharma AG, 153
NYSTATIN HF - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 100, 247, 263
NYVEPRIA - PFIZER INC., 391
obinutuzumab, 373
OCREVUS - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 406
OCREVUS 920 MG/23 ML - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 406
OCTAGAM - OCTAPharma AG, 339
OCTANATE - OCTAPharma AG, 154
OCTANATE LV - OCTAPharma AG, 154
OCTANINE F - OCTAPharma AG, 155
OCTAPLEX 500 IU - OCTAPharma AG, 151
OCTEANGIN - KLOSTERFRAU BERLIN GMBH, 514
OCTENISEPT - SHULKE & MAYR GMBH, 258
OESTRACLIN - SEID.S.A., 269
ofatumumab, 406
ofloksacin, 555
OFTAMYCIN - DEVA HOLDING A.S., 543

Indeks

OGIVRI - BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED, 374
OHB 12 - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 161
okrelizumab, 406
oksaliplatin, 380
OKSALIPLATIN QILU - QILU PHARMA SPAIN SL, 380
oksazepam, 478
oksimetazolin, 503
oksitocin, 284
okskarbazepin, 452
oktenidin, 513
oktreotid, 285
OKTREOTID TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 285
OLANDIX - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 470
olanzapin, 469
OLANZAPIN REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE, 470
olaparib, 382
OLEOVIT D3 - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 125
OLFEN - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 424
OLFREX - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 470
OLICARD RETARD - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 184
OLIRE - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 119
olmesartan medoksomil, 227
OLMETEC - DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH, 228
OLMETEC PLUS - DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH, 230
olodaterol, tiotropijum-bromid, 521
olopatadin, 552
OLYNTH - DELPHARM ORLÉANS, 504
OLYNTH HA - FAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U., 504
omalizumab, 528
OMEPRAZID - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 85
omeprazol, 84
OMEZOL - ALKALOID AD SKOPJE, 85
OMNIPAQUE - GE HEALTHCARE AS, 564
OMNITROPE - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 283
OMNITUS - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 534
OMNITUS FORTE - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 534
OMVOH - ELI LILLY EXPORT S.A., 402
ONBREZ BREEZHALER - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 516
ONCEAIR - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 527
ondansetron, 95
ONDANSETRON TROIKAA - TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 96
ONGENTYS - BIAL - PORTELA & CA,S.A., 465
ONKO BCG 100 - SYNTHAVERSE S.A., 392
ONTRIL - BOSNALIJEK D.D., 525
OPALERG - UNIMED PHARMA SPOL. S.R.O., 552
OPATANOL - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 552
OPDIVO - BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, 376
OPERIL - LABORATORIOS ALCALA FARMA, S.L., 503
OPERIL P - LABORATORIOS ALCALA FARMA, S.L., 503
opikapon, 465
OPRYMEA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 464
OPTIMON - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 211
OPTIMON HCT - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 217

OPTIRAY 300 - GUERBET, 566
 OPTIRAY 350 - GUERBET, 566
 ORABLOC - PIERREL S.P.A., 437
 ORALSEPT - REPLEK AD SKOPJE, 82
 ORAMORPH - L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SOCIETA DI ESERCIZIO- S.P.A., 438
 OREBRITON - LABORMED-PHARMA S.A., 141
 ORLADEYO - BIOCRYST IRELAND LIMITED, 177
 ORMIDOL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 200
 OROFAR AKUT - GEISER PHARMA, S.L.U., 514
 ORVAGIL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 264, 326, 501
 OSADENT - DR. A. & L. SCHMIDGALL GMBH & CO KG, 563, 573
 osimertinib, 362
 OSPEN K 1 MIU - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 298
 OSPEN 750 - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 298
 OSPEN K 1,5 MIU - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 298
 Ostali lijekovi koji djeluju na nervni sistem, 499
 OTOL H - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 554
 OVERACT - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 225
 OVITRELLE - MERCK HEALTHCARE KGAA, 272
 OXALIPLATIN PLIVA 5 MG/ML - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 380
 OXALIPLATINUM ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O, 380
 OXAWAY - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 149
 OXYCORT - TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE, 255
 OYAVAS - STADA ARZNEIMITTEL AG, 377
 OZEMPIC - NOVO NORDISK A/S, 120
 PACLITAXEL PLIVA 6 MG/ML - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 355
 PACLITAXEL SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 355
 PAGAMAX - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 449
 PAICOR - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 222
 paklitaksel, 354
 PAKSTON - ALKALOID AD SKOPJE, 485
 palbociklib, 364
 PALEXIA - GRUNENTHAL GMBH, 442
 PALEXIA SR - GRUNENTHAL GMBH, 442
 paliperidon, 475
 PALIPERIDON TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.*, 476
 PALITREX - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 303
 palivizumab, 341
 PALLADA - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ş., 552
 PALLORIN - STADA ARZNEIMITTEL AG, 212
 PALLORIN COMBO - STADA ARZNEIMITTEL AG, 223
 PANADOL - GLAXOSMITHKLINE-CONSUMER MAGYARORSZAG KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG, 444
 PANADOL BABY - HALEON HUNGARY KFT, 444
 PANADOL EXTRA - GLAXOSMITHKLINE-CONSUMER MAGYARORSZAG KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG, 447
 PANADOL FORTE OPTIZORB - HALEON HUNGARY KFT, 447
 PANADOL OPTIZORB - HALEON HUNGARY KFT, 444
 PANATUS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 534
 PANATUS FORTE - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 534
 PANCEF - ALKALOID AD SKOPJE, 309

Indeks

PANCILLIN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 299

PANCURONIUM PANPHARMA - PANPHARMA S.A., 427

PANDEV - DEVA HOLDING A.S., 87

panitumumab, 375

PANKLAV - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 302

PANKLAV 2X - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 302

PANKLAV FORTE - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 302

pankreatin, 105

pankuronijum, 426

PANOCER - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 87

PANTHENOL - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 250

PANTHENOL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 128

PANTONOR - LABORATORIOS NORMON S.A., 87

pantoprazol, 86

PANTOPRAZOL HEMOFARM - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 87

PANTOPRAZOL STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG, 88

papilomavirus (humani tipovi 6, 11, 16, 18), 346

papilomavirus (humani tipovi 6,11,16,18,31,33,45,52,58), 346

PARACEROL - POLIFARMA ILAC SAN VE TIC.A.S., 444

PARACET FLU - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO, 446

paracetamol, 443

PARACETAMOL ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 445

PARACETAMOL AMSAL - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO, 445

PARACETAMOL BOSNALIJEK - BOSNALIJEK D.D., 445

PARACETAMOL GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 445

PARACETAMOL REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE, 445

PARACETAMOL S.A.L.F. - S.A.L.F.-S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO, 445

PARACETAMOL ZADA - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 445

paracetamol, pseudoefedrin, 508

paracetamol, tramadol, 440

PARAFEN - REPLEK AD SKOPJE, 421

PARAVANO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 237

PARAVANO DUO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 241

parikalcitol, 292

PARLIN - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 464

paroksetin, 485

PAROXAL - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 485

PAXIBAN - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 148

PAXLOVID - PFIZER INC., 333

pazopanib, 370

PAZOPANIB PHARMASCIENCE - PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED, 370

PAZOPANIB STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG, 370

PAZOPANIB TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.*, 370

PAZOPANIB ZENTIVA - PHAROS MT LTD., 371

PDSOLONE - SWISS PARENTERALS LIMITED., 288
PDSOLONE 40 MG - SWISS PARENTERALS LIMITED., 288
pegfilgrastim, 391
PELARIA - PHYTOPHARM KLEKA S.A., 528, 535
PELGRAZ - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O, 391
PELIMERA - SYNTHON B.V., 351
pembrolizumab, 376
pemetreksed, 351
PENOPEN - REMEDICA LIMITED, 298
pentaeritritil tetranitrat, 183
PENTASA - FERRING INTERNATIONAL CENTER SA, 104
PENTAXIM - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 347
PENTIAX - GOODWILL PHARMA DOO ZA TRGOVINU, USLUGE, EXPORT-IMPORT SUBOTICA, 472
PENTILIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 194
PENTOKAR - SAKAR HEALTHCARE LTD, 88
pentoksifilin, 194
PENTREXYL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 296
PERFOSE - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 559
PERGOVERIS - MERCK HEALTHCARE KGAA, 273
perindopril, 212
PERJETA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 374
PERSANTIN - GLENWOOD GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE (GLENWOOD GMBH), 139
PERSEN - SOPHARMA AD, 483
PERSEN FORTE - ADIPHARM EAD, 483
pertuzumab, 374
pertuzumab, trastuzumab, 379
PEYONA - CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH, 491
PHARMADON - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 473
PHARMAFLU - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 509
PHARMCORTI - SKYMAP PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED, 289
PHARMOX CV - INJECT CARE PARENTERALS PVT. LTD., 302
PHARYNGAL - BOSNALIJEK D.D., 511
PHENOBARBITON HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 451
PHESGO - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 379
PHEZAM - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.*, 491
PHLEBODIA - LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, 197
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUKOZA 1,36%W/V/13,6 MG/ML - BAXTER AG, 172
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUKOZA 2,27%W/V/22,7 MG/ML - BAXTER AG, 172
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUKOZA 3,86%W/V/38,6 MG/ML - BAXTER AG, 172
PHYSIONEAL 40 GLUKOZA 1,36% W/V - BAXTER AG, 172
PHYSIONEAL 40 GLUKOZA 2,27% W/V - BAXTER AG, 173
PHYSIONEAL 40 GLUKOZA 3,86% W/V - BAXTER AG, 173
PHYSIOTENS - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 186
PIFELTRO - MERCK SHARP & DOHME BV, 335
PIKOVIT - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 122, 123
PILFUD - BOSNALIJEK D.D., 261
pimekrolimus, 260
PINOX - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 207
piperacilin, tazobaktam, 302

Indeks

PIPERACILIN/TAZOBAKTAM KALCEKS - AS KALCEKS, 303
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI 4 G/0,5 G - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 303
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM PANPHARMA - PANPHARMA S.A., 303
PIQRAY - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 367
piracetam, 491
pirfenidon, 409
PIRFENIDON MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED, 409
piridoksin, 127
piridostigmin, 495
pitavastatin, 238
PLANICID - CENTURION ILAC SANAYI VE TIC. A.S., 324
PLAVIX - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 137
PLENVU - NORGINE B.V., 99
PLIBEX - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 126
PLICET RAPID - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 445
PLIMYCOL - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 264
PLIMYCOL - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 247
PLIVADON - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 448
PLIVATINIB - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 358
PLIVIT D3 - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 125
pneumokokus, prečišćeni polisaharidni antigen, 341
pneumokokus, prečišćeni polisaharidni antigen konjugovani, 342
PNEUMOVAX 23 - MERCK SHARP & DOHME BV, 342
polatuzumab vedotin, 378
POLGYL - POLIFARMA ILAC SAN VE TIC.A.S., 326
POLINOL - DR. GUSTAV KLEIN GMBH&CO. KG, 573
POLIVY - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 378
POLTECHNET - NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH, 570
POLYGYNAX - LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, 264
pomalidomid, 409
POMERGOLID - SYNTHON B.V., 410
ponesimod, 395
PONVORY - JANSSEN-CILAG KFT., 395
POROXIFEN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 430
PORTALAK - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 99
POSAGIL - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 331
posakonazol, 330
POSAKONAZOL MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED, 331
povidon jod, 257, 265, 511
POVIDON JOD HF - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 258, 265
PRALUENT - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 240
pramipeksol, 463
pramiracetam, 492
PRAMISTAR - BERLIN-CHEMIE AG, 492
prasugrel, 140
PRASUGREL MYLAN - MYLAN GERMANY GMBH., 140
PRATIN - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 238
PRAXITEN 15 - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 478
prazepam, 479
PRAZEPAM HEMOFARM - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 479

PRAZINE - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 466
 prazosin, 186
 prednizolon, tetrakain, tirotricin, 554
 prednizon, 289
PREDUCTAL - LES LABORATOIRES SERVIER, 184
PREDUCTAL MR - LES LABORATOIRES SERVIER, 185
 pregabalin, 448, 458
PREGABALIN REMEDICA - REMEDICA LIMITED, 449
PREGABIO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 449
PRENESSA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 212
PRENESSANEO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, LABENA D.O.O., TESLOVA 30, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA, 212
PRENEWEL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 217
PRENEWELNEO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 218
PREPIDIL - PFIZER INC., 266
PROSOLOL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 200
PRESONAT - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 201
PRESSING - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 538
PREVENAR 20 - PFIZER INC., 342
PREXANIL A - LES LABORATOIRES SERVIER, 212
PREXANIL COMBI A 10 MG/2,5 MG - LES LABORATOIRES SERVIER, 218
PREXANIL COMBI A 5 MG/1,25 MG - LES LABORATOIRES SERVIER, 218
PRIAMLO - ZENTIVA, K.S., 220
PRILEN - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 214
PRILEN PLUS - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 218
PRILENAP - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 210
PRILENAP H - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 216
PRILENAP HL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 216
PRILINDA - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 214
PRILINDA COMBO - ADAMED PHARMA S.A., 224
PRILINDA DUO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 221
PRILINDA PLUS - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 218
PRIMOLUT-NOR - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 271
PRIMOVIST - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 569
PRINORM - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 200
PRIORIX - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 344
 prirodni fosfolipidi, 541
PROBIOL - BOSNALIJEK D.D., 202
PROCULIN - ALKALOID AD SKOPJE, 551
PROGAS - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 88
 progesteron, 269
PROGRAF - ASTELLAS IRELAND CO. LTD, 403
PROLIA - AMGEN (EUROPE) GMBH, 431
PROMASS - BOSNALIJEK D.D., 430
 promazin, 466

Indeks

PROMAZIN FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 466
PROMIN - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 557
PRONERV - G.L. PHARMA GMBH, 126
PRONISON - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 289
PROPAFEN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 180
propafenon, 180
PROPAFENON ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 180
PROPAFENON FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 180
propiltiouracil, 291
propofol, 434
PROPOFOL 1% MCT FRESENIUS - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 434
PROPOFOL TROIKAA - TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 434
propranolol, 198
PROPRANOLOL GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 198
PROSPAN AKUT - ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, 530
PROSPAN LIQUID - ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, 530
PROSPAN SIRUP - ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, 530
PROSPERA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 473
PROSTAMOL UNO - BERLIN-CHEMIE AG, 282
PROSTULOSIN - ADAMED PHARMA S.A., 280
protamin, 557
PROTAMIN SULFAT GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 557
PROTECTA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 234
PROZERIN - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY PHARMACEUTICAL FIRM
DARNYTSIA, 495
prukaloprid, 99
pseudoefedrin, triprolidin, 508
PTU - ALKALOID AD SKOPJE, 291
PULCET - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 88
PULMOZYME - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 533
PYLOMID - BOSNALIJEK D.D., 95
QLAIRA - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT, 268
Q-PIN - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 472
QVAR AUTOHALER - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 522
rabeprazol, 89
RABEPRAZOL SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 89
RABEZOL - LABORATORIOS LICONSA S.A., 90
raltegravir, 335
RAMEAM - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 221
ramipril, 213
ramipril, rosuvastatin, 245
RANEXA - BERLIN-CHEMIE AG, 185
ranibizumab, 552
ranitidin, 83
RANOBEL - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 84
ranolazin, 185
RANTUDIL FORTE - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 414
RAPIDOL S - PHARMASWISS D.O.O., 418
RAPRIL - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO, 214
RAPTEN - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 425
RAPTEN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 412

RAPTEN - K - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 412
RAPTEN DUO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 412
RAPTEN FORTE - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 413
RAPTEN FORTE 2% GEL - STADA ARZNEIMITTEL AG, 425
rasagilin, 464
RASAGILINE REMEDICA - REMEDICA LIMITED, 464
ravulizumab, 406
REBIF - MERCK HEALTHCARE KGAA, 391
REBONE - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 431
RECARBRIO - MERCK SHARP & DOHME BV, 313
RECORMON - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 162
REDICLON 0,1% - DEVA HOLDING A.S., 546
REFACTO AF - PFIZER INC., 153
REFALGIN - REPLEK AD SKOPJE, 443
REFERUM - REPLEK AD SKOPJE, 159
REFIDORO - ALKALOID AD SKOPJE, 242
REFIXIA - NOVO NORDISK A/S, 154
REGLAN - ALKALOID AD SKOPJE, 95
REKONAZOL - REPLEK AD SKOPJE, 248
REKOVELLE - FERRING GMBH, 273
RELIKA - ALKALOID AD SKOPJE, 212
RELVAR ELLIPTA - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 520
REMABIRAT - REMEDICA LIMITED, 390
REMICADE - JANSSEN-CILAG KFT., 397
REMSIMA - CELLTRION INC., 397
REMUREL - SYNTHON B.V., 392
RENNIE - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 83
REPLAGAL - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, 129
REPPLE - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 193
REQUIP - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 463
REQUIP MODUTAB - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 463
RESELIGO - AMW GMBH, 385
RESPEKT - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 137
RESPIREX - STADA ARZNEIMITTEL AG, 520
RESPIRO - DEVA HOLDING A.S., 517
RESPIRO-D - DEVA HOLDING A.S., 518
RETOMIN - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 276
REVATIO - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 276
REVOLADE - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 158
REXTOL - RAFARM S.A., 293
RHEUMON - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 423
RHINOBOS - BOSNALIJEK D.D., 448
RHINOSTOP - BOSNALIJEK D.D., 447
RHINOSTOP HOT - BOSNALIJEK D.D., 508
RHINOZAD - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 508
RIBAXAN - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 144
ribociklib, 365
RICUS - BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., 473

Indeks

riluzol, 500
rimegepant, 450
RINASEK - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 508
RINGER LAKTAT DIACO - DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L., 170
RINGER LAKTAT VIOSER - VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY, 170
RINGEROV LAKTAT FRESENIUS KABI OTOPINA ZA INFUZIJU - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 170
RINGEROVA OTOPINA BRAUN - B.BRAUN MELSUNGEN AG, 170
RINGEROVA OTOPINA FRESENIUS KABI OTOPINA ZA INFUZIJU - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 170
RINOACT - BOSNALIJEK D.D., 505
RINOACT P - BOSNALIJEK D.D., 505
RINOFF - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 504
RINVOQ - ABBVIE INC., 405
RINVOQ, TABLETE SA PRODUŽENIM OSLOBAĐANJEM, 30 MG - ABBVIE INC., 405
RINVOQ, TABLETE SA PRODUŽENIM OSLOBAĐANJEM, 45 MG - ABBVIE INC., 405
risdiplam, 432
risperidon, 473
RISPOLEPT CONSTA - JANSSEN-CILAG KFT., 474
RISSAR - ALKALOID AD SKOPJE, 474
RISSET - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 474
rituksimab, 372
RITUXIMAB BIOCAD - ANABION SERVICES AND SOLUTIONS FZ-LLC, 372
rivaroksaban, 144
RIVAROKSABAN HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 144
RIVAROX - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 145
RIVAROXABAN ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O., 145
RIVAROXABAN ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O., 145
rivastigmin, 493
RIVER - BOSNALIJEK D.D., 145
RIVOKSAR - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 145
RIVOTRIL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 451
RIXATHON - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 372
ROACUTANE - CHEPLAPHARM SCHWEIZ GMBH, 260
ROCALTROL - ATNAHS PHARMA UK LTD, 124
ROCURONIUM BROMIDE KALCEKS - AS KALCEKS, 427
RODAVAN N - BOSNALIJEK D.D., 536
ROJAZOL 20 MG/G KREMA - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 247
ROJAZOL 200 MG VAGITORIJI - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 265
roksitromicin, 314
rokuronijum bromid, 427
ROLPRYNA SR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 463
RONDO - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 213
RONIX - CENTURION ILAC SANAYI VE TIC. A.S., 431
ropinirol, 462
ROPUIDO - ALKALOID AD SKOPJE, 237
ROSACTA - MEDIS D.O.O. LJUBLJANA, 426
ROSIX - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 237
ROSIX COMBI - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 242
ROSSTAT - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO, 237
ROSUCARD - ZENTIVA, K.S., 237

ROSUPRIL - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 245
 rosuvastatin, 236
 rosuvastatin, valsartan, 243
ROSUXAN - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 243
ROSWERA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 237
ROSWERA COMBI - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 242
 rota virus, petovalentni, živi,, 345
 rota virus, živi, atenuisani, 345
ROTARIX - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 345
ROTATEQ - MERCK SHARP & DOHME BV, 345
ROTEAS - BERLIN-CHEMIE AG, 149
ROTIN - BOSNALIJEK D.D., 238
ROWACHOL - ROWA PHARMACEUTICALS LTD, 97
ROWATINEX - ROWA PHARMACEUTICALS LTD, 274
ROXACET COLD - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 535
ROXAMPEX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 244
ROXIMISAN - SLAVIAMED D.O.O. BEOGRAD, 314
ROXIPER - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 244
ROZAMET - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 253
ROZLYTREK - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 371
ROZYFEN - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 418
RUDAKOL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 92
RUFIXALO - ALKALOID AD SKOPJE, 145
 ruksolitinib, 366
RUNAPLAX - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 146
RUPAFIN - NOUCOR HEALTH, S.A., 539
 rupertadin, 539
RUPILIP - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 238
RUPURUT - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 83
RUSOVAS - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 238
RUXIENCE - PFIZER INC., 372
RYBELSUS - NOVO NORDISK A/S, 120
RYBELSUS - NOVO NORDISK A/S, 120
RYBELSUS - NOVO NORDISK A/S, 120
RYTMONORM - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 180
RYZODEG - NOVO NORDISK A/S, 108
 safinamid, 464
SAFLUTAN - SANTEN OY, 551
SAIZEN - MERCK HEALTHCARE KGAA, 283
SAKLOVIR - SAKAR HEALTHCARE LTD, 333
 sakubitril, valsartan, 233
SALAZOPYRIN EN - PFIZER INC., 103
SALBUAL - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 516
 salbutamol, 515, 525
SALDISK - CELON PHARMA S.A., 518
SALMIMET - BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 104
SALOFALK - DR FALK PHARMA GMBH, 104
SALRES - DEVA HOLDING A.S., 516
SALTAPSA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 369
SANDIMMUN NEORAL - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 402
SANDOSTATIN - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 286
SANDOSTATIN LAR - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 286

Indeks

SANVAL - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 482
SARGIN - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 225
satralizumab, 402
SAURUS - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 275
SAURUS COMBO - STADA ARZNEIMITTEL AG, 280
SCEMBLIX - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 361
SCLEFIC - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 500
SEBRALER - DEVA HOLDING A.S., 525
SEEBRI BREEZHALER - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 525
SEFPOTEC - NOBEL ILAČ SANAYII VE TICARET A. Ş., 309
SEIDIGESTAN - SEID.S.A., 270
sekukinumab, 401
selumetinib, 364
semaglutid, 120
SEMGLEE - BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED, 108
SEPTANAZAL ZA DJECU - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 505
SEPTANAZAL ZA ODRASLE - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 505
SEPTOLETE TOTAL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 512, 515
SEPTOLETE TOTAL COLA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 515
SEPTOLETE TOTAL EUKALIPTUS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 515
SEPTOLETE TOTAL LIMUN I ĐUMBIR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 515
SEPTOLETE TOTAL LIMUN I MED - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 512, 514
SEPTOLETE TOTAL LIMUN I ZOVA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 512, 514
SERETIDE DISKUS - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 518
SERETIDE INHALER - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 518
SEROXAT - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 485
SERTAN - BOSNALIJEK D.D., 486
SERTOGEN - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ş., 420
sertralín, 485
SEVASOL - SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICALS CO.,LTD, 559
sevelamer, 558
SEVIKAR - DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH, 231
SEVIKAR HCT - DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH, 233
sevofluran, 433
SEVOFLURAN BAXTER - BAXTER AG, 433
SEVORANE - ABBVIE INC., 433
SIDATA - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 486
SILDENA - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 276
sildenafil, 276
SILETRIS - STADA ARZNEIMITTEL AG, 388
silimarín, 98
SILYMARIN BELUPO - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 98
SILYMARIN FORTE BELUPO - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 98
SIMBRINZA - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 548
simetikon, 93
simoktokog alfa, 152
SIMPONI - JANSSEN-CILAG KFT., 399

simvastatin, 233
 SINACILIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 297
 sinakalcet, 292
 SINEDOL - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 196
 SINEGRA - NOBEL ILAČ SANAYII VE TİCARET A. Ş., 276
 SINGULAIR - N.V. ORGANON, 527
 SINGULAIR JUNIOR - N.V. ORGANON, 527
 SINGULAIR MINI - N.V. ORGANON, 527
 SINODERM - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 254
 SINODERM N - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 256
 SINOLPAN - ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, 530
 SINOLPAN FORTE - ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, 530
 SINOLPAN FORTE - ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, 530
 SINTROM - MERUS LABS LUXCO II S.A.R.L., 133
 SIOFOR 1000 - BERLIN-CHEMIE AG, 112
 SIOFOR 500 - BERLIN-CHEMIE AG, 112
 SIOFOR 850 - BERLIN-CHEMIE AG, 112
 siponimod, 404
 SIPROBEL - NOBEL ILAC SANAYII VE TİCARET A.S., 321
 SITABEL - NOBEL ILAC SANAYII VE TİCARET A.S., 117
 SITABEL MET - NOBEL ILAC SANAYII VE TİCARET A.S., 115
 sitagliptin, 116
 SKOPRYL - ALKALOID AD SKOPJE, 211
 SKOPRYL COMBO - ALKALOID AD SKOPJE, 219
 SKOPRYL PLUS - ALKALOID AD SKOPJE, 217
 SKUDEX - BERLIN-CHEMIE AG, 441
 SLAM - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 369
 SLOŽENA OTOPINA NATRIJ LAKTATA BRAUN - B.BRAUN MELSUNGEN AG, 170
 SMART - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 492
 SMOFKABIVEN PERIPHERAL - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH., 168
 SMOFLIPID 20% - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 166
 SNUP 0,05% - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 504
 SNUP 0,1% - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 504
 SNUP D - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 505
 SOBYCOMBI - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 204
 SOBYCOR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 202
 SODIUM BICARBONATE LIQVOR - LIQVOR CJSC, 169
 SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULES T - CURIUM NETHERLANDS B.V., 571
 SODIUM OXYBATE KALCEKS - AS KALCEKS, 500
 sofosbuvir, velpatasvir, 335
 sojino ulje, trigliceridi, maslinovo ulje, riblje ulje sa omega 3 kiselinama (masne emulzije), 166
 SOLEZOL - ANFARM HELLAS S.A., 91
 SOLICILLIN - INJECT CARE PARENTERALS PVT. LTD., 296
 SOLIDAGOREN - DR. GUSTAV KLEIN GMBH & CO.KG, 278
 solifenacin, 275
 solifenacin, tamsulosin, 280
 SOLITAM - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO, 280
 SOLIX - TECNIMEDE – SOCIEDADE TECNICO MEDICINAL S.A., 275
 SOLTRIK - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 502
 somatrogon, 283
 somatropin, 283

Indeks

SOMNIS - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 482
SONA - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 259
SONA DUO - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 259
sorafenib, 369
SORAFENIB SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 370
SORAFENIB STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG, 370
SORAFENIB TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 370
SORAGEN - GENEPHARM S.A., 370
SORTIS - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 236
SORTIS PLUS - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 241
sotalol, 199
sotatercept, 188
SPALMOTIL - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 516, 525
SPASMEX FORTE - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 275
SPAZMOL - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 94
SPEXOTRAS - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 364
SPIILAK - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 192
SPINRAZA - BIOGEN INTERNATIONAL GMBH, 432
SPIOLTO RESPIMAT - BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO.KG, 521
SPIRIVA - BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO.KG, 524
SPIRIVA RESPIMAT - BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO.KG, 524
spironolakton, 191, 192
SPIRONOLAKTON GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 192, 193
SPIRTOS - STADA ARZNEIMITTEL AG, 361
SPYLACTON - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ş., 192, 193
SPYRO - ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC., 518
STAGE - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 238
STANICID - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 251
STARTINA - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 243
STINDAB - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 350
STOMATIDIN - BOSNALIJEK D.D., 81
STRENSIQ - ASTRAZENECA AB, 130
STREPSILS COOL - RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED, 512
STREPSILS LIMUN BEZ ŠEĆERA - RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED, 512
STREPSILS MED I LIMUN - RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED, 512
STREPSILS MENTOL I EUKALIPTUS - RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED, 513
STREPSILS NARANDŽA SA VITAMINOM C - RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED, 513
STREPSILS PLUS - RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED, 512
STULIPOR - VERISFIELD SINGLE MEMBER S.A., 263
SUCCINEX-M - WELCURE REMEDIES, 289
sugamadeks, 557
SUGAMMADEX MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED, 557
sugemalimab, 377
suhi ekstrakt korijena odoljena, suhi ekstrakt pasiflore, 483
suhi ekstrakt korijena pelargonije, 528

suhi ekstrakt korjena odoljena, suhi ekstrakt lista matičnjaka, suhi ekstrakt lista pitome nane, 483
 suhi ekstrakt lista bršljena, 529
 suhi ekstrakt medvjedkinog lista, 274
 suhi ekstrakt timijana, 529
 suhi ekstrakt timijana, tečni ekstrakt korijena bijelog sljeza, 529
 suksametonijum, 426
 sulfadiazin-srebro, 252
 sulfametoksazol, trimetoprim, 313
 sulfasalazin, 103
 SULFASALAZIN KRKA EN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 103
 SULIQUA SOLOSTAR - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 109
 sulpirid, 472
 SULPIRID FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 472
 SUMAMED - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 316
 SUMAMED 1200 - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 316
 SUMAMED FORTE - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 316
 sumatriptan, 450
 SUMATRIPTAN SLAVIAMED - SLAVIAMED D.O.O. BEOGRAD, 450
 SUNICOR - SYNTHON B.V., 368
 SUNIGEN - GENEPHARM S.A., 368
 sunitinib, 368
 SUNITINIB MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED, 368
 SUNITINIB PHARMASCIENCE - PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED, 368
 SUNITINIB PLIVA - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 369
 SUNITINIB STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG, 369
 SUNUBIS - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 369
 SURVANTA - ABBVIE INC., 540
 SUTENT - PFIZER INC., 369
 SUXAMETHONIUM CHLORID VUAB 100 MG - VUAB PHARMA A.S., 426
 SWISSCILLIN - SWISS PARENTERALS LIMITED., 296
 SYNAGIS - ASTRAZENECA AB, 341
 SYNETRA - ALKALOID AD SKOPJE, 137
 SYNOPEN - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 250, 537
 SYNTARPEN - TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE, 299
 SYNTOCINON - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 285
 SYRLENO - ALKALOID AD SKOPJE, 365
 TACFORIUS - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 403
 tadalafil, 277
 TADALAFIL HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 278
 TADILECTO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 278
 tafamidis, 500
 TAFINLAR - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 362
 tafluprost, 551
 TAGRISSO - ASTRAZENECA AB, 362
 TAITA - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 490
 TAKHZYRO - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, (IRELAND BRANCH), 177
 takrolimus, 403
 talidomid, 408
 TAMLOS - ALKALOID AD SKOPJE, 279

Indeks

TAMLOS DUOD - ALKALOID AD SKOPJE, 280
tamoksifen, 386
TAMOSIN - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 279
TAMOSIN DUO - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 280
TAMOXIFEN REMEDICA - REMEDICA LIMITED, 386
TAMSAL - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO, 279
TAMSOLIN - STADA ARZNEIMITTEL AG, 279
tamsulosin, 278
TANCER - ADAMED PHARMA S.A., 281
TANFLEX 0,15% - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 423
TANFLEX FORT - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 82
TANTUM VERDE - AZIENDE CHIMICHE RIUNITA ANGELINI FRANCESCO-
A.C.R.A.F. S.P.A., 82, 515
TANYZ ERAS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 279
TANYZ - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 279
TANYZ ERAS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 279
tapentadol, 442
TARGET PLUS - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 85
TARGINACT - BARD PHARMACEUTICALS LIMITED, 439
TASIGNA - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 360
TAVANIC - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 322
TAVOCTAME - COOPER S.A., 303
TAZIN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 279
TECENTRIQ - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 376
TECFIDERA - BIOGEN INTERNATIONAL GMBH, 410
tečni ekstrakt cvijeta kamilice, tečni ekstrakt gorke ognjice, tečni ekstrakt herbe
rosopasa, tečni ekstrakt korijena anđelike, tečni ekstrakt korijena sladića, tečni
ekstrakt lista matičnjaka, tečni ekstrakt lista pitome nane, tečni ekstrakt ploda
kima, tečni ekstrakt ploda sikavice, 92
tečni ekstrakt korijena bijelog sljeza, tečni ekstrakt timijana, 529
tečni ekstrakt lista žalfije, tečni ekstrakt timijana, 82
TEFOR - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 112
TEGRETOL - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 452
TEGRETOL CR - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 452
tehnećijum (99mTc) pertehnetat, 569
teikoplanin, 324
TEIKOPOL - POLIFARMA ILAC SAN VE TIC.A.S., 324
telmisartan, 227
TELUKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 527
temozolomid, 350
TEMOZOLOMID ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O., 350
tenekteplaza, 143
TENLOP - BOSNALIJEK D.D., 225
TENLOP H - BOSNALIJEK D.D., 228
tenofovir disoprosil, 334
TENOFIVIR REMEDICA - REMEDICA LIMITED, 334
TENOVIRAL - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 334
TENOX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 205
TENPRIL - BOSNALIJEK D.D., 214
TENPRIL DUO - BOSNALIJEK D.D., 218
TENSEC - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 202
TENSIS - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, 503

teofilin, 525
 TEOKAP SR - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 526
 TEOTARD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 526
 terbinafin, 248, 249
 TEREBO - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 394
 teriflunomid, 394, 407
 TERIFLUNOMID PHARMAS 14 MG FILMOM OBLOŽENE TABLETE - ADALVO LIMITED, 394
 TERIFLUNOMID STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG, 407
 TERIFLUNOMIDE PHARMASCIENCE - PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED, 394
 TERIMIDANE - PHARMACARE PREMIUM LTD., 395
 teriparatide, 292
 testosteron, 269
 TESTOSTERON DEPO - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 269
 TETANUS GAMMA - KEDRION S.P.A., 340
 tetanus imunoglobulin, 340
 tetanus toksoid, 342
 tetanus toksoid, kombinacije sa difterija toksoidom, 343
 TETAVAX - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 343
 TETRAXIM - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 347
 tetrizolin, 551
 TEZEO - ZENTIVA, K.S., 227
 TEZEO HCT - ZENTIVA, K.S., 230
 THALADEF - MSN LABS EUROPE LIMITED, 558
 THALIDINE - SHILPA MEDICARE LIMITED, 408
 THERAFLU MAX PLUS C - HALEON HUNGARY KFT, 509
 THIOGAMMA 600 ORAL - WÖRWAG PHARMA GMBH & CO.KG, 131
 THIOPENTAL PANPHARMA - PANPHARMA S.A., 433
 TIALERA - LABORATORIOS LICONSA S.A., 489
 tiamazol, 291
 tiamin, 125
 tianeptin, 488
 TICACOR - ADALVO LIMITED, 141
 TICADIL - BOSNALIJEK D.D., 141
 TICAGREX - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 141
 TICASA - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 141
 tietilperazin, 537
 TIGECID - CENTURION ILAC SANAYI VE TIC. A.S., 295
 tigeciklin, 295
 TIGECIKLIN ANFARM - ANFARM HELLAS S.A., 295
 TIGECIKLIN NORMON - LABORATORIOS NORMON S.A., 295
 TIGECYCLIN HF - TECNIMEDE SOCIEDADE TECNICI MEDICINAL S.A., 295
 TIGILIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 296
 tikagrelor, 140
 TILAC - BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 413
 TILANTA - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 141
 TILOBRASTIL, 90 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 141
 TILOBRASTIL, 60 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 142
 TILOBRASTIL, 90 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 141
 TIMADREN - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 549

Indeks

TIMALEN - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 549
timolol, 548
TIMOLOL ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 549
timolol, travoprost, 550
TINAZOL - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 502
TINGORA - ALKALOID AD SKOPJE, 142
tinidazol, 501
tinktura korijena pelargonije, 535
tiokolhikozid, 428
tioktinska kiselina, 130
TIOLIZEN - LABORMED-PHARMA S.A., 131
TIOPATI - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 131
tiopental, 433
TIOSAL - ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC., 524
tiotropijum-bromid, 523
TIRAMAT - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 456
tirotricin, 252
tirzepatid, 121
TISINON - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 131
TIVICAY - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 335
TIYOZID - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 428
TIYOZID, TABLETA, 8 MG - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 428
TIZOLES - NOBEL İLAC SANAYII VE TICARET A.S., 325
TOBRADEX - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 547
tobramicin, 318, 543
TOBRAVIS - BALKANPHARMA-RAZGRAD AD, 543
TOBRAVIS COMBO - PHARMAVISION EUROPE LTD., 547
TOBREX - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 543
tocilizumab, 400
tofacininib, 394
TOLDEX - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 275
tolterodin, 275
TOLUCOMBI - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 230
TOLURA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 227
TOMID - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 191
TONOCARDIN - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 187
TONSILOTREN - DR. GUSTAV KLEIN GMBH & CO.KG, 574
topiramat, 456
TOPIRIN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 442
torasemid, 191
TORECAN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 537
TOREM - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 191
TORENDO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 474
TORENDO Q-TAB - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 474
TOSYNAL - ALKALOID AD SKOPJE, 140
TOT`HEMA - LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, 160
TOTYLEM - LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, 160
TOUJEO - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 108
TOZAR - BOSNALIJEK D.D., 236
TRACTOCILE - FERRING GMBH, 267
TRAKTUS - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş., 531
tramadol, 441
TRAMADOL ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 441

TRAMADOL BOSNALIJEK 50 MG KAPSULA, TVRDA - BOSNALIJEK D.D., 441
 TRAMADOL HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 441
 TRAMADOL KRKA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 441
 trametinib, 363
 trandolapril, 214
 traneksaminska kiselina, 150
 TRANEXSOL - SKYMAP PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED, 150
 TRANSTEC 35 MG/H - GRUNENTHAL GMBH, 440
 TRANSTEC 52,5 MG/H - GRUNENTHAL GMBH, 440
 TRANSTEC 70 MG/H - GRUNENTHAL GMBH, 440
 trastuzumab, 373
 trastuzumab emtanzin, 375
 TRAVATAN - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 551
 TRAVAZOL - BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 248
 travoprost, 551
 TRAVOVIS - PHARMAVISION EUROPE LTD., 551
 TRAZEM - BOSNALIJEK D.D., 481
 TRAZIMERA - PFIZER INC., 374
 trazodon, 488
 TREANA - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 470
 TRECAR - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 450
 TREFERO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 475
 TREGONA D - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 493
 TREMFYA - JANSSEN-CILAG KFT., 401
 TRENOLK - BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A., 150
 TRESIBA - NOVO NORDISK A/S, 109
 TREVICTA - JANSSEN-CILAG KFT., 476
 TRICAL - BERLIN-CHEMIE AG, 114
 TRIDERM - N.V. ORGANON, 256
 trifluridin, tipiracil, 354
 TRILEPTAL - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 453
 TRIMBOW - CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH, 521
 TRIMETACOR MR - LABORMED-PHARMA S.A., 185
 trimetazidin, 184
 TRINOMIA - FERRER INTERNATIONAL, SA, 243
 TRIO VISION - BALKANPHARMA-RAZGRAD AD, 68 APRILSKO VASTANIE BLVD., 7200 RAZGRAD, 546
 TRIPLIXAM - LES LABORATOIRES SERVIER, 223
 triptorelin, 385
 TRITACE - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 214
 TRITAZIDE - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 218
 TRITTICO RETARD - AZIENDE CHIMICHE RIUNITA ANGELINI FRANCESCO-A.C.R.A.F. S.P.A., 488
 TRIUMEQ - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 336
 TRIXIN - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 393
 trokserutin, 197
 TROMBOMELT - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 148

Indeks

TROMBOPIRIN - G.L. PHARMA GMBH, 139
trospijum, 275
TRULICITY - ELI LILLY EXPORT S.A., 119
TRUQAP - ASTRAZENECA AB, 372
TRUSOPT - SANTEN OY, 548
TRUVADA - GILEAD SCIENCES IRELAND UC, 336
TRUXIMA - CELLTRION INC., 372
TRYCCEF - BOSNALIJEK D.D., 309
turoktokog alfa, 152
TYGACIL - PFIZER INC., 296
TYGEPOL - POLIFARMA ILAC SAN VE TIC.A.S., 296
TYGEX - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 296
TYGROL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 142
TYLOL COLD SYRUP - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 508
TYLOL HOT - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 508
TYLOL HOT C - NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A. Ş., 535
TYLOL HOT D - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 508
TYLOL HOT LIQUID DAY - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 535
TYLOL HOT PEDIATRIC - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 508
TYLOLFEN HOT - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 510
TYOFLEX - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., 429
TYROSUR - ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, 252
TYRUKO - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 405
TYSABRI - BIOGEN INTERNATIONAL GMBH, 405
ULCAMED - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 91
ULCOSAN - BOSNALIJEK D.D., 85
ulipristal, 268
ULSEPAN - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ş., 88
ULTIBRO BREEZHALER - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 521
ULTOMIRIS - ALEXION EUROPE SAS, 406
ULTOP - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 85
ULTRA-TECHNEKOW FM - CURIUM NETHERLANDS B.V., 570
ULTRAVIST-300 OTOPIKA ZA INJEKCIJU ILI OTOPIKA ZA INFUZIJU ILI ORALNA
OTOPINA - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT, 565
ULTRAVIST-370 OTOPIKA ZA INJEKCIJU ILI OTOPIKA ZA INFUZIJU ILI ORALNA
OTOPINA - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT, 565
UMAN ALBUMIN - KEDRION S.P.A., 164
UNICLOPHEN 0,1% - UNIMED PHARMA SPOL. S.R.O., 546
UNIFLOX 0,3% - UNIMED PHARMA SPOL. S.R.O., 555
UNIKORT - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 248
UNILAT - UNIMED PHARMA SPOL. S.R.O., 550
UNITIMOLOL 0,5 % - UNIMED PHARMA SPOL. S.R.O., 549
UNIVERZALNI 99MO/99MTC GENERATOR (UREĐAJ SA PRIBOROM) - INSTITUT ZA
NUKLEARNE NAUKE 'VINČA', INSTITUT OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA
REPUBLIKU SRBIJU, UNIVERZITET U BEOGRADU, 570
upadacitinib, 404
UPADIL - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 187
UPERIO - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 233
urapidil, 187
URAPIDIL CARINOPHARM 25 MG - CARINOPHARM GMBH, 187
URAPIDIL CARINOPHARM 50 MG - CARINOPHARM GMBH, 187
UROFEM - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 274
UROMITEXAN - BAXTER AG, 559

ursodeoksiholna kiselina, 97
 URISOFALK - DR FALK PHARMA GMBH, 97
 URSONORM - PRO.MED.CS PRAHA A.S., 97
 URSOSAN - PRO.MED.CS PRAHA A.S., 97
 URUTAL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 498
 URUTAL 24 MG - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 499
 URUTAL FORTE - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 499
 ustekinumab, 399
 UTROGESTAN - LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL S.A.S., 270
 UZPRUVO - STADA ARZNEIMITTEL AG, 400
 VABYSMO - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 554
 VAIRA - V - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 470
 vakcina protiv difterije, hemofilus influence B, pertusisa, poliomijelitisa, tetanusa, 347
 vakcina protiv difterije, hemofilus influence B, pertusisa, poliomijelitisa, tetanusa, hepatitis B, 347
 vakcina protiv difterije, pertusisa, poliomijelitisa, tetanusa, 347
 vakcina protiv varičele, živa, 345
 VAL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 225
 VAL PLUS - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 229
 VALAROX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 243
 VALICA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 231
 VALICA COMBI - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 232
 VALOMINDO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 228
 valproinska kiselina, 453
 VALSACOMBI - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 229
 VALSACOR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 225
 valsartan, 225
 VALTRICOM - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 232
 VAMYCIN - PHARMADA ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 324
 VANCOLIXIN - GUFIC BIOSCIENCES LIMITED, 324
 VANCOMAX - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 324
 VANCOMYCIN MYLAN - MYLAN GERMANY GMBH, 324
 VANKAR 1000 - SAKAR HEALTHCARE LTD, 100, 324
 VANKAR 500 - SAKAR HEALTHCARE LTD, 101, 324
 vankomicin, 100, 323
 VANKOMICIN APTAPHARMA - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O., 101, 324
 VANKOMICIN PHARMAS - STRIDES PHARMA (CYPRUS) LIMITED, 101
 varfarin, 133
 VARIVAX - MERCK SHARP & DOHME BV, 345
 VASILIP - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 234
 VASOFLEX - ALKALOID AD SKOPJE, 187
 VASTALOMA - LABORATORIOS FARMALAN S.A., 386
 VAXIGRIP TETRA - SANOFI PASTEUR, 343
 VAXNEUVANCE - MERCK SHARP & DOHME BV, 342
 VAZOTAL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA, 206
 VECTIBIX - AMGEN (EUROPE) GMBH, 375
 VEDICOR - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 204
 vedolizumab, 405
 VEGZELMA - CELLTRION INC., 377
 VELAFAX - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 489

Indeks

VELAFAX XL - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 489
velagluceraze alfa, 130
VELCADE - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., 381
vemurafenib, 362
VENCLYXTO - ABBVIE INC., 383
venetoklaks, 383
venlafaksin, 489
VENOMIA - SANOVEL ILAČ SAN. VE TIC A.Š., 146
VENOSAN - BOSNALIJEK D.D., 196
VENOSMIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 198
VENTAVIS - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT, 140
VENTOLIN - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 516
VENTOLIN INHALER - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 516
VENTOR - REPLEK AD SKOPJE, 423
verapamil, 207
VERAPAMIL ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 208
VERAPAMIL ALKALOID RETARD - ALKALOID AD SKOPJE, 208
VERAPAMIL HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA
D.O.O. BANJA LUKA, 208
VERAPAMIL REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE, 208
vericigvat, 184
VERION - BOSNALIJEK D.D., 282
VERION DUO - BOSNALIJEK D.D., 280
VEROBICINE - PHARMACARE PREMIUM LTD., 353
VERQUVO - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT, 184
VERTO - STADA ARZNEIMITTEL AG, 499
VERZENIOS - ELI LILLY EXPORT S.A., 365
VESIFIX - NOBEL ILAČ SANAYII VE TİCARET A. Ş., 275
VEXANA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 489
VFEND - PFIZER INC., 330
VIAGRA - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 277
VICTOZA - NOVO NORDISK A/S, 119
VIGAMOX - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 544
VILDABET - ILKO ILAČ SANAYI VE TİCARET A.S., 118
vildagliptin, 117
VILDANORM PLUS - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 115
VILPIN - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 206
vinorelbin, 354
VINORELBIN LABORMED - LABORMED-PHARMA S.A., 354
vinpocetin, 492
VIOPLEX-T - MEDICAIR BIOSCIENCE LABORATORIES S.A., 251
VIPDOMET - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, 116
VIPIDIA - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, 118
VIRENTE - NOBEL ILAČ SANAYII VE TİCARET A.S., 334
VISIKLEAR - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., 551
VISINE CLASSIC - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., SYNERGY HEALTH EDE B.V.,
MORSEESTRAAT 3, EDE GLD, 6716 AH, HOLANDIJA, 551
VISIPAQUE - GE HEALTHCARE AS, 566
VISTABEL - ABBVIE INC., 428
VITAMIN AD - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 123
VITAMIN B1 ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 125
VITAMIN B12 ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE, 161
VITAMIN C GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 127

VITAMIN D3 KRKA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 125
 VITOPRIL - STADA ARZNEIMITTEL AG, 211
 VITOPRIL H - STADA ARZNEIMITTEL AG, 217
 VIXARGIO - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 146
 VIZARSIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 277
 VIZOL - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D., 552
 VLOFINOX - ANFARM HELLAS S.A., 322
 VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD, 563
 voda za injekciju, 563
 VODA ZA INJEKCIJU LEKHIM - JOINT STOCK COMPANY LEKHIM-KHARKIV, 564
 vodeni ekstrakt mješavine korijena jagorčevine i herbe timijana, 528
 vodeno-etanolni ekstrakt herbe zlatice, herbe gusije trave i herbe rastavića, 278
 VOLTAREN - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 413
 VOLTAREN EMULGEL 1% - HALEON HUNGARY KFT, 425
 VOLTAREN FORTE - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 413
 VOLTAREN FORTE 2% - HALEON HUNGARY KFT, 425
 VOLTAREN RAPID - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 413
 VOLTAREN RETARD - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 413
 VOMEPRAM - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 95
 VORAMOL - PHARMATHEN S.A., 330
 VORAZYR - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 330
 vorikonazol, 330
 VORTEMYEL - SYNTHON B.V., 381
 VORTIFLEX - STADA ARZNEIMITTEL AG, 490
 vortiooksetin, 490
 VOTRIENT - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 371
 VPRIV - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, IRELAND BRANCH, 130
 VYDURA - PFIZER INC., 450
 VYNDAQEL MEKA KAPSULA - PFIZER INC., 500
 WAMLOX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 231
 WELLBUTRIN XR - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 488
 WILATE - OCTAPHARMA AG, 156
 WINREVAIR - MERCK SHARP & DOHME BV, 188
 XADOS - BERLIN-CHEMIE AG, 540
 XALACOM - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 549
 XALATAN - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 550
 XALKORI - PFIZER INC., 363
 XANAX - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 481
 XANAX SR - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 481
 XANIRVA - S.C.ZENTIVA S.A., 146
 XARELTO - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 146
 XELJANZ - PFIZER INC., 394
 XENETIX - GUERBET, 567
 XEPAR - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 140
 XEPLION - JANSSEN-CILAG KFT., 477
 XERDOXO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 147
 XICLAV - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 302
 XICLAV 1,2 G - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 302
 XICLAV 2X - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 302
 XILOZIN - BOSNALIJEK D.D., 504
 XILOZIN P - BOSNALIJEK D.D., 504

Indeks

XOFLUZA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 338
XOLAIR - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG, 528
XTANDI - ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., 387
XULTOPHY - NOVO NORDISK A/S, 109
YANIDA - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 226
YANIDA COMBO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA
D.O.O. BANJA LUKA, 231
YANIDA H - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 229
YANIDA HL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 229
YANIDA TRIO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 232
YASMIN - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 268
YASNAL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 493
YAZ - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 268
YERVOY - BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, 378
YESINTEK - BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED, 400
YLPJO - PRO.MED.CS PRAHA A.S., 230
YMANA - ALKALOID AD SKOPJE, 494
YUFLYMA - CELLTRION INC., 399
ZACEF - SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE `BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL
PHARMACEUTICAL PLANT` PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY, 307
ZALASTA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 470
ZALASTA Q-TAB - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 470
ZALDIAR 37,5 MG/325 MG - GRUNENTHAL GMBH, 440
ZALTRAP - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, 382
ZANFEXA - ALKALOID AD SKOPJE, 489
ZAPIN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 470
ZARACET - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO, 441
ZARZIO - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 391
ZASAN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 483
ZASSIDA - AQVIDA GMBH, 353
ZAVICEFTA - PFIZER INC., 310
ZEFFIX - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, 334
ZEFLAVON - EXTRACTUMPHARMA CO LTD., 198
ZELBORAF - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, 362
ZELDOX - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 468
ZENIX - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA, 327
ZEOKS - SYNTHON B.V., 558
ZEPIRA - ALKALOID AD SKOPJE, 487
ZERBAXA - MERCK SHARP & DOHME BV, 313
ZERCEPAC - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O., 374
ZESPIRA - BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., 527
ZEVESIN - ZENTIVA, K.S., 275
ZIDENAC - GALENICA S.A, 250
ZINNAT - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., 305
ZIPANTOLA - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 88
ZIPANTOLA PROTECT - PLIVA HRVATSKA D.O.O., 88
ziprazidon, 468
ZIRABEV - PFIZER INC., 377

ZITHROTEL - ANFARM HELLAS AP, 317
ZOFECARD - BERLIN-CHEMIE AG, 215
zofenopril, 215
zoledronska kiselina, 431
ZOLEDRONSKA KISELINA FRESENIUS KABI - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 431
ZOLEDRONSKA KISELINA TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., 431
zolmitriptan, 450
ZOLOFT - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH, 486
ZOLPAN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O., 88
zolpidem, 482
ZOLTEX - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., 88
ZULBEX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 90
ZYGLIP - ALKALOID AD SKOPJE, 239
ZYGOSIS - POLIFARMA ILAC SAN VE TIC.A.S., 88
ZYLIT - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 138
ZYMBAKTAR - HEMOFARM A.D. VRŠAC, 315
ZYPREXA - CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, 470
ZYTRON - ALKALOID AD SKOPJE, 96
željezo (III) hidroksid saharoza kompleks, 160

Indeks

REGISTROVANI LIJEKOVI PREMA ATC-KLASIFIKACIJI

A	ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM
A01	STOMATOLOŠKI PREPARATI
A01A	Stomatološki preparati
A01AB	Antiinfektivni i antiseptici za lokalnu oralnu primjenu

A01AB09 mikonazol

Doziranje: *orofaringealna kandidijaza:* odojčad 4-24 mjeseca, 1,25 ml (1/4 kafene kašičice gela) 4 puta dnevno, nakon obroka; odrasli i djeca starija od 2 god. 2,5 ml (pola kašičice) gela 4 puta dnevno; *kandidijaza gastrointestinalnog trakta:* odojčad preko 4 mjeseca, djeca i odrasli, koji imaju problem sa gutanjem, 20 mg/kg tjelesne težine na dan, podijeljeno u 4 doze; maks. dnevna doza 250 mg (10 ml oralnog gela); terapiju produžiti nedjelju dana nakon povlačenja simptoma

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DAKTANOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

BRp oralni gel [20 mg/1 g] Al-tuba sa 40 g oralnog gela, u kutiji

A01AB12 heksetidin

Doziranje: *oralna higijena:* odrasli i djeca preko 6 god. 15 ml nerazrijeđenog rastvora 2-3 puta dnevno (isprati usta ili grgljati, najbolje ujutro i uveče uvijek poslije jela); upozorenje: rastvor ne gutati

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HEXTEND - HEMOFARM A.D. VRŠAC

BRp rastvor za usnu sluznicu [1 mg/1 mL] 200 ml rastvora za usnu sluznicu (1 plastična (PET) boca sa CRC zatvaračem), u kutiji

STOMATIDIN - BOSNALIJEK D.D.

BRp rastvor za ispiranje usta [1 mg/1 mL] 1 staklena boca sa 200 ml rastvora za ispiranje usta, sa sigurnosnim zatvaračem (CRC/TE), u kutiji

A01AD Ostali lijekovi za lokalnu terapiju oralne sluznice

A01AD02 benzydamin

Doziranje: *zapaljenski procesi u ustima i grlu:* rastvor, odrasli i djeca preko 12 god. ispirati ili grgljati sa oko 15 ml rastvora svakih 1,5-3 sata (u slučaju peckanja razblažiti sa jednakom količinom vode); sprej, odrasli 4-8 prskanja 2-6 puta dnevno poprsati zahvaćeno područje u razmacima 1,5-3 sata; djeca 6-12 god. 4 prskanja 2-6 puta dnevno; djeca mlađa od 6 god. 1 prskanje na svakih 4 kg tjelesne mase do maks. 4 prskanja odjednom, 2-6 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BEZIDIN - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

BRp sprej za usnu sluznicu, otopina [1,5 mg/1 mL] 30 ml otopine za usnu sluznicu u HDPE bočici sa pumpicom i nastavkom za raspršivanje, u kutiji

BRp sprej za usnu sluznicu, otopina [3 mg/1 mL] 15 ml otopine za usnu sluznicu u HDPE bočici sa pumpicom i nastavkom za raspršivanje, u kutiji

ORALSEPT - REPLEK AD SKOPJE

BRp rastvor za usnu sluznicu [1,5 mg/1 mL] Kutija sa plastičnom bočicom sa sigurnosnim zatvaračem za djecu, sa 100 ml rastvora za usnu sluznicu.

BRp sprej za usnu sluznicu, rastvor [1,5 mg/1 mL] Kutija sa plastičnom bočicom sa pumpicom za doziranje, sa 30 ml spreja za usnu sluznicu, rastvora.

TANFLEX FORT - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

BRp sprej za usnu sluznicu, rastvor [3 mg/1 mL] 30 ml spreja za usnu sluznicu sa pumpicom za raspršivanje, u kutiji

TANTUM VERDE - AZIENDE CHIMICHE RIUNITA ANGELINI FRANCESCO-A.C.R.A.F. S.P.A.

BRp sprej za usnu sluznicu, rastvor [1,5 mg/1 mL] 1 polietilenska bočica sa 30 ml spreja za usnu sluznicu sa raspršivačem, u kutiji

A01AD11 *tečni ekstrakt lista žalfije, tečni ekstrakt timijana*

Doziranje: simptomatsko liječenje upala u ustima ili grlu (kao što je upala grla, promuklost i poteškoće pri gutanju) povezanih sa prehladom: odrasli, 1- 2 puta nanijeti rastvor u usta i grlo, 2-4 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BRONCHOSTOP SPREJ ZA USNU SLUZNICU - KWIZDA PHARMA GMBH

BRp sprej za usnu sluznicu [0.32 g/1 g+ 0.32 g/1 g] 1 smeđa staklena bočica sa sprej pumpom, sa 15 ml spreja za usnu sluznicu, u kutiji

A02 *LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOJE SU IZAZVANE POREMEĆAJEM ACIDITETA*

A02A *Antacidi*

A02AD *Kombinacija i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma*

A02AD *aluminijum magnezijum silikat*

Doziranje: simptomatska terapija akutnog i hroničnog gastritisa, ulkusa želuca i duodenuma, tegoba vezanih za pojačano lučenje kiseline (hiperaciditet, gorušica, podrigivanje, osjećaj nadutosti); nakon teških dijeta ili nakon preopterećenja želuca alkoholom, nikotinom, kafom, slatkišima i kod medikamentozno uslovljenih želučanih tegoba: po potrebi 1-2 tbl. (sisati ili žvakati) više puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FOMELA - HEMOFARM A.D. VRŠAC

BRp tableta [500 mg/1 tableta] 40 tableta (4 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

A02AD01 *kalcijum-karbonat, magnezijum-karbonat*

Doziranje: smanjenje hiperaciditeta, gorušice i nadimanja: odrasli i djeca preko 12 god. 1 ili 2 tbl. žvakati ili sisati 1 sat poslije glavnih obroka ili pred spavanje ili kod akutne nelagodnosti; maks. dnevna doza 11 tbl.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

**GASTROGUARD MENTOL TABLETE ZA ŽVAKANJE SA UKUSOM MENTOLA -
ALKALOID AD SKOPJE**

BRp tableta za žvakanje [680 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 24 tablete za žvakanje (3 PVC/PVDC/Al blistera po 8 tableta), u kutiji

A02AD01 kalcijum karbonat, magnezijum karbonat, teški

Doziranje: *žgaravica, regurgitacija želučane kiseline, epizodni želučani bolovi, poremećaji probave i dispepsija:* odrasli i djeca preko 12 god: 1-2 tablete otopiti u ustima ili sažvakati 1 sat nakon glavnih obroka i prije spavanja ali i između u slučaju žgaravice; maks. 11 tableta dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**RENNIE - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**

BRp tableta za žvakanje [680 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 24 tablete za žvakanje (2 PVC/Al blistera po 12 tableta), u kutiji

A02AD01 aluminijum-hidroksid, magnezijum-karbonat, magnezijum-hidroksid

Doziranje: simptomatsko ublažavanje hiperaciditeta (sa žgaravicom ili bez nje), povezanog s peptičkim ulkusom, gastritisom, refluksnim ezofagitisom, ili hijatalnom hernijom: odrasli, 1-2 tablete 4-6 puta na dan (ne više od 8 tableta tokom 24-satnog perioda, ne duže od 6 dana), otprilike jedan sat nakon obroka i uveče prije spavanja; protiv žgaravice uzima se jednaka doza bez obzira na obrok;

REGISTROVANI LIJEKOVI:**GASTAL - PLIVA HRVATSKA D.O.O.**

BRp tableta [450 mg/1 tableta+ 300 mg/1 tableta] 24 tablete (4 PVC/Al blistera po 6 tableta), u kutiji

BRp tableta [450 mg/1 tableta+ 300 mg/1 tableta] 48 tableta (8 PVC/Al blistera po 6 tableta), u kutiji

A02AD04 hidrotalcit

Doziranje: *dispepsija, gastritis; ulkus želuca i duodenuma:* odrasli i djeca starija od 12 god. 1-2 tablete nekoliko puta na dan po potrebi, između obroka i prije odlaska na spavanje, maks. dnevno 12 tableta;

REGISTROVANI LIJEKOVI:**RUPURUT - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**

BRp tableta za žvakanje [500 mg/1 tableta] 20 tableta za žvakanje (2 PP/PP - bistera po 10 tableta), u kutiji

A02B Lijekovi za liječenje peptičkog ulkusa i bolesti gastroezofagusnog refluksa**A02BA Antagonisti H2 receptora****A02BA02 ranitidin**

Doziranje: oralno, *benigni gastrični i duodenalni ulkusi, hronične epizode dispepsije:* odrasli i djeca preko 12 god, 150 mg dva puta dnevno ili 300 mg u jednoj večernjoj dozi tokom 4-8 nedjelja kod benignog gastričnog i duodenalnog ulkusa, do 6 nedjelja kod *hroničnih epizoda dispepsije*, i do 8 nedjelja kod *ulkusa usljed primjene NSAID* (kod duodenalnog ulkusa može se dati 300 mg dva puta dnevno tokom 4 nedjelje do postizanja veće stope izlječenja); djeca 3-12 god. (benigni gastrični i duodenalni ulkusi) 2-4 mg/kg (maks. 150 mg) dva puta dnevno tokom 4-8 nedjelja; *prevencija duodenalnih ulkusa povezanih sa upotrebom nesteroidnih antiinflamatornih lijekova, posebno kod pacijenata sa istorijom peptičkog ulkusa:* odrasli i djeca iznad 12 god., 300 mg dva puta dnevno; *duodenalni ulkusi povezani sa infekcijom bakterijom Helicobacter pylori:* oralno, 300 mg prije spavanja ili 150 mg dva puta dnevno zajedno sa drugim lijekovima u sklopu protokola; *gastro-ezofagusni refluks:* odrasli i djeca preko 12 god, 150 mg dva puta dnevno ili 300 mg u jednoj večernjoj dozi tokom 8 nedjelja, ili ako je potrebno 12 nedjelja

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

(umjereni do jak oblik, 600 mg dnevno u 2-4 podjeljene doze tokom 12 nedjelja); dugotrajni tretman 150 mg dva puta dnevno; djeca starosti 3 - 12 godina, 2,5 - 5 mg/kg (maks. 300 mg) dva puta dnevno; *Zollinger-Ellisonov sindrom*: početna doza 150 mg tri puta dnevno, zabilježena je dobra podnošljivost doza do 6 g dnevno; *hronična epizoda dispepsije*: oralno, 150 mg dva puta dnevno u trajanju do 6 nedjelja; *prevencija aspiracije želučane kiseline prije izvođenja opšte anestezije, kod rizičnih pacijenata (Mendelsonov sindrom), posebno akušerskih pacijenata tokom rađanja*: odrasli i djeca iznad 12 god, 150 mg kod akušerskih pacijenata prije porođaja, a zatim nastaviti 150 mg na 6 sati; kod hirurških procedura i.m. ili spora i.v. inj. 50 mg 45 - 60 min. prije početka anestezije (i.v. inj. razblažiti do 20 ml i davati tokom najmanje 2 min.) ili oralno 150 mg 2 h prije početka anestezije i takođe kada je moguće, prethodno veće; i.m. inj. 50 mg svakih 6-8 sati; spora i.v. inj. odrasli i djeca preko 12 god, 50 mg razblaženo do 20 ml fiziološkog rastvora, davati tokom najmanje 2 min; može se ponoviti na 6-8 sati; *profilaksa gastrointestinalnog krvarenja nastalog zbog stresom izazvanog ulkusa kod ozbiljno oboljelih pacijenata*: odrasli i djeca iznad 12 god, spora i.v. inj. tokom najmanje 2 min, 50 mg razblaženo do 20 ml svakih 8 sati (može se zamjeniti sa 150 mg dva puta dnevno, oralno);

REGISTROVANI LIJEKOVI:

RANOBEL - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Rp film tableta [150 mg/1 tableta] 1 staklena bočica sa 60 film tableta, u kutiji

A02BA03 famotidin

Doziranje: *terapija benignog gastričnog i duodenalnog ulkusa*, terapija, oralno, 40 mg uveče prije spavanja tokom 4-8 nedjelja; održavanje (duodenalni ulkus), 20 mg uveče; *terapija održavanja duodenalnog ulkusa*: oralno, 20 mg jednom dnevno, uveče; *refluksni ezofagitis*: oralno, 20-40 mg 2 puta dnevno tokom 6-12 nedjelja; održavanje, oralno, 20 mg 2 puta dnevno; *Zollinger-Ellison-ov sindrom*: oralno, početi sa 20 mg, liječenje nastaviti dok je klinički neophodno; *funkcionalna gastropatija sa hiperaciditetom*: oralno, 20 mg prije spavanja

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FAMOTIDIN HF - HEMOFARM A.D. VRŠAC

Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

Rp film tableta [40 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

FANISAN - PRO.MED.CS PRAHA A.S.

Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/Al blistera po 10 film tableta) u kutiji

FANISAN FORTE - PRO.MED.CS PRAHA A.S.

Rp film tableta [40 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/Al blister po 10 film tableta) u kutiji

Rp film tableta [40 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

A02BC Inhibitori protonске pumpe

A02BC01 omeprazol

Doziranje: oralno, odrasli - *benigni gastrični i duodenalni ulkus*: 20 mg jednom dnevno tokom 4 nedjelje kod duodenalnog ulkusa ili 8 nedjelja kod gastričnog ulkusa; u teškim slučajevima ili kod ponavljanja dozu povećati na 40 mg dnevno; *prevencija recidiva kod gastričnog ulkusa*, 20 mg jednom dnevno, povećati do 40 mg jednom dnevno, ako je potrebno; *prevencija recidiva kod duodenalnog ulkusa*, 20 mg jednom dnevno (raspon 10-40 mg dnevno); *duodenalni ili gastrični ulkus i gastroduodenalne erozije povezane sa*

primjenom NSAID: 20 mg jednom dnevno tokom 4 nedjelje, nastaviti još 4 nedjelje, ako nije došlo do potpunog izlječenja; *profilaksa kod pacijenata sa istorijom NSAID-povezanih duodenalnih i gastričnih ulkusa, gastroduodenalnih lezija ili kod dispeptičnih simptoma kod osoba kojima je neophodna terapija NSAID*, 20 mg jednom dnevno; *duodenalni ili gastrični ulkus povezan sa H.pylori*: 20-40 mg dva puta dnevno po protokolu u kombinaciji sa odgovarajućim antibioticima za liječenje ulkusa povezanih sa H.pylori; *Zollinger-Ellison-ov sindrom*: početna doza 60 mg jednom dnevno, uobičajeni raspon doza 20-120 mg dnevno (iznad 80 mg u 2 podijeljene doze); *gastro-ezofagusna refluksna bolest*: 20 mg jednom dnevno tokom 4 nedjelje, nastaviti tokom 4-8 nedjelja, ako se ne postigne potpuno izlječenje; 40 mg jednom dnevno se daje tokom 8 nedjelja kod gastro-ezofagusnog refluksa otpornog na druge terapije, doza održavanja 20 mg jednom dnevno; *refluks izazvan viškom želučane kiseline (dugotrajna terapija)*: 10 mg dnevno povećati na 20 mg jednom dnevno ako se simptomi vraćaju; *dispepsija izazvana viškom želučane kiseline*: 10 mg jednom dnevno tokom 2-4 nedjelje prema odgovoru; *teški ezofagitis, refraktoran na početnu terapiju*: 40 mg 2 puta dnevno; pedijatrijska populacija - *refluksni ezofagitis, simptomatsko liječenje žgaravice i regurgitacije želučane kiseline u gastroezofagusnoj refluksnoj bolesti*: djeca starija od 2 god. tjelesne mase preko 20 kg 20 mg jednom dnevno povećati po potrebi na 40 mg jednom dnevno (trajanje liječenja kod refluksnog ezofagitisa 4 - 8 nedjelja, kod žgaravice i regurgitacije 2-4 nedjelje); za informacije o doziranju kod djece 1 mjesec - 2 god. konsultovati informacije o lijeku farmaceutskog oblika prikladnog za ovaj uzrast; *liječenje duodenalnog ulkusa povezanog sa H.pylori*: djeca starija od 4 god. i adolescenti, tjelesne težine 31-40 kg i preko 40 kg 20 mg dva puta dnevno, po protokolu u kombinaciji sa odgovarajućim antibioticima za liječenje ulkusa povezanih sa H.pylori, terapiju primjenjuje bolnički pedijatar;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEMEPAZOL - DEVA HOLDING A.S.

Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula] 14
gastorezistentnih kapsula tvrdih u HDPE bočici, u kutiji

LAPPOXO - ALKALOID AD SKOPJE

Rp oralni rastvor [10 mg/15 mL] 14 jednodoznih, dvokomornih HDPE
bočica na PVC postolju, u kutiji

Rp oralni rastvor [20 mg/15 mL] 14 jednodoznih, dvokomornih HDPE
bočica na PVC postolju, u kutiji.

OMEPAZID - NOBEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula] 14
gastorezistentnih kapsula, tvrdih (2 Al/Al blistera po 7 kapsula), u
kutiji

OMEZOL - ALKALOID AD SKOPJE

Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula] 14
gastorezistentnih kapsula, tvrdih (1 staklena bočica), u kutiji

TARGET PLUS - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula] 14
gastorezistentnih kapsula, tvrdih u staklenoj bočici, u kutiji

ULCOSAN - BOSNALIJEK D.D.

Rp kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula] 14 kapsula, tvrdih (1 staklena
bočica sa 14 kapsula), u kutiji

ULTOP - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula] 1 plastični
spemnik sa 14 gastorezistentnih kapsula, tvrdih, u kutiji

Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [40 mg/1 kapsula] 1 plastični
spremnik sa 28 gastorezistentnih kapsula, tvrdih, u kutiji

A02BC02 pantoprazol

Doziranje: oralno, *benigni gastrični ulkus:* odrasli preko 18 god, 40 mg dnevno tokom 8 nedjelja, u teškim slučajevima povećati na 80 mg dnevno; *duodenalni ulkus:* odrasli preko 18 god, 40 mg dnevno tokom 4 nedjelje, u teškim slučajevima povećati na 80 mg dnevno; *eradikacija H.pylori*, u kombinaciji sa drugim lijekovima: oralno, odrasli 40 mg dnevno tokom 7 dana za prvu i drugu liniju eradikacione terapije, 10 dana kod treće linije eradikacione terapije; *peptički ulkus povezan sa upotrebom NSAID:* oralno, odrasli 40 mg jednom dnevno tokom 8 nedjelja; *profilaksa gastričnih i duodenalnih ulkusa povezanih sa upotrebom NSAID kod pacijenata sa povećanim rizikom od gastroduodenalnih komplikacija koji zahtijevaju kontinuiranu terapiju NSAID:* odrasli preko 18 god, 20 mg dnevno; *gastro-ezofagusna refluksna bolest:* odrasli i djeca preko 12 god: 20-80 mg dnevno ujutro tokom 4 nedjelje, nastaviti tokom još 4 nedjelje ukoliko nije postignuto potpuno izlječenje; *doza održavanja* 20 mg dnevno, povećati na 40 mg dnevno ukoliko se simptomi vraćaju; *teški ezofagitis:* oralno, odrasli 40 mg jednom dnevno tokom 8 nedjelja, nastaviti kao terapiju održavanja ako je odgovarajuća; *teški ezofagitis, otporan na početnu terapiju:* oralno, odrasli 40 mg 2 puta dnevno; *funkcionalna dispepsija:* oralno, odrasli 20 mg jednom dnevno tokom 4 nedjelje; *neistražena dispepsija:* oralno, odrasli 40 mg jednom dnevno tokom 4 nedjelje; *Zollinger-Ellisonov sindrom (i druga hipersekretorna stanja),* odrasli preko 18 god. u početku 80 mg (160 mg ako se zahtijeva brza kontrola aciditeta) zatim 80 mg jednom dnevno podešavati prema odgovoru; dnevne doze iznad 80 mg se daju u 2 podijeljene doze; i.v. inj. ili i.v.inf. tokom najmanje 2 min. ili i.v. inf, odrasli preko 18 god, duodenalni ulkus, gastrični ulkus, i gastro-ezofagusni refluks, 40 mg dnevno do mogućnosti prelaska na oralnu primjenu; *Zollinger-Ellisonov sindrom (i druga hipersekretorna stanja):* odrasli, početna doza 80 mg, alternativno 160 mg u dvije podijeljene doze, ukoliko je neophodna brza kontrola aciditeta, zatim 80 mg jednom dnevno (maks. po dozi 80 mg), podesiti prema odgovoru; napomena: tablete od 20 mg mogu imati bezreceptni režim za kratkotrajnu terapiju refluksnih simptoma (npr, gorušica/žgaravica) kod odraslih preko 18 god, maks. dnevna doza 20 mg tokom maks. 4 nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ACIPAN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp gastrerezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 14 gastrerezistentnih tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister sa 14 tableta), u kutiji
- Rp gastrerezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 28 gastrerezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp gastrerezistentna tableta [40 mg/1 tableta] 14 gastrerezistentnih tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister sa 14 tableta), u kutiji
- Rp gastrerezistentna tableta [40 mg/1 tableta] 28 gastrerezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- ZU prašak za rastvor za injekciju [40 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju u kutiji

CONTROLOC - TAKEDA GMBH

- Rp gastrerezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 28 gastrerezistentnih tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji
- Rp gastrerezistentna tableta [40 mg/1 tableta] 14 gastrerezistentnih tableta (1 Al/Al - blister sa 14 tableta), u kutiji
- ZU prašak za rastvor za injekciju [40 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa 40 mg praška za rastvor za injekcije, u kutiji

FENIX - BOSNALIJEK D.D.

- Rp želučanootporna tableta [20 mg/1 tableta] 28 želučanootpornih tableta (2 Alu/Alu blistera sa po 14 tableta), u kutiji

- Rp želučanootporna tableta [40 mg/1 tableta] 14 želučanootpornih tableta (1 Alu/Alu blister sa 14 tableta), u kutiji
- FENIX NEO - BOSNALIJEK D.D.**
- BRp želučanootporna tableta [20 mg/1 tableta] 14 želučanootpornih tableta (1 Alu/Alu blister sa 14 tableta), u kutiji
- NOLPAZA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO**
- Rp gastorezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 14 gastorezistentnih tableta (1 OPA/Al/PVC//Al blister), u kutiji
- Rp gastorezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 28 gastorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- Rp gastorezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 30 gastorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji
- Rp gastorezistentna tableta [40 mg/1 tableta] 14 gastorezistentnih tableta (1 OPA/Al/PVC//Al blister sa 14 tableta), u kutiji
- Rp gastorezistentna tableta [40 mg/1 tableta] 28 gastorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- Rp gastorezistentna tableta [40 mg/1 tableta] 30 gastorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji
- ZU prašak za otopinu za injekciju [40 mg/1 boca] 1 bočica sa praškom za otopinu za injekciju, u kutiji
- NOLPAZA CONTROL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO**
- BRp gastorezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 14 gastorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera po 7 gastorezistentnih tableta), u kutiji
- BRp gastorezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 7 gastorezistentnih tableta (1 OPA/Al/PVC//Al blister), u kutiji
- PANDEV - DEVA HOLDING A.S.**
- Rp gastorezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 28 gastorezistentnih tableta (4 PA/ALU/PVC//Al blistera po 7 gastorezistentnih tableta), u kutiji
- Rp gastorezistentna tableta [40 mg/1 tableta] 14 gastorezistentnih tableta (2 PA/ALU/PVC//Al blistera po 7 tableta), u kutiji
- PANOCER - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.**
- Rp gastorezistentna tableta [40 mg/1 tableta] 14 gastorezistentnih tableta (1 PA/Al/PVC-Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- PANTONOR - LABORATORIOS NORMON S.A.**
- ZU prašak za rastvor za injekciju [40 mg/1 bočica] 1 staklena bočica (staklo tip I), u kutiji
- ZU prašak za rastvor za injekciju [40 mg/1 bočica] 50 staklenih bočica (bezbojno staklo tip I), u kutiji
- PANTOPRAZOL HEMOFARM - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA**
- Rp gastorezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 14 gastorezistentnih tableta (1 Al/Al blister sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp gastorezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 28 gastorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp gastorezistentna tableta [40 mg/1 tableta] 14 gastorezistentnih tableta (1 Al/Al blister sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp gastorezistentna tableta [40 mg/1 tableta] 28 gastorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- PANTOPRAZOL STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG**

ZU	prašak za rastvor za injekciju [40 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju, u kutiji.
PENTOKAR - SAKAR HEALTHCARE LTD	
ZU	prašak za rastvor za injekciju [40 mg/1 bočica] 1 jantarna staklena bočica od 10 ml sa praškom za rastvor za injekciju, u kutiji
PROGAS - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	
ZU	liofilizat za rastvor za injekciju [40 mg/10 mL] 1 staklena bočica sa liofilizatom za rastvor za injekciju, u kutiji
PULCET - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.	
Rp	gastrorezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister), u kutiji
Rp	gastrorezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 28 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
ZU	liofilizat za otopinu za injekciju [40 mg/1 bočica] 1 bočica (bezbojna staklena bočica zapremine 10 ml (tip I) sa aluminijskim zatvaračem i sivim gumenim čepom, u kutiji
Rp	gastrorezistentna tableta [40 mg/1 tableta] 14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister), u kutiji
Rp	gastrorezistentna tableta [40 mg/1 tableta] 28 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
ULSEPAN - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ş.	
ZU	prašak za rastvor za injekciju [40 mg/1 bočica] staklena bočica od 15 ml, u kutiji
ZIPANTOLA - PLIVA HRVATSKA D.O.O.	
Rp	gastrorezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 28 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
Rp	gastrorezistentna tableta [40 mg/1 tableta] 28 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
ZIPANTOLA PROTECT - PLIVA HRVATSKA D.O.O.	
BRp	gastrorezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister po 14 gastrorezistentnih tableta), u kutiji
ZOLPAN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.	
Rp	gastrorezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 14 gastrorezistentnih tableta (1 HDPE bočica), u kutiji
Rp	gastrorezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 28 gastrorezistentnih tableta (1 HDPE bočica), u kutiji
Rp	gastrorezistentna tableta [40 mg/1 tableta] 14 gastrorezistentnih tableta (1 HDPE bočica), u kutiji
ZOLTEx - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.	
ZU	prašak za rastvor za injekciju [40 mg/1 bočica] Staklena bočica od 10 ml s praškom, s gumenim čepom i aluminijskom kapicom, u kutiji
ZYGOSIS - POLIFARMA ILAC SAN VE TIC.A.S.	
ZU	prašak za rastvor za injekciju [40 mg/1 bočica] 1 bezbojna staklena bočica (tip I) od 10 ml, u kutiji

A02BC03 lansoprazol

Doziranje: *benigni gastrični ulkus:* oralno, odrasli 30 mg dnevno ujutro tokom 8 nedjelja; *duodenalni ulkus:* oralno, odrasli 30 mg dnevno ujutro tokom 4 nedjelje, doza održavanja 15 mg dnevno; *gastrični i duodenalni ulkusi u vezi sa upotrebom NSAIL:* oralno, odrasli 30 mg jednom dnevno tokom 4 - 8 nedjelja; profilaksa 15-30 mg jednom dnevno; *eradikacija Helicobacter pylori:* oralno, odrasli (u kombinaciji sa odgovarajućim antibioticima za liječenje ulkusa povezanih sa H.pylori: 30 mg dva puta dnevno tokom 7 dana za prvu i drugu liniju eradikacione terapije; 10 dana za treću liniju eradikacione

terapije; *Zollinger-Ellisonov sindrom* (i druga hipersekretorna stanja): oralno, odrasli početnu dozu 60 mg jednom dnevno podešavati prema odgovoru; dnevnu dozu od 120 mg ili više davati u 2 podijeljene doze; *gastro-ezofagusna refluksna bolest*: oralno, odrasli 30 mg dnevno ujutro tokom 4 nedjelje, nastaviti tokom još 4 nedjelje ukoliko nije postignuto potpuno izlječenje; doza održavanja 15-30 mg dnevno; *teški ezofagitis*: oralno, odrasli 30 mg jednom dnevno tokom 8 nedjelja, nastaviti sa terapijom održavanja ukoliko je terapija odgovarajuća; *teški ezofagitis refraktoran na početnu terapiju*: oralno, odrasli 30 mg dva puta dnevno; *dispepsija izazvana viškom želučane kiseline*: oralno, odrasli 15-30 mg dnevno, ujutro tokom 4 nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

APRAZOL - BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Rp kapsula, tvrda [30 mg/1 kapsula] 14 kapsula, tvrdih, u staklenoj bočici boje čilibara sa bijelim sigurnosnim poklopcem od HDPE materijala na vanjskoj i LDPE materijala na unutrašnjoj strani poklopca, u kutiji

DEGASTROL - DEVA HOLDING A.S.

Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [30 mg/1 kapsula] 1 HDPE bočica sa 14 gastorezistentnih kapsula, tvrdih, u kutiji

LANSOPROL - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [15 mg/1 kapsula] 28 gastorezistentnih kapsula, tvrdih (2 blistera po 14 kapsula) u kutiji

Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [30 mg/1 kapsula] 14 gastorezistentnih kapsula, tvrdih (1 blister) u kutiji

Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [30 mg/1 kapsula] 28 gastorezistentnih kapsula, tvrdih (2 blistera po 14 kapsula) u kutiji

LANZUL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp kapsula, tvrda [15 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 PVC/PE/PVDC - Al blistera po 7 kapsula), u kutiji

Rp kapsula, tvrda [30 mg/1 kapsula] 14 kapsula, tvrdih (2 PVC/PE/PVDC - Al blistera po 7 kapsula), u kutiji

A02BC04 rabeprazol

Doziranje: *benigni ulkus na želucu*: 20 mg dnevno (ujutro), tokom 4 nedjelje, nastaviti još 4 nedjelje ukoliko je potrebno; *duodenalni ulkus*: 20 mg dnevno (ujutro) tokom 4 nedjelje, nastaviti još 4 nedjelje ukoliko je potrebno; *gastro-ezofagusna refluksna bolest*: 20 mg jednom dnevno tokom 4-8 nedjelja; doza održavanja 10-20 mg dnevno; *gastro-ezofagusna refluksna bolest (simptomatski tretman u odsustvu ezofagitisa)*, 10 mg dnevno do 4 nedjelje, zatim 10 mg dnevno po potrebi; *teški ezofagitis*: 20 mg jednom dnevno tokom 8 nedjelja, ukoliko je odgovarajuće nastaviti kao terapiju održavanja; *teški ezofagitis otporan na početnu terapiju*: 20 mg dva puta dnevno; *Zollinger-Ellison-ov sindrom*: početna terapija 60 mg jednom dnevno, podešavati prema odgovoru (maks. 120 mg dnevno); doze iznad 100 mg dnevno davati u 2 podijeljene doze; *sastavni dio terapije duodenalnog i benignog gastričnog ulkusa povezanog sa Helicobacter pylori*: 20 mg dva puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

RABEPRAZOL SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Rp gastorezistentna tableta [10 mg/1 tableta] 14 gastorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera sa po 7 tableta) u kutiji

Rp gastorezistentna tableta [10 mg/1 tableta] 28 gastorezistentnih tableta (4 Al/Al blistera sa po 7 tableta) u kutiji

Rp gastorezistentna tableta [20 mg/1 tableta] 14 gastorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera sa po 7 tableta) u kutiji

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

Rp	gastrorezistentna tableta [20 mg/1 tableta]	28 gastrorezistentnih tableta (4 Al/Al blistera sa po 7 tableta) u kutiji
RABEZOL - LABORATORIOS LICONSA S.A.		
Rp	gastrorezistentna tableta [20 mg/1 tableta]	14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister) u kutiji
Rp	gastrorezistentna tableta [20 mg/1 tableta]	28 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al blister sa 14 tableta) u kutiji
ZULBEX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO		
Rp	gastrorezistentna tableta [10 mg/1 tableta]	28 gastrorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC blistera po 14 tableta) u kutiji
Rp	gastrorezistentna tableta [20 mg/1 tableta]	28 gastrorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC blistera po 14 tableta) u kutiji

A02BC05 esomeprazol

Doziranje: oralno, peptički ulkus; gastrični ulkus u vezi sa primjenom NSAIL: odrasli preko 18 god, 20 mg jednom dnevno tokom 4-8 nedjelja; profilaksa kod pacijenata sa povećanim rizikom od gastroduodenalnih komplikacija koji zahtijevaju stalnu terapiju NSAIL, 20 mg dnevno; gastro-ezofagusna refluksna bolest (u prisustvu erozivnog refluksnog ezofagitisa): odrasli i djeca preko 12 god, 40 mg jednom dnevno tokom 4 nedjelje, nastaviti tokom još 4 nedjelje ukoliko nije postignuto potpuno izlječenje ili ukoliko su prisutni simptomi; doza održavanja 20 mg dnevno; djeca 1 -12 god, tjelesne težine 10-20 kg, 10 mg jednom dnevno tokom 8 nedjelja; tjelesne mase preko 20 kg, 10-20 mg jednom dnevno tokom 8 nedjelja; simptomatsko liječenje gastro-ezofagusne refluksne bolesti (u odsustvu ezofagitisa): odrasli i djeca preko 12 god, 20 mg jednom dnevno do 4 nedjelje, zatim 20 mg dnevno, kada je to potrebno; djeca 1-12 god, tjelesne težine preko 10 kg, 10 mg jednom dnevno do 8 nedjelja; Zollinger-Ellison-ov sindrom: odrasli preko 18 god, početnu dozu 40 mg dva puta dnevno podešavati prema odgovoru; uobičajeni raspon doza 80-160 mg dnevno (iznad 80 mg u 2 podijeljene doze); eradicacija *Helicobacter pylori*: 20 mg 2 puta dnevno tokom 7 dana; i.v. inj. tokom najmanje 3 min. ili i.v. inf.: odrasli preko 18 god, gastro-ezofagusna refluksna bolest, 40 mg jednom dnevno; simptomatska refluksna bolest bez ezofagitisa, gastrični ulkus u vezi sa terapijom NSAIL, prevencija gastričnog i duodenalnog ulkusa kod terapije NSAIL: 20 mg dnevno; nastaviti dok oralna primjena ne bude moguća; ozbiljno krvarenje peptičkog ulkusa (poslije endoskopske terapije): odrasli preko 18 god, početna doza i.v. inf. 80 mg tokom 30 min, a zatim stalnom i.v. inf. 8 mg/sat tokom 72 sata, zatim oralno 40 mg jednom dnevno tokom 4 nedjelje.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EMANERA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp	gastrorezistentna kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula]	14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 kapsula), u kutiji
Rp	gastrorezistentna kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula]	28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 kapsula), u kutiji
Rp	gastrorezistentna kapsula, tvrda [40 mg/1 kapsula]	14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 kapsula), u kutiji
Rp	gastrorezistentna kapsula, tvrda [40 mg/1 kapsula]	28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 kapsula), u kutiji

ESOM I.V. - NOBEL ILAČ SANAYII VE TICARET A. Ş.

ZU	prašak za rastvor za injekciju/infuziju [40 mg/1 bočica]	1 staklena bočica od 10 ml sa praškom, u kutiji

ESOMEPRAZOL FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula] 28 gastorezistentnih kapsula, tvrdih (4 Al/Al blistera po 7 kapsula), u kutiji
- Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [40 mg/1 kapsula] 28 gastorezistentnih kapsula, tvrdih (4 Al/Al blistera po 7 tableta), u kutiji

ESONOR - LABORATORIOS NORMON S.A.

- ZU prašak za rastvor za injekciju/infuziju [40 mg/1 bočica] 1 bezbojna staklena bočica, u kutiji

ESSO - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula] 14 gastorezistentnih kapsula, tvrdih (2 Al/Al blistera sa 7 kapsula) u kutiji
- Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula] 28 gastorezistentnih kapsula, tvrdih (4 Al/Al blistera po 7 kapsula) u kutiji
- Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [40 mg/1 kapsula] 14 gastorezistentnih kapsula, tvrdih (2 Al/Al blistera po 7 kapsula) u kutiji
- Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [40 mg/1 kapsula] 28 gastorezistentnih kapsula, tvrdih (4 Al/Al blistera po 7 kapsula) u kutiji

SOLEZOL - ANFARM HELLAS S.A.

- ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [40 mg/1 bočica] 10 bočica (staklena bočica tip I, čep od brombutil gume tip I) u kutiji

A02BX *Drugi lijekovi za peptički ulkus i gastroezofagealne refluksne bolesti (GORD)***A02BX05 bizmut subcitrat**

Doziranje: ulkus želuca i dvanaestopalačnog crijeva, pomoć u eradikaciji *Helicobacter pylori* u kombinaciji sa drugim lijekovima, gastritis povezan sa dispeptičkim poremećajem kada je poželjna eradikacija *Helicobacter pylori*: 1 tbl. četiri puta dnevno na prazan želudac (pola sata prije glavnih obroka i prije spavanja) ili 2 tbl. dva puta dnevno na prazan želudac (pola sata prije doručka i pola sata prije večere ili prije spavanja); maks. trajanje jedne kure liječenja 2 mjeseca, prije nove kure liječenja moraju proći bar 2 mjeseca

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ULCAMED - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO**

- Rp filmom obložena tableta [120 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [120 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

A03 LIJEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

A03 **tečni ekstrakt cvijeta kamilice, tečni ekstrakt gorke ognjice, tečni ekstrakt herbe rospasa, tečni ekstrakt korijena anđelike, tečni ekstrakt korijena sladića, tečni ekstrakt lista matičnjaka, tečni ekstrakt lista pitome nane, tečni ekstrakt ploda kima, tečni ekstrakt ploda sikavice**

Doziranje: *simptomatsko liječenje funkcionalnih i motilitetom uslovljenih gastrointestinalnih smetnji (funkcionalne dispepsije i sindroma nadraženog crijeva, uključujući gastrointestinalne grčeve, kao i za potporno simptomatsko liječenje gastritisa: odrasli i djeca starija od 12 god, 3 puta po 20 kapi (1ml); djeca 6-12 god, 3 puta po 15 kapi (0,75ml)*

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IBEROGAST - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT

BRp oralne kapi, tekućina [15 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 20 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 5 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL] 20 ml oralnih kapi, tekućine, u staklenoj bočici, u kartonskoj kutiji.

A03A **Lijekovi koji regulišu funkcionalne gastrointestinalne poremećaje**

A03AA **Sintetski antiholinergici, estri sa tercijarnom amino grupom**

A03AA04 **mebeverin**

Doziranje: *sindroma iritabilnog kolona: oralno, upotrebljavajući tablete sa produženim oslobađanjem, odrasli i djeca preko 10 god. 200 mg 2 puta dnevno; dopuna terapiji želučano-crijevnih poremećaja koje karakteriše spazam glatkih mišića; oralno, upotrebljavajući tablete sa trenutnim oslobađanjem, odrasli i djeca preko 10 god: 135-150 mg 3 puta dnevno po mogućnosti 20 min. prije obroka;*

REGISTROVANI LIJEKOVI:

COLOSPA RETARD - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

Rp kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda [200 mg/1 kapsula] 30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 15 kapsula), u kutiji

DUSKONAL - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Š.

Rp kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda [200 mg/1 kapsula] 30 kapsula sa modificiranim oslobađanjem, tvrdih (3 Al/PVC blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

RUDAKOL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda [200 mg/1 kapsula] 30 kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrdih (2 PVC/PVDC//Al blistera sa po 15 kapsula), u kutiji
Rp obložena tableta [135 mg/1 tableta] 50 obloženih tableta u smeđoj staklenoj bočici (sa Al-PP - zatvaračem), u kutiji

A03AX *Ostali lijekovi za regulisanje funkcionalnih poremećaja crijeva*

A03AX13 *simetikon*

Doziranje: *simptomatsko liječenje gastrointestinalnih poteškoća povezanih sa nakupljanjem gasa (meteorizam, nadutost):* kapsula, meka, odrasli, adolescenti i djeca starija od 6 god, 2 kapsule 3-4 puta dnevno u toku ili nakon obroka, i prije spavanja ako je potrebno; *simptomatsko liječenje gastrointestinalnih poteškoća povezanih sa nakupljanjem gasa (meteorizam, nadutost), kolika kod dojenčadi (3-mjesečne kolike)-samoliječenje:* kapi 100 mg/ml (oralna emulzija), dojenčad, 5-10 kapi po svakoj bočici hrane ili prije svakog podoja; djeca 1-6 god, 3-5 puta po 10 kapi; djeca 6-14 god. 3-5 puta po 10-20 kapi, odrasli i djeca preko 14 god. 3-5 puta po 20 kapi; *kao pomoćno sredstvo u dijagnostici abdomena (rentgenski snimci i sonografija):* kapsula, meka, odrasli 1 dan prije ispitivanja 3 puta po 2 kapsule i sutradan ujutro, na dan ispitivanja 2 kapsule; kapi 100 mg/ml (oralna emulzija), 1 ml 3 puta dnevno, dan prije pregleda nakon obroka i 1 ml ujutro na dan pregleda; - *kao dodatak suspenzijama kontrastnih sredstava:* 2-4 ml na 1 l kontrastnog sredstva za dvostruku kontrastnu radiografiju; -*za pripremu gastroduodendoskopije pod ljekarskim nadzorom:* prije endoskopije 2-3 ml, ako je potrebno, nekoliko mlilitara emulzije se može dati kroz endoskopsku sondu kako bi se eliminisali gasovi;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ESPUMISAN - BERLIN-CHEMIE AG

BRp kapsula, meka [40 mg/1 kapsula] 25 kapsula, mekih (1 PVC Al blister sa 25 kapsula), u kutiji

ESPUMISAN LX - BERLIN-CHEMIE AG

BRp oralne kapi, emulzija [100 mg/1 mL] jedna bočica od 30 ml sa oralnim kapima, emulzijom, u kutiji

A03B *Alkaloidi beladone i derivati, monokomponentni preparati*

A03BA *Alkaloidi beladone, tercijarni amini*

A03BA01 *atropin*

Doziranje: *bradikardija:* odrasli i djeca starija od 12 god. i.m. ili i.v. 0,3-0,6 mg svakih 4-6 h do maks. doze 2 mg; *srčano oživljavanje:* odrasli i djeca starija od 12 god i.v. 0,5 mg svakih 5 min. do postizanja željene srčane frekvencije; djeca do 12 god. s.c. i.m. ili i.v. 0,01-0,02 mg/kg svakih 5 min. maks. 0,1 mg; *kod premedikacije:* odrasli i djeca starija od 12 god. i.v. 0,3-0,6 mg ili s.c. ili i.m. 30-60 min. prije anestezije ili neposredno prije same hirurške intervencije; djeca do 12 god. i.m. ili s.c. 30-60 min. prije anestezije ili neposredno prije hirurške intervencije; djeca preko 3 kg 0,1 mg, djeca 7-9 kg 0,2 mg, djeca 12-16 kg 0,3 mg, djeca preko 20 kg dobijaju dozu za odrasle; *akutna intoksikacija antiholinesteraznim lijekovima, organofosfornim spojevima:* odrasli i djeca starija od 12 god. i.m. 1 mg ili i.v. svakih 5-10 min. do pojave proširenih zjenica i prekida znojenja i salivacije, djeca do 12 god. i.m. ili i.v. 0,02 mg/kg svakih 10 min. do pojave proširenih zjenica i prekida znojenja i salivacije

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ATROPIN SOPHARMA - SOPHARMA AD

ZU rastvor za injekciju [1 mg/1 mL] 10 staklenih ampula sa po 1 ml rastvora za injekciju, u PVC blisteru u kutiji

ATROPINA SOLFATO BIOINDUSTRIA L.I.M. 1 MG/ML - BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.

ZU rastvor za injekciju [1 mg/1 mL] 10 staklenih ampula sa po 1 ml
rastvora za injekciju, u kutiji

**A03BB *Alkaloidi beladone, polusintetski, kvaternarna
amonijum jedinjenja***

A03BB01 *butilskopolamin*

Doziranje: akutni spazam kod renalnih ili bilijarnih kolika, u radiologiji za diferencijalnu dijagnozu opstrukcije i ublažavanje spazma i bola prilikom pijelografije i u drugim dijagnostičkim procedurama u kojima spazam može predstavljati problem: 20 mg i.m. ili i.v. po potrebi ponoviti nakon pola sata; kod endoskopije doza se može ponavljati i češće; maks. dnevno 100 mg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BUSCOLYSIN - SOPHARMA AD

ZU rastvor za injekciju [20 mg/1 mL] 10 ampula sa po 1 ml rastvora za
injekciju u PVC blisteru, u kutiji

A03BB01 *hioscin butilbromid*

Doziranje: spazam gastrointestinalnog trakta, spazam i diskinezija žučnih puteva i spazam urogenitalnog trakta: odrasli i djeca starija od 6 god, 3-5 puta dnevno 10-20 mg;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BUSCOPAN - SANOFI-AVENTIS GROUPE

BRp obložena tableta [10 mg/1 tableta] 20 obloženih tableta (1
PVC/PVDC/Al blister), u kutiji

A03D *Spazmolitici u kombinaciji sa analgeticima*
A03DB *Beladona i derivati u kombinaciji sa analgeticima*

A03DB04 *butilskopolamin, paracetamol*

Doziranje: bolovi tipa kolika kod oboljenja želuca i crijeva, bilijarne kolike i bilijarni funkcionalni poremećaji, bolovi tipa kolika i funkcionalni poremećaji urinarnog trakta i ženskih genitalnih organa (npr. dismenoreja): odrasli i djeca iznad 12 god. 1 tbl. 3 puta dnevno, po potrebi u jednoj dozi se mogu uzeti 2 tbl. maks. 4 tbl. dnevno; vremenski razmak između doza najmanje 8 sati

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SPAZMOL - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

BRp film tableta [10 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta] 20 film tableta (2
PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

A03F *Propulzivi*
A03FA *Propulzivi*

A03FA01 *metoklopramid*

Doziranje: simptomatska terapija mučnine i povraćanja, uključujući i onu koja je u vezi sa akutnom migrenom, odgođena (ali ne akutna) mučnina i povraćanje indukovana hemoterapijom, mučnina i povraćanje indukovana radioterapijom, prevencija postoperativne mučnine i povraćanja; oralno ili i.m. inj. ili spora i.v. inj. (tokom najmanje 3 min): odrasli preko 18 god, tjelesne mase ispod 60 kg, maks. dnevna doza 500 mcg/kg u 3 podijeljene doze; odrasli, tjelesne mase preko 60 kg, 10 mg do 3 puta dnevno; kod djece se koristi kao druga opcija u prevenciji odložene mučnine i povraćanja indukovane hemoterapijom i u terapijama sa ustanovljenom post-operativnom mučninom i povraćanjem; upotreba metoklopramida je kontraindikovana kod djece ispod jedne

godine: maksimalna doza za odrasle i djecu tokom 24 sata je 0,5 mg po kg tjelesne mase; kod odraslih, uobičajena doza konvencionalnih formulacija (svi putevi primjene) je 10 mg do 3 puta dnevno; preporučena doza kod djece je 0,1 do 0,15 mg po kg tjelesne mase do 3 puta dnevno, maks. doza u toku 24 sata je 0,5 mg/kg tjelesne mase

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KLOMETOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- △ Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ ZU rastvor za injekciju [10 mg/2 mL] 10 staklenih ampula po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

KLOMID - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- △ Rp tableta [10 mg/1 tableta] 40 tableta (4 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

PYLOMID - BOSNALIJEK D.D.

- △ Rp tableta [10 mg/1 tableta] 40 tableta (4 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

REGLAN - ALKALOID AD SKOPJE

- △ Rp oralni rastvor [5 mg/5 mL] staklena bočica sa 120 mL rastvora, plastični dozator i plastična kašika u kutiji
- △ Rp tableta [10 mg/1 tableta] 40 tableta (4 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

VOMEPRAM - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

- △ ZU rastvor za injekciju/ infuziju [10 mg/2 mL] 5 bezbojnih staklenih ampula sa 2 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

A03FA03 domperidon

Doziranje: *ublažavanje simptoma mučnine i povraćanja:* odrasli i djeca (starosti 12 god. i starija i težine 35 kg ili više): 10 mg do tri puta dnevno, maks. dnevna doza 30 mg);

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GASTROPERIDON - HEMOFARM A.D. VRŠAC

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

A03FA07 itoprid

Doziranje: *simptomi gastrointestinalne funkcionalne, neulcerozne dispepsije:* jedna tableta 3 puta dnevno prije obroka

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ITOMED - PRO.MED.CS PRAHA A.S.

- Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 20 film tableta (1 PVC/PVdC/Al blister sa 20 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 40 film tableta (2 PVC/PVdC/Al blistera po 20 tableta), u kutiji

A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI PROTIV NAUZEJE

A04A Antiemetici i lijekovi protiv nauzeje

A04AA Antagonisti serotonina (5-HT3)

A04AA01 ondansetron

Doziranje: *umjereno emetogena hemoterapija ili radioterapija:* odrasli 18-65 god, oralno, 8 mg 1-2 sata prije terapije ili i.m. ili spora i.v. inj. koje mogu biti date neposredno prije

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

terapije, zatim 8 mg svakih 12 sati do 5 dana; stariji preko 65 god. oralno, 8 mg 1-2 h prije terapije ili i.m. inj. ili i.v. inf. (tokom najmanje 15 min.), zatim 8 mg, oralno svakih 12 sati tokom perioda do 5 dana - *jako emetogena hemoterapija*, odrasli 18-65 god, oralno, 24 mg 1-2 h prije terapije ili i.m. inj. ili spora i.v. inj. početna doza 8 mg neposredno prije terapije praćeno sa 8 mg svakih 4 sata, ukoilko je potrebno sa 2 doze, alternativno, praćeno sa (kontinuiranom i.v.inf.) 1 mg/sat do 24 sata, zatim (oralno) 8 mg svakih 12 sati do 5 dana; stariji 65-75 god. početi sa i.m. inj, 8 mg neposredno prije terapije, što je obavezno praćeno sa 2 doze od 8 mg u intervalima od 4 sata (ili sa kontinuiranom i.v. inf. 1 mg /sat do 24 sata) zatim oralno 8 mg svakih 8 sati do 5 dana; stariji preko 75 god. početi sa 8 mg i.v. inf. neposredno prije terapije (tokom najmanje 15 min.), što je obavezno praćeno sa 2 doze od 8 mg u intervalima od 4 sata, zatim oralno 8 mg svakih 12 sati do 5 dana; starije osobe 65-75 god. i.v. inf. (tokom najmanje 15 min.) 16 mg neposredno prije terapije, što je obavezno praćeno sa 2 doze od 8 mg i.m. ili i.v. inf. (tokom najmanje 15 min.) u intervalima od 4 sata zatim oralno, 8 mg svakih 12 sati do 5 dana - *hemoterapijom izazvana mućnina i povraćanje*, djeca 6 mjeseci-18 god, i.v. inf. tokom najmanje 15 min, 5 mg/m² (maks. 8 mg) neposredno prije hemoterapije, onda za tijelo površine manje od 0,6 m², 2 mg oralno svakih 12 sati u periodu do 5 dana; za tijelo površine 0,6 m² ili više 4 mg oralno svakih 12 sati u periodu do 5 dana; maks. ukupna dnevna doza 32 mg alternativno, i.v. inf. tokom najmanje 15 min, odmah 150 mcg/kg (maks. 8 mg) neposredno prije hemoterapije ponoviti u intervalima od 4 sata za 2 doze, zatim za tjelesnu masu 10 kg ili manje 2 mg oralno svakih 12 sati u periodu do 5 dana; za tjelesnu masu preko 10 kg 4 mg oralno svakih 12 sati do 5 dana; maks. ukupna dnevna doza 32 mg. Napomena: za mućninu i povraćanje izazvanu hemoterapijom, sa oralnim doziranjem se može početi 12 sati poslije intravenske primjene; *prevencija postoperativne mućnine i povraćanja*, odrasli preko 18 god, oralno, 16 mg 1 sat prije anestezije ili 8 mg 1 sat prije anestezije praćen dozom od 8 mg u intervalima od po 8 sati za 2 doze alternativno, i.m. ili spora i.v. inj, 4 mg u indukciji anestezije; djeca 1 mjesec-18 god, sporom i.v. inj. tokom najmanje 30 sekundi, 100 mcg/kg (maks. 4 mg) prije, tokom ili poslije indukcije anestezije - *terapija postoperativne mućnine i povraćanja*, i.m. ili spora i.v. inj. 4 mg; djeca 1 mjesec-18 god, spora i.v. inj. tokom najmanje 30 sekundi, 100 mcg/kg (maks. 4 mg).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ONDANSETRON TROIKAA - TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED

ZU	rastvor za injekciju/ infuziju [2 mg/1 mL] 5 bezbojnih staklenih ampula rastvora za injekciju/infuziju po 2 mL, u kutiji
ZU	rastvor za injekciju/ infuziju [2 mg/1 mL] 5 bezbojnih staklenih ampula sa 4 mL rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZYTRON - ALKALOID AD SKOPJE

Rp	film tableta [4 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 AL/PVC blister), u kutiji
Rp	film tableta [8 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 AL/VC blister), u kutiji

A04AA02

granisetron

Doziranje: *mućnina i povraćanje izazvani citotoksićnom hemoterapijom ili radioterapijom*; oralno, 1-2 mg 1 sat prije početka terapije, a zatim 2 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze tokom terapije; kada se koristi i i.v. inf, maks. kombinovano ukupno 9 mg tokom 24 sata; *prevencija*, 40 mcg/kg (maks. 3 mg) prije početka citotoksićne terapije; i.v. inj. ili i.v. inf. odrslri 10-40 mcg/kg (maks. po dozi 3 mg) dati 5 min. prije početka terapije, dozu po potrebi ponoviti s razmakom od najmanje 10 min. za i.v. inj. svaki mg granisetrona mora biti razblažen sa 5 ml i davan tokom najmanje 30 sekundi; *postoperativna mućnina i povraćanje*, i.v. inj. *prevencija* - 1 mg (razblažiti do 5 ml i davati preko 30 sekundi); *terapija* - 1 mg (razblažiti do 5 ml i davati preko 30 sekundi, maks. 3 mg dnevno)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GRATRYL - PHARMADA ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

ZU/Rp rastvor za injekciju/ infuziju [3 mg/3 mL] 5 ampula po 3 mL rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

KYTRIL - ATNAHS PHARMA UK LTD

Rp film tableta [1 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/Al - blister), u kutiji

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [3 mg/3 mL] 5 ampula po 3 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

**A05 TERAPIJA BOLESTI BILIJARNOG TRAKTA
(ŽUČNIH PUTEVA) I JETRE**

A05A Lijekovi za liječenje bolesti žučnih puteva

A05AA Žučne kiseline i derivati

A05AA02 ursodeoksiholna kiselina

Doziranje: rastvaranje holesterolskih žučnih kamenaca: 8-12 mg/kg dnevno (2-5 kapsula) uveče, prije spavanja kao pojedinačna doza ili u 2 podijeljene doze, do 2 god; terapija se nastavlja i 3-4 mjeseca poslije rastvaranja kamenaca; *terapija žučnog refluksnog gastritisa:* 250 mg jednom dnevno uveče, prije spavanja tokom 10-14 dana; *primarna bilijarna ciroza:* 12-16 mg/kg dnevno (3-7 kapsula) u 3 podijeljene doze tokom 3 mjeseca, zatim 12-16 mg/kg kao pojedinačna doza uveče prije spavanja; *liječenje hepatobilijarnog poremećaja kod djece koji je povezan sa cističnom fibrozom:* djeca uzrasta 6-18 god. 20 mg/kg/dan podijeljeno u 2-3 pojedinačne doze sa mogućim povećanjem na dozu od 30 mg/kg/dan ukoliko je potrebno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BILEXIN - BOSNALIJEK D.D.

Rp film tableta [250 mg/1 tableta] 50 film tableta (5 PVC/PVdC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

URSOFALK - DR FALK PHARMA GMBH

Rp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 100 kapsula, tvrdih (4 Alu/PVC blistera po 25 kapsula) u kutiji

Rp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 50 kapsula tvrdih (2 Alu/PVC blistera po 25 kapsula) u kutiji

URSONORM - PRO.MED.CS PRAHA A.S.

Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 50 film tableta (5 PVC/PVdC//Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

URSOSAN - PRO.MED.CS PRAHA A.S.

Rp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 50 kapsula, tvrdih (5 Al/PVC blistera po 10 kapsula) u kutiji

A05AX Drugi lijekovi za terapiju bolesti bilijarnog trakta

A05AX alfa pinen, beta pinen, borneol, cineol, levomentol, kamfen, menton

Doziranje: za liječenje i otapanje radiolucentnih žučnih kamenaca u žučnom mjehuru: odrasli, uobičajena doza je 1 do 2 kapsule 3 puta na dan prije jela; djeca od 6 do 14 god, 1 kapsula 2 puta na dan prije jela, djeca od 14 do 18 god. 1 do 2 kapsule tri puta na dan prije jela

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ROWACHOL - ROWA PHARMACEUTICALS LTD

BRp želučanootporna kapsula, meka [13.6 mg/1 kapsula+ 3.4 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula+ 32 mg/1 kapsula+ 6 mg/1

kapsula] 50 želučanoopornih kapsula, mekih (5 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

A05AX02 himekromon

Doziranje: pomoćno sredstvo kod simptomatskog tretmana spazma Odijevog sfinktera, diskinezije, dispeptičnih poremećaja; kod funkcionalnog oštećenja žučnog kanala kod pacijenata sa nekomplikovanom holecistijazom; kod stanja nakon operacije žučne kese i žučnih kanala, kao i u slučaju anoreksije, mučnine i zatvora povezanih sa smanjenom sekrecijom žuči: odrasli, 1-2. tbl pola sata prije obroka, 3 puta dnevno tokom 7 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MENDIAXON - ADAMED PHARMA SPOLKA AKCYJNA

BRp tableta [200 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

BRp tableta [200 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

A05B Lijekovi za liječenje bolesti jetre, lipotropni lijekovi **A05BA Lijekovi za liječenje bolesti jetre**

A05BA03 silimarin

Doziranje: poremećaji funkcije jetre (vezano uz hronični hepatitis B i C, alkoholna bolest jetre uz prestanak unošenja alkohola, produžena primjena lijekova, hronična intoksikacija, ciroza jetre): početna doza i kod težih stanja: 2 kapsule 2 puta dnevno tokom 8 nedjelja; doza održavanja i lakša stanja: 1 kapsula 2 puta dnevno; tablete, 1 tabletu 2 puta dnevno tokom 8 nedjelja, a zatim nastaviti sa 1 tabletom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CARSIL - SOPHARMA AD

BRp kapsula, tvrda [90 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (5 PVC/Al blistera sa po 6 kapsula), u kutiji

SILYMARIN BELUPO - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

BRp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

SILYMARIN FORTE BELUPO - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

BRp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa 15 tableta) u kutiji

A06 LIJEKOVI ZA KONSTIPACIJU **A06A Lijekovi za konstipaciju** **A06AB Kontaktni laksativi**

A06AB02 bisakodil

Doziranje: opstipacija: oralno, odrasli i djeca starija od 10 god. 5-10 mg (1-2 tablete) uveče prije spavanja; djeca 4-10 god. 5 mg (1 tableta) dnevno uveče prije spavanja; rektalno, odrasli i djeca starija od 10 god. 10 mg dnevno; *priprema za dijagnostičke pretrage i preoperativno;* odrasli i djeca starija od 10 god. oralno, 10 mg ujutro i 10 mg uveče prije pregleda i rektalno 10 mg (1 supozitorija) sljedećeg jutra na dan procedure; djeca 4-10 god, 5 mg uveče prije pregleda i pedijatrijski laksativ sa momentalnim djelovanjem (npr. supozitoriju) sljedećeg jutra na dan procedure; napomena: tablete djeluju nakon 10-12 sati, supozitorije djeluju nakon 20-60 min.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DULCOLAX - SANOFI-AVENTIS GROUPE

BRp čepić [10 mg/1 supozitorija] 6 čepića (1 Al - folija sa 6 čepića), u kutiji
 BRp obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

LAXADIN - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

BRp gastrozistentna tableta [5 mg/1 tableta] 30 gastrozistentnih tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 gastrozistentnih tableta), u kutiji

A06AD Osmotski laksativi**A06AD11 laktuloza**

Doziranje: *opstipacija:* početna doza, odrasli i adolescenti: 15 ml-45 ml (1-3 velike kašike) dnevno, podešavati prema odgovoru; djeca do 1 god. 5 ml dnevno, podešavati prema odgovoru; djeca 1-5 god. 5-10 ml (1-2 male kašike) dnevno, podešavati prema odgovoru; djeca 5-18 god. 10-40 ml dnevno, podešavati prema odgovoru; *hepatična encefalopatija (portalna sistemska encefalopatija):* 30-45 ml tri puta dnevno, zatim podesiti tako da pacijent ima 2-3 meke stolice dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**LAKTULOZA HF - HEMOFARM A.D. VRŠAC**

BRp sirup [66.7 g/100 mL] 200 ml sirupa u PVC boci, u kutiji

PORTALAK - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

BRp sirup [66.7 g/100 mL] 1 polietilenska boca sa 250 ml sirupa
 Rp sirup [66.7 g/100 mL] 1 polietilenska boca sa 500 ml sirupa

A06AD65 askorbinska kiselina, kalijum-hlorid, makrogol, natrijum sulfat, natrijum-askorbat, natrijum-hlorid

Doziranje: *čišćenje crijeva za operaciju, kolonoskopiju ili radiološki pregled:* odrasli stariji od 18 god, 2 litre rekonstituisanog rastvora uveče prije procedure ili 1 litra rekonstituisanog rastvora uveče prije procedure, a 1 litra rekonstituisanog rastvora rano ujutro na dan procedure; terapija treba biti završena najmanje 1 sat prije kolonoskopije. Savjet: jedan par vrećica (A i B) treba biti rastvoren u 1 litar vode i tako izrađen rastvor se mora popiti u roku od 1-2 sata; u razdoblju od početka postupka uzimanja lijeka do završetka kliničkog postupka ne smije se uzimati čvrsta hrana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**MOVIPREP - NORGINE B.V.**

BRp prašak za oralni rastvor [4.7 g/1 kesica+ 1.015 g/1 kesica+ 100 g/1 kesica+ 7.5 g/1 kesica+ 5.9 g/1 kesica+ 2.691 g/1 kesica] 2 prozirne vrećice koje sadrže vrećicu A i vrećicu B (vrećica A (papir/LDPE/Al/LDPE) sadrži 112 g praška, vrećica B (papir/LDPE/Al/LDPE) sadrži 11 g praška), u kutiji

PLENVU - NORGINE B.V.

Rp prašak za oralnu otopinu [7,54 g/1 vrećica+ 1 g/1 vrećica+ 1,2 g/1 vrećica+ 100 g/1 vrećica+ 40 g/1 vrećica+ 9 g/1 vrećica+ 48,11 g/1 vrećica+ 3,2 g/1 vrećica+ 2 g/1 vrećica] 3 vrećice s praškom u zaštitnoj vrećici, u kutiji

A06AX Ostali laksativi**A06AX05 prukaloprid**

Doziranje: simptomatsko liječenje hronične konstipacije kod odraslih kod kojih laksativi ne uspijevaju da pruže adekvatno olakšanje: 2 mg jednom dnevno sa ili bez hrane u bilo koje doba

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ABEMOT - MEDOCHEMIE LTD

Rp film tableta [1 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Alu/Alu blistera sa 14 tableta), u kutiji.

Rp film tableta [2 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Alu/Alu blistera sa 14 tableta), u kutiji.

LAXOPRID - COMBINO PHARM MALTA, LTD.

Rp film tableta [1 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Alu/Alu blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp film tableta [2 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Alu / Alu blistera po 14 tableta), u kutiji

A07 **ANTIDIJAROICI I INTESTINALNI**
ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFJEKTIVNI LIJEKOVI
A07A **Intestinalni antiinfektivni**
A07AA **Antibiotici**

A07AA02 **nistatin**

Doziranje: *intestinalna kandidijaza:* tablete, 1-2 tablete 3 puta dnevno; po potrebi ova doza se može i udvostručiti; prašak za oralnu suspenziju, 5 ml 4 puta dnevno nakon obroka, obično tokom 7 dana (nastaviti još 2 dana nakon povlačenja lezija); *oralna i perioralna kandidijaza:* 1 ml 4 puta dnevno nakon obroka; u profilaksi kandidijaze kod novorođenčadi preporučuje se doza od 1ml, jednom dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NYSTATIN HF - HEMOFARM A.D. VRŠAC

BRp obložena tableta [500000 i.j./1 tableta] 10 obloženih tableta (1 PVC/Al-blistar), u kutiji

BRp prašak za oralnu suspenziju [100000 i.j./1 mL] staklena bočica sa kapaljkom i sa 4,6 g praška za pripremu 24 mL oralne suspenzije, u kutiji

A07AA09 **vankomicin**

Doziranje: *infekcije izazvane Clostridium difficile:* oralno, 125 mg svakih 6 sati tokom 10 dana; po potrebi povećati na 500 mg svakih 6 sati tokom 10 dana, u slučaju teške ili komplikovane bolesti; *komplikovane infekcije kože i mekog tkiva; infekcije kostiju i zglobova; vanbolnička pneumonija; bolnički stečena pneumonija, uključujući pneumoniju povezanu sa mehaničkom ventilacijom; infektivni endokarditis:* i.v. odrasli i djeca iznad 12 god. 15-20 mg/kg svakih 8-12 sati (maks. po dozi 2 g); kod ozbiljno oboljelih pacijenata, udarna početna doza 25-30 mg/kg tjelesne težine može se upotrijebiti da bi se olakšalo brzo postizanje željenih koncentracija vankomicina u serumu; dojenčad i djeca od jednog mjeseca do manje od 12 god. starosti, 10-15 mg/kg svakih 6 sati; terminska novorođenčad (od rođenja do 27 dana postnatalne starosti) i pretermenska novorođenčad (od rođenja do očekivanog datuma poroda plus 27 dana): za doziranje konsultovati informacije o lijeku; *preoperativna profilaksa bakterijskog endokarditisa:* i.v. 15 mg/kg u jednoj dozi prije uvođenja u anesteziju, u zavisnosti od trajanja operativnog zahvata može biti potrebna druga doza.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VANKAR 1000 - SAKAR HEALTHCARE LTD

ZU prašak za rastvor za infuziju [1000 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

VANKAR 500 - SAKAR HEALTHCARE LTD

ZU prašak za rastvor za infuziju [500 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

VANKOMICIN APTAPHARMA - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O.

ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [1000 mg/1 bočica] 10 bočica od 20 mL, u kutiji

ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [500 mg/1 bočica] 10 bočica od 10 mL, u kutiji

VANKOMICIN PHARMAS - STRIDES PHARMA (CYPRUS) LIMITED

Rp kapsula, tvrda [125 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (2 Al-PVC/PE/Aclar blistera sa po 14 kapsula), u kutiji

Rp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (2 Al-PVC/PE/Aclar blistera sa po 14 kapsula), u kutiji

A07AC

Derivati imidazola

A07AC01

mikonazol

Doziranje: *orofaringealna kandidijaza:* odojčad 4-24 mjeseca, 1,25 ml (1/4 kafene kašičice gela) 4 puta dnevno, nakon obroka; odrasli i djeca starija od 2 god. 2,5 ml (pola kašičice) gela 4 puta dnevno; *kandidijaza gastrointestinalnog trakta:* odojčad preko 4 mjeseca, djeca i odrasli, koji imaju problem sa gutanjem, 20 mg/kg tjelesne težine na dan, podijeljeno u 4 doze; maks. dnevna doza 250 mg (10 ml oralnog gela); terapiju produžiti nedjelju dana nakon povlačenja simptoma

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DAKTANOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

BRp oralni gel [20 mg/1 g] Al-tuba sa 40 g oralnog gela, u kutiji

A07AX

Ostali intestinalni antiinfektivni

A07AX03

nifuroksazid

Doziranje: simptomatska terapija akutne dijareje (najčešće bakterijskog porijekla, bez invazivnih simptoma (pogoršanje opšteg stanja, groznica, znakovi intoksikacije): odrasli, 4 puta po 200 mg; djeca starija od 6 god, 3-4 puta po 200 mg; oralna suspenzija: djeca starija od 2 god, 3 puta dnevno po 5 ml, odrasli 4 puta dnevno po 5 ml; terapija ne isključuje dijetetski režim i rehidraciju; trajanje liječenja se ograničava na 7 dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ENTEROFURYL - BOSNALIJEK D.D.

Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/Al - blistera po 10 kapsula), u kutiji

Rp kapsula, tvrda [200 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 8 kapsula, tvrdih), u kutiji

Rp kapsula, tvrda [200 mg/1 kapsula] 8 kapsula, tvrdih (1 PVC/Al blister), u kutiji

Rp oralna suspenzija [200 mg/5 mL] 1 smeđa staklena boca sa 90 ml oralne suspenzije i plastična odmjerna kašika, u kutiji

ENTEROFURYL STOP - BOSNALIJEK D.D.

BRp kapsula, tvrda [200 mg/1 kapsula] 12 kapsula, tvrdih (2 Al/PVC blistera sa po 6 kapsula, tvrdih), u kutiji

LAXID - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 Al/PVC blistera sa po 10 kapsula) u kutiji

Rp kapsula, tvrda [200 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (2 Al/PVC blistera sa po 10 kapsula) u kutiji

Rp	oralna suspenzija [200 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 90 ml oralne suspenzije i plastična građirana dozirna čašica, u kutiji
NIFUROKSAZID ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE	
Rp	kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji
Rp	kapsula, tvrda [200 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji
Rp	oralna suspenzija [200 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 90 ml oralne suspenzije i plastična građirana dozirna čašica, u kutiji

A07B *Intestinalni adsorbensi*
A07BA *Preparati medicinskog uglja*

A07BA01 *aktivni medicinski ugalj*

Doziranje: *dijareja i nadutost:* tablete, odrasli i djeca preko 12 god. 4-7 tableta razmučenih u vodi ili čaju 3-4 puta dnevno nakon jela; *pedijatrijska populacija,* 2-4 tablete razmučene u vodi ili čaju, 1-2 puta na dan nakon jela; ne preporučuje se djeci mlađoj od 3 god.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CARBOMED - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

BRp	tableta za oralnu suspenziju [150 mg/1 tableta] 30 tableta (2 blistera PVC/PVDC//Al po 15 tableta), u kutiji

A07D *Antipropulzivi*
A07DA *Antipropulzivi*

A07DA03 *loperamid*

Doziranje: *akutna dijareja:* oralno, odrasli i djeca starija od 12 god. početna doza 2-4 mg, nastaviti davati 2 mg nakon svake neformirane stolice do 5 dana; uobičajena doza 6-8 mg dnevno; maks. 10 mg dnevno; *simptomatsko liječenje akutnih epizoda proljeva pri sindromu iritabilnog kolona u odraslih osoba starijih od 18 god:* početna doza 4 mg, a zatim nastaviti dozom od 2 mg nakon svake neformirane stolice, maks. 12 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LOPERAMID ZDRAVLJE - ZDRAVLJE A.D.LESKOVAC

Rp	tableta [2 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

LORDIAR - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

BRp	kapsula, tvrda [2 mg/1 kapsula] 10 kapsula, tvrdih (1 Al/PVC blister po 10 kapsula), u kutiji

A07E *Intestinalni antiinflamatorni lijekovi*
A07EA *Korikosteroidi za lokalnu primjenu*

A07EA06 *budesonid*

Doziranje: *blagi do umjereni napadi Kronove bolesti koja pogađa ileum ili uzlazni dio debelog crijeva:* odrasli preko 18 god, 3 mg 3 puta dnevno prije jela; *autoimuni hepatitis,* za indukciju remisije: 3 mg 3 puta dnevno; za održavanje remisije: 3 mg 2 puta dnevno (ujutro i uveče); *mikroskopski kolitis:* za indukciju remisije 9 mg jednom dnevno (ujutro), održavanje remisije 6 mg jednom dnevno (ujutro) ili naizmjenično 6 mg jednom dnevno-ujutro i 3 mg jednom dnevno ujutro, što odgovara prosječnoj dnevnoj dozi budesonida 4,5 mg dnevno; tablete sa produženim oslobađanjem-*ulcerozni kolitis i mikroskopski kolitis:* za indukciju remisije 1 tbl. od 9 mg tokom najviše 8 sedmica

REGISTROVANI LIJEKOVI:**BUDOSAN - DR FALK PHARMA GMBH**

Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [3 mg/1 kapsula] 100 gastorezistentnih kapsula, tvrdih (10 Al/PVC/PVDC blistera po 10 kapsula), u kutiji

CORTIMENT MMX - COSMO S.P.A.

Rp tableta s produženim oslobađanjem [9 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 poliamid/aluminij/PVC-aluminij blistera sa po 10 tableta), u kutiji

A07EC**Aminosalicilna kiselina i slični preparati****A07EC01****sulfasalazin**

Doziranje: *terapija akutnog napada umjereno blagog i umjerenog i jakog ulceroznog kolitisa, aktivna Crohnova bolest:* odrasli, akutni napad, 1-2 g 4 puta dnevno do postizanja remisije (ukoliko je neophodno, kortikosteroidi se takođe mogu dati), smanjiti na dozu održavanja 500 mg 4 puta dnevno, djeca starija od 2 god, akutni napad 40-60 mg sulfasalazina na kg tjelesne mase dnevno, smanjiti na dozu održavanja 20-30 mg sulfasalazina na kg tjelesne mase dnevno; *aktivni reumatoidni artritis:* odrasli, početi sa 500 mg dnevno, povećavati postepeno po 500 mg svake nedjelje, povećati na 2-3 g dnevno u podijeljenim dozama

REGISTROVANI LIJEKOVI:**SALAZOPYRIN EN - PFIZER INC.**

Rp gastorezistentna tableta [500 mg/1 tableta] 100 gastorezistentnih tableta (1 HD polietilen bočica), u kutiji

SULFASALAZIN KRKA EN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp gastorezistentna tableta [500 mg/1 tableta] 50 gastorezistentnih tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

A07EC02**mesalazin**

Doziranje: *terapija blagog do umjerenog ulceroznog kolitisa i održavanje remisije:* tablete, 0,5-1,5 g 3 puta dnevno; održavanje, 0,5 g 3 puta dnevno; djeca iznad 6 godina i starija (tjelesne mase preko 40 kg): akutni napad 30 – 50 mg mesalazina po kg tjelesne težine dnevno u podijeljenim dozama, maks. doza: 75 mg/kg/dan; održavanje remisije, 15 – 30 mg/kg tjelesne težine dnevno u podijeljenim dozama; rektalna suspenzija, akutni napad, odrasli 1 g uveče pred spavanje; supozitorije 500 mg, akutni napad koji zahvata rektum, sigmoidni kolon i silazni dio kolona, rektalno, odrasli i djeca preko 15 god, 0,5-1 g 2-3 puta dnevno, dozu podešavati prema odgovoru; djeca 12-15 god, akutni napad 1 g dnevno tokom 2-4 nedjelje; doza održavanja 1 g dnevno; supozitorije 1 g, odrasli preko 18 god. akutni napad koji zahvata rektum, rektalno 1 g dnevno, najbolje uveče pred spavanje; granule, akutni napad 1,5-3 g jednom dnevno (najbolje ujutro) ili 0,5-1 g 3 puta dnevno; održavanje 0,5 g 3 puta dnevno; djeca 5-18 god. tjelesne mase niže od 40 kg, akutni napad, 10-20 mg/kg 3 puta dnevno, tjelesne mase preko 40 kg 1-2 g dnevno, ukupna dnevna doza može se alternativno dati u 3 ili 4 podijeljene doze; djeca 5-18 god, održavanje remisije, djeca tjelesne mase manje od 40 kg, 7,5 mg-15 mg 2 puta dnevno; ukupna dnevna doza alternativno se može dati u 3 podijeljene doze, tjelesne mase preko 40 kg, 2 g jednom dnevno; *Chronova bolest:* tablete sa produženim oslobađanjem, individualno doziranje, do 4 g dnevno u dvije ili tri podijeljene doze kod aktivne bolesti i kod terapije održavanja; tablete sa trenutnim oslobađanjem, kod aktivne bolesti 1,5 do 4,5 g u 3 podijeljene doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:**MESALAZIN REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE**

Rp	film tableta [500 mg/1 tableta] 50 film tableta (5 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
PENTASA - FERRING INTERNATIONAL CENTER SA	
Rp	tableta s produženim oslobađanjem [500 mg/1 tableta] 100 tableta sa produženim oslobađanjem (10 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	čepić [1 g/1 čepić] 28 čepića (4 Al/Al - blistera po 7 čepića), u kutiji
Rp	granule sa produženim oslobađanjem [2 g/1 kesica] 60 kesica sa po 2 g granula sa produženim oslobađanjem, u kutiji
Rp	rektalna suspenzija [1 g/100 mL] 7 polietilenskih bočica sa po 100 ml rektalne suspenzije i aplikatorom u Al vrećici, u kutiji
SALMIMET - BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	
Rp	gastrorezistentna tableta [500 mg/1 tableta] 100 gastrorezistentnih tableta (10 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji
SALOFALK - DR FALK PHARMA GMBH	
Rp	gastrorezistentna tableta [500 mg/1 tableta] 100 gastrorezistentnih tableta (10 PVC/PDVC/Al - blister po 10 tableta), u kutiji
Rp	gastrorezistentna tableta [500 mg/1 tableta] 50 gastrorezistentnih tableta (5 PVC/PDVC/ Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	gastrorezistentne granule [1.5 g/1 kesica] 35 kesica sa gastrorezistentnim granulama, u kutiji
Rp	gastrorezistentne granule [1000 mg/1 kesica] 100 kesica sa gastrorezistentnim granulama, u kutiji
Rp	gastrorezistentne granule [1000 mg/1 kesica] 50 kesica sa gastrorezistentnim granulama, u kutiji
Rp	gastrorezistentne granule [3 g/1 kesica] 20 kesica sa gastrorezistentnim granulama, u kutiji
Rp	gastrorezistentne granule [500 mg/1 kesica] 100 kesica sa gastrorezistentnim granulama, u kutiji
Rp	rektalna suspenzija [4 g/60 mL] 7 klizmi po 60 ml rektalne suspenzije u kutiji
Rp	supozitorija [1 g/1 supozitorija] 30 supozitorija (3 PVC/PE blistera po 10 supozitorija), u kutiji
Rp	supozitorija [500 mg/1 supozitorija] 10 supozitorija (2 PVC/PE blister folije po 5 supozitorija), u kutiji
Rp	supozitorija [500 mg/1 supozitorija] 30 supozitorija (6 PVC/PE blister folija po 5 supozitorija), u kutiji

A07F Antidijaroici - mikroorganizmi

A07FA Antidijaroici – mikroorganizmi

A07FA01 mliječno kiselinske bakterije

Doziranje: preventivna i pomoćna terapija kod dijareje, meteorizma i drugih probavnih poremećaja izazvanih narušavanjem ravnoteže crijevne mikroflore (virusne i bakterijske infekcije GIT-a, liječenja antibioticima širokog spektra, zračenja abdominalnih i zdjelčnih organa); Flonivin BS, odrasli i djeca preko 3 god. 4-6 kapsula dnevno; odojčad i djeca do 3 god. 3-4 kapsule dnevno; Linex, odrasli i djeca starija od 12 god. 3 puta dnevno po 2 kapsule; djeca 2-12 god. 3 puta dnevno po 1-2 kapsule; dojenčad i djeca do 2 god. 3 puta dnevno po 1 kapsula; Linex forte, odrasli i djeca starija od 12 god. 1-3 puta dnevno po 1 kapsula; djeca 2-12 god. 1-2 puta dnevno po 1 kapsula; dojenčad i djeca do 2 god. jedanput dnevno po 1 kapsula.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LINEX - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

BRp kapsula, tvrda [12 megaCFU/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 Al/Al blistera po 8 kapsula, tvrdih), u kutiji)

LINEX FORTE - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

BRp kapsula, tvrda [2 gigaCFU/1 kapsula] 14 kapsula, tvrdih (2 Al/Al blistera po 7 kapsula, tvrdih), u kutiji

A07FA02 liofilizirana kultura *Saccharomyces boulardii*

Doziranje: *prevencija i liječenje dijareje različitih etiologija:* odrasli, 2 kapsule (kesice) dva puta dnevno; djeca starija od 3 god. 1 kapsula (kesica) dva puta dnevno; djeca mlađa od 3 god. 1 kapsula (kesica) dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BULAREN 250 MG - ABELA PHARM D.O.O. BEOGRAD

BRp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 10 kapsula, u kutiji

BRp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 20 kapsula, kutiji

BRp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih u kutiji

ENTEROL - BIOCDEX

BRp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 1 staklena bočica sa 10 kapsula, tvrdih u kutiji

BRp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 1 staklena bočica sa 30 kapsula, tvrdih, u kutiji

BRp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 1 staklena bočica sa 50 kapsula, tvrdih, u kutiji

BRp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 10 kapsula, tvrdih (2 Al/PVC-Al blistera sa 5 kapsula), u kartonskoj kutiji

BRp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (4 Al/PVC-Al blistera sa po 5 kapsula), u kartonskoj kutiji

BRp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (5 Al/PVC-Al blistera sa po 6 kapsula), u kartonskoj kutiji

BRp prašak za oralnu suspenziju [250 mg/1 kesu] 10 kesica sa praškom za oralnu suspenziju, u kutiji

A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME

A09A Digestivi, uključujući enzime

A09AA Lijekovi sa enzimima

A09AA02 pankreatin

Doziranje: supstitucija pankreasnih enzima usljed nedovoljnog lučenja ili potpunog odsustva egzokrine sekrecije pankreasa, kod insuficijencije egzokrinog pankreasa organskog porijekla (cistična fibroza): odrasli i djeca, 150-500 mg uz svaki obrok.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KREON 10000 - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

BRp gastorezistentna kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 20 kapsula (2 Al/Al - blistera po 10 kapsula), u kutiji

KREON 25000 - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [300 mg/1 kapsula] 50 kapsula (plastični HPDE - spremnik) u kutiji

KREON 35 000 - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [420 mg/1 kapsula] 1 HDPE bočica sa 50 kapsula, u kutiji.

MEZYM 10000 - BERLIN-CHEMIE AG

BRp	gastrorezistentna tableta [80 mg/1 tableta - 111,11 mg/1 tableta] 20 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
MEZYM 20000 - BERLIN-CHEMIE AG	
BRp	gastrorezistentna tableta [160 mg/1 tableta - 222,22 mg/1 tableta] 20 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera sa po 10 tableta) u kutiji

A10 ANTIHIPERGLIKEMICI (LIJEKOVI ZA LIJEČENJE DIJABETESA)

A10A Insulini i analozi

A10AB Insulini i analozi za injekciju kratkog djelovanja

A10AB01 insulin

Doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vrijeme ubrizgavanja određuje ljekar

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ACTRAPID FLEXPEN - NOVO NORDISK A/S

Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [100 i.j./1 mL] 5 napunjenih penova (FlexPen) po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

GENSULIN R - BIOTON S.A.

Rp rastvor za injekciju [100 i.j./1 mL] 5 staklenih patrona za pen sa po 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji

Rp rastvor za injekciju [100 i.j./1 mL] 10 ml rastvora za injekciju (1 bočica), u kutiji

HUMULIN R - ELI LILLY EXPORT S.A.

Rp otopina za injekciju u ulošku [100 i.j./1 mL] 5 uložaka (staklo tipa I) po 3 ml otopine za injekciju (1 blister), u kutiji

A10AB04 insulin lispro

Doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vrijeme ubrizgavanja određuje ljekar

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HUMALOG - ELI LILLY EXPORT S.A.

Rp otopina za injekciju u ulošku [100 jedinica/1 mL] 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju (u blister pakovanju), u kutiji

HUMALOG JUNIOR KWIKPEN - ELI LILLY EXPORT S.A.

Rp otopina za injekciju [100 jedinica/1 mL] 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine, u kutiji

HUMALOG KWIKPEN - ELI LILLY EXPORT S.A.

Rp otopina za injekciju [100 jedinica/1 mL] 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine, u kutiji

A10AB05 insulin aspart

Doziranje: dijabetes mellitus: individualno, vrstu insulina, dozu i vrijeme ubrizgavanja određuje ljekar

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FIASP FLEXTOUCH - NOVO NORDISK A/S

Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [100 jedinica/1 mL] 5 napunjenih penova od 3 ml, u kutiji

NOVORAPID FLEXPEN - NOVO NORDISK A/S

Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [100 i.j./1 mL] 5 napunjenih penova po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

A10AB06 insulin glulisin

Doziranje: svi tipovi dijabetesa: s.c. vrstu insulina, dozu i vrijeme ubrizgavanja određuje ljekar

REGISTROVANI LIJEKOVI:**APIDRA SOLOSTAR - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE**

Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [100 jedinica/1 mL] 5 napunjenih penova po 3 ml rastvora za injekciju - SoloStar u kutiji

A10AC *Insulini i analozi za injekciju, srednje dugog djelovanja*

A10AC01 insulin

Doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vrijeme ubrizgavanja određuje ljekar

REGISTROVANI LIJEKOVI:**GENSULIN N - BIOTON S.A.**

Rp suspenzija za injekciju [100 i.j./1 mL] 10 ml suspenzije za injekciju (1 bočica), u kutiji

Rp suspenzija za injekciju [100 i.j./1 mL] 5 staklenih patrona za pen sa po 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji

HUMULIN N - ELI LILLY EXPORT S.A.

Rp suspenzija za injekciju u ulošku [100 i.j./1 mL] 5 uložaka (staklo tipa I) po 3 ml suspenzije za injekciju (1 blister), u kutiji

INSULATARD FLEXPEN - NOVO NORDISK A/S

Rp suspenzija za injekciju u napunjenom penu [100 i.j./1 mL] 5 napunjenih penova sa 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

A10AD *Insulini i analozi za injekciju, srednje - ili dugog - djelovanja u kombinaciji sa insulinima kratkog djelovanja*

A10AD01 insulin

Doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vrijeme ubrizgavanja određuje ljekar

REGISTROVANI LIJEKOVI:**GENSULIN M30 - BIOTON S.A.**

Rp suspenzija za injekciju [100 i.j./1 mL] 10 ml suspenzije za injekciju (1 bočica), u kutiji

Rp suspenzija za injekciju [100 i.j./1 mL] 5 staklenih patrona za pen sa po 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji

HUMULIN M3 - ELI LILLY EXPORT S.A.

Rp suspenzija za injekciju u ulošku [100 i.j./1 mL] 5 staklenih uložaka sa 3 ml suspenzije za injekciju (u blister pakovanju), u kutiji

MIXTARD 30 FLEXPEN - NOVO NORDISK A/S

Rp suspenzija za injekciju u napunjenom penu [100 i.j./1 mL] 5 napunjenih penova (FlexPen) po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

A10AD04 insulin lispro

Doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vrijeme ubrizgavanja određuje ljekar

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HUMALOG MIX 25 KWIKPEN - ELI LILLY EXPORT S.A.

Rp suspenzija za injekciju [100 jedinica/1 mL] 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekciju, u kutiji

HUMALOG MIX 50 KWIKPEN - ELI LILLY EXPORT S.A.

Rp suspenzija za injekciju [100 jedinica/1 mL] 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekcije u kutiji

A10AD05 insulin aspart

Doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vrijeme ubrizgavanja određuje ljekar; kombinovana primjena insulina i oralnih antidijabetika, u slučajevima kada nije postignuta adekvatna regulacija glikemije upotrebom samo oralnih antidijabetika: individualno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NOVOMIX 30 FLEXPEN - NOVO NORDISK A

Rp suspenzija za injekciju u napunjenom penu [100 i.j./1 mL] 5 napunjenih penova po 3 ml suspenzije, u kutiji

A10AD06 insulin aspart, insulin degludek

Doziranje: svi tipovi dijabetesa: s.c. doziranje individualno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

RYZODEG - NOVO NORDISK A/S

Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [1.05 mg/1 mL+ 2.56 mg/1 mL] 5 napunjenih penova FlexTouch (3 ml rastvora u ulošku s klipom i čepom nalazi se u jednokratnom, višedoznom napunjenom penu) u kutiji

A10AE Insulini i analozi za injekciju, dugog djelovanja

A10AE04 insulin glargin

Doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vrijeme ubrizgavanja određuje ljekar

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ABASAGLAR - ELI LILLY EXPORT S.A.

Rp otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici [100 jedinica/1 mL] 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji

LANTUS - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

Rp rastvor za injekciju u patroni [3.6378 mg/1 mL] 5 patrona po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

SEMGLEE - BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED

Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [100 jedinica/1 mL] 5 napunjenih penova sa po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

TOUJEO - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [300 jedinica/1 mL] 3 pena po 1,5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

A10AE05 insulin detemir

Doziranje: svi tipovi dijabetesa: individualno, vrstu insulina, dozu i vrijeme ubrizgavanja određuje ljekar

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LEVEMIR - NOVO NORDISK A/S

Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [100 jedinica/1 mL] 5 napunjenih penova (FlexPen) sa 3 mL rastvora za injekciju, u kutiji

A10AE06 insulin degludek

Doziranje: *dijabetes mellitus*: odrasli, adolescenti i djeca preko 1 god, doziranje individualno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TRESIBA - NOVO NORDISK A/S

Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [100 jedinica/1 mL] 5 napunjenih penova (Flex Touch) po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

A10AE54 insulin glargin, liksisenatid

Doziranje: *dijabetes melitus tip 2* kao dodatak dijeti i tjelesnoj aktivnosti u kombinaciji sa metforminom sa ili bez inhibitora SGLT-2: individualno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SULIQUA SOLOSTAR - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [100 jedinica/1 mL+ 33 µg/1 mL] 3 napunjena pena sa po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [100 jedinica/1 mL+ 50 µg/1 mL] 3 napunjena pena sa po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

A10AE56 insulin degludek, liraglutid

Doziranje: liječenje šećerne bolesti tipa 2 radi poboljšanja regulacije glikemije u kombinaciji s peroralnim lijekovima za snižavanje nivoa glukoze kada oni sami ne omogućavaju dovoljno dobru regulaciju glikemije, kao dodatak ishrani i vježbanju: odrasli, s.c. inj. dodatak peroralnim lijekovima za snižavanje nivoa glukoze-preporučena početna doza 10 odmjernih koraka, najveća dnevna doza 50 odmjernih koraka; prelaz sa bazalnog insulina u tipu 2 šećerne bolesti koja nije kontrolisana oralnim antidijabeticima u kombinaciji sa bazalnim insulinom: odrasli, s.c. inj.-preporučena početna doza 16 odmjernih koraka jednom dnevno, podešavati prema odgovoru, maks. dozvoljena dnevna doza 50 odmjernih koraka

REGISTROVANI LIJEKOVI:

XULTOPHY - NOVO NORDISK A/S

Rp rastvor za injekciju [100 jedinica/1 mL+ 3,6 mg/1 mL] 3 napunjene brizgalice sa po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

A10B Antihiperglikemici, isključujući insuline

A10BA Bigvanidini

A10BA02 metformin

Doziranje: *dijabetes mellitus (tip 2)*; može se primjenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom: oralno, upotrebljavajući tablete sa trenutnim oslobađanjem, odrasli i djeca preko 10 god, počinje se sa 500 mg dnevno uz ili nakon doručka, tokom najmanje 1 sedmicu, zatim 500 mg uz ili nakon doručka i večere tokom najmanje 1 sedmice uz postepeno povećanje doze prema potrebi bolesnika; zatim 500 mg uz ili nakon doručka, ručka i večere; poslije 10 do 15 dana, dozu treba prilagoditi na osnovu mjerenja nivoa glukoze u krvi; uobičajena maksimalna preporučena dnevna doza je 2 g metformina, u podijeljenim dozama; oralno, upotrebljavajući tablete sa produženim oslobađanjem, početna doza 500 mg jednom dnevno, zatim po potrebi povećati na 2 g jednom dnevno, dozu povećavati postepeno svakih 10-15 dana, dozu treba uzeti sa večernjim obrokom, alternativno povećati na 1 g dva puta dnevno, dozu treba uzeti uz obrok, alternativna doza se uzima ukoliko kontrola

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

nije postignuta sa jednodnevnom režimom uzimanja; ukoliko kontrola i dalje nije postignuta, preći na tablete sa trenutnim oslobađanjem; *smanjenje rizika ili odlaganje pojave dijabetes melitus tip 2*: tablete sa produženim oslobađanjem, odrasli početna doza 500 mg jednom dnevno, zatim po potrebi povećati na dozu do 2 g jednom dnevno, doza se povećava postepeno svakih 10-15 dana, doza se uzima uz večernji obrok

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AGLIKEM - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp film tableta [1000 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

AGLIKEM XR - STADA ARZNEIMITTEL AG

- Rp tableta s produženim oslobađanjem [500 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/PVdC/Aluminijum blistera sa 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta s produženim oslobađanjem [750 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/PVdC/Aluminijum blistera sa 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta sa produženim oslobađanjem [1000 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/PVdC/Aluminijum blistera sa 10 tableta), u kutiji

ALKAFORMIN - ALKALOID AD SKOPJE

- Rp film tableta [1000 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [850 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

FORDEX - BOSNALIJEK D.D.

- Rp film tableta [1000 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [850 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PE/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

GLIFOR - BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

- Rp film tableta [1000 mg/1 tableta] 100 film tableta (10 PVC/PE/PVdC//Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji
- Rp film tableta [850 mg/1 tableta] 100 film tableta (10 PVC/PE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji

GLUCONORM - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- Rp film tableta [1000 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/ALU blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [1000 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PVDC/ALU blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PvDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 60 film tableta (3 PVC/PvDC/Al blistera po 20 tableta) u kutiji

Rp film tableta [850 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PvDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp film tableta [850 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PvDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

GLUCOPHAGE - MERCK HEALTHCARE KGAA

Rp film tableta [1000 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 PVC/Al blistera po 15 film tableta), u kutiji

Rp film tableta [1000 mg/1 tableta] 60 film tableta (4 PVC/Al blistera po 15 film tableta) u kutiji

Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 PVC/Al blistera po 15 film tableta) u kutiji

Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 60 film tableta (4 PVC/Al blistera po 15 film tableta) u kutiji

Rp film tableta [850 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 PVC/Al blistera po 15 film tableta) u kutiji

Rp film tableta [850 mg/1 tableta] 60 film tableta (4 PVC/Al blistera po 15 film tableta) u kutiji

GLUCOPHAGE XR - MERCK HEALTHCARE KGAA

Rp tableta s produženim oslobađanjem [750 mg/1 tableta] 60 tableta sa produženim oslobađanjem (4 PVC/PVDC/Al blistera) u kutiji

Rp tableta sa produženim oslobađanjem [1000 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp tableta sa produženim oslobađanjem [1000 mg/1 tableta] 60 tableta sa produženim oslobađanjem (4 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta) u kutiji

Rp tableta sa produženim oslobađanjem [500 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (2 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta) u kutiji

Rp tableta sa produženim oslobađanjem [500 mg/1 tableta] 60 tableta sa produženim oslobađanjem (4 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta) u kutiji

Rp tableta sa produženim oslobađanjem [750 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (2 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta) u kutiji

GLUFORMIN 1000 MG - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Rp filmom obložena tableta [1000 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVdC/Al neprovidna blistera po 10 tableta), u kutiji

GLUFORMIN 850 MG - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Rp filmom obložena tableta [850 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVdC/Al neprovidna blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [850 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVdC/Al neprovidnih blistera po 10 tableta), u kutiji

METFORIX - VEFA ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Rp film tableta [850 mg/1 tableta] 100 film tableta (10 AL/PVC blistera po 10 tbl) u kutiji

METFORMIN HF - STADA ARZNEIMITTEL AG

Rp film tableta [1000 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera sa 10 film tableta) u kutiji

Rp film tableta [1000 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/Al blistera sa 10 film tableta) u kutiji

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

Rp	film tableta [500 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera sa 10 film tableta) u kutiji
Rp	film tableta [500 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/Al blistera sa 10 film tableta) u kutiji
Rp	film tableta [850 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera sa 10 film tableta) u kutiji
Rp	film tableta [850 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/Al blistera sa 10 film tableta) u kutiji
METFORMIN ZENTIVA - ZENTIVA S.A.	
Rp	film tableta [1000 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 Al/PVC blistera sa 15 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [1000 mg/1 tableta] 60 film tableta (3 Al /PVC blistera sa 20 tableta), u kutiji
NATFORMIN - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG	
Rp	filmom obložena tableta [1000 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC /Aluminijski blister sa po 10 tableta) u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [850 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blister sa po 10 tableta) u kutiji
SIOFOR 1000 - BERLIN-CHEMIE AG	
Rp	film tableta [1000 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [1000 mg/1 tableta] 60 film tableta (4 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
SIOFOR 500 - BERLIN-CHEMIE AG	
Rp	film tableta [500 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/Al blistera sa 10 tableta) u kutiji
SIOFOR 850 - BERLIN-CHEMIE AG	
Rp	film tableta [850 mg/1 tableta] 60 film tableta (4 PVC/Al blistera sa 15 tableta) u kutiji
TEFOR - GALENIKA A.D. BEOGRAD	
Rp	film tableta [500 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/PVC - PVC/PVdC blistera po 10 film tableta), u kutiji

A10BB **Sulfonamidi, derivati sulfoniluree**

A10BB01 **glibenklamid**

Doziranje: *dijabetes melitus (tip 2)*: početna doza 2,5 - 5 mg dnevno sa ili neposredno poslije doručka, dozu podešavati prema odgovoru, maks. 15 mg dnevno; Maninil-početna doza 1,75-3,5 g dnevno, dozu postepeno povećavati u intervalima od nekoliko dana do 1 sedmice, maks. dnevna doza 10,5 g

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DIABOS - BOSNALIJEK D.D.

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji

GLIBEDAL - ALKALOID AD SKOPJE

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

MANINIL 5 - BERLIN-CHEMIE AG

Rp tableta [5 mg/1 tableta] bezbojna staklena bočica sa 120 tableta, u kutiji

A10BB09 gliklazid

Doziranje: *dijabetes melitus (tip 2)*: oralno, tablete sa trenutnim oslobađanjem, početi sa 40-80 mg dnevno, podešavati prema odgovoru, do 160 mg kao pojedinačna doza, uz doručak; više doze uzimati podijeljeno; maks. 320 mg dnevno; oralno, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, početna doza 30 mg dnevno uz doručak; podešavati prema odgovoru svake 4 nedjelje (nakon 2 nedjelje ukoliko nema smanjenja vrijednosti glukoze u krvi); maks.120 mg dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**GLICLADA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO**

- Rp tableta sa modifikovanim oslobađanjem [30 mg/1 tableta] 30 tableta sa modifikovanim oslobađanjem (2 OPA/Al/PVC//Al blistera po 15 tableta), u kutiji
- Rp tableta sa modifikovanim oslobađanjem [30 mg/1 tableta] 60 tableta sa modifikovanim oslobađanjem (4 OPA/Al/PVC//Al blistera po 15 tableta), u kutiji

GLICLADA SR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta s prilagođenim oslobađanjem [60 mg/1 tableta] 30 tableta s prilagođenim oslobađanjem (2 (OPA/Al/PVC-Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji

GLIORAL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- Rp tableta [80 mg/1 tableta] 30 tableta (3 blistera od ALU/PVC trake i tvrde PVC trake sa po 10 tableta), u kutiji

A10BB12 glimepirid

Doziranje: *dijabetes melitus (tip 2)*: početna doza 1 mg dnevno, podešavati prema odgovoru u intervalu od 1-2 nedjelje po 1 mg; uobičajeno maks. 4 mg dnevno (izuzetno se može uzeti do 6 mg dnevno; lijek se uzima neposredno prije ili sa prvim glavnim obrokom.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**AMARYL - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE**

- Rp tableta [2 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta) u kutiji
- Rp tableta [3 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta) u kutiji

DIAMELL - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- Rp tableta [1 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blister po 10 tableta) u kutiji
- Rp tableta [2 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp tableta [3 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp tableta [4 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

GLIMEPIRID HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp tableta [1 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji
- Rp tableta [2 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji
- Rp tableta [3 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp	tableta [4 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji
MELPAMID 1 MG - BOSNALIJEK D.D.	
Rp	tableta [1 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
MELPAMID 2 MG - BOSNALIJEK D.D.	
Rp	tableta [2 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
MELPAMID 3 MG - BOSNALIJEK D.D.	
Rp	tableta [3 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
TRICAL - BERLIN-CHEMIE AG	
Rp	tableta [1 mg/1 tableta] 30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 30 tableta), u kutiji
Rp	tableta [2 mg/1 tableta] 30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 30 tableta), u kutiji
Rp	tableta [3 mg/1 tableta] 30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 30 tableta), u kutiji

A10BD Kombinacije oralnih antihyperglikemika

A10BD07 metformin, sitagliptin

Doziranje: *dijabetes melitus tip 2* koji se ne može kontrolisati samo metforminom ili metforminom u kombinaciji bilo sa sulfonilureom ili pioglitazonom ili insulinom: odrasli, jedna tableta 2 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALTUXERIN PLUS - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Rp	filmom obložena tableta [1000 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 OPA/Al/PVC blistera po 14 tableta) u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [1000 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 14 tableta) u kutiji

DOLISTA DUO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp	film tableta [1000 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 60 film tableta (4 PVC/PVDC-aluminijum blistera sa po 15 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [850 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 60 film tableta (4 PVC/PVDC-aluminijum blistera sa po 15 tableta), u kutiji

GITAS PLUS - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp	filmom obložena tableta [1000 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

GLEROVA - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

Rp	film tableta [1000 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PE/PVdC Al blistera po 14 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [850 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PE/PVdC Alu blistera po 14 tableta) u kutiji

MAYMETSI - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp	filmom obložena tableta [1000 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji

- Rp filmom obložena tableta [1000 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [850 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [850 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PE/PVDC/PE/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

SITABEL MET - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

- Rp filmom obložena tableta [1000 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (8 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [850 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (8 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji

A10BD08 metformin, vildagliptin

Doziranje: *dijabetes melitus tip 2* koji se ne može kontrolisati samo metforminom ili metforminom u kombinaciji sa derivatima sulfoniluree ili insulinom: odrasli preko 18 god. 1 tableta dva puta dnevno (doza se određuje na osnovu važeće doze metformina)

REGISTROVANI LIJEKOVI:**EUCREAS - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG**

- Rp film tableta [1000 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PA/Al/PVC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji
- Rp film tableta [1000 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PCTFE/PVC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji
- Rp film tableta [850 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PA/Al/PVC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji
- Rp film tableta [850 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PCTFE/PVC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

INDIVIL MET - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp film tableta [1000 mg/1 tableta+ 50 mg/1 mtableta] 60 film tableta (6 OPA/Al/PVC-Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji
- Rp film tableta [850 mg/1 tableta+ 50 mg/1 mtableta] 60 film tableta (6 OPA/Al/PVC-Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji

VILDANORM PLUS - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- Rp film tableta [1000 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [1000 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 60 tableta (6 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [850 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [850 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 60 tableta (6 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji

A10BD11 linagliptin, metformin

Doziranje: *dijabetes melitus tip 2* koji nije kontrolisan samo metforminom ili metforminom u kombinaciji sa sulfonilureom ili insulinom: odrasli, 1 tableta 2 puta dnevno (na osnovu važeće doze metformina).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LINATIN MET - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

Rp filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta+ 1000 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

LINATIN MET - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

Rp filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta+ 850 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

A10BD13 alogliptin, metformin

Doziranje: *dijabetes mellitus tip 2* koji nije adekvatno kontrolisan samim metforminom ili metforminom u kombinaciji ili sa pioglitazonom ili insulinom: oralno, odrasli 1 tabletu 2 puta dnevno, rukovodeći se trenutnom dozom metformina

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VIPDOMET - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG

Rp film tableta [12.5 mg/1 tableta+ 1000 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PCTFE/PVC blistera sa protisnom Al folijom sa po 14 film tableta), u kutiji

Rp film tableta [12.5 mg/1 tableta+ 850 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PCTFE/PVC blistera sa protisnom Al folijom sa po 14 film tableta), u kutiji

A10BD15 dapagliflozin, metformin

Doziranje: *dijabetes mellitus tip 2*, kao dodatak dijeti i povećanoj fizičkoj aktivnosti (kod kojih glikemija nije dovoljno dobro regulisana najvećom podnošljivom dozom samog metformina, u kombinaciji sa drugim lijekovima za liječenje šećerne bolesti kod pacijenata kod kojih glikemija nije dovoljno dobro regulisana metforminom i tim lijekovima, kod pacijenata koji se već liječe kombinacijom dapagliflozina i metformina u zasebnim tabletama): oralno, jedna tableta 2 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MARPAD COMBO - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 1000 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVD//Al blistera po 15 tableta), u kutiji

A10BH Inhibitori dipeptidil peptidaze 4 (DPP-4)

A10BH01 sitagliptin

Doziranje: *dijabetes mellitus-tip 2* kao monoterapija (ukoliko metformin nije prikladan) ili u kombinaciji sa drugim lijekovima koji snižavaju nivo šećera u krvi (uključujući insulin), ukoliko postojeća terapija ne uspijeva postići adekvatnu glikemijsku kontrolu: 100 mg jednom dnevno, za više informacija o upotrebi sa drugim antidijabeticima, konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALTUXERIN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 30 filmom obložena tableta (3 OPA/ Al /PVC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 30 filmom obložena tableta (3 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC Al blister) u kutiji

Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 10 tableta) u kutiji

ALTUXERIN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- ALTUXERIN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.**
- Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- DOLISTA - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA**
- Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC - aluminijum blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [25 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC-aluminijum blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC-aluminijum blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- GITAS - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO**
- Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//AL blistera po 14 tableta), u kutiji
- JAGLIX - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH**
- Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 OPA/aluminij/PVC//aluminij blistera sa po 14 tableta), u kutiji.
- Rp film tableta [25 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 OPA/aluminij/PVC//aluminij blistera sa 14 tableta), u kutiji .
- Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 OPA/aluminij/PVC//aluminij blistera sa po 14 tableta), u kutiji.
- JANUVIA - MERCK SHARP & DOHME BV**
- Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al - blistera po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al - blistera po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al - blistera po 14 tableta), u kutiji
- JAZETA NOVUM - ZENTIVA, K.S.**
- Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa 15 tableta), u kutiji
- MAYSIGLU - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO**
- Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC7/Al blister sa po 15 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blister sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 15 tableta) u kutiji
- SITABEL - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.**
- Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

A10BH02 vildagliptin

Doziranje: *dijabetes melitus-tip 2 kao monoterapija* (kada je primjena metformina neodgovarajuća) ili *u kombinaciji sa drugim antidijabeticima (uključujući insulin)* ukoliko se sa postojećom terapijom nije postigla odgovarajuća kontrola glikemije: oralno, odrasli

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

50 mg 2 puta dnevno, ujutru i uveče, smanjiti na 50 mg jednom dnevno ujutro kada se uzima u kombinaciji sa sulfonilureom; za više informacija konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AGNIS - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp tableta [50 mg/1 tableta] 30 tableta (3 oPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [50 mg/1 tableta] 60 tableta (6 oPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

GALVUS - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp tableta [50 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PA/Al/PVC//Al - blistera po 14 tableta) u kutiji

GLYPVIL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp tableta [50 mg/1 tableta] 30 tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji

INDIVIL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp tableta [50 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [50 mg/1 tableta] 60 tableta (6 OPA/Al/PVC//Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

NORMAVIL - BOSNALIJEK D.D.

Rp tableta [50 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [50 mg/1 tableta] 60 tableta (6 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

VILDABET - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp tableta [50 mg/1 tableta] 28 tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp tableta [50 mg/1 tableta] 56 tableta (4 Al/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

A10BH04 alogliptin

Doziranje: dijabetes melitus tipa 2, u kombinaciji s drugim lijekovima za snižavanje glukoze uključujući insulin: odrasli, 25 mg jedanput na dan, za više informacija o upotrebi sa drugim antidijabeticima-konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VIPIDIA - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG

Rp film tableta [12.5 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PCTFE/PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp film tableta [25 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PCTFE/PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

A10BH05 linagliptin

Doziranje: dijabetes melitus tipa 2 kao monoterapija (kada je metformin neodgovarajuća terapija) ili u kombinaciji sa drugim antidijabeticima (uključujući insulin) ukoliko se postojećom terapijom ne postiže adekvatna kontrola glikemije: oralno, odrasli 5 mg jednom dnevno-za više informacija o upotrebi sa drugim antidijabeticima konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LINATIN - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

LIZERA - ABDI İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.S.

Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera sa 15 tableta) u kutiji

A10BJ Analizi glukagonu sličnog peptida-1 (GLP-1)

A10BJ02 liraglutid

Doziranje: **Victoza** - *dijabetes melitus tip 2* kao monoterapija (ukoliko je primjena metformina neodgovarajuća), ili u kombinaciji sa drugim antidijabeticima, (uključujući insulin) ukoliko se sa postojećom terapijom ne postiže adekvatna glikemijska kontrola: s.c. odrasli i djeca starija od 10 god. početna doza 0,6 mg jednom dnevno, povećati nakon najmanje 1 nedjelje na 1,2 mg jednom dnevno, dalje povećavati ukoliko je neophodno nakon najmanje 1 nedjelje na maks. 1,8 mg jednom dnevno, za informacije o primjeni sa drugim antidijabeticima konsultovati literaturu proizvođa; **Olire**, **Lirux** - dodatak režimu ishrane sa smanjenim unosom kalorija i povećanom fizičkom aktivnošću kod pacijenata sa početnim indeksom tjelesne mase od 30 kg/m² ili više, ili kod pacijenata sa početnim indeksom tjelesne mase od 27 kg/m² ili više u prisustvu bar jednog komorbiditeta kao što su disglukemija (hipertenzija, dislipidemija ili opstruktivna apneja u snu): s.c. odrasli, početi sa 0,6 mg jednom dnevno, zatim povećavati u koracima po 0,6 mg, doze treba povećavati u intervalima ne kraćim od nedjelju dana do doze održavanja od 3 mg jednom dnevno ili dok se ne postigne maksimalna doza koja se dobro podnosi; razmotrite prekid liječenja ukoliko se povećanje doze ne toleriše tokom 2 uzastopne nedjelje; liječenje treba prekinuti ukoliko se nakon 12 nedjelja primjene maksimalne doze ne izgubi najmanje 5% početne tjelesne mase; maks. 3 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LIRUX® - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [6 mg/1 mL] 2 napunjena injekciona pena od 3ml, u kutiji
Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [6 mg/1 mL] 3 napunjena injekciona pena od 3ml, u kutiji

OLIRE - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [6 mg/1 mL] 3 napunjena injekciona pena od 3 ml, u kutiji

VICTOZA - NOVO NORDISK A/S

Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [6 mg/1 mL] 2 napunjena pena sa uloškom po 3 ml rastvora za injekciju

A10BJ05 dulaglutid

Doziranje: *dijabetes melitus tip 2* kao monoterapija ukoliko metformin nije prikladan: s.c. odrasli 0,75 mg jednom nedjeljno; *dijabetes melitus tip 2* u kombinaciji sa insulinom ili drugim antidijabeticima (ukoliko se sa postojećom terapijom ne postiže adekvatna kontrola glikemije): odrasli, s.c. 1,5 mg jednom nedjeljno; po potrebi dozu povećati na 3 mg jedanput nedjeljno nakon najmanje 4 nedjelje; zatim po potrebi povećati na 4,5 mg jednom nedjeljno nakon naredne 4 nedjelje; za potencijalno osjetljive pacijente može se razmotriti početna doza od 0,75 mg jedanput nedjeljno; maksimalno 4,5 mg nedjeljno; djeca 10-17 god, 0,75 mg jednom nedjeljno, po potrebi povećati na 1,5 mg jednom nedjeljno nakon najmanje 4 nedjelje; maksimalna doza 1,5 mg jednom nedjeljno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TRULICITY - ELI LILLY EXPORT S.A.

Rp otopina za injekciju [0.75 mg/0.5 mL] 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji
Rp otopina za injekciju [1.5 mg/0.5 mL] 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

Rp	otopina za injekciju [3 mg/0.5 mL] 4 napunjene staklene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji
Rp	otopina za injekciju [4,5 mg/0.5 mL] 4 napunjene staklene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji

A10BJ06 **semaglutid**

Doziranje: *dijabetes melitus tip 2* (monoterapija (ukoliko je metformin neodgovarajući) ili u kombinaciji sa drugim antidijabetičima (uključujući insulin) ukoliko se sa postojećim tretmanom ne postiže adekvatna glikemijska kontrola: s.c.inj. odrasli, početna doza 0,25 mg jednom nedjeljno, zatim povećati na 0,5 mg jednom nedjeljno nakon najmanje 4 nedjelje, zatim povećati ukoliko je neophodno na 1 mg jednom nedjeljno, za informacije o upotrebi sa drugim antidijabetičima, konsultovati literaturu proizvoda; oralno, početna doza 3 mg jednom dnevno tokom jednog mjeseca, zatim povećati na 7 mg tokom najmanje jednog mjeseca, zatim po potrebi povećati na 14 mg jednom dnevno; maks. preporučena jednokratna doza je 14 mg dnevno; uzimanje dvije tablete od 7 mg radi postizanja efekta doze od 14 mg nije ispitano i stoga se ne preporučuje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OZEMPIC - NOVO NORDISK A/S

Rp	rastvor za injekciju u napunjenom penu [1,34 mg/1 mL] 1 unaprijed napunjeni pen sa 1,5 ml rastvora i 4 jednokratne igle NovoFine Plus
Rp	rastvor za injekciju u napunjenom penu [1,34 mg/1 mL] 1 unaprijed napunjeni pen sa 1,5 ml rastvora i 4 jednokratne igle NovoFine Plus
Rp	rastvor za injekciju u napunjenom penu [1,34 mg/1 mL] 1 unaprijed napunjeni pen sa 3 ml rastvora i 4 jednokratne igle NovoFine Plus

RYBELSUS - NOVO NORDISK A/S

Rp	tableta [14 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji

RYBELSUS - NOVO NORDISK A/S

Rp	tableta [3 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji

RYBELSUS - NOVO NORDISK A/S

Rp	tableta [7 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji

A10BK ***Inhibitori natrijum-glukoza co-transportera 2 (SGLT2)***

A10BK01 **dapagliflozin**

Doziranje: *šećerna bolest tipa 2* (kao monoterapija, kada se primjena metformina ne smatra prikladnim zbog nepodnošenja ili u kombinaciji sa insulinom i drugim antidijabetičima); *simptomatska hronična srčana insuficijencija*; *hronična bubrežna bolest*: oralno, 10 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DAFORBIS - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 OPA/ALU/PVC-alu blistera sa 14 tableta), u kutiji.
Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 OPA/ALU/PVC-alu blistera sa 14 tableta), u kutiji.

DAGRAFORS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp	filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 OPA /Alu /PVC /Alu blistera sa po 15 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 filmom obložena tableta (2 OPA /Alu /PVC /Alu blistera sa po 15 tableta), u kutiji

DAPALIF - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Al/Al blistera po 14 film tableta), u kutiji
- Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Al/Al blistera po 14 film tableta), u kutiji

FORXIGA - ASTRAZENECA AB

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 Al blistera po 14 tableta) u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta),u kutiji.
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 Al blistera po 14 tableta) u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta),u kutiji.

A10BK03 empagliflozin

Doziranje: *dijabetes melitus tip 2 kao monoterapija* (ukoliko je metformin neodgovarajući); *dijabetes melitus tip 2 u kombinaciji sa insulinom ili drugim antidijabeticima* (ukoliko se sa postojećom terapijom ne postiže adekvatna kontrola glikemije): oralno, odrasli 18-84 god. 10 mg jednom dnevno, povećati na 25 mg jednom dnevno ukoliko je neophodno i ukoliko se podnosi; djeca preko 10 godina, 10 mg jednom dnevno, doza se može povećati na 25 mg jedanput dnevno; *simptomatska hronična srčana insuficijencija*: 10 mg jedanput dnevno; *hronična bubrežna bolest*: 10 mg jednom dnevno;

REGISTROVANI LIJEKOVI:**JARDIANCE - BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO.KG**

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 blistera po 10 filmom obloženih tableta) u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 blistera po 10 filmom obloženih tableta), u kutiji

A10BX Ostali antidijabetici, isključujući insuline**A10BX16 tirzepatid****Doziranje:**

šećerna bolest tipa 2 kao monoterapija (ukoliko se primjena metformina ne smatra prikladnom); šećerna bolest tipa 2 u kombinaciji sa drugim antidijabeticima (uključujući insulin, ukoliko se sa postojećom terapijom ne postiže adekvatna kontrola glikemije); kontrola tjelesne težine: u kombinaciji sa djetetom i pojačanom fizičkom aktivnošću kod osoba sa indeksom tjelesne mase (ITM) > 30 kg/m² ili većim, ili kod osoba sa ITM većim od 27 kg/m² ali uz prisustvo najmanje jednog komorbiditeta povezanog sa tjelesnom težinom (npr. hipertenzija, dislipidemije, opstruktivne apneje u snu, kardiovaskularne bolesti, predijabetes ili šećerna bolest tipa 2): s.c. odrasli, početi sa 2,5 mg jednom nedjeljno tokom 4 nedjelje, zatim povećati na 5 mg jednom nedjeljno tokom najmanje 4 nedjelje, zatim povećati na 15 mg jednom nedjeljno, doze se povećavaju u koracima od po 2,5 mg u intervalima od najmanje 4 nedjelje; maks. 15 mg jednom nedjeljno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**MOUNJARO - ELI LILLY EXPORT S.A.**

- Rp otopina za injekciju [10 mg/0.5 mL] 1 bočica sa 0,5 ml otopine,u kutiji
- Rp otopina za injekciju [10 mg/0.5 mL] 4 bočica sa 0,5 ml otopine, u kutiji

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

Rp	otopina za injekciju [12,5 mg/0.5 mL]	1 bočica sa 0,5 ml otopine, u kutiji
Rp	otopina za injekciju [12,5 mg/0.5 mL]	4 bočica sa 0,5 ml otopine, u kutiji
Rp	otopina za injekciju [15 mg/0.5 mL]	1 bočica sa 0,5 ml otopine, u kutiji
Rp	otopina za injekciju [15 mg/0.5 mL]	4 bočica sa 0,5 ml otopine, u kutiji
Rp	otopina za injekciju [2,5 mg/0.5 mL]	1 bočica sa 0,5 ml otopine, u kutiji
Rp	otopina za injekciju [2,5 mg/0.5 mL]	4 bočice sa 0,5 ml otopine, u kutiji
Rp	otopina za injekciju [5 mg/0.5 mL]	1 bočica sa 0,5 ml otopine, u kutiji
Rp	otopina za injekciju [5 mg/0.5 mL]	4 bočice sa 0,5 ml otopine, u kutiji
Rp	otopina za injekciju [7,5 mg/0.5 mL]	1 bočica sa 0,5 ml otopine, u kutiji
Rp	otopina za injekciju [7,5 mg/0.5 mL]	4 bočice sa 0,5 ml otopine, u kutiji

MOUNJARO KWIKPEN - ELI LILLY EXPORT S.A.

Rp	otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici [10 mg/0.6 mL]	1 napunjena brizgalica od 2,4 ml, u kutiji
Rp	otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici [12,5 mg/0.6 mL]	1 napunjena brizgalica od 2,4 ml, u kutiji
Rp	otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici [15 mg/0.6 mL]	1 napunjena brizgalica od 2,4 ml, u kutiji
Rp	otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici [2,5 mg/0.6 mL]	1 napunjena brizgalica od 2,4 ml, u kutiji
Rp	otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici [5 mg/0.6 mL]	1 napunjena brizgalica od 2,4 ml, u kutiji
Rp	otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici [7,5 mg/0.6 mL]	1 napunjena brizgalica od 2,4 ml, u kutiji

A11

VITAMINI

A11A

Multivitamini, kombinacije

A11AA

Multivitamini sa mineralima

A11AA02

askorbinska kiselina, folna kiselina, fosfor, holekalciferol, kalcijum-hidrogenfosfat, kalcijum-pantotenat, nikotinamid, piridoksin, retinol, riboflavin, tiamin, vitamin B12

Doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: djeca u dobi 4-6 god, 1 obloženu tbl. 4 ili 5 puta dnevno rastopiti u ustima; djeca u dobi 7-14 god. 1 obloženu tbl. 5-7 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PIKOVIT - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp	obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 0.04 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta+ 80 i.j./1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta+ 1.2 mg/1 tableta+ 3 mg/1 tableta+ 0.3 mg/1 tableta+ 600 i.j./1 tableta+ 0.3 mg/1 tableta+ 0.25 mg/1 tableta+ 0.2 µg/1 tableta]	30 obloženih tableta (2 PVC/PVDC/PVC//Al - blistera po 15 tableta), u kutiji

A11AA03 askorbinska kiselina, bakar, cijanokobalamin, cink, folna kiselina, fosfor, gvožđe (II)-fumarat, holekalciferol, kalcijum-hidrogenfosfat, kalcijum-pantotenat, magnezijum, mangan, molibden, nikotinamid, piridoksin, retinol, riboflavin, tiamin, vitamin E

Doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: odrasli, jednom dnevno 1 plava tableta i 1 crvena tableta

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DUOVIT - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp obložena tableta [60 mg/1 tableta+ 1 mg/1 tableta+ 3 µg/1 tableta+ 3 mg/1 tableta+ 0.4 mg/1 tableta+ 12 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta+ 200 i.j./1 tableta+ 15 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 1 mg/1 tableta+ 0.1 mg/1 tableta+ 13 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta+ 5000 i.j./1 tableta+ 1.2 mg/1 tableta+ 1 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 40 obloženih tableta (20 crvenih vitaminskih i 20 plavih mineralnih tableta u Al// PVC/PVDC/PVC blisteru), u kutiji

A11B *Multivitamini, monokomponentni*

A11BA *Multivitamini, monokomponentni*

A11BA askorbinska kiselina, deksantenol, holekalciferol, nikotinamid, piridoksin, retinol, tiamin, vitamin B12, vitamin B2

Doziranje: povećana potreba za vitaminima i kao dodatak nepotpunoj ishrani: djeca u dobi 1-3 god. 1 mjerna kašika (5 ml) sirupa dva puta dnevno; djeca u dobi 4-6 god. 1 mjerna kašika (5 ml) sirupa 3 puta dnevno; djeca u dobi 7-14 god. 1 mjerna kašika (5 ml) sirupa 3-4 puta dnevno; sirup se daje poslije obroka u mjernoj kašičici ili pomiješan s čajem, sokom ili voćnom kašicom

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PIKOVIT - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp sirup [50 mg/5 mL+ 2 mg/5 mg+ 100 i.j./5 mL+ 5 mg/5 mL+ 0.6 mg/5 mL+ 900 i.j./5 mL+ 1 mg/5 mg+ 1 µg/5 mL+ 1 mg/5 mL] Staklena bočica (plastični zatvarač, plastična mjerna kašikica) sa 150 mL sirupa, u kutiji

A11C *Vitamin A, vitamin D, uključujući i njihove kombinacije*

A11CB *Vitamin A i D u kombinaciji*

A11CB ergokalciferol, vitamin A

Doziranje: prevencija stanja koja se karakterišu deficitom vitamina A i/ili D: djeca do 6 mjeseci, 1 kap na dan, samo po preporuci pedijatra; djeca 6 mjeseci-5 god, 2 kapi na dan, starija djeca i odrasli, 2-3 kapi na dan; trudnice i dojilje, 2-3 kapi na dan, samo po preporuci ljekara; stariji od 60 god, 3-4 kapi na dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VITAMIN AD - HEMOFARM A.D. VRŠAC

Rp oralne kapi, rastvor [5000 i.j./1 mL+ 22522 i.j./1 mL] 1 staklena bočica sa 10 ml oralnih kapi, rastvora, u kutiji

A11CC Vitamin D i analozi

A11CC04 kalcitriol

Doziranje: oralno, *renalna osteodistrofija*, početna doza 250 nanograma dnevno, ili svakog drugog dana (kod pacijenata sa normalnom ili tek neznatno smanjenom plazma koncentracijom kalcijuma), povećavati ukoliko je potrebno u koracima od 250 nanograma u intervalima od 2-4 sedmice; uobičajena doza 0,5 -1 mikrograma dnevno; *ustanovljena postmenopauzalna osteoporoza*, 250 nanograma dva puta dnevno (praćenje plazma koncentracije kalcijuma i kreatinina, konsultovati literaturu proizvoda).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ROCALTROL - ATNAHS PHARMA UK LTD

Rp kapsula, meka [0.25 µg/1 tableta] 100 kapsula, mekih (10 opalescentnih PVC blistera po 10 kapsula), u kutiji

A11CC05 holekalciferol

Doziranje: **Plivit D3** - *prevencija rahitisa u dojenčadi i male djece, nadoknada povećanih potreba u trudnica i dojilja:* oralno, dojenčad u toku prve god. života: 2-5 kapi (400-1000 i.j.) dnevno, prema preporuci lekara; djeca starija od jedne god, trudnice i dojilje: 2 kapi (400 i.j.) dnevno; *prevencija osteoporoze:* 2-5 kapi dnevno se uzimaju u kašičici soka ili mlijeka (jedna kap sadrži približno 200 i.j. holekalciferola); *manjak vitamina D:* dojenčad u toku prve god. života: 2-5 kapi (400-1000 i.j.) dnevno, prema preporuci lekara; djeca starija od jedne god i adolescenti do 18 god. 3-5 kapi (600 - 1000 i.j.) dnevno u zavisnosti od preporuke lekara; **Devit-3: nedostatak vitamina D, održavanje nivoa vitamina D, profilaksa nedostatka vitamina D:** oralno, za doziranje konsultovati literaturu proizvoda; *nedostatak vitamina D kod pacijenata sa poremećajima u apsorpciji u probavnom sistemu:* i.m. za doziranje konsultovati literaturu proizvoda; **Oleovit D3 - sprečavanje i liječenje nedostatka vitamina D; liječenje rahitisa; kao pomoć specifičnoj terapiji osteoporoze kod pacijenata koji su izloženi riziku od nedostatka vitamina D:** oralno, za doziranje konsultovati literaturu proizvoda; **Vitamin D3 Krka:** oralno, *sprečavanje manjka vitamina D kod djece starije od 6 god, adolescenata i odraslih s prepoznatim visokim rizikom:* 1 tbl. dnevno; *liječenje manjka vitamina D kod adolescenata i odraslih:* početno liječenje 6-12 nedjelja, adolescenti 2 tbl. dnevno, odrasli 4 tbl. dnevno; doza održavanja, adolescenti 1 tbl. dnevno, odrasli, 2 tbl. dnevno; *dodatak specifičnom liječenju osteoporoze kod odraslih s manjkom vitamina D ili prepoznatim visokim rizikom od manjka vitamina D:* 1 tbl. dnevno; **Dibase:** za indikacije i doziranje konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEVIT-3 - DEVA HOLDING A.S.

Rp oralne kapi, rastvor [50000 i.j./15 mL] 1 bočica sa 15 ml oralnih kapi, rastvora, u kutiji

ZU/Rp rastvor za injekciju [300000 i.j./1 mL] 1 ampula sa 1 ml rastvora za injekciju, u kutiji

DIBASE 1.000 I.J. - ABIOTEN PHARMA S.P.A.

BRp kapsula, tvrda [1000 i.j./1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

DIBASE 2.000 I.J. - ABIOTEN PHARMA S.P.A.

Rp kapsula, tvrda [2000 i.j./1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

DIBASE 25.000 I.J. - ABIOTEN PHARMA S.P.A.

Rp kapsula, tvrda [25000 i.j./1 kapsula] 12 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 4 kapsule), u kutiji

DIBASE 6.000 I.J. - ABIOTEN PHARMA S.P.A.

Rp kapsula, tvrda [6000 i.j./1 kapsula] 12 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 4 kapsule), u kutiji

OLEOVIT D3 - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

Rp oralne kapi, rastvor [14400 i.j./1 mL] 12,5 ml oralnih kapi, rastvora u staklenoj bočici, u kutiji

PLIVIT D3 - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Rp oralne kapi, otopina [4000 i.j./1 mL] staklena bočica sa ugrađenom kapaljkom i sa 10 mL oralnih kapi, otopine, u kutiji

VITAMIN D3 KRKA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp tableta [1000 i.j./1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC-Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

BRp tableta [1000 i.j./1 tableta] 60 tableta (6 OPA/Al/PVC-Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

A11CC06 kalcifediol

Doziranje: terapija i prevencija manjka vitamina D: 1 kapsula jednom mjesečno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**DEFEVIX - BERLIN-CHEMIE AG**

Rp kapsula, meka [266 µg/1 kapsula] 10 mekih kapsula (2 PVC/PVDC/Al blistera sa po 5 kapsula), u kutiji.

Rp kapsula, meka [266 µg/1 kapsula] 1 meka kapsula (1 PVC/PVDC/Al blister sa 1 kapsulom), u kutiji

Rp kapsula, meka [266 µg/1 kapsula] 5 mekih kapsula (1 PVC/PVDC/Al blister sa 5 kapsula), u kutiji

A11D Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12**A11DA Vitamin B1, monokomponentni****A11DA01 tiamin**

Doziranje: prevencija i terapija poremećaja uzrokovanih deficitom tiamina (Wernicke-ova encefalopatija, sindrom „beri-beri“ i druga stanja udružena sa deficitom tiamina): odrasli, terapijske doze kod deficita tiamina su 100-200 mg dnevno; u nekim slučajevima gdje su neophodne veće doze primjenjuje se i do 1000 mg/prvih 12 h.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**VITAMIN B1 ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE**

ZU rastvor za injekciju [100 mg/1 mL] 50 ampula po 1 ml rastvora za injekciju (10 PVC - uložaka po 5 ampula), u kutiji

A11DB vitamin B1 u kombinaciji sa vitaminom B6 i/ili vitaminom B12**A11DB cijanokobalamin, lidokain, piridoksin, tiamin**

Doziranje: hematološki i neurološki simptomi uzrokovani kontinuiranim nedostatkom vitamina B1, B6 i B12: i.m. odrasli i djeca preko 12 god. početi sa jednom ampulom jednom dnevno, kasnije jedna ampula 2-3 puta sedmično

REGISTROVANI LIJEKOVI:**NEIRATAX - AS KALCEKS**

ZU rastvor za injekciju [1 mg/2 mL+ 20 mg/2 mL+ 100 mg/2 mL+ 100 mg/2 mL] 5 čilabarnih staklenih ampula (staklo tip I) sa 2 mL rastvora za injekciju, u kutiji

A11DB cijanokobalamin, piridoksin, tiamin

Doziranje: *sistemske neurološke bolesti izazvane dokazanom deficijencijom vitamina B1, B6 i B12:* akutna terapija 1 inj. jednom dnevno, kod blažih oblika 1 inj. 2-3 puta nedjeljno; tablete, 1 tbl. dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MILGAMMA N - WÖRWAG PHARMA GMBH & CO.KG

ZU rastvor za injekciju [1 mg/2 mL+ 100 mg/2 mL+ 100 mg/2 mL] 5 ampula sa po 2 mL rastvora za injekciju, u kutiji

PRONERV - G.L. PHARMA GMBH

Rp film tableta [0,2 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta+ 100 mg/1 mtableta] 20 film tableta (2 Al/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

Rp film tableta [0,2 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta+ 100 mg/1 tableta] 100 film tableta (10 Al/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

A11DB benfotiamin, piridoksin

Doziranje: *neurološka oboljenja usljed deficita vitamina B1 i B6:* 3 puta dnevno po 1 tabletu

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MILGAMMA 100 - WÖRWAG PHARMA GMBH & CO.KG

Rp obložena tableta [100 mg/1 tableta+ 100 mg/1 tableta] 30 obloženih tableta (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp obložena tableta [100 mg/1 tableta+ 100 mg/1 tableta] 60 obloženih tableta (4 PVC/PVDC//Al - blistera po 15 tableta), u kutiji

A11E Vitamini B-kompleksa, uključujući kombinacije

A11EA Vitamini B-kompleksa

A11EA cijanokobalamin, kalcijum-pantotemat, nikotinamid, piridoksin, riboflavin, tiamin

Doziranje: prevencija hipovitaminoze i liječenje hipovitaminoze i avitaminoze; povećana potrošnja vitamina B-grupe; poremećena apsorpcija kod pacijenata sa bolestima probavnog sistema i jetre; beri-beri, neuralgija, polineuritis, neurodermatosa: odrasli, 1 do 2 obložene tablete 2 do 3 puta na dan; djeca od 5 do 14 godina, 1 obložena tableta jedanom dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

B-COMPLEX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp filmom obložena tableta [1 µg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/PVC//Al - blistera po 15 tableta), u kutiji

BRp filmom obložena tableta [1 µg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (4 PVC/PVDC/PVC//Al - blistera po 15 tableta), u kutiji

PLIBEX - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

BRp film tableta [1 µg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

A11EA cijanokobalamin, kalcijum-pantotenat, nikotinamid, piridoksin, tiamin, vitamini B-kompleksa

Doziranje: teži oblici nedostatka vitamina grupe B, potpuna parenteralna ishrana, posljedice hroničnog alkoholizma, polineuritisa i ishialgija: odrasli, i.m. i i.v. 1 do 2 ampule, 1 do 2 puta dnevno, ili 1 do 4 ampule dnevno, lagano i.v. (u toku 10 min.) ili infuzijom na kap; djeca: individualno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**BEVIPLEX - GALENIKA A.D. BEOGRAD**

ZU liofilizat za rastvor za injekciju [0.004 mg/1 viala+ 10 mg/1 viala+ 100 mg/1 viala+ 8 mg/1 viala+ 40 mg/1 viala+ 4 mg/1 viala] 5 staklenih bočica sa gumenim zatvaračem i flip kapicom, u kutiji

A11G Vitamin C (askorbinska kiselina), uključujući kombinacije**A11GA Vitamin C (askorbinska kiselina), monokomponentni****A11GA01 askorbinska kiselina**

Doziranje: profilaksa i terapija skorbuta; odrasli, profilaksa 200-500 mg dnevno, terapija 0,5-1 g; djeca, profilaksa 30 mg dnevno, terapija 100-300 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**VITAMIN C GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD**

ZU rastvor za injekciju [500 mg/5 mL] 50 staklenih ampula sa po 5 ml rastvora za injekciju (10 PVC nosača po 5 ampula), u kutiji

A11H Ostali monokomponentni vitaminski preparati**A11HA Ostali monokomponentni vitaminski preparati****A11HA02 piridoksin**

Doziranje: deficit piridoksina: 50-250 mg dnevno (oralno, i.m. ili i.v.); periferni neuritis izazvan izoniazidom: oralno, profilaksa 20 mg dnevno; terapija 140-160 mg dnevno podijeljeno u 3 doze; idiopatska sideroblastična anemija: 100-400 mg dnevno (oralno, i.m. ili i.v.), podijeljeno u nekoliko doza; terapija piridoksin-zavisnih konvulzija kod male djece: 10-100 mg (i.m. ili i.v.), novorođenčad 4 mg/kg dnevno; akutna intoksikacija izoniazidom: primjenjuje se doza piridoksina koja je jednaka dozi ingestiranog izoniazida, uz potrebne antikonvulzive, 1-4 g piridoksina se daje i.v., a potom se nastavlja sa i.m. primjenom 1 g svakih 30 min. do pune doze.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**BEDOXIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD**

Rp tableta [20 mg/1 tableta] 20 tableta (2 Alu/ PVdC/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

ZU rastvor za injekciju [50 mg/2 mL] 50 staklenih ampula po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

A11HA31 kalcijum-pantotenat

Doziranje: ublažavanje simptoma zapaljenja sluznice usne duplje, ždrijela, jezika i desni (stomatitis, afte, glositis, faringitis, laringitis): odrasli, 3-6 komprimovanih lozengi na dan, sisati dok se ne istope u ustima.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**PANTHENOL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA**

BRp komprimovana lozenga [120 mg/1 lozenga] 20 komprimovanih lozengi (2 PVC-Al blistera sa po 10 lozengi), u kutiji

A12 **MINERALI**
A12A **Kalcijum**
A12AA **Kalcijum**

A12AA04 **kalcijum-karbonat**

Doziranje: *hiperfosfatemija, hronična bubrežna insuficijencija, bez obzira da li je bolesnik na dijalizi ili ne:* odrasli 2,5-17 g podijeljeno u više doza; djeca 6-12. god. 3-4 puta dnevno po 0,5 g; djeca 12-18 god. 3-4 puta po 1-1,5g, maks. 3 g dnevno; uzima se za vrijeme obroka, doza se određuje individualno u zavisnosti od koncentracije kalcijuma i fosfata u serumu (koncentracija fosfata u serumu treba da bude 0,8-1,5 mmol/l, a kalcijuma 2,1-2,7 mmol/l); *terapija nedostatka kalcijuma:* odrasli 0,5-3 g 3 puta dnevno; djeca 6-12 god. 0,5 g 3-4 puta dnevno, djeca 12-18 god. 1-1,5 g 3-4 puta dnevno, maks. 5 g dnevno; *želučani hiperaciditet:* odrasli, 0,5-3 g 3 puta dnevno; djeca 0,25-1 g 3 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KALCIUM KARBONAT ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

BRp tableta [1 g/1 tableta] 50 tableta (1 staklena bočica), u kutiji

A12AX **Kalcijum, kombinacije sa vitaminom D i/ili drugim lijekovima**

A12AX **holekalciferol, kalcijum**

Doziranje: *prevencija i terapija nedostatka vitamina D i kalcijuma kod starijih pacijenata, terapija osteoporoze:* odrasli i stariji pacijenti, jedna tableta dva puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IDEOS - LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL

BRp tableta za žvakanje [400 i.j./1 tableta+ 500 mg/1 tableta] 30 tableta za žvakanje (2 polipropilenske tube sa po 15 tableta), u kutiji

A12B **KALIJUM**
A12BA **Kalijum**

A12BA01 **kalijum-hlorid**

Doziranje: *prevencija hipokalijemije:* individualno, zavisno od vrijednosti kalijuma u serumu, uobičajena doza iznosi 20-40 mmol dnevno u podijeljenim dozama (1 tbl. 500 mg=6,7 mmol); *liječenje hipokalijemije:* 40-100 mmol kalijuma podijeljeno u 2-4 doze (maks. 160 mmol/dan i maks. pojedinačna doza 40 mmol)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KALII CHLORIDI UFAR - UFAR D.O.O. BEOGRAD

Rp prašak za oralni rastvor [1 g/1 kesica] 10 kesica sa praškom za oralni rastvor, u kutiji

KALIJ KLORID JADRAN - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

Rp tableta za oralnu otopinu [500 mg/1 tableta] 20 tableta za oralnu otopinu (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

KALIJEV KLORID NATURA PHARM - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

Rp tableta za oralnu otopinu [500 mg/1 tableta] 30 tableta za oralnu otopinu (2 PVC/Al blistera sa po 15 tableta za oralnu otopinu), u kutiji

A12BA30 kalijum-citrat, limunska kiselina

Doziranje: izražena hipokalijemija, naročito u metaboličkoj acidozi, poremećaji srčanog ritma ili neuromuskularni poremećaji izazvani hipokalijemijom, hipokalijemija u terapiji digitalisom, profilaksa hipokalijemije u slučaju ketoacidoze, sprečavanje ponovnog stvaranja bubrežnih kamenaca: individualno, u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu; maks. odrasli do 160 mmol dnevno, odnosno do 4 šumeće tablete; prosječna dnevna doza je od 1 do 2 tablete.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KALINOR - LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T.

Rp šumeća tableta [2.17 g/1 tableta+ 2.057 g/1 tableta] 15 šumećih tableta u plastičnoj tubi, u kutiji

A16 RAZNI LIJEKOVI ZA ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM**A16A RAZNI LIJEKOVI ZA ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM****A16AB Enzimi****A16AB02 imigluceraza**

Doziranje: *ne-neurološke manifestacije tipa I ili ne-neurološke manifestacije tipa III Gaucher-ove bolesti:* i.v. inf., početna doza 60 U/kg tjelesne težine jedanput u 2 nedjelje tokom 6 mjeseci (doze ispod 15 U/kg tjelesne težine jedanput u 2 nedjelje mogu uticati na poboljšanje hematoloških parametara i organomegalije); održavanje, podesiti dozu prema odgovoru.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CEREZYME - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [400 jedinica/1 bočica] 1 bočica sa praškom za koncentrat za rastvor za infuziju, u kutiji

A16AB03 agalzidaza alfa

Doziranje: *Fabryjeva bolest:* i.v. inf. odrasli, 200 mcg/kg svake druge nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

REPLAGAL - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG

ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [1 mg/1 mL] 1 bočica, u kutiji

A16AB04 agalzidaza beta

Doziranje: *Fabry-ijeva bolest (deficit alfa galaktozidaze A):* i.v.inf. odrasli i djeca preko 8 god. 1 mg/kg svake 2 nedjelje.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FABRAZYME - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

ZU prašak za koncentrat za otopinu za infuziju [35 mg/1 viala] 1 bočica sa praškom za koncentrat za otopinu za infuziju, u kutiji

A16AB05 laronidaza

Doziranje: dugotrajna enzimska zamjenska terapija u pacijenata sa potvrđenom dijagnozom mukopolisaharidoze I (MPS I; alfa-L-iduronidaze) za liječenje manifestacija bolesti koje nisu neurološke prirode: 100 jedinica/kg tjelesne težine primjenjen jedanput svake sedmice.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALDURAZYME - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

ZU	koncentrat za rastvor za infuziju [100 jedinica/1 mL] 1 bočica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

A16AB07 alglukozidaza alfa

Doziranje: dugotrajno enzimsko dopunsko liječenje bolesnika s potvrđenom dijagnozom Pompeove bolesti (nedostatak kisele-glukozidaze): i.v.inf. 20 mg/kg tjelesne mase jednom u 2 (dvije) nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MYOZYME - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

ZU	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [50 mg/1 boca] 1 bočica (staklo tipa I) sa 50 mg praška za koncentrat za rastvor za infuziju, u kutiji

A16AB09 idursulfase

Doziranje: mukopolisharidoza II: i.v. inf. 0,5 mg/kg jednom nedjeljno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ELAPRASE - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, IRELAND BRANCH

ZU/Rp	Koncentrat za otopinu za infuziju [2 mg/1 mL] 1 staklena bočica od 5 ml (tip I) sa 3 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

A16AB10 velagluceraze alfa

Doziranje: tip I Gauscherove bolesti: 60 jedinica/kg svake druge nedjelje; podesiti prema odgovoru na 15-60 jedinica/kg svake druge nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VPRIV - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, IRELAND BRANCH

ZU/Rp	prašak za otopinu za infuziju [400 jedinica/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za otopinu za infuziju, u kutiji

A16AB13 asfotaza alfa

Doziranje: hipofosfatazija nastala u pedijatrijskoj dobi: s.c. odrasli 2 mg/kg 3 puta nedjeljno, alternativno 1 mg/kg 6 puta nedjeljno, za više detalja o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

STRENSIQ - ASTRAZENECA AB

ZU/Rp	otopina za injekciju [100 mg/1 mL] 12 staklenih bočica (staklo tip I) sa 0,8 mL otopine za injekciju, u kutiji
ZU/Rp	otopina za injekciju [40 mg/1 mL] 12 staklenih bočica (staklo tip I) sa 0,45 mL otopine za injekciju, u kutiji
ZU/Rp	otopina za injekciju [40 mg/1 mL] 12 staklenih bočica (staklo tip I) sa 0,7 mL otopine za injekciju, u kutiji
ZU/Rp	otopina za injekciju [40 mg/1 mL] 12 staklenih bočica (staklo tip I) sa 1 mL otopine za injekciju, u kutiji

A16AX Razni lijekovi za alimentarni trakt i metabolizam

A16AX01 tiotkinska kiselina

Doziranje: dijabetička polineuropatija: dnevna doza 600 mg 30 min. prije prvog obroka, za održavanje terapije navedena doza se može kasnije smanjiti na 300 mg dnevno ili 100 mg tri puta dnevno; kod veoma izražene parestezije i.v. primjena u dozi 600 mg dnevno, tokom 2-4 nedjelje, a zatim se liječenje nastavlja oralno, dozom 300-600 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALFAZAN - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp film tableta [600 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji

ALTIOKS - BOSNALIJEK D.D.

Rp film tableta [600 mg/1 tableta] 30 film tableta u staklenoj bočici, u kutiji

BERLITHION - BERLIN-CHEMIE AG

Rp kapsula, meka [600 mg/1 kapsula] 30 kapsula, mekih (3 PVC/PVDC/AL blistera po 10 kapsula), u kutiji

BERLITHION 600 ED - BERLIN-CHEMIE AG

ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [600 mg/24 mL] 5 staklenih ampula po 24 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

THIOGAMMA 600 ORAL - WÖRWAG PHARMA GMBH & CO.KG

Rp film tableta [600 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC//AI blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [600 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC-PVDC//AI blistera po 10 tableta), u kutiji

TIOLIZEN - LABORMED-PHARMA S.A.

Rp film tableta [600 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC / PVDC /AI blistera sa 10 tableta), u kutiji

TIOPATI - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp film tableta [600 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 AI/AI blistera po 10 film tableta), u kutiji

A16AX04 nitisinone

Doziranje: *nasljedna tirozinemija tipa I* (u kombinaciji sa ograničenjem unosa tirozina i fenilalanina): djeca i odrasli, početi sa 1 mg/kg dnevno, podešavati prema odgovoru; maks. 2 mg/kg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TISINON - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

Rp kapsula, tvrda [10 mg/1 kapsula] 60 kapsula, tvrdih u HDPE bočici, u kutiji

Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula] 60 kapsula, tvrdih u HDPE bočici, u kutiji

B
B01 **KRV I KRVOTVORNI ORGANI**
ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA
(ANTIKOAGULANSI)
B01A **Antitrombotička sredstva (antikoagulansi)**
B01AA **Antagonisti vitamina K**

B01AA03 **varfarin**

Doziranje: liječenje i profilaksa tromboza dubokih vena i plućne embolije, profilaksa tromboembolija kod osoba sa fibrilacijom pretkomora, vještačkim srčanim zaliscima i kod reumatske srčane bolesti, profilaksa sistemskih embolija nakon tranzitnog ishemijskog ataka (TIA): individualno i u zavisnosti od INR-a (internacionalnog normalizovanog odnosa protrombinskog vremena, koji predstavlja odnos bolesnikovog i normalnog protrombinskog vremena), uobičajena početna doza je 10 mg 2 dana, svakog dana u isto vrijeme; u većini slučajeva je dovoljna početna doza od 5 mg dnevno; doza održavanja 3-9 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FARIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta),
u kutiji

B01AA07 **acenokumarol**

Doziranje: profilaksa i terapija tromboembolijskih poremećaja: početna doza 2-4 mg jednom dnevno tokom 2 dana (liječenje se može započeti i sa početnom dozom od 6 mg prvog dana), zatim 4 mg drugog dana; doza održavanja 1-8 mg dnevno, svakog dana u isto vrijeme;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ACENOKUMAROL REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE

Rp tableta [4 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera sa 10 tableta)
u kutiji

SINTROM - MERUS LABS LUXCO II S.A.R.L.

Rp tableta [4 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta) u
kutiji

B01AB **Heparinska grupa**

B01AB01 **heparin**

Doziranje: terapija i prevencija tromboembolijskih poremećaja (duboka venska tromboza, akutna embolija arterija ili tromboza, tromboflebitis, embolija pluća, masna embolija): terapijske doze: individualno, i.v. 5000-10000 i.j. na 4 h ili 500 i.j./kg tjelesne mase dnevno kao kontinuirana inf. u rastvoru natrijum hlorida ili dekstroze; inicijalna doza s.c. inj. 250 i.j./kg tjelesne mase; dalje, na svakih 12 h uz individualno korigovanje doze na osnovu testa koagulacije; podešavanje doze je individualno; profilaksa postoperativne tromboze dubokih vena i plućne embolije: s.c. 5000 i.j. 2 sata prije operacije a zatim svakih 8-12 sati tokom 7 dana ili dok je pacijent u bolnici; terapija nestabilne angine pectoris ili akutne okluzije perifernih arterija: kontinuirana i.v. inf. u istim dozama kao kod tromboze dubokih vena i plućne embolije; nakon infarkta miokarda u prevenciji reokluzije koronarnih arterija: i.v. 5000 i.j. a zatim 1000 i.j./h sa alteplazom; prevencija zgrušavanja krvi u ekstrakorporalnoj cirkulaciji za vrijeme hemodijalize: početna doza 1000 - 5000 i.j., terapija održavanja 1000-2000 i.j./h, prilagođeno za održavanje vremena zgrušavanja većeg od 40 min.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HEPARIN GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

ZU rastvor za injekciju [25000 i.j./5 mL] 10 staklenih ampula sa 5 ml
 rastvora za injekciju, u kutiji

HEPARIN NATRIJUM PANPHARMA - PANPHARMA S.A.

ZU rastvor za injekciju [25000 i.j./5 mL] 10 staklenih bočica po 5 ml
 rastvora za injekciju, u kutiji

HEPARIN-INDAR - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ON THE PRODUCTION OF INSULIN „INDAR"

ZU rastvor za injekciju [5000 i.j./1 mL] 1 staklena bočica sa 5 ml rastvora
 za injekciju, u kutiji

B01AB04 dalteparin

Doziranje: *liječenje akutnih tromboza dubokih vena i embolije pluća:* s.c. u jednoj (200 i.j./kg), ili podijeljeno u dvije dnevne doze (2x100 i.j./kg), kod bolesnika sa povećanim rizikom od krvarenja; *prevencija koagulacije u ekstrakorporalnom sistemu u toku hemodijalize i hemofiltracije:* u trajanju dužem od 4 sata: i.v. bolus inj. 30-40 i.j./kg tjelesne mase nakon čega se daje 10-15 i.j./kg/sat u i.v.inf; trajanja kraće od 4 sata, i.v. bolus inj. 30-40 i.j./kg tjelesne mase, praćeno i.v. inf. od 10-15 i.j./kg/sat ili jedan i.v. bolus od 5000 i.j.; *prevencija tromboza kod pacijenta podvrgnutih hirurškim zahvatima: bolesnici sa umjerenim rizikom od tromboembolijskih komplikacija:* s.c. 2500 i.j. 1-2 sata prije operacije i kasnije 2500 i.j. svako jutro poslije operacije dok traje imobilizacija (5-7 dana, ili duže); *bolesnici sa visokim rizikom od tromboembolija:* daje se dok god traje imobilizacija (uglavnom 5-7 dana) ili duže i to: na dan operacije – s.c. 2500 i.j. 1-2 sata prije operacije i s.c. 2500 i.j. 8-12 sati nakon operacije, zatim 5000 i.j. svaka 24 sata, alternativno početna doza od 5000 i.j. veće prije operacije i 5000 i.j. nakon 24 sata i zatim svaka 24 sata 5000 i.j.; *profilaksa tromboembolizma kod određenih grupa pacijenata sa visokim rizikom i smanjenom pokretljivošću:* s.c. jednom dnevno 5000 i.j. 12 do 14 dana ili duže, ukoliko se imobilnost pacijenata produžava; *nestabilna angina pectoris i infarkt miokarda bez ST- elevacije:* s.c. 120 i.j./kg tjelesne mase svakih 12 sati do 8 dana, maks. doza je 10000 i.j./12 sati. Ako nije posebno kontraindikovano pacijent može istovremeno primati i niske doze acetylsalicylne kiseline (75 i 325 mg/dan). Ukupan tretman ne treba da bude duži od 45 dana; *liječenje akutne duboke venske tromboze (VTE) i plućne embolije i prevencija ponovnog javljanja kod bolesnika sa solidnim tumorima:* s.c. 200 i.j./kg tjelesne mase jednom dnevno tokom prvih 30 dana terapije; ukupna dnevna doza ne bi trebalo da bude veća od 18000 i.j., do 6 mjeseci; *liječenje simptomatske venske tromboembolije u pedijatrijskih pacijenata u dobi od 1 mjeseca i starijih:* 1 mjesec do manje od 2 godine, 150 i.j./kg dva puta dnevno, 2 godine do manje od 8 godina 125 i.j./kg dva puta dnevno, 8 godina do manje od 18 godina 100 i.j./kg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FRAGMIN - PFIZER INC.

ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [2500 i.j./1 doza] 10
 jednodoznih napunjenih šprica po 0,2 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [5000 i.j./1 doza] 10
 jednodoznih napunjenih šprica po 0,2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

B01AB05 enoksaparin

Doziranje: *profilaksa dubokih venskih tromboza posebno kod hirurških pacijenata,* s.c. umjeren rizik: 20 mg (2000 jedinica) oko 2 sata prije operacije, a zatim 20 mg (2000 jedinica) svaka 24 sata; visoki rizik (npr. hirurgija u ortopediji), 40 mg (4000 jedinica) 12 sati prije operacije, a zatim 40 mg (4000 jedinica) svaka 24 sata; *profilaksa duboke venske tromboze kod bolničkih pacijenata,* s.c. 40 mg (4000 jedinica) svakih 24 sata; *tretman dubokih venskih tromboza ili plućne embolije:* s.c. 1,5 mg/kg (150 jedinica/kg)

svakih 24 sata dok se ne uspostavi odgovarajuća oralna antikoagulantna terapija; *produženo liječenje venskog tromboembolizma i sprečavanje njegovog vraćanja kod pacijenata koji boluju od karcinoma*: s.c. 100 i.j./kg (1 mg/kg) dva puta dnevno tokom 5 do 10 dana na osnovu procjene individualnog rizika pacijenta, zatim 150 i.j./kg (1,5 mg/kg) jednom dnevno narednih 6 mjeseci; *akutni infarkt miokarda sa elevacijom ST-segmenta*: odrasli ispod 75 god. i.v. inj. 30 mg (3000 jedinica) praćeno s.c. 1 mg/kg (100 jedinica/kg) zatim s.c. 1 mg/kg svakih 12 sati do 8 dana (maks. 100 mg (10000 jedinica) za samo prve 2 subkutane doze); stariji preko 75 god. jedino s.c. 750 mcg/kg (75 jedinica/kg) svakih 12 sati (maks. 75 mg (7500 jedinica) za samo prve 2 doze); *pacijenti koji prolaze perkutanu koronarnu intervenciju*, dodatna doza, i.v. inj. 300 mcg/kg (30 jedinica/kg) u vrijeme procedure ukoliko je poslednja subkutanu doza data više od 8 sati ranije; *nestabilna angina i infarkt miokarda bez elevacije ST-segmenta*: s.c. 1 mg/kg (100 jedinica/kg) svakih 12 sati obično tokom 2-8 dana (min. 2 dana); *sprečavanje zgrušavanja u vanjtelesnoj cirkulaciji za vrijeme hemodijalize*: konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CLEXANE - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [100 mg/1 mL] 10 staklenih šprica (sa iglom) sa 0,2 ml rastvora za injekciju, u kutiji
- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [100 mg/1 mL] 10 staklenih šprica (sa iglom) sa 0,4 ml rastvora za injekciju u zaštitnom pakovanju, u kutiji
- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [100 mg/1 mL] 2 staklene šprice (sa iglom) sa 0,6 ml rastvora za injekciju u zaštitnom pakovanju, u kutiji
- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom špricu [100 mg/1 mL] 2 staklene šprice (sa iglom) sa 0,8 ml rastvora za injekciju u zaštitnom pakovanju, u kutiji

CRUSIA 10000 IU (100 MG)/1 ML RASTVOR ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ ŠPRICI - ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A.

- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [10000 i.j./1 mL] 10 napunjenih šprica s 1 ml rastvora, u kutiji

CRUSIA 2000 IU (20 MG)/0,2 ML RASTVOR ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ ŠPRICI - ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A.

- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [2000 i.j./0.2 mL] 10 napunjenih šprica s 0,2 ml rastvora, u kutiji

CRUSIA 4000 IU (40 MG)/0,4 ML RASTVOR ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ ŠPRICI - ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A.

- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [4000 i.j./0.4 mL] 10 napunjenih šprica s 0,4 ml rastvora, u kutiji

CRUSIA 6000 IU (60 MG)/0,6 ML RASTVOR ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ ŠPRICI - ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A.

- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom špricu [6000 i.j./0.6 mL] 10 napunjenih šprica s 0,6 ml rastvora, u kutiji

CRUSIA 8000 IU (80 MG)/0,8 ML RASTVORA ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ ŠPRICI - ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A.

- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [8000 i.j./0.8 mL] 10 napunjenih šprica s 0,8 ml rastvora, u kutiji

ENOXAPARIN LEDRAXEN - VENIPHARM S.A.S.

- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [2000 i.j./0.2 mL] 10 napunjenih šprica sa 0,2 mL rastvora za injekciju, u kutiji
- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [4000 i.j./0.4 mL] 10 napunjenih šprica sa 0,4 mL rastvora za injekciju, u kutiju

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [6000 i.j./0.6 mL] 10 napunjenih šprica sa 0,6 mL rastvora za injekciju, u kutiju
ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [8000 i.j./0.8 mL] 10 napunjenih šprica sa 0,8 mL rastvora za injekciju, u kutiju
INHIXA - SHENZHEN TECHDOW PHARMACEUTICAL CO. LTD.	
ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [100 mg/1 mL] 10 napunjenih injekcionih šprica bez zaštite za iglu sa 0,2 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [100 mg/1 mL] 10 napunjenih injekcionih šprica bez zaštite za iglu sa 0,4 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [100 mg/1 mL] 10 napunjenih injekcionih šprica sa zaštitom za iglu sa 0,2 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [100 mg/1 mL] 10 napunjenih injekcionih šprica sa zaštitom za iglu sa 0,4 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [100 mg/1 mL] 2 napunjene injekcione šprice bez zaštite za iglu sa 0,6 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [100 mg/1 mL] 2 napunjene injekcione šprice bez zaštite za iglu sa 0,8 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [100 mg/1 mL] 2 napunjene injekcione šprice sa zaštitom za iglu sa 0,6 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [100 mg/1 mL] 2 napunjene injekcione šprice sa zaštitom za iglu sa 0,8 ml rastvora za injekciju, u kutiji

B01AB06 nadroparin

Doziranje: *prevencija nastanka tromboembolijskih poremećaja u opštoj hirurgiji:* s.c. 0,3 ml (2850 i.j.) primijenjeno 2-4 sata prije operativnog zahvata, a potom svakog sljedećeg dana jednom dnevno; daje se minimalno 7 dana, do postizanja pune pokretljivosti; *prevencija nastanka tromboembolijskih poremećaja u ortopediji:* s.c. doza zavisi od tjelesne mase pacijenta (konsultovati informacije o lijeku), prva doza se daje 12 sati prije hirurškog zahvata, sljedeća doza 12 sati poslije hirurškog zahvata, zatim naredna 3 dana, nakon čega se doza povećava za 50% i traje dok se pacijent ne mobilizira, a najmanje 10 dana; *prevencija nastanka tromboembolijskih poremećaja kod internističkih pacijenata kod kojih je rizik vrlo velik i koji se liječe na odjelu intenzivne njege (respiratorna insuficijencija i/ili infekcija disajnih puteva i/ili srčana insuficijencija:* s.c. odrasli pacijenti tjelesne mase manje od 70 kg 0,4 ml (3800 i.j.) jednom dnevno, a pacijenti preko 70 kg tjelesne mase 0,6 ml (5700 i.j.) jednom dnevno, tokom perioda povećanog rizika od tromboembolije; *liječenje tromboembolijskih poremećaja:* s.c. 2 puta dnevno, u razmaku od 12 sati, uobičajeno tokom 10 dana, doza zavisi od tjelesne mase i ciljna doza je 86 i.j./kg tjelesne mase, za više detalja konsultovati informacije o lijeku; *sprečavanje zgrušavanja tokom hemodijalize:* doziranje individualno, za više detalja konsultovati informacije o lijeku; *liječenje nestabilne angine pectoris i akutnog infarkta miokarda bez Q zupca:* s.c. 2 puta dnevno u razmaku od 12 sati, zajedno sa acetilsalicilnom kiselinom u dozi do 325 mg, početna doza u i.v. bolusu a ostale s.c, daje se obično 6 dana, doza zavisi od tjelesne mase i ciljna doza je 86 i.j./kg tjelesne mase, za više detalja konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FRAXIPARINE - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	[2850 i.j./0.3 mL]	10
	napunjenih staklenih šprica, u kutiji		
ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	[3800 i.j./0.4 mL]	10
	napunjenih staklenih šprica, u kutiji		
ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	[5700 i.j./0.6 mL]	10
	napunjenih staklenih šprica, u kutiji		
ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	[7600 i.j./0.8 mL]	10
	napunjenih staklenih šprica, u kutiji		

B01AC *Inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin*
B01AC04 *klopidogrel*

Doziranje: *prevencija aterotrombotičkih događaja kod periferne arterijske bolesti ili nakon infarkta miokarda (u rasponu od nekoliko do najviše 35 dana) ili ishemičnog moždanog udara (od 7 dana do 6 mjeseci): 75 mg jednom dnevno; prevencija aterotrombotičkih događaja u akutnom koronarnom sindromu bez elevacije ST segmenta (sa acetilsalicilnom kiselinom): početna doza 300 mg, zatim 75 mg dnevno; prevencija aterotrombotičkih događaja u akutnom koronarnom sindromu sa elevacijom ST segmenta (sa acetilsalicilnom kiselinom): početna doza 300 mg, zatim 75 mg dnevno tokom najmanje 4 sedmice (kod bolesnika starijih od 75 god. izostaviti početnu-udarnu dozu); umjereni do visokorizični prolazni ishemijski napad ili manji ishemijski moždani udar u kombinaciji sa acetilsalicilnom kiselinom: 75 mg jednom dnevno; prevencija aterotrombotičkih i tromboembolijskih događaja kod pacijenata sa atrijskom fibrilacijom i najmanje jednim faktorom rizika za nastanak vaskularnih događaja (sa acetilsalicilnom kiselinom) i za koje varfarin nije odgovarajući: odrasli, 75 mg jednom dnevno*

REGISTROVANI LIJEKOVI:
ATTERA - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO

Rp	filmom obložena tableta [75 mg/1 tableta]	30 filmom obloženih tableta (3 Al/Al blistera po 10 filmom obloženih tableta), u kutiji

CLODIL - BOSNALJEK D.D.

Rp	film tableta [75 mg/1 tableta]	30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

CLOPIGAL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp	film tableta [75 mg/1 tableta]	28 film tableta (2 PVC/PVDC/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji

KLOPIDEX - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

Rp	filmom obložena tableta [75 mg/1 tableta]	30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

PLAVIX - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

Rp	film tableta [75 mg/1 tableta]	28 film tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji

RESPEKT - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp	film tableta [75 mg/1 tableta]	28 film tableta (2 oPA/Al/PVC/Al blistera po 14 tableta) u kutiji

SYNETRA - ALKALOID AD SKOPJE

Rp	film tableta [75 mg/1 tableta]	30 film tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ZYLLT - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp filmom obložena tableta [75 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

B01AC06 acetilsalicilna kiselina

Doziranje: smanjenje rizika od smrti kod pacijenata sa suspektnim akutnim srčanim udarom: 200-300 mg odmah po sumnji, najbolje sažvakati, doza održavanja 200-300 mg u trajanju do 30 dana nakon srčanog udara, a zatim razmotriti dalje preventivno liječenje; smanjenje rizika od obolijevanja i smrti kod pacijenata koji su već preboljeli srčani udar; sekundarno sprečavanje moždanog udara; smanjenje rizika od tranzitornih ishemijskih ataka (TIA) i moždanog udara kod pacijenata koji pate od TI; smanjenje rizika od obolijevanja i smrti kod pacijenata sa stabilnom i nestabilnom anginom pectoris; sprečavanje tromboembolije poslije operativnih ili intervencijskih zahvata na krvnim sudovima, kao što su perkutana transluminalna koronarna angioplastika, aortokoronarna premoštenja, karotidna endarterektomija, arteriovenska premoštenja: 100-300 mg dnevno; smanjenje rizika od prvog srčanog udara kod osoba s kardiovaskularnim faktorima rizika (dijabetes, hiperlipidemija, hipertenzija, gojaznost, pušenje, starost): 100-200 mg dnevno ili 300 mg svaki drugi dan; Kawasaki sindrom - inhibicija upale za vrijeme trajanja febrilne faze: početi sa 30-50 mg/kg/dan u 3-4 podijeljene doze, i u kombinaciji sa imunoglobulinima, neki slučajevi zahtijevaju primjenu viših doza (80-120 mg/kg/dan); profilaktička inhibicija agregacije trombocita kod aneurizmi koronarnih arterija: nakon što se klinički parametri poboljšaju (obično od 2. do 3. sedmice bolesti), treba nastaviti sa 3-5 mg/kg/dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ANBOL CARDIO - FARMALIDER S.A.

BRp gastorezistentna tableta [100 mg/1 tableta] 30 gastorezistentnih tableta , (2 PVC-Al blistera sa po 15 tableta) , u kutiji

ANBOL CARDIO - GALENIKA A.D. BEOGRAD

BRp gastorezistentna tableta [75 mg/1 tableta] 30 gastorezistentnih tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

ANDOL 100 - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

BRp tableta [100 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVDC/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ANDOL GR 100 - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

BRp gastorezistentna tableta [100 mg/1 tableta] 30 gastorezistentnih tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ANDOL GR 75 - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

BRp gastorezistentna tableta [75 mg/1 tableta] 30 gastorezistentnih tableta (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

ASA ZADA - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

BRp gastorezistentna tableta [100 mg/1 tableta] 30 gastorezistentnih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ASKA PRO - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

BRp želučanootporna tableta [100 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC//Al blistera sa 15 tableta), u kutiji

ASPIRIN PROTECT 100 - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT

BRp gastorezistentna tableta [100 mg/1 tableta] 28 gastorezistentnih tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
BRp gastorezistentna tableta [100 mg/1 tableta] 98 gastorezistentnih tableta (7 PVC/PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

BOSPYRIN - BOSNALIJEK D.D.

BRp tableta [100 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

BOSPYRIN PROTECT - BOSNALIJEK D.D.

- BRp želučanootporna tableta [100 mg/1 tableta] 30 želučanootpornih tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- CARDIOPIRIN GR - ICN POLFA RZESZOW S.A.,**
- BRp gastrozistentna tableta [100 mg/1 tableta] 30 gastrozistentnih tableta (3 PVC/Al blistera po 10 gastrozistentnih tableta)
- MIDOL PROTECT - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA**
- BRp gastrozistentna tableta [100 mg/1 tableta] 30 gastrozistentnih tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- MIDOL PROTECT 75 - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA**
- BRp gastrozistentna tableta [75 mg/1 tableta] 30 gastrozistentnih tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- TROMBOPIRIN - G.L. PHARMA GMBH**
- BRp gastrozistentna tableta [100 mg/1 tableta] 30 gastrozistentnih tableta (3 PVC-Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
- BRp gastrozistentna tableta [75 mg/1 tableta] 30 gastrozistentnih tableta (3 PVC-Alu blistera po 10 tableta), u kutiji

B01AC07 dipiridamol

Doziranje: profilaksa tromboembolije povezane sa ugradnjom umjetnih srčanih zalistaka (kao dodatak oralnim antikoagulantima): 300-450 mg dnevno, podijeljeno u više doza; maks. dnevna doza 600 mg

REGISTROVANI LIJEKOVI:**PERSANTIN - GLENWOOD GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE (GLENWOOD GMBH)**

- Rp obložena tableta [75 mg/1 tableta] 60 obloženih tableta (3 PVC/PVdC - blistera po 20 tableta), u kutiji

B01AC11 iloprost

Doziranje: koncentrat za otopinu za infuziju: uznapredovali tromboangitis obliterans (Bürgerova bolest) s kritičnom ishemijom ekstremiteta u slučajevima gdje nije indikovana revaskularizacija; pacijenti sa uznapredovalom perifernom arterijskom okluzivnom bolesti (kod koje postoji opasnost od gangrene), te kada revaskularizacija nije moguća; pacijenti s jakim hendikepirajućim Raynaud fenomenom koji ne pokazuju reakcije na druge terapije: inicijalno 0,5 ng/kg/min tokom 30 minuta; dozu treba povećavati u intervalima svakih 30 minuta počev od 0,5 ng/kg/min do 2,0 ng/kg/min; tačna stopa infuzije treba da se računa na bazi tjelesne težine da bi se efektivirala infuzija po stopi od 0,5 ng/kg/min do 2,0 ng/kg/min. (Ilomedin 20 je otopina u staklenoj ampuli; sadržaj ampule se vadi i razrjeđuje s rastvorom natrijum hlorida (0,9%) ili glukoze 5%); otopina za atomizator: primarna plućna hipertenzija (funkcionalne klase NYHA III) radi poboljšanja kapaciteta obavljanje fizičkih aktivnosti i ublažavanja simptoma kod odraslih: inhalacijska primjena nebulizacijom, preporučena doza 2,5 mcg ili 5,0 mcg, počevši od niske doze od 2,5 mcg za prvu inhalaciju, zatim 5,0 mcg za drugu inhalaciju; u slučaju slabe podnošljivosti doze od 5,0 mcg, dozu treba smanjiti na 2,5 mcg; dozu za jednu inhalaciju treba primijeniti 6-9 puta dnevno u skladu sa pojedinačnim potrebama i podnošljivošću

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ILOMEDIN - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**

- ZU koncentrat otopine za infuziju [20 µg/1 mL] 5 ampula po 1 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

VENTAVIS - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

ZU otopina za atomizator [10 µg/1 mL] 90 ampula po 2 ml otopine za atomizator, u kutiji

B01AC22 prasugrel

Doziranje: u kombinaciji sa aspirinom za prevenciju aterotrombotičkih događaja kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom (nestabilnom anginom, infarktom miokarda bez elevacije ST segmenta ili infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta, kod pacijenata koji se podvrgavaju perkutanoj koronarnoj intervenciji: oralno, odrasli inicijalno 60 mg u jednoj dozi, zatim 10 mg jednom dnevno, obično do 12 mjeseci

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ELISKARDIA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PE+DES//Al/PE blistera sa po15 tableta), u kutiji
Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PE+DES//Al/PE blistera sa po15 tableta), u kutiji

PRASUGREL MYLAN - MYLAN GERMANY GMBH,

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 28 film tableta u bijeloj neprovidnoj (HDPE) bočici , u kutiji

PRASUGREL MYLAN - MYLAN GERMANY GMBH,

Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 28 film tableta u bijeloj neprovidnoj (HDPE) bočici , u kutiji

TOSYNAL - ALKALOID AD SKOPJE

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta),u kutiji

XEPAR - HEMOFARM A.D. VRŠAC

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji

B01AC23 cilostazol

Doziranje: intermitentna klaudikacija kod pacijenata bez bola u mirovanju i kod kojih nije dokazana nekroza perifernih tkiva: oralno, odrasli, 100 mg 2 puta dnevno 30 min. prije jela

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CILOSTA - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

Rp tableta [100 mg/1 tableta] 56 tableta (4 PVC/PVdC/Al blistera po 14 tableta) u kutiji

DILVAS - NOUCOR HEALTH, S.A.

Rp tableta [100 mg/1 tableta] 28 tableta (1 PVC/Al blister sa po 28 tableta), u kutiji
Rp tableta [100 mg/1 tableta] 56 tableta (2 PVC/Al blistera sa po 28 tableta), u kutiji

B01AC24 tikagrelor

Doziranje: prevencija aterotrombotskih događaja kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom (u kombinaciji sa acetilsalicilnom kiselinom): oralno, odrasli, početna doza 180 mg kao pojedinačna doza, zatim 90 mg 2 puta dnevno obično tokom 12 mjeseci; prevencija aterotrombotskih događaja kod pacijenata sa istorijom infarkta miokarda i visokim rizikom od aterotrombotskih događaja (u kombinaciji sa acetilsalicilnom kiselinom): oralno, odrasli, 60 mg 2 puta dnevno, produžena terapija može biti započeta bez prekida nakon prvobitne 12-mjesečne terapije akutnog koronarnog sindroma. Liječenje se takođe može započeti do 2 god. nakon infarkta miokarda ili u roku od jedne

godine nakon prekida prethodnog liječenja inhibitorom receptora adenozin difosfata (ADP). Podaci o efikasnosti i bezbjednosti produženog liječenja dužeg od 3 godine su ograničeni.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TILOBRASTIL, 90 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Rp film tableta [90 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al-PVC/PE/PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

ATIXARSO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp filmom obložena tableta [60 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [90 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji

GARTYZ - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp film tableta [90 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PVDC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

IGZELYM - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 Aluminij-PVC/PE/PVDC blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp film tableta [90 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 Aluminij-PVC/PE/PVDC blistera po 14 tableta), u kutiji

OREBRITON - LABORMED-PHARMA S.A.

Rp film tableta [90 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PVDC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

TICACOR - ADALVO LIMITED

Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PVDC-Alu blistera sa 14 tableta), u kutiji

Rp film tableta [90 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PVDC-Alu blistera sa 14 tableta), u kutiji

TICADIL - BOSNALIJEK D.D.

Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PVDC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [90 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

TICAGREX - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 60 film tableta (4 PVC/PVDC//Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji

Rp film tableta [90 mg/1 tableta] 60 film tableta (4 PVC/PVDC//Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji

TICASA - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Rp filmom obložena tableta [60 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PE/PVDC/Al prozirna blistera sa 14 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [90 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PE/PVDC/Al prozirna blistera sa 14 tableta), u kutiji

TILANTA - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp filmom obložena tableta [60 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PE/PVDC- ALU blistera po 14 tableta), u kutiji.

Rp filmom obložena tableta [90 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PE/PVDC-Alu blistera po 14 tableta), u kutiji

TILOBRASTIL, 90 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Rp film tableta [90 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al-OPA/Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

TILOBRASIL, 60 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al-PVC/PE/PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al-OPA/Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

TINGORA - ALKALOID AD SKOPJE

- Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 OPA/Al/PVC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [90 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 OPA/Al/PVC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [90 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji

TYGROL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp filmom obložena tableta [90 mg/1 tableta] 56 tableta (4 PVC/PVDC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

B01AC30 acetilsalicilna kiselina, klopido^grel

Doziranje: *prevencija aterotrombotičkih događaja* nakon inicijalne terapije klopido^grelom i acetilsalicilnom kiselinom zasebno primjenjivanim; *akutni koronarni sindrom bez elevacije ST-segmenta (nestabilna angina ili infarkt miokarda bez Q-zupca), akutni infarkt miokarda s elevacijom ST-segmenta* kod pacijenata koji se podvrgavaju perkutanoj koronarnoj intervenciji (uključujući pacijente koji se podvrgavaju postavljanju stenta) ili medicinski liječenih pacijenata koji ispunjavaju uslove za trombolitičku/fibrinolitičku terapiju: 1 tbl. jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DUOPLAVIN - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

- Rp film tableta [100 mg/1 tableta+ 75 mg/1 tableta] 28 film tableta (4 Al/Al blistera po 7 tableta), u kutiji

B01AD Enzimi

B01AD02 alteplaza

Doziranje: *akutni infarkt miokarda:* 90 minutni dozni režim (unutar prvih 6 sati): 15 mg u i.v. bolusu, zatim 50 mg tokom prvih 30 min, zatim 35 mg tokom 60 min, do maks. doze od 100 mg (tokom 90 min.); kod pacijenata sa tjelesnom težinom ispod 65 kg ukupnu dozu prilagoditi težini: 15 mg u i.v. bolusu, zatim u i.v. infuziji 0,75 mg/kg tjelesne težine u trajanju 30 min. (maks. 50 mg), zatim 0,5 mg/kg tokom 60 min. (maks. ukupna doza 100 mg tokom 90 min.); 3 satni dozni režim (unutar 6-12 sati nakon početka simptoma): 10 mg u i.v. bolusu, zatim 50 mg u i.v. infuziji tokom prvog sata, zatim i.v. infuzijom 10 mg u trajanju 30 minuta, do maksimalne doze od 100 mg u trajanju od 3 sata; kod pacijenata sa tjelesnom težinom ispod 65 kg ukupna doza ne bi trebala biti veća od 1,5 mg/kg (maks. doza: 100 mg tokom 3 sata); *plućna embolija:* 10 mg u i.v. bolusu u trajanju od 1-2 min, zatim 90 mg u i.v. infuziji u trajanju 2 sata; kod pacijenata sa tjelesnom težinom ispod 65 kg ukupna doza ne treba prelaziti 1,5 mg/kg; *akutni ishemijski moždani udar* (tretman mora biti započet unutar 4,5 sati od nastupanja simptoma): 0,9 mg/kg (maksimalno 90 mg) i.v. infuzijom u trajanju 60 min. pri čemu treba 10% ukupne doze inicijalno primjeniti u i.v. bolusu

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ACTILYSE - BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO.KG

- ZU prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju [50 mg/1 bočica] 1 bočica praška, 1 bočica otapala i 1 transferna kanila, u kutiji

B01AD11 tenekteplaza

Doziranje: akutni infarkt miokarda: i.v. inj. sa terapijom treba početi što prije nakon nastupa simptoma i ne kasnije od 4,5 sata od posljednjeg poznatog trenutka kada je osoba još bila dobro, a nakon što se isključi postojanje intrakranijalnog krvarenja; za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:**METALYSE - BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO.KG**

ZU prašak za otopinu za injekciju [5000 jedinica/1 bočica] 1 prozirna staklena bočica od 10 mL sa 25 mg praška za otopinu za injekciju, u kutiji

B01AE *Direktni inhibitori trombina***B01AE07 dabigatran eteksilat**

Doziranje: primarna prevencija venskih tromboembolijskih događaja (VTE) kod odraslih bolesnika koji su podvrgnuti hirurškom zahvatu ugradnje endoproteze kuka ili koljena: prevencija VTE-a nakon hirurškog zahvata ugradnje endoproteze koljena, odrasli, 110 mg (stariji preko 75 god, 75 mg) 1-4 sata nakon hirurškog zahvata, zatim 220 mg (stariji preko 75 god, 150 mg) jedanput dnevno tokom 10 dana; prevencija VTE-a nakon hirurškog zahvata ugradnje endoproteze kuka: odrasli, 110 mg (stariji preko 75 god, 75 mg) 1-4 sata nakon hirurškog zahvata, zatim 220 mg (stariji preko 75 god, 150 mg) jedanput dnevno tokom 28-35 dana; bolesnici s umjerenim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina, CrCL 30-50 ml/min), bolesnici koji istovremeno primaju verapamil - početak liječenja na dan hirurškog zahvata 1-4 sata nakon završetka hirurškog zahvata 75 mg, doza održavanja počevši od prvog dana nakon hirurškog zahvata 150 mg (10 dana hirurški zahvat ugradnje endoproteze koljena) ili 28-35 dana hirurški zahvat ugradnje endoproteze kuka); liječenje duboke venske tromboze i plućne embolije i prevencija rekurentne duboke venske tromboze i plućne embolije: odrasli, 150 mg (stariji preko 80 godina ili pacijenti na istovremenoj terapiji verapamilom, 110 mg) 2 puta dnevno, nakon liječenja parenteralnim antikoagulansom u minimalnom trajanju od 5 dana (niže doze od 110 mg dva puta dnevno mogu biti razmotrene za pacijente starosti 75-80 god. ili kod pacijenata sa umjerenim bubrežnim oštećenjem ili kod pacijenata sa povećanim rizikom od krvarenja; prevencija moždanog udara i sistemske embolije kod odraslih osoba sa nevalvularnom atrijskom fibrilacijom sa jednim ili više rizičnih faktora: 150 mg (pacijenti stariji od 80 god. ili pacijenti koji istovremeno uzimaju verapamil, 110 mg) 2 puta dnevno (niže doze od 110 mg dva puta dnevno mogu biti razmotrene za pacijente starosti 75-80 god, ili za pacijente sa umjerenim bubrežnim oštećenjem, ili kod pacijenata sa povećanim rizikom od krvarenja)

REGISTROVANI LIJEKOVI:**DABIGATRAN MYLAN - MYLAN GERMANY GMBH**

Rp kapsula, tvrda [110 mg/1 kapsula] 60 kapsula, tvrdih (6 Al- blistera laminirana desikantom po 10 kapsula, tvrdih), u kutiji
Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 60 kapsula, tvrdih (6 Al- blistera laminirana desikantom po 10 kapsula, tvrdih), u kutiji
Rp kapsula, tvrda [75 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 Al blistera laminirana desikantom po 10 kapsula), u kutiji

GALIKEKS - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp kapsula, tvrda [110 mg/1 kapsula] 60 kapsula, tvrdih (6 Alu-Alu blistera sa 10 kapsula), u kutiji
Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 60 kapsula, tvrdih (6 Alu-Alu blistera sa 10 kapsula), u kutiji

Rp	kapsula, tvrda [75 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 Alu-Alu blistera sa 10 kapsula), u kutiji

B01AF Direktni inhibitori faktora Xa

B01AF01 rivaroksaban

Doziranje: *prevencija venske tromboembolije kod odraslih koji se podvrgavaju ugradnji vještačkog koljena:* oralno, odrasli 10 mg jednom dnevno tokom 2 nedjelje, a početi 6-10 sati poslije hirurške intervencije; *prevencija venske tromboembolije kod odraslih koji se podvrgavaju ugradnji vještačkog kuka:* oralno, odrasli 10 mg jednom dnevno tokom 5 nedjelja, a početi 6-10 sati poslije hirurške intervencije; *liječenje duboke venske tromboze, liječenje plućne embolije:* oralno, odrasli početna doza 15 mg dva puta dnevno tokom 21 dana, a zatim doza održavanja 20 mg jednom dnevno sa hranom; *profilaksa rekurentne duboke venske tromboze, profilaksa rekurentne plućne embolije:* oralno, odrasli početna doza 10 mg jednom dnevno tokom najmanje 6 mjeseci antikoagulantne terapije, uzima se sa hranom, razmotriti dozu od 20 mg jednom dnevno kod osoba sa visokim rizikom od ponovnih tromboembolijskih događaja; *profilaksa inzulta i sistemske embolije kod pacijenata sa ne-valvularnom atrijskom fibrilacijom (sa jednim ili više rizika faktora kao što su kongestivno zatajenje srca, hipertenzija, starost preko 75 god, dijabetes melitus, raniji inzult ili prolazni ishemijski atak):* oralno, odrasli 20 mg jednom dnevno sa hranom; *profilaksa aterotrombotskih događaja nakon akutnog koronarnog sindroma kod pacijenata sa povećanim srčanim biomarkerima (u kombinaciji sa aspirinom ili aspirinom i klopogrelom):* oralno, odrasli 2,5 mg dva puta dnevno tokom 12 mjeseci; *profilaksa aterotrombotskih događaja kod pacijenata sa koronarnom arterijskom bolešću ili simptomatskom perifernom arterijskom bolešću sa visokim rizikom od ishemijskih događaja (u kombinaciji sa aspirinom):* oralno, odrasli 2,5 mg dva puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ELMASTAN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 blister od PVC/PVDC/aluminijske folije sa po 10 film tableta), u kutiji
Rp	film tableta [15 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 blistera od PVC/PVDC/aluminijske folije sa po 10 film tableta), u kutiji
Rp	film tableta [2,5 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 blistera od PVC/PVDC/aluminijske folije sa po 10 film tableta), u kutiji
Rp	film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 blistera od PVC/PVDC/aluminijske folije sa po 10 film tableta), u kutiji

RIBAXAN - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp	filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 Al/PVC blister sa 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [15 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC blistera sa po 14 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 Al/PVC blistera sa po 14 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC blistera sa po 14 tableta), u kutiji

RIVAROKSABAN HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PVdC-Aluminijumski blister sa 10 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [15 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 PVC/PVdC-Aluminijumska blistera sa 15 tableta), u kutiji

- Rp film tableta [2,5 mg/1 tableta] 60 film tableta (4 PVC/PVdC-aluminijumska blistera sa 15 tableta), u kutiji;
 Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC-Aluminijumska blistera sa 10 tableta), u kutiji

RIVAROX - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PVDC-Alu blister sa 10 tableta) u kutiji
 Rp film tableta [15 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVDC-Alu blistera sa 14 tableta) u kutiji
 Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVDC-Alu blistera sa 14 tableta) u kutiji

RIVAROXABAN ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 film obloženih tableta (2 PVC-Alu blistera po 14 tableta), u kutiji

RIVAROXABAN ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 10 film obloženih tableta (1 PVC-Alu blister po 10 tableta), u kutiji
 Rp filmom obložena tableta [15 mg/1 tableta] 28 film obloženih tableta (2 PVC-Alu blistera po 14 tableta), u kutiji
 Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 28 film obloženih tableta (2 PVC-Alu blister po 14 tableta), u kutiji

RIVER - BOSNALIJEK D.D.

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PVDC/AI blister sa 10 tableta), u kutiji
 Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/AI blistera sa 10 tableta), u kutiji
 Rp film tableta [15 mg/1 mtableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/AI blistera sa po 10 tableta), u kutiji
 Rp film tableta [2,5 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PVDC/AI blistera sa 10 film tableta), u kutiji
 Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/AI blistera sa po 10 tableta), u kutiji

RIVOKSAR - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PE/PVDC/AI blister sa 10 tableta), u kutiji
 Rp film tableta [15 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PE/PVDC/AI blistera sa po 14 tableta), u kutiji
 Rp film tableta [2,5 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PE/PVDC/AI blistera sa po 14 tableta), u kutiji
 Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PE/PVDC/AI blistera sa po 14 tableta), u kutiji

RUFIXALO - ALKALOID AD SKOPJE

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 Al-PVC/PE/PVdC blister po 10 tableta), u kutiji
 Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al-PVC/PE/PVdC blistera po 10 film tableta), u kutiji
 Rp film tableta [15 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Al-PVC/PE/PVdC blistera po 14 film tableta), u kutiji
 Rp film tableta [15 mg/1 tableta] 42 film tableta (3 AL-PVC / PE / PVdC blistera po 14 film tableta), u kutiji
 Rp film tableta [2,5 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 Al-PVC/PE/PVdC blistera po 14 film tableta), u kutiji

Rp	film tableta [20 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Al-PVC/PE/PVdC blistera po 14 film tableta), u kutiji
RUNAPLAX - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.	
Rp	filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 neprovidna PVC/PVDC/ALU blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/ALU/PVC/ALU blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 providna PVC/PVDC/ALU blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [15 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 neprovidna PVC/PVDC/ALU blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [15 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/ALU/PVC/ALU blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [15 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 providna PVC/PVDC/ALU blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 neprovidna PVC/PVDC/ALU blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/ALU/PVC/ALU blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 providna PVC/PVDC/ALU blistera po 10 tableta), u kutiji
VENOMIA - SANOVEL ILAČ SAN. VE TIC A.Š	
Rp	kapsula, tvrda [15 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 PVC/PVDC-Al blistera po 7 kapsula), u kutiji
Rp	kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 PVC/PVDC-Al blistera po 7 kapsula), u kutiji
VIXARGIO - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH	
Rp	filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC-Al blister po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [15 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC-Al blistera po 14 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PVDC-Al blistera sa 14 tableta), u kutiji.
Rp	filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC-Al blistera po 14 tableta), u kutiji
XANIRVA - S.C.ZENTIVA S.A.	
Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 Alu/PVC blistera po 15 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [15 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Alu/PVC blistera po 14 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [2,5 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Al/PVC blistera po 14 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [20 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Alu/PVC blistera po 14 tableta), u kutiji
XARELTO - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT	
Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PP/Al blister), u kutiji
Rp	film tableta [15 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PP/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [20 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PP/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
XERDOXO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO	

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC/PVC prozirna folija//Al folija blister sa 14 tableta, kalendarska pakiranja), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/PVC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [15 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/PVC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/PVC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/PVC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

B01AF02 apiksaban

Doziranje: prevencija venskih tromboembolijskih događaja kod odraslih bolesnika podvrgnutim elektivnom hirurškom zahvatu ugradnje endoproteze kuka: oralno, odrasli, 2,5 mg 2 puta dnevno, preporučeno trajanje liječenja od 32 do 38 dana, a započeto od 12 do 24 h nakon hirurškog zahvata; prevencija venskih tromboembolijskih događaja kod odraslih bolesnika podvrgnutim elektivnom hirurškom zahvatu ugradnje endoproteze koljena: oralno, odrasli 2,5 mg 2 puta dnevno, preporučeno trajanje liječenja 10-14 dana, započeto od 12 do 24h nakon hirurškog zahvata; liječenje duboke venske tromboze i plućne embolije: oralno, odrasli, početna doza 10 mg 2 puta dnevno tokom 7 dana, a u nastavku liječenja smanjiti dozu na 5 mg 2 puta dnevno; prevencija ponavljajuće duboke venske tromboze i plućne embolije: 2,5 mg 2 puta dnevno (nakon završenog šestomjesečnog liječenja antikoagulantnim tretmanom); prevencija moždanog udara i sistemske embolije kod bolesnika sa nevalvularnom fibrilacijom atrijske i najmanje jednim faktorom rizika (kao što su prethodni moždani udar ili tranzitorni ishemijski atak, simptomatska srčana insuficijencija, dijabetes melitus, hipertenzija ili starost preko 75 god.): oralno, odrasli 5 mg 2 puta dnevno, smanjiti dozu na 2,5 mg dva puta dnevno kod pacijenata koji imaju barem dvije od sljedećih karakteristika: starosna dob 80 god. i više, tjelesna težina manja od 61 kg ili vrijednost kreatinina u serumu veća od 133 mikromola/litru

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ABATIXENT - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.**

- Rp filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 Al-PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 Al-PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

ABOXOMA - KRKA, TOVARNA ZDRAVLJ, D.D., NOVO MESTO

- Rp filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC/PVC prozirna folija/Al folija blister sa 20 tableta) u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/PVC prozirna folija/Al folija blistera sa 20 tableta) u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/PVC prozirna folija/Al folija blistera sa 20 tableta) u kutiji

APEXYR - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- Rp film tableta [2,5 mg/1 tableta] 10 film tableta (1Al/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [2,5 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji
APIKSABAN ZADA - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.	
Rp	film tableta [2,5 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Alu/Alu blistera sa 10 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Alu/Alu blistera sa 10 tableta), u kutiji
APIXA - BOSNALIJEK D.D.	
Rp	film tableta [2,5 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PVDC film/Al blistera po 10 tableta) , u kutiji
Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PVDC film / Al blistera sa 10 tableta) , u kutiji
AXEBAN - MSN LABS EUROPE LIMITED	
Rp	film tableta [2,5 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PVdC Alu blistera po 10 tableta) u kutiji
Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PVdC Alu blistera po 10 tableta) u kutiji
BANXIOL - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH	
Rp	film tableta [2,5 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al-PVC/PVdC blistera po 10 film tableta), u kutiji
Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al-PVC/PVdC blistera po 10 film tableta), u kutiji
ELIQUIS - PFIZER INC.	
Rp	filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (1 Al-PVC/PVdC blister sa 20 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 Al-PVC/PVdC blistera sa po 10 filmom obloženih tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 Al-PVC/PVdC blistera sa po 10 filmom obloženih tableta), u kutiji
ELYES - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO	
Rp	filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 Al/PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 Al/PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji
PAXIBAN - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	
Rp	filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 providna PVC/PE/PVDC-Al blistera po 10 tableta) u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (8 providnih PVC/PE/PVDC-Al blistera po 7 tableta) u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 56 filmom obložena tableta (4 providna PVC/PE/PVDC-Al blistera po 14 tableta) u kutiji
TROMBOMELT - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA	
Rp	film tableta [2,5 mg/1 tableta] 60 film tableta (3 PVC-PE-PVDC/Al blistera po 20 tableta) u kutiji
Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 60 film tableta (3 PVC-PE-PVDC/Al blistera po 20 tableta) u kutiji

B01AF03 edoksaban

Doziranje: prevencija moždanog udara i sistemske embolije kod odraslih pacijenata sa nevalvularnom fibrilacijom atrijsa sa jednim ili više faktore rizika kao što su kongestivna srčana insuficijencija, hipertenzija, starost preko 75 god, šećerna bolest, pretrpljeni

moždani udar ili tranzitorni ishemijski napad: oralno, odrasli (do 60 kg tjelesne mase) 30 mg jednom dnevno; odrasli preko 60 kg tjelesne mase, 60 mg jednom dnevno; terapija duboke venske tromboze; prevencija ponavljajuće duboke venske tromboze; terapija plućne embolije; profilaksa ponavljajuće plućne embolije: oralno, odrasli (do 60 kg tjelesne mase) 30 mg jednom dnevno, trajanje terapije podesiti prema riziko faktorima-konsultovati literaturu proizvoda, terapija treba biti nastavak početne parenteralne antikoagulantne terapije tokom najmanje 5 dana; odrasli preko 60 kg tjelesne mase, 60 mg jednom dnevno, trajanje terapije podesiti prema riziko faktorima-konsultovati literaturu proizvoda, terapija treba biti nastavak početne parenteralne antikoagulantne terapije tokom najmanje 5 dana;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EKSABAN - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

- Rp filmom obložena tableta [15 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PE/PVDC - Al blister sa 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [30 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PE/PVDC - Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [60 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PE/PVDC - Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

OXAWAY - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- Rp film tableta [15 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/Al blister djeljiv na pojedinačne doze, sa 10 tableta), u kutiji.
- Rp film tableta [15 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [15 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PVDC/Al blister djeljiv na pojedinačne doze, sa 10 tableta), u kutiji.
- Rp film tableta [15 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [30 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/Al blistera sa 14 tableta), u kutiji.
- Rp film tableta [30 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa 14 tableta), u kutiji.
- Rp film tableta [30 mg/1 tableta] 98 film tableta (7 PVC/Al blistera sa 14 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [30 mg/1 tableta] 98 film tableta (7 PVC/PVDC/Al blistera sa 14 tableta), u kutiji.
- Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/Al blistera sa 14 tableta), u kutiji.
- Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa 14 tableta), u kutiji.
- Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 98 film tableta (7 PVC/Al blistera sa 14 tableta), u kutiji.
- Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 98 film tableta (7 PVC/PVDC/Al blistera sa 14 tableta), u kutiji.

ROTEAS - BERLIN-CHEMIE AG

- Rp film tableta [15 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [30 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

B01AX Ostali antitrombotici

B01AX05 fondaparinuks

Doziranje: prevencija venske tromboembolije (VT) poslije ortopedskih ili abdominalnih operacija: s.c. 2,5 mg 6 sati po završetku operacije, potom 2,5 mg jednom dnevno; nestabilna angina pectoris i infarkt miokarda bez elevacije ST-segmenta: s.c. 2,5 mg jednom na dan, najduže 8 dana ili do otpusta iz bolnice; infarkt miokarda s elevacijom ST-segmenta: i.v. inj. ili inf. 2,5 mg prvi dan, zatim s.c. 2,5 mg do 8 dana (ili do otpusta iz bolnice); akutna duboka venska tromboza (DVT) i plućna embolija (PE): s.c. odrasli tjelesne mase ispod 50 kg, 5 mg svakih 24 sata; tjelesne mase 50-100 kg, 7,5 mg svakih 24 sata; tjelesne mase preko 100 kg, 10 mg svakih 24 sata; terapija površinske venske tromboze: s.c. odrasli tjelesne mase preko 50 kg, 2,5 mg jednom dnevno, tokom najmanje 30 dana (maks. 45 dana u slučaju visokog rizika od tromboembolijskih komplikacija); liječenje treba trajati najmanje 5 dana sve dok se ne uspostavi adekvatna terapija oralnim antikoagulansima; ne preporučuje se primjena kod djece ispod 17 god.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ARIXTRA - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [10 mg/0.8 mL] 10 napunjenih šprica po 0,8 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [2,5 mg/0.5 mL] 10 napunjenih šprica po 0,5 mL rastvora, u kutiji
ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [7,5 mg/0.6 mL] 10 napunjenih šprica po 0,6 ml rastvora za injekciju, u kutiji

B02 ANTIHEMORAGICI

B02A Antifibrinolitici

B02AA Amino kiseline

B02AA02 traneksaminska kiselina

Doziranje: prevencija i terapija hemoragija nastalih usljed generalizovane ili lokalne fibrinolize (menoragija i metroragija, gastrointestinalna krvarenja, hemoragijski urinarni poremećaji, naročito poslije operacije prostate ili hirurških zahvata na urinarnom traktu; hirurgija uha, grla, nosa (adenoidektomija, tonzilektomija, dentalne ekstrakcije); ginekološke hirurške intervencije ili poremećaji u porodiljstvu; torakalne i abdominalne hirurške intervencije i druge velike hirurške intervencije kao što je kardiovaskularna hirurgija; hemoragije nastale usljed primjene fibrinolitickih agenasa: standardna terapija lokalne fibrinolize, 0,5 g do 1 g putem spore i.v.inj. ili inf, dva do tri puta dnevno; standardna terapija generalizovane fibrinolize, 1 g putem spore i.v.inj. ili inf. na svakih 6 do 8 sati, što odgovara 15 mg/kg tjelesne težine

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TRANXSOL - SKYMAP PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED

ZU	rastvor za injekciju/ infuziju [100 mg/1 mL] 5 bezbojnih staklenih ampula od 5 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

TRENOLK - BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.

ZU	otopina za injekciju [100 mg/1 mL] 5 ampula sa po 5 ml otopine, u PVC blisteru, u kutiji

B02B Vitamin K i ostali hemostatici

B02BB Fibrinogen

B02BB01 fibrinogen humani

Doziranje: liječenja epizoda krvarenja i perioperativna profilaksa krvarenja kod pacijenata sa urođenom hipo- ili afibrinogenemijom uz sklonost krvarenju; tokom hirurške intervencije za zbrinjavanje nekontrolisanog teškog krvarenja kod pacijenata sa stečenom hipofibrinogenemijom: i.v. inf. ili inj. za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FIBRYGA - OCTAPharma AG

ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju [$\approx$ 1 g/1 bočica] 1 g humanog fibrinogena u bezbojnoj staklenoj bočici, 50 ml rastvarača (voda za injekcije) u bezbojnoj staklenoj bočici, Nextaro v 20/32 set za prijenos sa integrisanim filterom

B02BD Faktori koagulacije krvi

B02BD01 faktor koagulacije II, humani, faktor koagulacije IX, faktor koagulacije VII, humani, faktor koagulacije X, humani, protein c, protein s

Doziranje: liječenje krvarenja i perioperativna profilaksa krvarenja kod stečenog nedostatka koagulacijskih faktora protrombinskog kompleksa, kao što je nedostatak uzrokovan liječenjem antagonistima vitamina K ili u slučaju predoziranja antagonistima vitamina K, kada je potrebna brza korekcija nedostatka; liječenje krvarenja i perioperativna profilaksa kod nasljednog nedostatka koagulacijskih faktora II i X ovisnih o vitaminu K, kada pročišćeni lijek sa specifičnim koagulacijskim faktorima nije raspoloživ: liječenje treba započeti pod nadzorom ljekara, doziranje individualno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OCTAPLEX 500 IU - OCTAPharma AG

ZU prašak i rastvarač za rastvor za infuziju [14 i.j./1 mL - 38 i.j./1 mL + < 25 i.j./1 mL + 9 i.j./1 mL - 24 i.j./1 mL + 18 i.j./1 mL - 30 i.j./1 mL + 13 i.j./1 mL - 31 i.j./1 mL + 12 i.j./1 mL - 32 i.j./1 mL] 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa rastvaračem, 1 set za prijenos Nextaro, u kutiji

B02BD02 efmoroktokog alfa

Doziranje: liječenje i profilaksa krvarenja kod pacijenata s hemofilijom A (urođeni nedostatak faktora VIII): i.v. individualno, konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ELOCTA - SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)

ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [1000 i.j./1 bočica] 1 komplet (prašak u bočici od stakla tip I, 3 ml rastvarača u napunjenoj šprici, klip, nastavak za bočicu, set za infuziju, 2 alkoholom natopljene vatičice, dva flastera, 1 kompres od gaze)

ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [1500 i.j./1 bočica] 1 komplet (prašak u bočici od stakla tip I, 3 ml rastvarača u napunjenoj šprici, klip, nastavak za bočicu, set za infuziju, 2 alkoholom natopljene vatičice, dva flastera, 1 kompres od gaze)

ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [2000 i.j./1 bočica] 1 komplet (prašak u bočici od stakla tip I, 3 ml rastvarača u napunjenoj

	šprici, klip, nastavak za bočicu, set za infuziju, 2 alkoholom natopljene vaticke, dva flastera, 1 kompres od gaze)
ZU/Rp	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [3000 i.j./1 bočica] 1 komplet (prašak u bočici od stakla tip I, 3 ml rastvarača u napunjenoj šprici, klip, nastavak za bočicu, set za infuziju, 2 alkoholom natopljene vaticke, dva flastera, 1 kompres od gaze)
ZU/Rp	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [500 i.j./1 bočica] 1 komplet (prašak u bočici od stakla tipa I, 3 ml rastvarača u napunjenoj šprici, klip, nastavak za bočicu, komplet za infuziju, 2 alkoholom natopljene vaticke, dva flastera, 1 kompres od gaze)

B02BD02 damoktokog alfa pegol

Doziranje: liječenje i profilaksa krvarenja u prethodno liječenih bolesnika u dobi od 12 i više godina s hemofilijom A (nasljedni nedostatak faktora VIII): i.v. za doziranje konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:

JIVI 1000 IU - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

ZU	prašak i otapalo za otopinu za injekciju [1000 i.j./2.5 mL] 1 bočica s praškom, 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml vode za injekcije, 1 nastavak za bočicu i 1 pribor za venepunkciju; u kutiji

JIVI 2000 IU - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

ZU	prašak i otapalo za otopinu za injekciju [2000 i.j./2.5 mL] 1 bočica s praškom, 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml vode za injekcije, 1 nastavak za bočicu i 1 pribor za venepunkciju; u kutiji

JIVI 3000 IU - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

ZU	prašak i otapalo za otopinu za injekciju [3000 i.j./2.5 mL] 1 bočica s praškom, 1 napunjena štrcaljka s 2,5 ml vode za injekcije, 1 nastavak za bočicu i 1 pribor za venepunkciju; u kutiji

B02BD02 turoktokog alfa

Doziranje: profilaksa i terapija krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A (urođeni nedostatak faktora VIII): i.v. doziranje i trajanje nadomjesne terapije zavisi od težine nedostatka faktora VIII, mjesta i obima krvarenja i određuje se individualno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ESPEROCT - NOVO NORDISK A/S

ZU/Rp	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [1000 i.j./1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom, 1 sterilni nastavak za bočicu za rekonstituciju, 1 napunjena šprica s 4 ml rastvarača, 1 potisnik klipa, u kutiji.

NOVOEIGHT - NOVO NORDISK A/S

ZU/Rp	prašak i otapalo za otopinu za injekciju [1000 i.j./1 bočica] 1 bočica sa praškom, 4 ml otapala u napunjenoj šprici, 1 potisni klip i nastavak za bočicu
ZU/Rp	prašak i otapalo za otopinu za injekciju [1500 i.j./1 bočica] 1 bočica sa praškom, 4 ml otapala u napunjenoj šprici, 1 potisni klip i nastavak za bočicu
ZU/Rp	prašak i otapalo za otopinu za injekciju [500 i.j./1 bočica] 1 bočica sa praškom, 4 ml otapala u napunjenoj šprici, 1 potisni klip i nastavak za bočicu

B02BD02 simoktokog alfa

Doziranje: liječenje i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A (nasljedni nedostatak faktora VIII): individualno, prema literaturi proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:**NUWIQ - OCTAPharma AG**

- ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [1000 i.j./1 bočica] 1 bočica sa praškom i 1 napunjena šprica sa rastvaračem (2,5 ml vode za injekciju), 1 sterilni nastavak za bočicu (za rekonstituciju), 1 infuzioni set i 2 alkoholna tufera; u kutiji
- ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [2000 i.j./1 bočica] 1 bočica sa praškom, 1 napunjena šprica sa rastvaračem (2,5 ml vode za injekciju), 1 sterilni nastavak za bočicu (za rekonstituciju), 1 infuzioni set i 2 alkoholna tufera; u kutiji
- ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [250 i.j./1 bočica] 1 bočica sa praškom i 1 napunjena šprica sa rastvaračem (2,5 ml vode za injekciju), 1 sterilni nastavak za bočicu (za rekonstituciju), 1 infuzioni set i 2 alkoholna tufera; u kutiji
- ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [500 i.j./1 bočica] 1 bočica sa praškom i 1 napunjena šprica sa rastvaračem (2,5 ml vode za injekciju), 1 sterilni nastavak za bočicu (za rekonstituciju), 1 infuzioni set i 2 alkoholna tufera; u kutiji

B02BD02 moroktokog alfa

Doziranje: profilaksa i liječenje krvarenja u hemofiliji A (urođeni nedostatak faktora VIII): doza i trajanje terapije određuje se individualno (konsultovati literaturu proizvođača)

REGISTROVANI LIJEKOVI:**REFACTO AF - PFIZER INC.**

- ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [1000 i.j./1 bočica] 1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju, 1 šprica sa rastvaračem, sistem za otapanje sa sterilnim nastavkom za bočicu, sterilni kompet, vata, flaster i kompres od gaze, u kutiji
- ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [250 i.j./1 bočica] 1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju, 1 šprica sa rastvaračem, sistem za otapanje sa sterilnim nastavkom za bočicu, sterilni kompet, vata, flaster i kompres od gaze, u kutiji
- ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [500 i.j./1 bočica] 1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju, 1 šprica sa rastvaračem, sistem za otapanje sa sterilnim nastavkom za bočicu, sterilni kompet, vata, flaster i kompres od gaze, u kutiji

B02BD02 faktor koagulacije VIII, humani

Doziranje: liječenje i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A (kongenitalni deficit faktora VIII), stečeni deficit faktora VIII, hemofilijari sa antitijelima protiv faktora VIII (profilaksa i terapija krvarenja); liječenje i profilaksa krvarenja tokom operacija kod pacijenata sa von Willebrandovom bolešću kada je samo liječenje dezmodpresinom neefikasno ili kontraindikovano: doziranje individualno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**EMOCLOT - KEDRION S.P.A.**

- ZU prašak i rastvarač za rastvor za infuziju [1000 i.j./1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju) i set za pripremu i primjenu (medicinsko sredstvo za rekonstituciju, šprica za injekciju i leptir igla sa PVC cjevčicom), u kutiji
- ZU prašak i rastvarač za rastvor za infuziju [500 i.j./1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa 10 ml rastvarača (voda za

injekciju) i set za pripremu i primjenu (medicinsko sredstvo za rekonstituciju, šprica za injekciju i leptir igla sa PVC cjevčicom), u kutiji

OCTANATE - OCTAPHARMA AG

- ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [1000 i.j./10 mL] 1 bočica sa praškom, 1 bočica sa 10 ml rastvarača (voda za injekcije) i paket s priborom (jednokratna šprica, set za transfer Nextaro, igla za injekciju i dva tupfera natopljena alkoholom), u kutiji
- ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [500 i.j./10 mL] 1 bočica sa praškom, 1 bočica sa 10 ml rastvarača (voda za injekcije) i paket s priborom (jednokratna šprica, set za transfer Nextaro, igla za injekciju i dva tupfera natopljena alkoholom), u kutiji

OCTANATE LV - OCTAPHARMA AG

- ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [100 i.j./1 mL] Dvije kartonske kutije spojene prozirnom trakom u jedno pakovanje: kutija - 1 bočica sa praškom (500 i.j.); kutija - 1 bočica sa 5 ml rastvarača (voda za injekciju), 1 šprica za jednokratnu upotrebu, 1 set za prenos, 1 infuzioni set, 2 tupfera natopljena alkoholom
- ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [200 i.j./1 mL] Dvije kartonske kutije spojene prozirnom trakom u jedno pakovanje: kutija - 1 bočica sa praškom (1000 i.j.); kutija - 1 bočica sa 5 ml rastvarača (voda za injekciju), 1 šprica za jednokratnu upotrebu, 1 set za prenos, 1 set za infuziju, 2 tupfera natopljena alkoholom

B02BD04 eftrenonakog alfa

Doziranje: liječenje i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom B (urođeni nedostatak faktora IX): i.v. doziranje individualno, konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALPROLIX - SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)

- ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [1000 i.j./1 bočica] 1 komplet (1 bočica sa praškom, 5 ml rastvarača u napunjenoj šprici, klip, 1 nastavak za bočicu, 1 komplet za infuziju, 2 alkoholom natopljene vaticе, 2 flastera, 1 kompres od gaze)
- ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [2000 i.j./1 bočica] 1 komplet (1 bočica sa praškom, 5 ml rastvarača u napunjenoj šprici, klip, 1 nastavak za bočicu, 1 komplet za infuziju, 2 alkoholom natopljene vaticе, 2 flastera, 1 kompres od gaze)
- ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [3000 i.j./1 bočica] 1 komplet (1 bočica sa praškom, 5 ml rastvarača u napunjenoj šprici, klip, 1 nastavak za bočicu, 1 komplet za infuziju, 2 alkoholom natopljene vaticе, 2 flastera, 1 kompres od gaze)

B02BD04 nonakog beta pegol

Doziranje: liječenje i profilaksa krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B (urođeni nedostatak faktora IX) u dobi od 12 i više godina: i.v. profilaksa 40 i.j./kg jednom sedmično, za liječenje po potrebi konsultovati literaturu proizvođa

REGISTROVANI LIJEKOVI:

REFIXIA - NOVO NORDISK A/S

- ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [1000 i.j./1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za injekciju i 1 napunjena šprica s 4 ml rastvarača (rastvor histidina), 1 potisni klip i 1 nastavak za bočicu; u kutiji

B02BD04 nonakog alfa

Doziranje: liječenje i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom B (urođeni nedostatak faktora IX): doza i trajanje terapije se određuje individualno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**BENEFIX - PFIZER INC.**

ZU/Rp prašak i otapalo za otopinu za injekciju [1000 i.j./1 bočica] 1 bočica (staklo tip I) sa praškom, 1 napunjena šprica (staklo tip I) sa otapalom, sterilni set, vata, flaster i gaza, u kutiji

BENEFIX - PFIZER INC.

ZU/Rp prašak i otapalo za otopinu za injekciju [2000 i.j./1 bočica] 1 bočica (staklo tip I) od 10 mL sa praškom za otopinu za injekciju i 1 napunjena šprica (staklo tip I) sa otapalom, sterilni set, vata, flaster i gaza, u kutiji

ZU/Rp prašak i otapalo za otopinu za injekciju [250 i.j./1 bočica] 1 bočica (staklo tip I) sa praškom, 1 napunjena šprica (staklo tip I) sa otapalom, sterilni set, vata, flaster i gaza, u kutiji

ZU/Rp prašak i otapalo za otopinu za injekciju [500 i.j./1 bočica] 1 bočica (staklo tip I) sa praškom, 1 napunjena šprica (staklo tip I) sa otapalom, sterilni set, vata, flaster i gaza, u kutiji

B02BD04 faktor koagulacije IX

Doziranje: profilaksa i liječenje krvarenja u hemofiliji B, urođeni deficit faktora IX: doza i trajanje terapije određuje se individualno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**AIMAFIX - KEDRION S.P.A.**

ZU prašak i rastvarač za rastvor za infuziju [1000 i.j./1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju) i set za pripremu i primjenu, u kutiji

ZU prašak i rastvarač za rastvor za infuziju [500 i.j./1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju) i set za pripremu i primjenu, u kutiji

OCTANINE F - OCTAPHARMA AG

ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [1000 i.j./10 mL] 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju) i set za pripremu i primjenu, u kutiji (kutije povezane trakom)

ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [500 i.j./5 mL] 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa 5 ml rastvarača (voda za injekciju) i set za pripremu i primjenu, u kutiji (kutije povezane trakom)

B02BD06 faktor koagulacije VIII, humani

Doziranje: liječenje i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A (kongenitalni deficit faktora VIII), stečeni deficit faktora VIII (profilaksa i terapija krvarenja); liječenje i profilaksa krvarenja tokom operacija kod pacijenata sa von Willebrandovom bolešću kada je samo liječenje dezmopresinom neefikasno ili kontraindikovano: doziranje individualno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**FANHDI 100 I.J. FVIII/120 I.J. VWF PO ML - INSTITUTO GRIFOLS S.A.**

ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [1000 i.j./10 mL] 1 bočica praška (liofilizat) +1 unaprijed napunjena šprica sa 10 ml rastvarača (voda za injekcije) + pribor (adapter za bočicu, filter, 2 tufera natopljena alkoholom i leptir igle) u kutiji

FANHDI 25 I.J. FVIII/30 I.J. VWF - INSTITUTO GRIFOLS S.A.

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

ZU	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [250 i.j./10 mL] 1 bočica praška (liofilizat) +1 unaprijed napunjena šprica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju) + pribor (adapter za bočicu, filter, 2 tufera natopljena alkoholom i leptir igla), u kutiji
FANHDI 50 I.J. FVIII/60 I.J. VWF - INSTITUTO GRIFOLS S.A.	
ZU	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [500 i.j./10 mL] 1 bočica praška (liofilizat) +1 unaprijed napunjena šprica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju) + pribor (adapter za bočicu, filter, 2 tufera natopljena alkoholom i leptir igle) u kutiji

B02BD06 faktor koagulacije VIII, humani, von Willebrand-ov faktor

Doziranje: terapija i profilaksa krvarenja kod urođenog nedostatka faktora VIII (hemofilija A) stečenog nedostatak faktora VIII, von Willebrand-ove bolesti: trajanje terapije zavisi od vrste i jačine krvarenja; primjenjuje se kao i.v. inj. ili kontinuirana infuzija; terapiju treba provoditi pod nadzorom ljekara iskusnog u liječenju poremećaja koagulacije.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IMMUNATE 1000 IU FVIII/750 IU VWF - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG	
ZU	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [1000 i.j./1 viala+ 750 i.j./1 viala] 1 bočica sa praškom, 1 bočica rastvarača (10 mL) i set za otapanje i injiciranje lijeka, u kutiji
IMMUNATE 500 IU FVIII/375 IU VWF - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG	
ZU	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [500 i.j./1 viala+ 375 i.j./1 viala] 1 bočica sa praškom, 1 bočica sa rastvaračem (5 mL) i set za otapanje i injiciranje lijeka, u kutiji
WILATE - OCTAPharma AG	
ZU/Rp	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [1000 i.j./1 viala+ 1000 i.j./1 viala] 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa rastvaračem, 1 šprica za jednokratnu upotrebu, 1 set za transfer (Nextaro), 1 set za infuziju, 2 alkoholna tupfera, u kutiji
ZU/Rp	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [500 i.j./1 viala+ 500 i.j./1 viala] 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa rastvaračem, 1 šprica za jednokratnu upotrebu, 1 set za transfer (Nextaro), 1 set za infuziju, 2 alkoholna tupfera, u kutiji

B02BD08 eptakog alfa

Doziranje: terapija i profilaksa hemoragije kod pacijenata sa hemofilijom A ili B sa inhibitorima na faktore koagulacije VIII ili IX, kongenitalna hemofilija kod koje se očekuje snažan anamnestički odgovor, stečena hemofilija, nedostatak faktora VII, Glanzmann-ova trombastenija: doza, interval i dužina terapije određuje se prema protokolu; primjenjuje se kao bolus i.v. injekcija u trajanju od 2-5 min; teško postporođajno krvarenje kada uterotonici nisu dovoljni da se postigne hemostaza: i.v.inj. 60-90 mcg/kg po jednoj dozi, maks. aktivnost koagulacije se može očekivati nakon 10 min, druga doza se može primijeniti nakon 30 min. u slučaju nedovoljnog hemostatskog odgovora

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NOVOSEVEN - NOVO NORDISK A/S

ZU/Rp	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [1 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom, 1 šprica sa rastvaračem i 1 adapter za bočicu; u kutiji
ZU/Rp	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [2 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom, 1 šprica sa rastvaračem i 1 adapter za bočicu; u kutiji

B02BX**Ostali sistemski hemostatici****B02BX01****etamsilat**

Doziranje: prevencija i liječenje prije, ili postoperativnog kapilarnog krvarenja u svim komplikovanijim operacijama ili operacijama u bogato prokrvljenom tkivu- E.N.T, ginekološke, akušerske, urološke, oralno hirurške, oftalmološke ili plastično-rekonstruktivne operacije; prevencija i liječenje kapilarnog krvarenja bilo kojeg porijekla ili lokalizacije (hematurija, hematemeza, melena, epistaksa, gingivoragija); metroragija, primarna, ili menoragija vezana za IUD u odsustvu organske patologije: tablete, odrasli i adolescenti, preoperativno, 250-500 mg jedan sat prije operacije; postoperativno, 250-500 mg svakih 4-6 sati dok postoji rizik od krvarenja; interna medicina: 1000-1500 mg dnevno podijeljeno u 2-3 doze; ginekologija, menometroragija: 500 mg 3 puta dnevno, liječenje traje 10 dana, a započinje 5 dana prije očekivanog početka menstruacije; otopina za injekciju: odrasli i adolescenti, pre operativno: i.m. ili i.v. 250-500 mg, jedan sat prije operacije; intra operativno: i.v. 250-500 mg, ponoviti dozu ako je neophodno; post operativno: 250-500 mg, ponoviti dozu svakih 4-6 sati dok god postoji rizik od krvarenja; hitna stanja i u zavisnosti od težine bolesti: i.m. ili i.v. 250-500 mg, ponoviti dozu svakih 4-6 sati sve dok ne nestane rizik od krvarenja; topikalna primjena: natopiti tupfer sadržajem jedne ampule i staviti na mjesto koje krvari ili u šupljinu nakon ekstrakcije zuba, po potrebi ponoviti; može se kombinovati primjena sa oralnim ili parenteralnim oblikom ovog lijeka; novorođenčad, i.m. 10 mg/kg tjelesne težine (0.1 ml = 12.5 mg) u prva dva sata po rođenju, zatim svakih 6 sati tokom naredna 4 dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**DICYNONE - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.**

Rp	tableta [250 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji
ZU	otopina za injekciju [250 mg/2 mL] kutija sa 10 ampula po 2 ml rastvora za injekciju

B02BX05**eltrombopag**

Doziranje: hronična imuna (idiopatska) trombocitopenična purpura kod pacijenata refraktornih na druge terapije (kao što su kortikosteroidi ili imunoglobulini): odrasli preko 18 god i djeca 6-17. god, inicijalno 50 mg 1 put dnevno, podešavati do postizanja broja trombocita od većeg ili jednakog 50000/μl-konsultovati literaturu proizvođača za podešavanje doze, prekinuti liječenje ukoliko je odgovor neadekvatan nakon 4 sedmice kod maks. doze; maks. 75 mg 1 puta dnevno; djeca 1-5 god. 25 mg jednom dnevno; trombocitopenija kod odraslih pacijenata sa hroničnom infekcijom virusom hepatitisa C kod kojih je trombocitopenija glavni faktor koji sprečava započinjanje ili ograničava mogućnost održavanja optimalnog liječenja interferonom: odrasli preko 18 god, inicijalno 25 mg 1 put dnevno, podešavati do postizanja broja trombocita od 50000-75000 /μl (održavanje broja trombocita iznad nivoa koji predstavlja rizik od nastupanja krvarenja), konsultovati literaturu proizvođača za podešavanje doze, prekinuti liječenje ukoliko je odgovor neadekvatan nakon 2 sedmice kod maks. doze; maks. 100 mg 1 puta dnevno; stečena teška aplastična anemija kod pacijenata koji su ili refraktorni na prethodnu imunosupresivnu terapiju ili jako pretretirani i neprikladni za transplantaciju hematopetskim matičnim ćelijama: odrasli preko 18 god, inicijalno 50 mg 1 put dnevno, podešavati do postizanja broja trombocita od većeg ili jednakog 50000/μl-konsultovati literaturu proizvođača za podešavanje doze, prekinuti liječenje ukoliko je odgovor neadekvatan nakon 16 sedmica terapije; maks. 150 mg 1 puta dnevno;

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ELMOPAG - GALENIKA A.D. BEOGRAD**

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

Rp	film tableta [25 mg/1 tableta]	28 film tableta (4 OPA/Alu/PVC/Alu blistera sa po 7 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [50 mg/1 tableta]	28 film tableta (4 OPA/Alu/PVC/Alu blistera sa po 7 tableta), u kutiji
ELTROMBOPAG MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED		
Rp	filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta]	28 filmom obloženih tableta (4 OPA/Al/PVC/Al blistera sa 7 tableta) u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta]	28 filmom obloženih tableta (4 OPA/Al/PVC/Al blistera sa 7 tableta) u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [75 mg/1 tableta]	28 filmom obloženih tableta (4 OPA/Al/PVC/Al blistera sa 7 tableta) u kutiji
ERGOTROMB - SYNTHON B.V.		
Rp	film tableta [25 mg/1 tableta]	28 film tableta (4 oPA/Alu/PVC/Alu blistera sa 7 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [50 mg/1 tableta]	28 film tableta (4 oPA/Alu/PVC/Alu blistera sa 7 tableta), u kutiji
GELTRO - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.		
Rp	film tableta [25 mg/1 tableta]	14 film tableta (1 Al/Al blister), u kutiji
Rp	film tableta [50 mg/1 tableta]	14 film tableta (1 Al/Al blister), u kutiji
Rp	film tableta [75 mg/1 tableta]	14 film tableta (1 Al/Al blister), u kutiji
REVOLADE - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG		
Rp	filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta]	28 filmom obloženih tableta (4 PA/Al/PVC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta]	28 filmom obloženih tableta (4 PA/Al/PVC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji

B02BX06 emicizumab

Doziranje: profilaksa hemoragije kod pacijenata sa hemofilijom A: s.c. 3 mg/kg jednom nedjeljno tokom 4 nedjelje, zatim doza održavanja 1,5 mg/kg jednom nedjeljno, alternativno doza održavanja 3 mg/kg svake 2 nedjelje, alternativno doza održavanja 6 mg/kg svake 4 nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HEMLIBRA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

ZU	otopina za injekciju [105 mg/0.7 mL]	1 bočica sa 0,7 ml otopine za injekciju, u kutiji
ZU	otopina za injekciju [150 mg/1 mL]	1 bočica sa 1 ml otopine za injekciju, u kutiji
ZU	otopina za injekciju [30 mg/1 mL]	1 bočica sa 1 ml otopine za injekciju, u kutiji
ZU	otopina za injekciju [60 mg/0.4 mL]	1 bočica sa 0,4 ml otopine za injekciju, u kutiji

B03	ANTIANEMICI (LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ANEMIJE)
B03A	Preparati gvožđa
B03AA	Divalentno gvožđe, oralni preparati

B03AA02 gvožđe (II)-fumarat

Doziranje: krvarenje različite etiologije, povećane potrebe za gvožđem (trudnoća, porođaj, laktacija, pubertet): odrasli, terapija, dva puta po jedna kapsula, prije jela; profilaksa, jedna kapsula dnevno; djeca starija od 12 god. (koja mogu da uzimaju kapsule) jedna kapsula dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**HEFEROL - ALKALOID AD SKOPJE**

Rp kapsula, tvrda [350 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

B03AB***Trovalentno gvožđe, oralni preparati*****B03AB05 gvožđe (III) hidroksid-polimaltozni kompleks**

Doziranje: *manifestni nedostatak gvožđa (liječenje anemije koja je posljedica manjka gvožđa):* djeca 1-12 god. 50-100 mg dnevno; djeca iznad 12 god. odrasli i dojilje, 100-300 mg dnevno; vrijednost hemoglobina se normalizuje nakon 3-5 mjeseci liječenja, za popunjavanje depoa gvožđa liječenje treba nastaviti još nekoliko nedjelja; trudnice, 200-300 mg dnevno, dok se vrijednost hemoglobina ne normalizuje, zatim liječenje nastaviti sa 100 mg dnevno, najmanje do kraja trudnoće, kako bi se popunili depoi gvožđa u organizmu; *latentni nedostatak gvožđa:* djeca 1-12 god. 25-50 mg dnevno; djeca starija od 12 god. odrasli i dojilje 100 mg dnevno 1-2 mjeseca; *sprečavanje pojave manjka gvožđa u trudnoći:* 100 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**FERRUM SANDOZ 100 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.**

Rp tableta za žvakanje [100 mg/1 tableta] 30 tableta za žvakanje (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

REFERUM - REPLEK AD SKOPJE

Rp sirup [100 mg/5 mL] 100 ml sirupa u staklenoj boci, u kutiji
Rp sirup [50 mg/5 mL] 100 ml sirupa u staklenoj boci, u kutiji

B03AC***Gvožđe, parenteralni preparati*****B03AC gvožđe, parenteralni preparati**

Doziranje: stanja u kojima postoji potreba za brzo popunjavanje rezervi željeza u organizmu, slaba podnošljivost liječenja oralnim oblicima željeza ili nesarađnja pacijenta u liječenju oralnim oblicima; aktivne upalne bolesti crijeva gdje oralni oblici željeza nisu efikasni; pri hroničnoj bolesti bubrega kada je oralna primjena manje efikasna: za doziranje konsultovati literaturu proizvođa

REGISTROVANI LIJEKOVI:**DEMROSE - PHARMADA ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**

ZU koncentrat za rastvor za injekciju/ infuziju [20 mg/1 mL] 5 staklenih ampula boje čilibara od 5 ml, u kutiji

B03AC gvožđe

Doziranje: *nedostatak željeza:* i.v. inj. nerazblažen rastvor maks. 15 mg/kg tjelesne težine ali ne smije preći 1000 mg željeza; i.v.inf. razblaženim rastvorom maks. 20 mg/kg tjelesne težine ali ne smije preći 1000 mg željeza

REGISTROVANI LIJEKOVI:**FERAPPLIC - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.**

ZU otopina za injekciju/ infuziju [50 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 10 mL otopine za injekciju/infuziju ,u kutiji
ZU otopina za injekciju/ infuziju [50 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 2 mL otopine za injekcije/infuzije, u kutiji
ZU otopina za injekciju/ infuziju [50 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 20 mL otopine za injekciju/infuziju, u kutiji

B03AC željezo (III) hidroksid saharoza kompleks

Doziranje: stanja u kojima postoji potreba za brzo popunjavanje rezervi željeza u organizmu, slaba podnošljivost liječenja oralnim oblicima željeza ili nesaradnja pacijenta u liječenju oralnim oblicima; aktivne upalne bolesti crijeva gdje oralni oblici željeza nisu efikasni; pri hroničnoj bolesti bubrega kada je oralna primjena manje efikasna: za doziranje konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEMROSE - PHARMADA ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

ZU koncentrat za rastvor za injekciju/ infuziju [20 mg/1 mL] 5 staklenih ampula boje čilibara od 5 ml, u kutiji

EMFER - BIEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

ZU rastvor za injekciju/ infuziju [100 mg/5 mL] 5 ampula sa po 5 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

B03AD Gvožđe u kombinaciji sa folnom kiselinom

B03AD05 gvožđe glukonat, folna kiselina

Doziranje: profilaksa i liječenje nedostatka željeza s povećanom potrebom za folnom kiselinom tokom trudnoće, nakon poroda i tokom dojenja: 1 tableta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TOTYLEM - LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL

Rp film tableta [0,4 mg/1 mtableta] 30 film tableta (3 PVC/PE/PVDC/aluminij blistera sa po 10 tableta), u kutiji

B03AE Gvožđe u drugim kombinacijama

B03AE10 bakar-glukonat, gvožđe-glukonat hidrat, mangan-glukonat

Doziranje: anemija izazvana deficitom gvožđa: odrasli, uobičajeno 100–150 mg dnevno (2-3 ampule dnevno), izbjegavati na prazan stomak; dojenčad iznad mjesec dana i djeca: 3 mg gvožđa/kg/dan, ne prelazeći 60 mg; trudnice (profilaksa, samo ako je opravdana): 1 ampula dnevno, od četvrtog mjeseca; ampulu otvoriti i popiti, razblažuje se sa vodom ili sokom

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TOTHEMA - LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL

Rp oralna otopina [0,7 mg/10 mL+ 50 mg/10 mL+ 1.33 mg/10 mL] 20 ampula po 10 ml oralnog rastvora, u kutiji

B03B Vitamin B12 i folna kiselina

B03BA Vitamin B12 (cijankobalamin) i analozi

B03BA01 cijanokobalamin

Doziranje: Adisonova perniciozna anemija i druge makrocitne anemije bez neuroloških problema: 250 mcg do 1000 mcg svakog drugog dana, tokom jedne do dvije sedmice, a zatim 250 mcg sedmično do normalizovanja krvne slike; doza održavanja: 1000 mcg mjesečno; perniciozna anemija i druge makrocitne anemije sa neurološkim poremećajima: i.m. svaki drugi dan po 1000 mcg, doza održavanja 1000 mcg jednom mjesečno; profilaksa makrocitne anemije kod pacijenata sa nedostatkom vitamina B12 izazvanim gastrektomijom ili sindromima malapsorpcije i striktnim vegetarijanstvom: 250 mcg–1000 mcg i.m. svakog mjeseca; Šilingov test: 1000 mcg i.m.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VITAMIN B12 ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

ZU rastvor za injekciju [500 µg/1 mL] 50 staklenih ampula sa po 1 ml rastvora za injekciju (pakovanje 10 plastičnih (PVC) uložaka po 5 ampula), u kutiji

B03BA03 hidroksokobalamin

Doziranje: odrasli i djeca, *i.m. perniciozna anemija i druge megaloblastne anemije bez neuroloških komplikacija:* početna doza 250-1000 mcg, svakog drugog dana, tokom 1-2 nedjelje, a potom 250 mcg do normalizacije krvne slike; doza održavanja 1000 mcg na svaka 2-3 mjeseca; *perniciozna anemija i druge megaloblastne anemije sa neurološkim komplikacijama:* početna doza 1000 mcg svakog drugog dana, dok se ne postigne poboljšanje; doza održavanja 1000 mcg na svaka 2 mjeseca; *prevencije megaloblastne anemije nastale usljed nedostatka vitamina B12 (kao posljedice gastrektomije, nekih malapsorpcionih sindroma ili vegetarijanskog načina ishrane):* 1000 mcg na svaka 2-3 mjeseca; *pušačka ambliopija i Leberova optička atrofija:* početna doza 1000 mcg dnevno, tokom dvije nedjelje, a potom 1000 mcg dva puta nedjeljno, dok se ne postigne poboljšanje; doza održavanja: 1000 mcg na svakih 1-3 mjeseca

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OHb 12 - GALENIKA A.D. BEOGRAD

ZU rastvor za injekciju [2500 µg/2 mL] 5 ampula sa po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

B03BB Folna kiselina i derivati

B03BB01 folna kiselina

Doziranje: *megaloblastna anemija prouzrokovana deficitom folata:* oralno, odrasli i djeca preko 1 god. preporučena dnevna doza 1 tbl. (5 mg) na dan, tokom 4 mjeseca; kod stanja malapsorpcije dnevna doza 15 mg (kod djece 1-10 mjeseci 10 mg); *profilaksa deficita folata kod primjene nekih lijekova* (npr. fenitoin, fenobarbitalprimidon, metotreksat, sulfametoksazol/trimetoprim): 5 mg na dan tokom 4 mjeseca; doza do 15 mg može biti potrebna za stanja malapsorpcije; *profilaksa deficita folata u hroničnim hemolitičkim stanjima:* oralno, odrasli 5 mg svakih 1-7 dana; *profilaksa deficita folata kod pacijenata na dijalizi:* oralno, odrasli 5 mg svakih 1-7 dana, djeca 12-18 god. 1-2 tbl. (5-10 mg) jednom dnevno, djeca 1-12 god. 250 mcg/kg (maks. 10 mg) jednom dnevno; *dodatak folne kiseline trudnicama u cilju prevencije pojave spine bifide i drugih efekata neuralne tube kod novorođenčeta:* 1 tbl. (5 mg) dnevno, u periodu prije začeća do dvanaeste nedjelje trudnoće

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FOLACIN - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 20 tableta (2 neprozirna PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

FOLESSA - BOSNALIJEK D.D.

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

FOLIK - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

FOLNA KISELINA REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

B03X Ostali lijekovi za liječenje anemije
B03XA Ostali lijekovi za liječenje anemije

B03XA01 epoetin beta

Doziranje: *liječenje simptomatske anemije povezane sa hroničnim zatajenjem bubrega kod odraslih i pedijatrijskih bolesnika:* s.c. odrasli i djeca, početna doza 20 i.j./kg 3 puta nedjeljno tokom 4 nedjelje, povećati prema odgovoru u intervalima od 4 nedjelje u koracima po 20 i.j./kg 3 puta nedjeljno; ukupna nedjeljna doza može biti podijeljena u dnevne doze; početno smanjenje doze je na polovinu podešene prema odgovoru u intervalima od 1-2 nedjelje; ukupna nedjeljna doza održavanja može biti data kao pojedinačna doza ili podijeljena u 3-7 nedjeljnih doza; maks. 720 i.j./kg nedjeljno; i.v. inj. tokom 2 min, odrasli i djeca, početna doza 40 i.j./kg 3 puta nedjeljno tokom 4 nedjelje, povećati prema odgovoru na 80 i.j./kg 3 puta nedjeljno nakon 4 nedjelje, sa daljim povećanjima ukoliko je neophodno u intervalima od 4 nedjelje u koracima od 20 i.j. /kg 3 puta nedjeljno; doza održavanja, početno smanjenje doze je na polovinu podešene prema odgovoru u intervalima od 1-2 nedjelje; maks. 720 i.j./kg nedjeljno; *prevencija anemije kod nedonoščadi porođajne težine od 750 do 1500 g i gestacijske dobi manje od 34 sedmice:* s.c. 250 i.j./kg 3 puta nedjeljno, terapiju treba započeti što ranije, poželjno od 3. dana i nastaviti tokom 6 nedjelja; *liječenje simptomatske anemije kod odraslih bolesnika sa nemijeloičnim malignim bolestima koji primaju hemoterapiju:* s.c. početna doza 450 i.j./kg nedjeljno (kao pojedinačna doza ili podijeljeno u 3-7 podijeljenih doza nedjeljno), povećati ukoliko je neophodno nakon 4 nedjelje (ukoliko nije postignut porast hemoglobina od najmanje 1 g/100 ml) na 900 i.j./kg nedjeljno (kao pojedinačna doza ili u 3-7 podijeljenih nedjeljnih doza); kada se postigne terapijski cilj dozu treba smanjiti za 25-50%; maks. 60000 i.j. nedjeljno; *povećanje količine vlastite krvi kod bolesnika u predonacijskom programu:* i.v. ili s.c. konsultovati literaturu proizvođa; multidozna injekcija

REGISTROVANI LIJEKOVI:

RECORMON - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

ZU/Rp rastvor za injekciju [2000 i.j./0.3 mL] 6 staklenih šprica po 0,3 ml
rastvora za injekciju i 6 igala , u kartonskoj kutiji

B03XA01 epoetin alfa

Doziranje: anemija kao posljedica hronične insuficijencije bubrega kod djece i odraslih (bolesnici na hemodijalizi, peritoneumskoj dijalizi ili pred dijalizom); liječenje anemija i smanjenja potreba za transfuzijom krvi kod odraslih pacijenata koji primaju hemoterapiju radi solidnih tumora, malignog limfoma ili multiplog mijeloma i kod postojanja rizika zbog transfuzije krvi udruženih sa pacijentovim opštim stanjem (npr. kardiovaskularni status, prethodno postojeća anemija na početku hemoterapije); povećanje produkcije autologne krvi kod odraslih u predonacijskom programu; za prikupljanje autologne krvi za hirurške zahvate; simptomatska anemija kod odraslih sa niskim ili srednjim rizikom primarnog mijelodisblastičnog sindroma koji imaju nizak serumski eritropoetin: za doziranje konsultovati literaturu proizvođa

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BINOCRIT - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

ZU rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [2000 i.j./1 mL] 6 napunjenih
šprica sa 1 ml otopine, bez sigurnosne zaštite za iglu
ZU rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [2000 i.j./1 mL] 6 napunjenih
šprica(staklo tip I) sa 1 ml rastvora, sa sigurnosnom zaštitom za iglu,
u kutiji

EPREX - JANSSEN-CILAG KFT.

- ZU otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki [2000 i.j./0.5 mL] 6 napunjenih štrcaljki sa iglom i klipom, te sigurnosnim zaštitnikom za iglu po 0,5 ml otopine, u kutiji

B03XA02 darbepoetin alfa

Doziranje: *simptomatska anemija povezana sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata na dijalizi, odraslih i djece preko 11 god, s.c. ili i.v. putem, u početku 450 nanograma/kg jednom nedjeljno i nakon 4 nedjelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%; kada se postigne koncentracija hemoglobina od 11 g/100 ml, doza održavanja se daje jednom nedjeljno ili jednom u 2 nedjelje; koncentracija hemoglobina ne smije biti veća od 12 g/100 ml; simptomatska anemija povezana sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom kod pacijenata koji nisu na dijalizi, odraslih i djece preko 11 god, s.c. ili i.v. putem, u početku 450 nanograma/kg jednom nedjeljno ili s.c. 750 nanograma/kg 1 put svake 2 sedmice nakon 4 nedjelje (u zavisnosti od odgovora) dozu smanjiti za 25%; kada se postigne koncentracija hemoglobina od 12 g/100 ml, doza održavanja se daje s.c. ili i.v. jednom nedjeljno ili s.c. jednom u 2 nedjelje ili s.c. jednom mjesečno; simptomatska anemija kod odraslih koji primaju hemoterapiju za ne-mijeloidni malignitet: odrasli, s.c. inj. početna doza 6,75 mikrograma/kg jednom svake 3 nedjelje ili 2,25 mikrograma/kg jednom nedjeljno (ako je odgovor neadekvatan nakon 9 nedjelja dalji tretman ne može biti efikasan i terapiju treba prekinuti); ako je adekvatan odgovor postignut, smanjiti dozu do 25-50%; davanje lijeka treba prekinuti otprilike 4 nedjelje nakon završetka hemoterapije*

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ARANESP - AMGEN (EUROPE) GMBH

- ZU/Rp otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki [10 µg/0.4 mL] 1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,4 ml otopine za injekciju, u kutiji.
- ZU/Rp otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki [20 µg/0.5 mL] 1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,5 ml (20 mcg/0,5 ml) otopine za injekciju, u kutiji
- ZU/Rp otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki [30 µg/0.3 mL] 1 napunjena injekciona štrcaljka sa 0,3 ml (30 mcg/0,3 ml) otopine za injekciju, u kutiji

B03XA03 metoksi polietilen glikol-epoetin beta

Doziranje: *simptomatska anemija udružena sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom: bolesnici koji se trenutno ne liječe lijekovima za stimulaciju eritropoeze: početna doza u bolesnika koji nisu na dijalizi iznosi 1,2 mcg/kg s.c. jedanput mjesečno ili 0,6 mcg/kg i.v. ili s.c. jedanput svake dvije sedmice (u bolesnika na dijalizi ili u bolesnika koji nisu na dijalizi); bolesnici koji se trenutno liječe lijekovima za stimulaciju eritropoeze: početna doza temelji se na izračunu prethodne sedmične doze darbepoetina alfa ili epoetina u trenutku zamjene; primjenjuje se pod nadzorom ljekara koji ima iskustva u liječenju bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom.*

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MIRCERA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

- ZU otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki [100 µg/0.3 mL] 1 staklena napunjena šprica s 0,3 ml otopine i 1 igla, u kutiji
- ZU otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki [50 µg/0.3 mL] 1 staklena napunjena šprica s 0,3 ml otopine i 1 igla, u kutiji
- ZU otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki [75 µg/0.3 mL] 1 staklena napunjena šprica s 0,3 ml otopine i 1 igla, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [120 µg/0.3 mL] 1 staklena napunjena šprica s 0,3 ml rastvora i 1 igla, u kutiji

B05 **ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIONI RASTVORI**
B05A **Krv i slični proizvodi**
B05AA **Supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme**

B05AA01 **albumin**

Doziranje: nadoknada i održavanje cirkulišućeg volumena krvi u stanjima u kojima je dokazano njegovo smanjenje, a primjena koloida prikladna: i.v. individualno, zavisi od indikacije i stanja bolesnika

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALBUMIN-BIOPHARMA - BIOPHARMA PLASMA LLC

- ZU rastvor za infuziju [200 mg/1 mL] 1 staklena boca sa 100 ml rastvora za infuziju, u kutiji
- ZU rastvor za infuziju [200 mg/1 mL] 1 staklena boca sa 50 ml rastvora za infuziju, u kutiji

ALBUNORM 20% - OCTAPHARMA AG

- ZU rastvor za infuziju [200 g/1 L] 1 bočica sa 50 mL rastvora za infuziju, u kutiji
- ZU rastvor za infuziju [200 g/1 L] 1 bočicom sa 100 mL rastvora za infuziju, u kutiji

ALBUNORM 5% - OCTAPHARMA AG

- ZU rastvor za infuziju [50 g/1 L] 1 staklena boca sa 250 ml rastvora za infuziju, u kutiji
- ZU rastvor za infuziju [50 g/1 L] 1 staklena boca sa 500 mL rastvora za infuziju, u kutiji

ALBUTEIN 200 G/L - INSTITUTO GRIFOLS S.A.

- ZU rastvor za infuziju [200 mg/1 mL] 1 bočica sa 100 mL rastvora za infuziju, u kutiji
- ZU rastvor za infuziju [200 mg/1 mL] 1 bočica sa 50 mL rastvora za infuziju, u kutiji

ALBUTEIN 50 G/L - INSTITUTO GRIFOLS S.A.

- ZU rastvor za infuziju [50 mg/1 mL] 1 boca sa 250 mL rastvora za infuziju, u kutiji
- ZU rastvor za infuziju [50 mg/1 mL] 1 boca sa 500 mL rastvora za infuziju, u kutiji
- ZU rastvor za infuziju [50 mg/1 mL] 1 bočica sa 100 mL rastvora za infuziju, u kutiji

HUMAN ALBUMIN 200G/L TAKEDA - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG

- ZU rastvor za infuziju [200 g/1000 mL] 1 staklena bočica sa 100 ml rastvora za infuziju, u kutiji
- ZU rastvor za infuziju [200 g/1000 mL] 1 staklena bočica sa 50 ml rastvora za infuziju, u kutiji

UMAN ALBUMIN - KEDRION S.P.A.

- ZU rastvor za infuziju [200 g/1 L] 50 ml rastvora za infuziju u staklenoj bočici, u kutiji

B05B Rastvori za intravensku primjenu
B05BA Rastvori za parenteralnu ishranu

B05BA01 alanin, arginin, fenilalanin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin, serin, taurin, tirozin, treonin, triptofan, valin

Doziranje: izvor aminokiselina u režimu parenteralne ishrane (u kombinaciji sa adekvatnom količinom energetskih suplemenata: doziranje individualno, za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AMINOVEN 10% - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

ZU rastvor za infuziju [14 g/1000 mL+ 12 g/1000 mL+ 5,1 g/1000 mL+ 11 g/1000 mL+ 3 g/1000 mL+ 5 g/1000 mL+ 4,7 g/1000 mL+ 6,6 g/1000 mL+ 4,3 g/1000 mL+ 11,2 g/1000 mL+ 6,5 g/1000 mL+ 1 g/1000 mL+ 0,4 g/1000 mL+ 4,4 g/1000 mL+ 2 g/1000 mL+ 6,2 g/1000 mL] 10 staklenih boca sa po 500 ml rastvora za infuziju, u kutiji

B05BA01 alanin, arginin, cistein, fenilalanin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin, serin, treonin, triptofan, valin

Doziranje: nadoknada aminokiselina u sklopu parenteralnog režima ishrane u slučaju teškog oblika insuficijencije jetre sa hepatičkom encefalopatijom ili bez nje, kada oralna ili enteralna ishrana nije moguća ili je nedovoljna ili je kontraindikovana: i.v. maks. 18,75 ml/kg/dan (1,5 g aminokiselina/kg/dan) što odgovara približno 1300 ml za osobu od 70 kg u toku 24 sata

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HEPASOL 8% - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

ZU rastvor za infuziju [4.64 g/1000 mL+ 10.72 g/1000 mL+ 0.52 g/1000 mL+ 0.88 g/1000 mL+ 5.82 g/1000 mL+ 2.8 g/1000 mL+ 10.4 g/1000 mL+ 13.09 g/1000 mL+ 6.88 g/1000 mL+ 1.1 g/1000 mL+ 5.73 g/1000 mL+ 2.24 g/1000 mL+ 4.4 g/1000 mL+ 0.7 g/1000 mL+ 10.08 g/1000 mL] 1 staklena boca sa 500 ml rastvora za infuziju

B05BA01 glicin, L-alanin, L-arginin, L-fenilalanin, L-histidin, L-izoleucin, L-leucin, L-lizin, L-metionin, L-prolin, L-serin, L-treonin, L-triptofan, L-valin

Doziranje: snabdijevanje aminokiselinama kao dio režima parenteralne prehrane pacijenata sa teškim oblicima insuficijencije jetre sa i bez jetrene encefalopatije onda kada je oralna ili enteralna prehrana nemoguća, nedovoljna ili kontraindikovana: i.v. 1,0-1,25 ml/kg tjelesne mase/sat, maks. brzina infuzije 1,25 ml/kg tjelesne mase/sat, maks. dnevna doza 1,5 g aminokiselina/kg tjelesne mase

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AMINOSTERIL N-HEPA 8% - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

ZU rastvor za infuziju [5,82 g/1000 mL+ 4,64 g/1000 mL+ 10,72 g/1000 mL+ 0,88 g/1000 mL+ 2,8 g/1000 mL+ 10,4 g/1000 mL+ 13,09 g/1000 mL+ 6,88 g/1000 mL+ 1,1 g/1000 mL+ 5,73 g/1000 mL+ 2,24 g/1000 mL+ 4,4 g/1000 mL+ 0,7 g/1000 mL+ 10,08 g/1000 mL] 10 staklenih boca sa 500 ml rastvora za infuziju, u kutiji

B05BA01 aminokiseline

Doziranje: izvor aminokiselina u režimu parenteralne ishrane (u kombinaciji sa adekvatnom količinom energetskih suplemenata: doziranje individualno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AMINOSOL 10% - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

ZU rastvor za infuziju [9.31 g/1000 mL+ 11 g/1000 mL+ 14 g/1000 mL+ 12 g/1000 mL+ 5.1 g/1000 mL+ 3 g/1000 mL+ 5 g/1000 mL+ 7.4 g/1000 mL+ 4.3 g/1000 mL+ 11.2 g/1000 mL+ 6.5 g/1000 mL+ 0.4 g/1000 mL+ 4.4 g/1000 mL+ 2 g/1000 mL+ 6.2 g/1000 mL+ 1 g/1000 mL] 1 staklena boca sa 500 ml rastvora za infuziju

AMINOSOL 15% - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

ZU rastvor za infuziju [15.66 g/1000 mL+ 18.5 g/1000 mL+ 25 g/1000 mL+ 20 g/1000 mL+ 5.5 g/1000 mL+ 7.3 g/1000 mL+ 5.2 g/1000 mL+ 8.9 g/1000 mL+ 3.8 g/1000 mL+ 17 g/1000 mL+ 9.6 g/1000 mL+ 0.4 g/1000 mL+ 8.6 g/1000 mL+ 1.6 g/1000 mL+ 5.5 g/1000 mL+ 2 g/1000 mL] 1 staklena boca sa 500 ml rastvora za infuziju

B05BA02 sojino ulje, trigliceridi, maslinovo ulje, riblje ulje sa omega 3 kiselinama (masne emulzije)

Doziranje: snabdijevanje pacijenata energijom, esencijalnim masnim kiselinama i omega-3 masnim kiselinama kao dio režima parenteralne prehrane kada je oralna ili enteralna prehrana nemoguća, nedovoljna ili kontraindikovana: primjena- i.v. inf. u perifernu ili centralnu venu; odrasli: 1 - 2 g masti/kg tjelesne težine(TT)/dan što odgovara 5-10 ml/kg TT/dan, a preporučena brzina infuzije je 0,63 ml SMOFlipida/kg TT/sat; novorođenčad i dojenčad - početna doz treba biti 0,5-1 g masti/kg TT/dan, praćeno uzastopnim povećanjem za 0,5-1 g masti/kg TT/dan do količine od 3,0 g masti/kg TT/dan; kod nedonoščadi i novorođenčadi sa niskom porođajnom težinom SMOFlipid treba davati u vidu infuzije neprekidno oko 24 sata; djeca - maksimalno 3 g masti/kg TT/dan, što odgovara 15 ml SMOFlipid/kg TT/dan; dnevnu dozu postepeno povećavati u prvoy sedmici primjene

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SMOFLIPID 20% - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

ZU emulzija za infuziju [60 g/1000 mL+ 60 g/1000 mL] 10 staklenih boca sa po 500 ml emulzije za infuziju, u kutiji

ZU emulzija za infuziju [60 g/1000 mL+ 60 g/1000 mL] 10 staklenih bočica sa po 100 ml emulzije za infuziju, u kutiji

ZU emulzija za infuziju [60 g/1000 mL+ 60 g/1000 mL] 10 staklenih bočica sa po 250 ml emulzije za infuziju, u kutiji

B05BA03 glukoza

Doziranje: snabdijevanje organizma energijom putem glukoze, liječenje hipoglikemije, rastvor za prenos za kompatibilne elektrolite i lijekove: u vidu i.v. inf. preko perifernog venskog sistema; maks. dnevna doza do 40 ml/kg/dan, što odgovara 2 g glukoze (5% rastvor), odnosno 4 g glukoze (10% rastvor) po kg tjelesne težine na dan; maks. brzina infuzije može biti do 5 ml/kg/h (5% rastvor), odnosno 2,5 ml/kg/h (10% rastvor), što odgovara 0,25 g glukoze/kg/h; maks. brzina kapi 0,8 kapi/kg/min.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GLUCOSI INFUNDIBILE 10% - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

ZU rastvor za infuziju [100 g/1000 mL] 500 ml rastvora za infuziju u polietilenskoj boci (PE niske gustine)

GLUCOSI INFUNDIBILE 5% - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

ZU rastvor za infuziju [50 g/1000 mL] 500 ml rastvora za infuziju u polietilenskoj boci (PE niske gustine)

GLUKOZA 10% BRAUN - B.BRAUN MELSUNGEN AG

ZU otopina za infuziju [100 g/1000 mL] 500 ml otopine za infuziju (10 polietilenska boca sa 500 ml otopine) u kutiji

GLUKOZA 10% DIACO - DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L.

ZU otopina za infuziju [100 g/1000 mL] 1 staklena boca sa 500 ml otopine za infuziju

GLUKOZA 40% B. BRAUN - B.BRAUN MELSUNGEN AG

ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [440 mg/1 mL] 20 polietilenskih ampula po 10 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

GLUKOZA 5 % DIACO - DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L.

ZU otopina za infuziju [50 g/1000 mL] 1 staklena boca sa 500 ml otopine za infuziju

GLUKOZA 5% BRAUN - B.BRAUN MELSUNGEN AG

ZU otopina za infuziju [50 g/1000 mL] 250 ml otopine za infuziju (10 polietilenskih boca sa 250 ml otopine) u kutiji

ZU otopina za infuziju [50 g/1000 mL] 500 ml otopine za infuziju (10 polietilenskih boca sa 500 ml otopine) u kutiji

GLUKOZA 5% VIOSER - VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY

ZU otopina za infuziju [5,5 g/100 mL] 10 polietilenskih boca sa po 250 ml otopine za infuziju, u kutiji

ZU otopina za infuziju [5,5 g/100 mL] 10 polietilenskih boca sa po 500 ml otopine za infuziju, u kutiji

B05BA10 aminokiseline, masti, glukoza

Doziranje: parenteralna prehrana odraslih i djece starije od 2 god. u slučajevima kada je prehrana na usta ili enteralna prehrana nemoguća, nedovoljna ili kontrainikovana: individualno, konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:**KABIVEN PERIPHERAL 1000 KCAL - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH**

ZU emulzija za infuziju [16 g/1000 mL+ 3,4 g/1000 mL+ 4,9 g/1000 mL+ 22,3 g/1000 mL+ 7,9 g/1000 mL+ 7,9 g/1000 mL+ 121 g/1000 mL+ 5,6 g/1000 mL+ 6,8 g/1000 mL+ 5,6 g/1000 mL+ 0,74 g/1000 mL+ 5,97 g/1000 mL+ 7,9 g/1000 mL+ 9 g/1000 mL+ 5,6 g/1000 mL+ 6,8 g/1000 mL+ 4,5 g/1000 mL+ 0,23 g/1000 mL+ 5,6 g/1000 mL+ 1,9 g/1000 mL+ 7,3 g/1000 mL] 4 vrećice po 1440 ml emulzije za infuziju (vrećice sa po tri odjeljka), u kutiji

KABIVEN PERIPHERAL 1400 KCAL - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

ZU emulzija za infuziju [16 g/1000 mL+ 3,4 g/1000 mL+ 4,9 g/1000 mL+ 7,9 g/1000 mL+ 7,9 g/1000 mL+ 121 g/1000 mL+ 5,6 g/1000 mL+ 6,8 g/1000 mL+ 5,6 g/1000 mL+ 0,74 g/1000 mL+ 5,97 g/1000 mL+ 7,9 g/1000 mL+ 9 g/1000 mL+ 5,6 g/1000 mL+ 6,8 g/1000 mL+ 4,5 g/1000 mL+ 0,23 g/1000 mL+ 5,6 g/1000 mL+ 1,9 g/1000 L+ 7,3 g/1000 mL] 4 vrećice po 1920 ml emulzije za infuziju (vrećice sa po 3 odjeljka), u kutiji

KABIVEN PERIPHERAL 1700 KCAL - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

ZU emulzija za infuziju [16 g/1000 mL+ 3,4 g/1000 mL+ 4,9 g/1000 mL+ 22,3 g/1000 mL+ 7,9 g/1000 mL+ 7,9 g/1000 mL+ 121 g/1000 mL+ 5,6 g/1000 mL+ 6,8 g/1000 mL+ 5,6 g/1000 mL+ 0,74 mg/1000 mL+ 5,97 g/1000 mL+ 7,9 g/1000 mL+ 9 g/1000 mL+ 5,6 g/1000 mL+ 6,8 g/1000 mL+ 4,5 g/1000 mL+ 0,23 g/1000 mL+ 5,6 g/1000 mL+ 1,9 g/1000 mL+ 7,3 g/1000 mL] 4 vrećice po 1920 ml emulzije za infuziju (vrećice sa po 3 odjeljka), u kutiji

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

5,97 g/1000 mL+ 7,9 g/1000 mL+ 9 g/1000 mL+ 5,6 g/1000 mL+ 6,8 g/1000 mL+ 4,5 g/1000 mL+ 0,23 g/1000 mL+ 5,6 g/1000 mL+ 1,9 g/1000 mL+ 7,3 g/1000 mL] 3 vrećice po 2400 ml emulzije za infuziju (vrećice sa po 3 odjeljka), u kutiji

SMOFKABIVEN PERIPHERAL - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

- ZU emulzija za infuziju [4,4 g/1000 mL+ 1,3 g/1000 mL+ 1,1 g/1000 mL+ 8,5 g/1000 mL+ 3,8 g/1000 mL+ 0,004 g/1000 mL+ 1,6 g/1000 mL+ 3,5 g/1000 mL+ 71 g/1000 mL+ 0,93 g/1000 mL+ 1,6 g/1000 mL+ 0,18 g/1000 mL+ 1,4 g/1000 mL+ 2,3 g/1000 mL+ 2,1 g/1000 mL+ 1,3 g/1000 mL+ 3,5 g/1000 mL+ 2,1 g/1000 mL+ 0,32 g/1000 mL+ 0,12 g/1000 mL+ 1,4 g/1000 mL+ 0,63 g/1000 mL+ 2,9 g/1000 mL] 4 vrećice po 1448 ml emulzije za infuziju (vrećice po tri odjeljka), u kutiji
- ZU emulzija za infuziju [4,4 g/1000 mL+ 1,3 g/1000 mL+ 1,1 g/1000 mL+ 8,5 g/1000 mL+ 3,8 g/1000 mL+ 0,004 g/1000 mL+ 1,6 g/1000 mL+ 3,5 g/1000 mL+ 71 g/1000 mL+ 0,93 g/1000 mL+ 1,6 g/1000 mL+ 0,18 g/1000 mL+ 1,4 g/1000 mL+ 2,3 g/1000 mL+ 2,1 g/1000 mL+ 1,3 g/1000 mL+ 3,5 g/1000 mL+ 2,1 g/1000 mL+ 0,32 g/1000 mL+ 0,12 g/1000 mL+ 1,4 g/1000 mL+ 0,63 g/1000 mL+ 2 g/1000 mL] 4 vrećice po 1206 ml emulzije za infuziju (vrećice po tri odjeljka), u kutiji
- ZU emulzija za infuziju [4,4 g/1000 mL+ 1,3 g/1000 mL+ 1,1 g/1000 mL+ 8,5 g/1000 mL+ 3,8 g/1000 mL+ 0,004 g/1000 mL+ 1,6 g/1000 mL+ 3,5 g/1000 mL+ 71 g/1000 mL+ 0,93 g/1000 mL+ 1,6 g/1000 mL+ 0,18 g/1000 mL+ 1,4 g/1000 mL+ 2,3 g/1000 mL+ 2,1 g/1000 mL+ 1,3 g/1000 mL+ 3,5 g/1000 mL+ 2,1 g/1000 mL+ 0,32 g/1000 mL+ 0,12 g/1000 mL+ 1,4 g/1000 mL+ 0,63 g/1000 mL+ 2 g/1000 mL] 4 vrećice po 1904 ml emulzije za infuziju (vrećice po tri odjeljka), u kutiji

B05BA10 aminokiseline, elektroliti

Doziranje: *parenteralna prehrana:* i.v. upotreba (centralna venska infuzija), doziranje se prilagođava individualnim potrebama za amino kiselinama, elektrolitima i tečnošću, zavisno od kliničkog stanja pacijenta (prehrambeni status i/ili stepen katabolizma, razgradnje azota s obzirom na bolest); odrasli i adolescenti 15-17 god. prosječna dnevna doza je 10-20 ml/kg tjelesne mase

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AMINOPLASMAL B.BRAUN 10 % E - B.BRAUN MELSUNGEN AG

- ZU otopina za infuziju [10.5 g/1000 mL+ 5.6 g/1000 mL+ 3.581 g/1000 mL+ 2.858 g/1000 mL+ 0.36 g/1000 mL+ 11.5 g/1000 mL+ 4.7 g/1000 mL+ 12 g/1000 mL+ 7.2 g/1000 mL+ 3 g/1000 mL+ 5 g/1000 mL+ 2.453 g/1000 mL+ 8.9 g/1000 mL+ 6.85 g/1000 mL+ 0.508 g/1000 mL+ 4.4 g/1000 mL+ 5.5 g/1000 mL+ 2.3 g/1000 mL+ 0.4 g/1000 mL+ 4.2 g/1000 mL+ 1.6 g/1000 mL+ 6.2 g/1000 mL] 10 staklenih boca po 500 ml otopine za infuziju, u kutiji

B05BB Rastvori za uspostavljanje ravnoteže elektrolita

B05BB01 natrijum-hidrogenkarbonat

Doziranje: metabolička acidoza; alkalinizacija urina u slučaju akutnog trovanja slabim organskim kiselinama, npr. barbiturati ili acetilsalicilna kiselina; alkalinizacija urina u cilju poboljšanja rastvorljivosti lijekovitih supstanci koje su slabo rastvorljive u neutralnom ili kiselom medijumu, npr. metotreksat, sulfonamidi, alkalinizacija urina u slučaju hemolize: i.v. doziranje je individualno, za više informacija o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SODIUM BICARBONATE LIQVOR - LIQVOR CJSC

ZU rastvor za infuziju [1000 ml/84 g] 1 staklena bočica od 20 ml, u kutiji

B05BB01 kalcijum glukonat

Doziranje: *akutna simptomatska hipokalcijemija:* odrasli, i.v. i i.m. početi sa 10 ml što odgovara 2,25 mmol kalcijuma, po potrebi ponoviti, naredne doze prilagoditi prema koncentraciji kalcijuma u serumu; za više informacija o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:**KALCIJ GLUKONAT 10% B. BRAUN - B.BRAUN MELSUNGEN AG**

ZU otopina za injekciju [940 mg/10 mL] 20 LDPE ampula od 10 ml u kartonskoj kutiji

B05BB01 natrijum-hlorid

Doziranje: nadoknada izotonične tečnosti kod hipotonične i izotonične dehidracije, kratkotrajna intravaskularna nadoknada tečnosti, prenosna otopina za kompatibilne koncentrate elektrolita i lijekove, ovlaživanje povoja za previjanje rana: dozu treba prilagoditi trenutnim potrebama bolesnika za vodom i elektrolitima; i.v. inf. maks. dnevna doza 40 ml na kg tjelesne težine na dan, što odgovara 6 mmol natrijuma na kg tjelesne težine; brzina infuzije zavisi od individualnog stanja bolesnika; količina rastvora za ispiranje rana i ovlaživanje zavisi od trenutnih potreba

REGISTROVANI LIJEKOVI:**IZOTONIČNA OTOPINA NATRIJ-KLORIDA 0,9% BRAUN - B.BRAUN MELSUNGEN AG**

ZU otopina za infuziju [9 g/1000 mL] 10 polietilenskih boca po 1000 ml otopine za infuziju, u kartonskoj kutiji

ZU otopina za infuziju [9 g/1000 mL] 10 polietilenskih boca po 250 ml otopine za infuziju, u kartonskoj kutiji

ZU otopina za infuziju [9 g/1000 mL] 10 polietilenskih boca po 500 ml otopine za infuziju, u kartonskoj kutiji

ZU otopina za infuziju [9 g/1000 mL] 20 polietilenskih boca po 100 ml otopine za infuziju, u kartonskoj kutiji

NATRIJ HLORID 0,9% VIOSER - VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY

ZU otopina za infuziju [9 g/1000 mL] 250 ml otopine za infuziju (10 polietilenskih boca sa po 250 ml otopine za infuziju), u kartonskoj kutiji

ZU otopina za infuziju [9 g/1000 mL] 500 ml otopine za infuziju (10 polietilenskih boca sa po 500 ml otopine za infuziju), u kartonskoj kutiji

NATRIJUM-HLORID KABI - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

ZU otopina za infuziju [-] 20 Freeflex vreća (poliolefinskih vreća) po 500 mL otopine za infuziju, u kutiji

ZU otopina za infuziju [9 mg/1 mL] 10 Freeflex vreća (poliolefinskih vreća) po 1000 mL otopine za infuziju, u kutiji

ZU otopina za infuziju [9 mg/1 mL] 10 KabiPac spremnika (PE boca) po 500 mL otopine za infuziju, u kutiji

ZU otopina za infuziju [9 mg/1 mL] 20 KabiPac spremnika (PE boca) po 250 mL otopine za infuziju, u kutiji

ZU otopina za infuziju [9 mg/1 mL] 30 Freeflex vreća (poliolefinskih vreća) po 250 mL otopine za infuziju, u kutiji

ZU otopina za infuziju [9 mg/1 mL] 40 KabiPac spremnika (PE boca) po 100 mL otopine za infuziju, u kutiji

B05BB01 **kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-hlorid**

Doziranje: izvanćelijska dehidracija, nezavisna od uzroka (povraćanje, dijareja, fistule); hipovolemija, nezavisna od uzroka (hemoragijski šok, opekotine, peri-operativni gubitak vode i elektrolita); prenosni rastvor za kompatibilne koncentracije elektrolita i lijekove: i.v.inf. u skladu sa potrebama za tečnosti i elektrolitima, maksimalna dnevna doza do 40 ml/kg tjelesne težine na dan; maksimalna brzina infuzije 5 ml/kg tjelesne težine na sat, maksimalna brzina kapanja 1,7 kapi/kg tjelesne težine po minuti

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGER RASTVOR) - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

ZU rastvor za infuziju [0.33 g/1000 mL+ 0.3 g/1000 mL+ 8.6 g/1000 mL] 500 ml rastvora za infuziju u polietilenskoj boci (PE niske gustine)

RINGEROVA OTOPINA BRAUN - B.BRAUN MELSUNGEN AG

ZU otopina za infuziju [0.33 g/1000 mL+ 0.3 g/1000 mL+ 8.6 g/1000 mL] 10 polietilenskih boca po 500 ml otopine za infuziju, u kutiji

ZU otopina za infuziju [0.33 g/1000 mL+ 0.3 g/1000 mL+ 8.6 g/1000 mL] 10 polietilenskih boca po 1000 ml otopine za infuziju, u kutiji

RINGEROVA OTOPINA FRESENIUS KABI OTOPINA ZA INFUZIJU - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

ZU otopina za infuziju [0,33 g/1 L+ 0,3 g/1 L+ 8,6 g/1 L] 10 KabiPac spremnika (PE boca) po 500 mL otopine za infuziju, u kutiji

B05BB01 **kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-laktat**

Doziranje: deficit ekstracelularne tečnosti i elektrolita u stanjima neporemećene acidobazne ravnoteže ili blage acidoze; izotonična i hipotonična dehidratacija; kratkotrajna intravaskularna nadoknada volumena; prenosni rastvor za kompatibilne koncentrate elektrolita i lijekova: i.v. inf. doziranje zavisi od životne dobi, težine i kliničkog stanja pacijenta; najveća dnevna doza do 40 ml na kg tjelesne težine a najveća brzina infuzije 5 ml/kg/tt/sat, što odgovara 1,7 kapi/kg/u minuti; preporučena doza za dojenčad i djecu 20-100 ml/kg/tt/24 sata

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HARTMANOV RASTVOR - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

ZU rastvor za infuziju [0.294 g/1000 mL+ 0.373 g/1000 mL+ 6.02 g/1000 mL+ 6.276 g/1000 mL] 500 ml rastvora za infuziju u polietilenskoj boci (PE niske gustine)

RINGER LAKTAT DIACO - DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L.

ZU otopina za infuziju [0,27 g/1000 mL+ 0,4 mg/1000 mL+ 6 g/1000 mL+ 3,25 g/1000 mL] Staklena boca sa 500 ml otopine za infuziju

RINGER LAKTAT VIOSER - VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY

ZU otopina za infuziju [0,2 g/1000 mL+ 0,3 g/1000 mL+ 6 g/1000 mL+ 3,1 g/1000 mL] 500 ml otopine za infuziju (10 polietilenskih boca sa po 500 ml otopine za infuziju), u kartonskoj kutiji

RINGEROV LAKTAT FRESENIUS KABI OTOPINA ZA INFUZIJU - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

ZU otopina za infuziju [0,27 g/1 L+ 0,4 g/1 L+ 6 g/1 L+ 3,17 g/1 L] 10 KabiPac spremnika (PE bočica) po 500 mL otopine za infuziju, u kutiji

SLOŽENA OTOPINA NATRIJ LAKTATA BRAUN - B.BRAUN MELSUNGEN AG

ZU otopina za infuziju [0.027 g/100 mL+ 0.04 g/100 mL+ 0.6 g/100 mL+ 0.312 g/100 mL] 10 polietilenskih boca po 1000 ml otopine za infuziju, u kutiji

ZU otopina za infuziju [0.027 g/100 mL + 0.04 g/100 mL + 0.6 g/100 mL + 0.312 g/100 mL] 10 polietilenskih boca po 500 ml otopine za infuziju, u kutiji

B05BB02 **glukoza, natrijum-hlorid**

Doziranje: kod stanja gdje je potrebno obezbijediti nadoknadu vode i natrijum hlorida uz nadoknadu kalorija: individualno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GLUKOZA SA NATRIJ Kloridom DIACO - DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L.

ZU otopina za infuziju [50 g/1000 mL + 9 g/1000 mL] Staklena boca sa 500 ml otopine za infuziju

B05BC **Rastvori za osmotsku diurezu**

B05BC01 **manitol**

Doziranje: izazivanje diureze u prevenciji i/ili liječenju oligurije kod akutne renalne insuficijencije prije nego što poremećaj renalne funkcije postane ireverzibilan; snižavanje povišenog intrakranijalnog pritiska i terapija cerebralnog edema, ukoliko je krvno-moždana barijera intaktna; snižavanje povišenog intraokularnog pritiska koji se ne može regulisati drugim lijekovima; stimulacija urinarnе ekskrecije toksičnih supstanci (koje podliježu renalnoj eliminaciji) kod trovanja: i.v. individualno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MANITOL HF 20% - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

ZU rastvor za infuziju [200 g/1000 mL] 1 staklena boca sa 250 ml rastvora za infuziju

MANNITOL 20% VIOSER - VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY

ZU otopina za infuziju [200 mg/1 mL] 10 polietilenskih boca sa po 250 ml otopine za infuziju, u kutiji

B05BC01 **manitol, natrijum-laktat**

Doziranje: izazivanje diureze u prevenciji i/ili liječenju oligurije kod akutne renalne insuficijencije prije nego što poremećaj renalne funkcije postane ireverzibilan; snižavanje povišenog intrakranijalnog pritiska i terapija cerebralnog edema, ukoliko je krvno-moždana barijera intaktna; snižavanje povišenog intraokularnog pritiska koji se ne može regulisati drugim lijekovima; stimulacija urinarnе ekskrecije toksičnih supstanci (koje podliježu renalnoj eliminaciji) kod trovanja: i.v. individualno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MANITOL HF 10% E - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

ZU rastvor za infuziju [100 g/1000 mL + 13.44 g/1000 mL] 1 staklena boca sa 500 ml rastvora za infuziju

B05D **Rastvori za peritonealnu dijalizu**

B05DA **Izotonični rastvori**

B05DA **ikodekstrin, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-laktat**

Doziranje: akutna i hronična bubrežna oštećenja koja zahtjevaju tretman dijalize: odrasli preko 18 god. 2-2,5 l, instilacijom tokom 10-20 min; poslije 6-12 sati rastvor se mijenja.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EXTRANEAL - BAXTER AG

- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [75 g/1000 mL+ 0,257 g/1000 mL+ 0,051 g/1000 mL+ 5,4 g/1000 mL+ 4,5 g/1000 mL] 1 PVC vrećica (jednostruka) sa 2000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu, u kutiji
- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [75 g/1000 mL+ 0,257 g/1000 mL+ 0,051 g/1000 mL+ 5,4 g/1000 mL+ 4,5 g/1000 mL] 5 PVC vrećica sa 2000 ml rastvora, u kutiji

B05DB *Hipertonični rastvori*

B05DB **glukoza, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-hlorid, natrijum-laktat**

Doziranje: peritonealna dijaliza kod akutne i hronične insuficijencije bubrega, teške retencije tečnosti, teškog disbalansa elektrolita, intoksikacije lijekovima koje se mogu ukloniti dijalizom, kada nije dostupna alternativna terapija: intraperitonealno, za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUKOZA 1,36%W/V/13,6 MG/ML - BAXTER AG

- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [13,6 g/1 L+ 0,184 g/1 L+ 0,051 g/1 L+ 2,1 g/1 L+ 5,38 g/1 L+ 1,68 g/1 L] 2 dvokomorne jednostruke vrećice po 5000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu, u kutiji

PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUKOZA 2,27%W/V/22,7 MG/ML - BAXTER AG

- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [22,7 g/1 L+ 0,184 g/1 L+ 0,051 g/1 L+ 2,1 g/1 L+ 5,38 g/1 L+ 1,68 g/1 L] 2 dvokomorne jednostruke vrećice po 5000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu, u kutiji

PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUKOZA 3,86%W/V/38,6 MG/ML - BAXTER AG

- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [38,6 g/1 L+ 0,184 g/1 L+ 0,051 g/1 L+ 2,1 g/1 L+ 5,38 g/1 L+ 1,68 g/1 L] 2 dvokomorne jednostruke vrećice po 5000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu, u kutiji

B05DB **glukoza, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-bikarbonat, natrijum-hlorid, natrijum-laktat**

Doziranje: peritonealna dijaliza, uključujući slučajeve: akutnog i hroničnog zatajenje bubrega, obilnog zadržavanje vode u organizmu, teškog poremećaja ravnoteže elektrolita, trovanja lijekovima, supstancama koje se mogu ukloniti dijalizom, kada ne postoji adekvatnija terapijska alternativa; ovi rastvori za peritonealnu dijalizu sa fiziološkom pH vrijednošću na bazi bikarbonata/laktata su posebno indikovani kod bolesnika kojima rastvori sa niskom pH vrijednošću i koji sadrže samo laktatni pufer uzrokuju bol ili nelagodu prilikom utakanja u trbušnu šupljinu: odrasli, bolesnici na kontinuiranoj ambulantnoj peritonealnoj dijalizi (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis - CAPD) obično izvode 4 ciklusa na dan (24 časa); bolesnici na automatskoj peritonealnoj dijalizi (Automated Peritoneal Dialysis - APD) obično izvode 4-5 ciklusa tokom noći i do 2 ciklusa tokom dana; zapremina punjenja zavisi od tjelesne konstitucije, a obično iznosi 2,00 do 2,5 l; za primjenu kod djece konsultovati literaturu proizvođa

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PHYSIONEAL 40 GLUKOZA 1,36% W/V - BAXTER AG

- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [13,6 g/1 L+ 0,184 g/1 L+ 0,051 g/1 L+ 2,1 g/1 L+ 5,38 g/1 L+ 1,68 g/1 L] 2000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (5 dvostrukih PVC vrećica), u kutiji
- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [13,6 g/1 L+ 0,184 g/1 L+ 0,051 g/1 L+ 2,1 g/1 L+ 5,38 g/1 L+ 1,68 g/1 L] 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 dvostruke PVC vrećice), u kutiji

- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [13.6 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 1.68 g/1 L] 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 jednostruke PVC vrećice), u kutiji
- PHYSIONEAL 40 GLUKOZA 2,27% W/V - BAXTER AG**
- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [22.7 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 1.68 g/1 L] 2000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (5 dvostrukih PVC vrećica), u kutiji
- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [22.7 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 1.68 g/1 L] 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 dvostruke PVC vrećice), u kutiji
- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [22.7 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 1.68 g/1 L] 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 jednostruke PVC vrećice), u kutiji
- PHYSIONEAL 40 GLUKOZA 3,86% W/V - BAXTER AG**
- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [38.6 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 1.68 g/1 L] 2000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (5 dvostrukih PVC vrećica), u kutiji
- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [38.6 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 1.68 g/1 L] 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 dvostruke PVC vrećice), u kutiji
- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [38.6 g/1 L+ 0.184 g/1 L+ 0.051 g/1 L+ 2.1 g/1 L+ 5.38 g/1 L+ 1.68 g/1 L] 2500 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4 jednostruke PVC vrećice), u kutiji

B05DB glicin, kalcijum-hlorid, L-alanin, L-arginin, L-fenilalanin, L-histidin, L-izoleucin, L-leucin, L-lizin, L-metionin, L-prolin, L-serin, L-tirozin, L-treonin, L-triptofan, L-valin, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-laktat

Doziranje: u kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi kao dodatak za malnutricione pacijente sa renalnom insuficijencijom: rastvor zagrijan na 37°C infundirati u peritoneumsku šuplinu prema uputstvu lekara

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NUTRINEAL PD4 1,1% - BAXTER AG

- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [510 mg/1000 mL+ 184 mg/1000 mL+ 951 mg/1000 mL+ 1071 mg/1000 mL+ 570 mg/1000 mL+ 714 mg/1000 mL+ 850 mg/1000 mL+ 1020 mg/1000 mL+ 955 mg/1000 mL+ 850 mg/1000 mL+ 595 mg/1000 mL+ 510 mg/1000 mL+ 300 mg/1000 mL+ 646 mg/1000 mL+ 270 mg/1000 mL+ 1393 mg/1000 mL+ 51 mg/1000 mL+ 5380 mg/1000 mL+ 4480 mg/1000 mL] 5 PVC vrećica sa 2000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu, u kutiji

B05DB glukoza, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-laktat

Doziranje: Dianeal: akutna i hronična renalna insuficijencija, težak stepen retencije vode, elektrolitni disbalans, intoksikacija lijekovima (kada nije moguće sprovesti odgovarajući drugi način liječenja takvog stanja): način terapije, učestalost tretmana, izmjene volumena, trajanje prekida i trajanje dijalize određuje lekar u zavisnosti od kliničkog statusa bolesnika; **Balance, CAPD/DPCA:** završna faza (dekompenzacija) hroničnog bubrežnog oboljenja, bilo kojeg porijekla, koje se može tretirati peritoneumskom dijalizom: doziranje, volumen i broj izmjena neophodno je prilagoditi individualnim potrebama bolesnika prema uputstvu lekara.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BALANCE 1,5 % GLUKOZE 1,25 MMOL/L KALCIJA - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH	
ZU	otopina za peritonejsku dijalizu [16.5 g/1 L+ 0.1838 g/1 L+ 0.1017 g/1 L+ 5.64 g/1 L+ 3.925 g/1 L] 4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance system") po 2000 mL otopine za peritonealnu dijalizu u zaštitnoj plastičnoj vrećici sa 2 komore
BALANCE 1,5 % GLUKOZE 1,75 MMOL/L KALCIJA - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH	
ZU	otopina za peritonejsku dijalizu [16.5 g/1 L+ 0.2573 g/1 L+ 0.1017 g/1 L+ 5.64 g/1 L+ 3.925 g/1 L] 4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance system") po 2000 mL otopine za peritonealnu dijalizu u zaštitnoj plastičnoj vrećici sa 2 komore
BALANCE 2,3 % GLUKOZE 1,25 MMOL/L KALCIJA - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH	
ZU	otopina za peritonejsku dijalizu [25 g/1 L+ 0.1838 g/1 L+ 0.1017 g/1 L+ 5.64 g/1 L+ 3.925 g/1 L] 4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance System") po 2000 mL otopine za peritonealnu dijalizu u zaštitnoj plastičnoj vrećici sa 2 komore
BALANCE 2,3% GLUKOZE 1,75 MMOL/L KALCIJA - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH	
ZU	otopina za peritonejsku dijalizu [25 g/1 L+ 0.2573 g/1 L+ 0.1017 g/1 L+ 5.64 g/1 L+ 3.925 g/1 g] 4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance System") po 2000 mL otopine za peritonealnu dijalizu u zaštitnoj vrećici sa 2 komore
BALANCE 4,25 % GLUKOZE 1,25 MMOL/L KALCIJA - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH	
ZU	otopina za peritonejsku dijalizu [46.75 g/1 L+ 0.1838 g/1 L+ 0.1017 g/1 L+ 5.64 g/1 L+ 3.925 g/1 L] 4 pojedinačna pakovanja ("Stay Safe Balance System") po 2000 mL otopine za peritonejsku dijalizu u zaštitnoj plastičnoj vrećici sa 2 komore)
CAPD/DPCA 3 STAY SAFE - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH	
ZU	otopina za peritonejsku dijalizu [46.75 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL] 4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji
CAPD/DPCA 17 STAY SAFE - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH	
ZU	otopina za peritonejsku dijalizu [16.5 g/1000 mL+ 0.1838 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mg+ 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL] 4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji
CAPD/DPCA 19 STAY SAFE - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH	
ZU	otopina za peritonejsku dijalizu [25 g/1000 mL+ 0.1838 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL] 4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji
CAPD/DPCA 2 SLEEP SAFE - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH	
ZU	otopina za peritonejsku dijalizu [16.5 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL] 2 plastične vrećice sa 5000 mL otopine za peritonealnu dijalizu (sleep safe - sistem), u kartonskoj kutiji
CAPD/DPCA 2 STAY SAFE - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH	
ZU	otopina za peritonejsku dijalizu [16.5 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL] 4 vrećice sa po 2000 ml otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji
CAPD/DPCA 4 SLEEP SAFE - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH	

- ZU otopina za peritonejsku dijalizu [25 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL] 2 plastične vrećice sa 5000 mL otopine za peritonealnu dijalizu (sleep safe - sistem), u kutiji

CAPD/DPCA 4 STAY SAFE - FRESenius MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

- ZU otopina za peritonejsku dijalizu [25 g/1000 mL+ 0.2573 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 5.786 g/1000 mL+ 3.925 g/1000 mL] 4 vrećice sa po 2000 mL otopine za peritonejsku dijalizu u kartonskoj kutiji

DIANEAL PD4 - VANTIVE GMBH

- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [13.6 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL] 2 PVC vrećice sa 5000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu, u kutiji
- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [13.6 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL] 4 PVC vrećice sa 2500 mL rastvora za peritonealnu dijalizu, u kutiji
- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [13.6 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL] 5 PVC vrećica sa 2000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu, u kutiji
- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [22.7 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL] 2 PVC vrećice sa 5000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu, u kutiji
- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [22.7 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL] 4 PVC vrećice sa 2500 mL rastvora za peritonealnu dijalizu, u kutiji
- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [22.7 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL] 5 PVC vrećica sa 2000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu, u kutiji
- ZU rastvor za peritonealnu dijalizu [38.6 g/1000 mL+ 0.184 g/1000 mL+ 0.051 g/1000 mL+ 5.38 g/1000 mL+ 4.48 g/1000 mL] 5 PVC vrećica sa 2000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu, u kutiji

B05X *Dodaci intravenskim rastvorima*
B05XA *Rastvori elektrolita*

B05XA01 *kalijum-hlorid*

Doziranje: hipokalemija koja se ne može liječiti peroralno: i.v. inf, kao razrijeđena otopina u infuzijskoj otopini ugljikohidrata ili elektrolita; doziranje je individualno, u zavisnosti od stanja pacijenta i deficita kalijuma; odrasli: uobičajeno 10-20 mmol kalijuma/sat, u težim slučajevima se mogu infundirati i veće doze do 40 mmol kalijuma/sat; maks. dnevna doza 2-3 mmol kalijuma /kg/dan, odnosno 100–200 ml/dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KALIJ HLORID 7,45% B. BRAUN - B.BRAUN MELSUNGEN AG

- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [7,45 mg/1 mL] 20 LDPE ampula od 20 mL koncentrata za otopinu za infuziju

B05XA03 *natrijum-hlorid*

Doziranje: nadoknada tečnosti i natrijum hlorida, kod parenteralne primjene kompatibilnih koncentrata elektrolita i lijekova, za ispiranje rana i ovlaživanje tampona i zavoja na ranama: individualno, u zavisnosti od kliničkog stanja i starosti bolesnika, kao i od potreba; odraslima se obično daje oko 1 l rastvora, a maks. 2,5-3 l/dan; prosječna brzina davanja je 80 kapi/min. (oko 250 mL/h), a maks. 180 kapi/min. (oko 550 mL/h); djeci se kod dehidracije sa šokom u početku daje 20-30 mL/kg tjelesne mase/dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

ZU rastvor za infuziju [9 g/1000 mL] 500 ml rastvora za infuziju u polietilenskoj boci (PE niske gustine)

NATRIJ HLORID POLIFLEKS 0,9% RASTVOR ZA INFUZIJU - POLIFARMA ILAC SAN VE TIC.A.S.

ZU rastvor za infuziju [9 g/1000 mL] PP vrećica od 100 ml upakovana u zatvorenu, zaštitnu, vanjsku LHDPE plastičnu vrećicu (twinbag)

ZU rastvor za infuziju [9 g/1000 mL] PP vrećica od 1000 ml upakovana u zatvorenu, zaštitnu, vanjsku LHDPE plastičnu vrećicu (twinbag)

ZU rastvor za infuziju [9 g/1000 mL] PP vrećica od 250 ml upakovana u zatvorenu, zaštitnu, vanjsku LHDPE plastičnu vrećicu (twinbag)

ZU rastvor za infuziju [9 g/1000 mL] PP vrećica od 500 ml upakovana u zatvorenu, zaštitnu, vanjsku LHDPE plastičnu vrećicu (twinbag)

NATRIJ KLORID DIACO - DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L.

ZU otopina za infuziju [9 g/1000 mL] Staklena boca sa 100 ml otopine za infuzije

ZU otopina za infuziju [9 g/1000 mL] Staklena boca sa 250 ml otopine za infuziju

ZU otopina za infuziju [9 g/1000 mL] Staklena boca od 500 ml otopine za infuziju

B05Z Rastvori za hemodijalizu i hemofiltraciju

B05ZB Rastvori za hemofiltraciju

B05ZB glukoza, kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-hlorid

Doziranje: akutna renalna insuficijencija, hronična renalna insuficijencija, kod pacijenata kod kojih je kontinuirana bubrežna nadomjesna terapija naznačena kao dio tretmana kod trovanja u vodi rastvorljivim toksinima: za doziranje konsultovati literaturu proizvođa

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MULTIBIC 2 MMOL/L KALIJA - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

ZU otopina za hemodijalizu/hemofiltraciju [1.1 g/1000 mL+ 0.2205 g/1000 mL+ 0.1491 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 2.94 g/1000 mL+ 6.136 g/1000 mL] 2 vrećice (sa dvije komore) po 5000 ml otopine za hemodijalizu/ hemofiltraciju, u kutiji

MULTIBIC 3 MMOL/L KALIJA - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

ZU otopina za hemodijalizu/hemofiltraciju [1.1 g/1000 mL+ 0.2205 g/1000 mL+ 0.2237 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 2.94 g/1000 mL+ 6.136 g/1000 mL] 2 vrećice (sa dvije komore) od 5 000 ml otopine za hemodijalizu/hemofiltraciju, u kutiji

B06 OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA

B06A Ostala hematološka sredstva

B06AC Lijekovi koji se koriste kod nasljednog angioedema

B06AC02 icatibant

Doziranje: akutni napad hereditarnog angioedema kod pacijenata sa nedostatkom C1-esteraze: s.c. 30 mg u jednoj dozi, zatim 30 mg poslije 6 sati po potrebi, zatim 30 mg nakon 6 sati po potrebi; maksimalno 3 doze dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**FIRAZYR - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, IRELAND
BRANCH**

Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [30 mg/1 šprica] 1 šprica sa
3 ml rastvora za injekciju i igla za primjenu, u kutiji

B06AC05 lanadelumab

Doziranje: *prevencija ponavljajućih napada hereditarnog angioedema:* s.c. odrasli i djeca preko 12 god. inj. 300 mg svake dvije nedjelje, smanjiti na 300 mg svake četiri nedjelje kod stabilnih pacijenata bez napada

REGISTROVANI LIJEKOVI:**TAKHZYRO - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, (IRELAND
BRANCH)**

Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [300 mg/2 mL] 1 napunjena
šprica od 2 mL, u kutiji

B06AC06 berotralstat

Doziranje: rutinska prevencija ponavljajućih napada hereditarnog angioedema kod odraslih pacijenata i adolescenata u dobi od 12 godina i starijih: oralno, odrasli i adolescenti stariji od 12 godina, tjelesne mase preko 40kg, 150 mg jednom na dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ORLADEYO - BIOCRYST IRELAND LIMITED**

Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 PCTFE/PVC-
Al blistera po 7 kapsula), u kutiji

C
C01
C01A
C01AA

KARDIOVASKULARNI SISTEM
TERAPIJA BOLESTI SRCA
Srčani glikozidi
Glikozidi digitalisa

C01AA05 **digoksin**

Doziranje: kongestivna srčana insuficijencija, posebno ako je praćena fibrilacijom ili flaterom pretkomora; supraventrikularne aritmije (atrijalni flater i atrijalna fibrilacija): oralna primjena, brza digitalizacija 0,75-1,5 mg u nekoliko podijeljenih doza tokom 24 h (prvo se primjeni pojedinačna doza od 0,5-0,75 mg, zatim po 0,25 mg 3 puta na 8 h, a potom doza održavanja; postepena, tj. kumulativna digitalizacija: 0,25 mg dnevno; doza održavanja 0,0625-0,5 mg dnevno zavisno od funkcije bubrega i terapijskog odgovora na dozu; uobičajena doza održavanja je 0,125-0,25 mg dnevno (kod starijih osoba se primjenjuju niže doze); djeca do 10. god: digitalizacija 0,01-0,02 mg/kg (10-20 mcg/kg) na 6 h, 2-4 doze su dovoljne da bi se postigla digitalizacija; doza održavanja 25-30% dnevne doze za digitalizaciju; parenteralna primjena, brza digitalizacija, 0,5 mg, sporo i.v.; po potrebi manja doza na 4 sata; doza održavanja 0,5-1 mg dnevno; udarna doza 0,75-1 mg, može se dati u infuziji tokom najmanje 2 sata, a zatim oralna doza održavanja sljedećeg dana; prilagođavanje doze je neophodno kod starijih osoba i kod osoba sa bubrežnom insuficijencijom.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DIGOXIN SOPHARMA - SOPHARMA AD

ZU otopina za injekciju [0.25 mg/1 mL] 10 staklenih ampula sa po 2 ml otopine za injekciju u PVC blisteru, u kutiji

LANIBOS - BOSNALIJEK D.D.

Rp tableta [0.25 mg/1 tableta] 20 tableta (2 blistera po 10 tableta), u kutiji

C01B **Antiaritmici, grupa I i III**

C01BB **Antiaritmici, grupa Ib**

C01BB01 **lidokain**

Doziranje: supresija ventrikularnih ekstrasistola i ventrikularnih tahikardija, naročito poslije akutnog infarkta miokarda; lokalna anestezija (površinska infiltraciona, regionalna, epiduralna i kaudalna); anestezija u stomatologiji (sam ili u kombinaciji sa adrenalinom): s.c, i.m. ili i.v. inj. za informacije o doziranju konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LIDOCAINA CLORIDRATO BIOINDUSTRIA L.I.M. - BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.

ZU rastvor za injekciju [20 mg/1 mL] 25 bočica sa 50 ml rastvora za injekciju, u kutiji

LIDOCAINE 2% S.A.L.F. - S.A.L.F.-S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO

ZU rastvor za injekciju [20 mg/1 mL] 4 bočice po 50 ml rastvora za injekciju, u kutiji

LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 1% - GALENIKA A.D. BEOGRAD

ZU rastvor za injekciju [35 mg/3.5 mL] 10 staklenih ampula po 3,5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 2% - GALENIKA A.D. BEOGRAD

ZU rastvor za injekciju [40 mg/2 mL] 50 staklenih ampula po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

C01BC **Antiaritmici, grupa Ic**

C01BC03 **propafenon**

Doziranje: ventrikularna aritmija; paroksizmalna supraventrikularna tahiaritmija koja uključuje paroksizmalni atrijalni flater/fibrilaciju i paroksizmalnu reentrant tahikardiju u kojoj učestvuje AV-čvor ili akcesorni baj-pas putevi kada standardna terapija nije efikasna ili postoje kontraindikacije: oralno, odrasli, 3 puta dnevno po 150 mg, doza se može postepeno povećavati na 300 mg 2-3 puta dnevno, maks. 900 mg dnevno;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PROPAFEN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.

BANJA LUKA

Rp film tableta [150 mg/1 tableta] 50 film tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [300 mg/1 tableta] 50 film tableta (5 PVC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

PROPAFENON ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

Rp film tableta [150 mg/1 tableta] 40 film tableta (4 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

PROPAFENON FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp filmom obložena tableta [150 mg/1 tableta] 40 filmom obloženih tableta (4 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

RYTMONORM - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

Rp film tableta [150 mg/1 tableta] 50 film tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [300 mg/1 tableta] 50 film tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

C01BC04 **flekainid**

Doziranje: supraventrikularne aritmije: oralno, odrasli početna doza 50 mg 2 puta dnevno, povećati ukoliko je neophodno na 300 mg dnevno; ventrikularne aritmije: oralno, odrasli početna doza 100 mg 2 puta dnevno tokom 3-5 dana, maks. 400 mg dnevno i ova doza je uglavnom namijenjena za pacijente krupne tjelesne građe ili kada je neophodna brza kontrola aritmije; za održavanje, smanjiti dozu do najniže doze koja omogućava adekvatnu kontrolu aritmija (napomena: započinjanje terapije i prilagođavanje doze treba sprovoditi pod medicinskim nadzorom uz praćenje EKG-a i nivoa lijeka u plazmi)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FELKARID - ALKALOID AD SKOPJE

Rp tableta [100 mg/1 tableta] 3 PVC/PVDC/Aluminijska blistera sa po 10 tableta, u kutiji

Rp tableta [50 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Aluminijska blistera sa po 10 tableta), u kutiji

LECANID - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp tableta [100 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Aluminijumski blister sa po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [50 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Aluminijumski blister sa po 10 tableta), u kutiji

C01BD **Antiaritmici, grupa III**

C01BD01 **amiodaron**

Doziranje: teški poremećaji srčanog ritma u situacijama kada bolesnik ne reaguje na drugu terapiju ili je ona kontraindikovana (uključujući paroksizmalne supraventikularne,

nodalne i ventrikularne tahikardije, atrijsku fibrilaciju i fluter, ventrikularnu fibrilaciju i tahiaritmije povezane s Wolff-Parkinson-White sindromom): odrasli, oralno, inicijalna stabilizacija započinje s 200 mg, tri puta dnevno tokom prve nedjelje liječenja; nakon toga, dozu treba smanjiti na 200 mg, dva puta dnevno tokom naredne nedjelje; održavanje, dozu treba smanjiti na 200 mg dnevno, ili manje, a u rijetkim slučajevima mogu biti potrebne veće doze održavanja; potrebno je redovno procjenjivati dozu održavanja, naročito kada je ona veća od 200 mg dnevno; parenteralno, i.v. infuzija 5 mg/kg tokom 20-120 min. (primjenjuje se preko centralnog venskog katetera); maks. 1,2 g dnevno; za starije bolesnike važi pravilo primjene minimalne efikasne doze; terapiju treba započeti i njen tok pratiti samo u bolničkim uslovima ili pod kontrolom ljekara specijaliste.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AMIODARON FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp tableta [200 mg/1 tableta] 60 tableta (4 PVC/Al blistera sa 15 tableta), u kutiji

AMIODARONE CLORIDRATO BIOINDUSTRIA LIM - BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.

ZU rastvor za injekciju/ infuziju [150 mg/3 mL] 5 ampula sa po 3 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

AMIOKORDIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp tableta [200 mg/1 tableta] 60 tableta (6 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

ARYTMIL - SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE "BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL PHARMACEUTICAL PLANT" PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

ZU rastvor za injekciju [50 mg/1 mL] 5 ampula po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

CORDARONE - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

Rp tableta [200 mg/1 tableta] 60 tableta (4 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji

C01C *Stimulansi srčanog rada, isključujući srčane glikozide*

C01CA *Adrenergički i dopaminergički lijekovi*

C01CA03 *noradrenalin (norepinefrin)*

Doziranje: akutna hipotenzija: i.v. za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NORADRENALIN KALCEKS - AS KALCEKS

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [1 mg/1 mL] 10 ampula od 2 ml u PVC podlozi (liner), u kutiji

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [1 mg/1 mL] 10 ampula od 4 ml u PVC podlozi (liner), u kutiji

C01CA04 *dopamin*

Doziranje: stanje šoka bilo koje vrste (postinfarktni kardiogeni šok, hirurški šok, hipovolemijski ili hemoragijski šok, toksični šok, anafilaktički šok): i.v.inf. inicijalno 5-15 mcg/kg/min.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DOPAMINE S.A.L.F. - S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [200 mg/5 mL] 5 ampula sa po 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

C01CA07 dobutamin

Doziranje: inotropna podrška kod infarkta miokarda, operacije na srcu, kardiomiopatije, septičkog šoka, kardiogenog šoka i tokom ventilacije sa pozitivnim pritiskom na kraju ekspirijuma: i.v. infuzija, 2,5-10 mcg/kg/min, podešeno prema odgovoru; prije upotrebe razblažiti sa rastvorom natrijum hlorida za intravensku infuziju, 5% rastvorom dekstroze za intravensku infuziju ili 1,85% rastvorom natrijuma laktata za infuziju i primjeniti i.v. putem igle ili katetera i seta za davanje; terapiju nikad ne treba naglo obustaviti, nego dozu postepeno smanjivati, do potpunog prekida; može se koristiti za test opterećenja srca: preporučena doza se postepeno povećava za po 5 mcg/kg/minut, od 5 pa do 20 mcg/kg/minut, a svaka doza se daje u vidu infuzije tokom 8 minuta; kontinuirano ECG praćenje je esencijalno a infuzija se prekida u slučaju depresije ST segmenta >3 mm ili svake ventrikularne aritmije, ukoliko brzina srčanih otkucaja dostigne maksimum za datu starosnu grupu/pol, sistolni pritisak poraste iznad 220 mm Hg ili ukoliko se jave bilo kakva neželjena dejstva.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DOBUTAMINE PANPHARMA - PANPHARMA S.A.

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [250 mg/20 mL] 10 staklenih bočica
sa po 20 ml koncentrata za rastvor za infuziju

MIOZAC - FISIOPHARMA-S.R.L.

ZU rastvor za infuziju [250 mg/20 mL] 1 bočica sa 20 ml rastvora za
infuziju, u kutiji

C01CA24 adrenalin

Doziranje: *teške reakcije preosjetljivosti, anafilaktički šok:* i.m. inj. odrasli i djeca 12-18. god. 0,5 mg, po potrebi ova doza se može ponoviti nekoliko puta u intervalima od 5 min; djeca 6-12 god. 0,3 mg, djeca 6 mjeseci do 6 god. 0,15 mg, mlađi od 6 mjeseci 0,01mg/kg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ADRENALIN BRAWN - BRAWN LABORATORIES LIMITED

ZU rastvor za injekciju [1 mg/1 mL] 10 staklenih ampula sa 1 mL
rastvora za injekciju, u kutiji

C01D Vazodilatatori u terapiji bolesti srca

C01DA Organski nitrati

C01DA02 gliceril trinitrat

Doziranje: *profilaksa angine:* sublingvalno, tablete, odrasli 1 tableta prije aktivnosti koja dovodi do anginoznog napada; *terapija angine:* sublingvalno, tablete, 1 tabletu, doza se po potrebi može ponavljati u intervalu od 5 minuta, pozvati hitnu medicinsku pomoć ukoliko simptomi ne nestanu 5 minuta poslije druge doze ili ranije ukoliko se bol pojačava ili se osoba ne osjeća dobro; *profilaksa angine:* sublingvalni sprej, odrasli 400-800 mcg se aplicira ispod jezika prije aktivnosti koja može izazvati anginu a zatim se zatvore usta prije aktivnosti koja može izazvati anginu; *terapija angine:* sublingvalni sprej, odrasli 400-800 mcg se aplicira ispod jezika, a zatim se zatvore usta, doza se po potrebi može ponavljati u intervalu od 5 minuta, pozvati hitnu medicinsku pomoć ukoliko simptomi ne nestanu 5 minuta poslije druge doze ili ranije ukoliko se bol pojačava ili se osoba ne osjeća dobro; *kontrola hipertenzije i srčane ishemije tokom i nakon hirurških zahvata; indukcija i održavanje kontrolisane hipotenzije tokom hirurških zahvata; kongestivna srčana insuficijencija; nestabilna angina:* i.v.inf. 10-200 mcg/min, podešavati prema odgovoru; maks. 400 mcg/min; konsultovati literaturu proizvoda za preporučene početne doze kod specifičnih indikacija;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NITROGLICERINA BIOINDUSTRIA L.I.M. - BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [5 mg/1.5 mL] 10 ampula po 1,5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [50 mg/50 mL] 1 staklena bočica sa 50 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

NITROGLICEROL - BOSNALIJEK D.D.

- Rp kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda [2.5 mg/1 kapsula] 20 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

NITROLINGUAL SPREJ - G.POHL BOSKAMP GMBH & CO.KG

- Rp sublingvalni sprej, rastvor [0.4 mg/1 doza] 1 bočica sa 200 doza, u kutiji

C01DA05 pentaeritritil tetranitrat

Doziranje: profilaksa i dugoročna terapija angine pectoris: 2-3 puta dnevno po 1 tbl. (160-240 mg dnevno)

REGISTROVANI LIJEKOVI:**DILCORAN 80 - HEMOFARM A.D. VRŠAC**

- Rp tableta sa modifikovanim oslobađanjem [80 mg/1 tableta] 20 tableta sa modifikovanim oslobađanjem (2 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

C01DA08 izosorbid dinitrat

Doziranje: profilaksa i terapija angine pectoris: 30-120 mg dnevno u podijeljenim dozama; srčana insuficijencija: 40-160 mg dnevno u podijeljenim dozama, po potrebi povećati na 240 mg dnevno u podijeljenim dozama

REGISTROVANI LIJEKOVI:**CORNILAT - GALENIKA A.D. BEOGRAD**

- Rp tableta [20 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

C01DA14 izosorbid mononitrat

Doziranje: profilaksa i liječenje angine pectoris, dodatak terapiji kongestivne srčane insuficijencije, pomoćna terapija nakon akutnog infarkta miokarda: početna doza je 20 mg 2-3 puta dnevno ili 40 mg dva puta dnevno (10 mg dva puta dnevno za bolesnike koji ranije nisu liječeni organskim nitratima); doza održavanja je 2 puta po 20-40 mg dnevno (prva doza ujutru, a druga oko 17 h); do 120 mg dnevno u podijeljenim dozama ukoliko je potrebno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ANGINAL - BOSNALIJEK D.D.**

- Rp tableta [20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta s produženim oslobađanjem [40 mg/1 tableta] 30 tableta s produženim oslobađanjem (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta s produženim oslobađanjem [40 mg/1 tableta] 50 tableta s produženim oslobađanjem (5 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

MONIZOL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp tableta [20 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp	tableta [40 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
MONOSAN - PRO.MED.CS PRAHA A.S.	
Rp	tableta [20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [40 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
OLICARD RETARD - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH	
Rp	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda [40 mg/1 kapsula] 50 kapsula sa produženim oslobađanjem (5 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji
Rp	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda [60 mg/1 kapsula] 50 kapsula sa produženim oslobađanjem (5 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

C01DX *Drugi vazodilatatori koji se koriste kod srčanih oboljenja*

C01DX22 vericigvat

Doziranje: hronična srčana insuficijencija sa smanjenom ejekcionom frakcijom (kod pacijenata stabilizovanih nakon nedavnog događaja dekompenzacije za koji je bila potrebna i.v. primjena lijekova): oralno, odrasli, početi sa 2,5 mg jednom dnevno, dozu bi trebalo udvostručiti otprilike svake dvije sedmice ukoliko se toleriše, do postizanja ciljane doze održavanja; doza održavanja 10 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VERQUVO - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT

Rp	filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 14 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa 14 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 14 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC/ALU blister sa 14 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa 14 tableta), u kutiji

C01E *Ostali lijekovi u terapiji bolesti srca*

C01EB *Ostali lijekovi u terapiji bolesti srca*

C01EB15 trimetazidin

Doziranje: dodatna simptomatska terapija angine pectoris kod odraslih, kod kojih je bolest neadekvatno kontrolisana ili koji loše podnose antianginalnu terapiju prvog izbora: 1 tbl. ujutro i 1 tbl. uveče u toku obroka (tableta jačine 35 mg), ili 80 mg jedanput na dan ujutro

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PREDUCTAL - LES LABORATOIRES SERVIER

△ Rp	kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda [80 mg/1 kapsula] 30 kapsula s produženim oslobađanjem, tvrdih (3 Al/PVC blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

PREDUCTAL MR - LES LABORATOIRES SERVIER

- △ Rp tableta s prilagođenim oslobađanjem [35 mg/1 tableta] 60 tableta s prilagođenim oslobađanjem (2 PVC/Al blistera po 30 tableta) u kutiji
- TRIMETACOR MR - LABORMED-PHARMA S.A.**
- △ Rp tableta s prilagođenim oslobađanjem [35 mg/1 tableta] 60 tableta s prilagođenim oslobađanjem (6 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

C01EB17 ivabradin

Doziranje: *terapija angine kod pacijenata sa normalnim sinusnim ritmom:* oralno, odrasli 18-74 god. početna doza 2,5-5 mg dnevno, povećati ukoliko je neophodno nakon 3-4 nedjelje na 7,5 mg 2 puta dnevno (ukoliko se ova doza ne podnosi smanjiti na 2,5-5 mg 2 puta dnevno); stariji, početna doza 2,5 mg 2 puta dnevno; *umjerena do jaka hronična srčana insuficijencija:* oralno, odrasli 18-74 god. početna doza 5 mg dnevno, povećati ukoliko je neophodno nakon 2 nedjelje na 7,5 mg 2 puta dnevno (ukoliko se ova doza ne podnosi smanjiti na 2,5-5 mg 2 puta dnevno); stariji, početna doza 2,5 mg 2 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IVABRADIN SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 Alu/Alu blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVdC blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC-Alu blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [7,5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 Alu/Alu blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [7,5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVdC blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [7,5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC-Alu blistera sa po 14 tableta), u kutiji

C01EB18 ranolazin

Doziranje: dodatna terapija kod liječenja stabilne angine pektoris kod pacijenata kod kojih nije postignuta kontrola ili nisu podnosili antianginalnu terapiju prvog izbora: odrasli preko 18 god, početna doza 375 mg dva puta dnevno, povećati nakon 2-4 nedjelje na 500 mg dva puta dnevno, a zatim podešavati prema odgovoru do maks. 750 mg dva puta dnevno (smanjiti dozu na 375-500 mg dva puta dnevno, ako se ne podnosi)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

RANEXA - BERLIN-CHEMIE AG

- Rp tableta sa produženim oslobađanjem [375 mg/1 tableta] 60 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/PVdC//Al blistera po 20 tableta), u kutiji
- Rp tableta sa produženim oslobađanjem [500 mg/1 tableta] 60 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/PVdC//Al blistera po 20 tableta), u kutiji
- Rp tableta sa produženim oslobađanjem [750 mg/1 tableta] 60 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/PVdC//Al blistera po 20 tableta), u kutiji

C01EB22 meldonium

Doziranje: *adjuvantno liječenje blage hronične srčane insuficijencije:* oralno, 500-1000 mg dnevno, podijeljeno u 2 dnevne doze, maks. 1000 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MYLDROX - AS GRINDEKS

Rp kapsula, tvrda [500 mg/1 kapsula] 60 kapsula, tvrdih (6 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

C02 **ANTIHIPERTENZIVI**
C02A **Antiadrenergici, centralnog djelovanja**
C02AB **Metildopa**

C02AB01 **metildopa**

Doziranje: *esencijalna hipertenzija, renalna hipertenzija, hipertenzija u trudnoći:* početna doza 250 mg 2-3 puta dnevno, povećavati postepeno u intervalima od 2 ili više dana, maks. 3 g dnevno; kod starijih početna doza 125 mg dva puta dnevno, povećavati postepeno, maks. 2 g dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

METHYLDOPA HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

△ Rp film tableta [250 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/PVdC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

C02AC **Agonisti imidazolskih receptora**

C02AC05 **moksonidin**

Doziranje: *hipertenzija:* početna doza 0,2 mg ujutro, nakon 3 sedmice doza se može povećati na 0,4 mg jednom dnevno ili podijeljeno u dvije doze, nakon 3 naredne sedmice doza se može povećati na maks. 0,6 mg dnevno podijeljeno u dvije doze (maks. pojedinačna doza 0,4 mg)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PHYSIOTENS - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

Rp film tableta [0.2 mg/1 tableta] 28 film tableta (1 PVC/PVDC/Al - blister sa 28 tableta), u kutiji

Rp film tableta [0.4 mg/1 tableta] 28 film tableta (1 PVC/PVDC/Al - blister sa 28 tableta), u kutiji

C02C **Antiadrenergici, perifernog djelovanja**
C02CA **Antagonisti alfa-adrenergičkih receptora**

C02CA01 **prazosin**

Doziranje: *hipertenzija:* početna doza 0,5 mg uveče prije spavanja (kako bi se izbjegao rizik posturalne hipotenzije), zatim 0,5-1 mg 2-3 puta na dan; ako je potrebno, poslije 3 do 5 dana doze se povećavaju postepeno do najviše 20 mg dnevno podijeljeno u nekoliko pojedinačnih doza; uobičajena doza održavanja: 6-15 mg na dan, podijeljeno u više pojedinačnih doza; stariji pacijenti, pacijenti sa renalnom i hepatičkom insuficijencijom, početna doza: 0,5 mg dnevno, koja se postepeno povećava do maksimalno 2 mg dnevno; *kongestivna srčana insuficijencija:* početna doza: 0,5-4 mg dnevno, podijeljeno u više pojedinačnih doza; doza održavanja: 4-20 mg dnevno, podijeljeno u više pojedinačnih doza; *benigna hipertrofija prostate:* početna doza: 0,5 mg 2 puta na dan tokom 3-7 dana, a kasnije prema stanju pacijenta; doza održavanja: 1-2 mg 2 puta na dan; *Rejnaudov sindrom:* početna doza 0,5 mg 2 puta dnevno, ukoliko je neophodno povećati nakon 3-7 dana do uobičajene doze održavanja 1-2 mg 2 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VASOFLEX - ALKALOID AD SKOPJE

- Rp tableta [1 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [2 mg/1 tableta] 60 tableta (6 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

C02CA04 doksazosin

Doziranje: *hipertenzija*: oralno, tablete sa trenutnim oslobađanjem, početna doza 1 mg uveče, na 2 nedjelje dozu duplirati do optimalne, maks. 16 mg dnevno; oralno, tablete sa produženim oslobađanjem, početna doza 4 mg, dozu podešavati nakon 4 nedjelje, po potrebi povećati na 8 mg jednom dnevno; *benigna hiperplazija prostate*: oralno, tablete sa trenutnim oslobađanjem, 1 mg dnevno, dozu povećavati u intervalu 1-2 nedjelje na maks. 8 mg dnevno, uobičajena doza održavanja 2-4 mg dnevno; tablete sa produženim oslobađanjem, početna doza 4 mg, dozu podešavati nakon 4 nedjelje, po potrebi povećati na 8 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ALFADOX - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO**

- Rp tableta [2 mg/1 tableta] 20 tableta (1 PVC/PVDC//Al blister) u kutiji
- Rp tableta [4 mg/1 tableta] 20 tableta (1 PVC/PVDC//Al blister) u kutiji

DOXAT - BOSNALIJEK D.D.

- Rp tableta [2 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [4 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

KAMIREN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta [2 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [4 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po10 tableta), u kutiji

TONOCARDIN - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- Rp tableta [2 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [4 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

C02CA06 urapidil

Doziranje: hipertenzivne krize, teški oblici hipertenzije (maligna hipertenzija), hipertenzija rezistentna na druge lijekove, kontrolisano snižavanje krvnog pritiska kod bolesnika s visokim pritiskom za vrijeme i/ili nakon operacije: 10-50 mg sporom i.v. inj. (po potrebi ponoviti) ili i.v. inf. 2 mg/min. u početku terapije, smanjivati prema odgovoru do uobičajene doze održavanja 9 mg/h, najduže 7 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:**UPADIL - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**

- △ ZU otopina za injekciju [25 mg/5 mL] 5 ampula sa po 5 ml otopine za injekciju, u kutiji
- △ ZU otopina za injekciju [50 mg/10 mL] 5 ampula sa po 10 ml otopine za injekcije, u kutiji

URAPIDIL CARINOPHARM 25 MG - CARINOPHARM GMBH

- △ ZU rastvor za injekciju [25 mg/5 mL] 5 ampula sa 5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

URAPIDIL CARINOPHARM 50 MG - CARINOPHARM GMBH

- △ ZU rastvor za injekciju [50 mg/10 mL] 5 ampula sa 10 ml rastvora za injekciju, u kutiji

C02K **Ostali antihipertenzivi**
C02KX **Antihipertenzivi za plućnu arterijsku hipertenziju**

C02KX01 **bosentan**

Doziranje: *pulmonalna arterijska hipertenzija:* oralno, odrasli početna doza 62,5 mg dva puta dnevno tokom 4 sedmice, zatim povećati na 125 mg dva puta dnevno; maks. 250 mg po dozi, maks. 500 mg dnevno; *sistemska skleroza i aktivna bolest ulceracija prstiju:* oralno, odrasli, početna doza 62,5 mg dva puta dnevno tokom 4 nedjelje, zatim povećati na 125 mg dva puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BOSENTAN PHARMASCIENCE - PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED

- Rp film tableta [125 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PCTFE/aluminijum blistera sa po 14 tableta), u kutiji
Rp film tableta [62,5 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PCTFE/aluminijum blistera sa po 14 tableta), u kutiji

DIAMOND - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

- Rp film tableta [125 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PVDC-Al blistera po 14 tableta), u kutiji
Rp film tableta [62,5 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PVDC-Al blistera po 14 film tableta), u kutiji

C02KX04 **macitentan**

Doziranje: *plućna arterijska hipertenzija:* oralno, odrasli 10 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MASIPAH - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 PVC/PE/PVDC-Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji

C02KX06 **sotatercept**

Doziranje: *plućna arterijska hipertenzija:* s.c. odrasli, početi sa 0,3 mg/kg u jednoj dozi (maks. po dozi 55 mg), za podešavanje doze ili prekid terapije zbog povećanja vrijednosti hemoglobina ili smanjenja broja trombocita - konsultovati informacije o lijeku; zatim doza održavanja 0,7 mg/kg svakih 3 nedjelje (maks. po dozi 120 mg), sa dozom održavanja treba početi 3 nedjelje nakon inicijalne doze, za podešavanje doze ili prekid terapije zbog povećanja vrijednosti hemoglobina ili smanjenja broja trombocita - konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

WINREVAIR - MERCK SHARP & DOHME BV

- ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [45 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom (1 x 45 mg), 1 napunjena šprica sa 1,0 ml rastvarača, 1 dozirna šprica sa graduacijskim oznakama od 0,1 ml, 1 nastavak za bočicu, 1 igla za injekciju i 4 alkoholna tupfera, u kutiji
ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [45 mg/1 bočica] 2 bočice sa praškom (2 x 45 mg), 2 napunjene šprice sa 1,0 ml rastvarača, 1 dozirna šprica sa graduacijskim oznakama od 0,1 ml, 2 nastavka za bočicu, 1 igla za injekciju i 8 alkoholnih tupfera, u kutiji
ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [60 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom (1 x 60 mg), 1 napunjena šprica sa 1,3 ml rastvarača, 1 dozirna šprica sa graduacijskim oznakama od 0,1 ml, 1 nastavak za bočicu, 1 igla za injekciju i 4 alkoholna tupfera, u kutiji
ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [60 mg/1 bočica] 2 bočice sa praškom (2 x 60 mg), 2 napunjene šprice sa 1,3 ml rastvarača, 1

dozirna šprica sa graduacijskim oznakama od 0,1 ml, 2 nastavka za bočicu, 1 igla za injekciju i 8 alkoholnih tupfera, u kutiji

C03 **DIURETICI**
C03A **Slabi diuretici, tiazidi**
C03AA **Tiazidi, monokomponentni**

C03AA03 **hidrohlorotiazid**

Doziranje: *arterijska hipertenzija:* 25-50 mg na dan, jedanput na dan ili podijeljena u dvije pojedinačne doze, doza održavanja obično je 12,5-25 mg na dan; *kongestivna srčana slabost i edemi različite etiologije:* početna doza je 25-75 mg na dan aplicirana kao pojedinačna doza ili podijeljena u dvije pojedinačne doze; početna doza se može povećati, a doze veće od 100 mg ne dovode do značajnih poboljšanja efekta; nakon početnog poboljšanja, doza održavanja je 25 mg na dan, a nekad i svaki drugi dan; *nefrogeni dijabetes insipidus:* početna doza je 100 mg podijeljena u 2-4 pojedinačne doze, kasnije se doza može smanjiti; *idiopatska hiperkalciurija i profilaksa formiranja kalcijumovih kalkulusa:* 25-50 mg, dva puta na dan; doziranje kod djece: *hipertenzija, kongestivna srčana slabost, edemi:* uobičajena dnevna doza 1-2 mg/kg kao pojedinačna doza ili podijeljena u dvije pojedinačne doze; dnevna doza ne smije biti veća od 100 mg kod djece uzrasta od 2-12 godina; *nefrogeni dijabetes insipidus:* iskustva sa doziranjem kod ove indikacije u dječjem uzrastu su vrlo mala, ljekar treba dozu da odredi na osnovu individualne reakcije; *hiperkalciurija:* uobičajene doze su 1-2 mg/kg na dan; doziranje kod starijih ljudi: početne doze treba da budu male (12,5-25 mg) i titriranje doze treba sprovesti sporije nego kod mlađih pacijenata.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DIUNORM - SLAVIAMED D.O.O. BEOGRAD

Rp tableta [25 mg/1 tableta] 20 tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

HIDROHLOTIAZID ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

Rp tableta [25 mg/1 tableta] 20 tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji

C03B **Slabi diuretici, isključujući tiazide**
C03BA **Sulfonamidi, monokomponentni**

C03BA11 **indapamid**

Doziranje: *esencijalna hipertenzija:* oralno, lijekovi sa trenutnim oslobađanjem, odrasli 2,5 mg dnevno, najbolje ujutro; oralno, lijekovi sa produženim oslobađanjem, 1,5 mg dnevno, najbolje ujutro

REGISTROVANI LIJEKOVI:

INDAP - PRO.MED.CS PRAHA A.S.

Rp kapsula, tvrda [2.5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 Alu/PVC blistera po 10 kapsula) u kutiji

INDAPAMID LABORMED - LABORMED-PHARMA S.A.

Rp tableta sa produženim oslobađanjem [1.5 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta) u kutiji

INDAPRES - HEMOFARM A.D. VRŠAC

Rp film tableta [2.5 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

C03C Snažni diuretici (diuretici Henleove petlje)
C03CA Sulfonamidi, monokomponentni

C03CA01 furosemid

Doziranje: *edemi:* odrasli, oralno-početna doza 40 mg dnevno, ujutro, doza održavanja 20-40 mg dnevno; početno davanje i.m.inj. ili spora i.v.inj. ili i.v.inf., odrasli, početna doza 20-50 mg, povećavati ukoliko je neophodno za 20 mg svaka 2 sata; ako su potrebne veće doze od 50 mg preporučuje se da se daju u vidu i.v. inf; maks. 1,5 g dnevno; *rezistentni edem:* oralno, odrasli 80-120 mg dnevno; početno davanje i.m.inj. ili spora i.v.inj. ili i.v.inf., odrasli, početna doza 20-50 mg, povećavati ukoliko je neophodno za 20 mg svaka 2 sata; ako su potrebne veće doze od 50 mg preporučuje se da se daju u vidu i.v. inf; maks. 1,5 g dnevno; *rezistentna hipertenzija:* oralno, odrasli 40 mg dnevno, doza održavanja 20 mg dnevno ili 40 mg svaki drugi dan, maks. 80 mg dnevno; početno davanje i.m.inj. ili spora i.v.inj. ili i.v.inf. odrasli, početna doza 20-50 mg, povećavati ukoliko je neophodno za 20 mg svaka 2 sata; ako su potrebne veće doze od 50 mg preporučuje se da se daju u vidu i.v. inf; maks. 1,5 g dnevno; djeca 1-3 mg/kg, maks. 40 mg dnevno; parenteralno, djeca 0,5-1,5 mg/kg, maks. 20 mg dnevno;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EDEMID - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Rp tableta [40 mg/1 tableta] 12 tableta u staklenoj bočici, u kutiji
ZU rastvor za injekciju [20 mg/2 mL] 5 ampula po 2 ml rastvora za
 injekciju, u kutiji

EDEMID FORTE - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Rp tableta [500 mg/1 tableta] 20 tableta u staklenoj bočici, u kutiji

ENTIX - LABORATORIOS BASI-INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.

ZU rastvor za injekciju/ infuziju [20 mg/1 ampula] 50 ampula sa po 2 ml
 rastvora za injekciju/ infuziju (5 PVC blistera sa po 10 ampula), u
 kutiji

FUROMID - DEVA HOLDING A.S.

ZU rastvor za injekciju [20 mg/2 mL] 5 ampula po 2 ml rastvora za
 injekciju, u kutiji

FUROSEMIDE REMEDICA - REMEDICA LIMITED

Rp tableta [40 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al - blistera po 10
 tableta) u kutiji

**FUROSEMIDE-DARNYTSIA - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"PHARMACEUTICAL FIRM DARNYTSIA"**

ZU rastvor za injekciju/ infuziju [10 mg/1 mL] 10 staklenih ampula (tip I)
 sa 2 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

FURSEMID - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp tableta [40 mg/1 tableta] 20 tableta (1 PVC/Al blister sa 20 tableta)
 u kutiji

FURSEMID FORTE - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp tableta [500 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10
 tableta) u kutiji

LODIX - BOSNALIJEK D.D.

Rp tableta [40 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/Al blister) u kutiji

LODIX FORTE - BOSNALIJEK D.D.

Rp tableta [500 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blister sa po 10
 tableta), u kutiji

C03CA04 torasemid

Doziranje: *edemi:* 5 mg, jednom dnevno (ujutro), ukoliko je neophodno povećati do 20 mg jedanput dnevno, uobičajeno maks. 40 mg dnevno; *hipertenzija:* 2,5 mg dnevno, povećati ukoliko je neophodno na 5 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**MEROT - BOSNALIJEK D.D.**

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

TOMID - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC//Al blistera po 15 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (1 PVC//Al blister sa 30 tableta), u kutiji

TOREM - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

C03D Diuretici koji štede kalijum**C03DA Antagonisti aldosterona****C03DA01 spironolakton**

Doziranje: *edem i kongestivna srčana insuficijencija:* početna doza 100 mg (raspon doza 25-200 mg) dnevno, u jednoj ili u podijeljenim dozama; dozu održavanja podesiti prema odgovoru; *edem i ascites u cirozi jetre:* 100-400 mg dnevno, podešavati prema odgovoru; *umjerena do teška srčana insuficijencija (dodatak terapiji):* početna doza 25 mg jednom dnevno, zatim podešavati prema odgovoru do 50 mg jednom dnevno; *ciroza jetre sa edemima i ascitesom:* 100-400 mg dnevno, podesiti prema odgovoru; *ascites kod malignih oboljenja:* početna doza 100-200 mg dnevno, povećavati do 400 mg, ukoliko je neophodno; dozu održavanja podesiti prema odgovoru; *nefrotski sindrom:* 100-200 mg dnevno; *esencijalna hipertenzija:* 50-100 mg dnevno, a za teške i strogo ograničene slučajeve se može postepeno povećavati tokom intervala od dvije nedjelje do 200 mg; terapija se može nastaviti još dvije nedjelje ili duže, ukoliko je izostao adekvatan odgovor; *primarni hiperaldosteronizam:* terapija-kod pacijenata koji čekaju operaciju, 100-400 mg dnevno; dugotrajno održavanje ukoliko operacija nije moguća, upotrebljavaju se najmanje efektivne doze; dijagnostika-kratki test: 400 mg dnevno tokom 4 dana, dugi test 400 mg dnevno tokom 3-4 nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ALDACTONE - KERN PHARMA S.L.**

- Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 10 kapsula) u kutiji
- Rp obložena tableta [25 mg/1 tableta] 20 obloženih tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp obložena tableta [50 mg/1 tableta] 20 obloženih tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

SPILAK - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- Rp film tableta [25 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/Alu blistera po 10 film tableta), u kutiji
- Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji

SPIRONOLAKTON GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- Rp tableta [100 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [25 mg/1 tableta] 40 tableta (4 Alu/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

SPYLACTON - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Š.

- Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 40 filmom obloženih tableta (4 PVC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 40 filmom obloženih tableta (4 PVC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji

C03DA01 spironolakton

Doziranje: *edem i kongestivna srčana insuficijencija:* početna doza 100 mg (raspon doza 25-200 mg) dnevno, u jednoj ili u podijeljenim dozama; dozu održavanja podesiti prema odgovoru; *edem i ascites u cirozi jetre:* 100-400 mg dnevno, podešavati prema odgovoru; *umjerena do teška srčana insuficijencija* (dodatak terapiji): početna doza 25 mg jednom dnevno, zatim podešavati prema odgovoru do 50 mg jednom dnevno; *ciroza jetre sa edemima i ascitesom:* 100-400 mg dnevno, podesiti prema odgovoru; *ascites kod malignih oboljenja:* početna doza 100-200 mg dnevno, povećavati do 400 mg, ukoliko je neophodno; dozu održavanja podesiti prema odgovoru; *nefrotski sindrom:* 100-200 mg dnevno; *esencijalna hipertenzija:* 50-100 mg dnevno, a za teške i strogo ograničene slučajeve se može postepeno povećavati tokom intervala od dvije nedjelje do 200 mg; terapija se može nastaviti još dvije nedjelje ili duže, ukoliko je izostao adekvatan odgovor; *primarni hiperaldosteronizam:* terapija-kod pacijenata koji čekaju operaciju, 100-400 mg dnevno; dugotrajno održavanje ukoliko operacija nije moguća, upotrebljavaju se najmanje efektivne doze; dijagnostika-kratkotest: 400 mg dnevno tokom 4 dana, dugi test 400 mg dnevno tokom 3-4 nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALDACTONE - KERN PHARMA S.L.

- Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/Alu blistera po 10 kapsula) u kutiji
- Rp obložena tableta [25 mg/1 tableta] 20 obloženih tableta (2 PVC/Alu blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp obložena tableta [50 mg/1 tableta] 20 obloženih tableta (2 PVC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji

SPILAK - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- Rp film tableta [25 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/Alu blistera po 10 film tableta), u kutiji
- Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji

SPIRONOLAKTON GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- Rp tableta [100 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [25 mg/1 tableta] 40 tableta (4 Alu/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

SPYLACTON - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ş.

- Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 40 filmom obloženih tableta (4 PVC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 40 filmom obloženih tableta (4 PVC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji

C03DA04 eplerenon

Doziranje: dodatak standardnoj terapiji u stabilnih bolesnika s disfunkcijom lijeve komore i kliničkim znacima srčane insuficijencije nakon nedavno preboljelog infarkta miokarda (terapiju započeti unutar 3-14 dana nakon akutnog infarkta miokarda); dodatak standardnoj optimalnoj terapiji u svrhu smanjenja rizika od kardiovaskularnog mortaliteta i morbiditeta kod pacijenata sa hroničnom srčanom insuficijencijom NYHA klase II i sistolnom disfunkcijom lijeve komore (LVEF): početi sa 25 mg jednom dnevno, povećavati tokom 4 sedmice do 50 mg jednom dnevno, za više informacija o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:**EPLECOR - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO**

- Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

INSPIRA - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- Rp film tableta [25 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

REPPLE - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

C03DA05 finerenone

Doziranje: hronična bubrežna bolest (sa albuminurijom) povezana sa dijabetesom tipa 2 kod odraslih: 20 mg jednom dnevno, za prilagođavanje doze i prekid u skladu sa nivoima kalijuma u serumu - pogledajte informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:**KERENDIA - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**

Rp	filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa 14 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa 14 tableta), u kutiji

C03E *Kombinacije diuretika koji štede kalijum sa ostalim diureticima*

C03EA *Slabi diuretici i diuretici koji štede kalijum*

C03EA01 amilorid, hidrohlorotiazid

Doziranje: *arterijska hipertenzija:* početna doza 1 tbl, po potrebi povećati na 1 tbl. dnevno; *kongestivna srčana insuficijencija:* početna doza 1 tableta dnevno, po potrebi može se povećati na 2 tbl. dnevno; *ciroza jetre sa ascitesom:* početna doza je 1 tbl. dnevno, povećavati do postizanja potrebne diureze, maks. do 2 tbl. dnevno; kad se stanje stabilizuje, dozu treba smanjiti.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

**HEMOPRES - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.
BANJA LUKA**

Rp	tableta [5 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 40 tableta (4 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

C04 *PERIFERNI VAZODILATATORI*

C04A *Periferni vazodilatatori*

C04AD *Derivati purina*

C04AD03 pentoksifilin

Doziranje: *periferna vaskularna oboljenja:* oralno, 400 mg 2-3 puta dnevno poslije jela; parenteralno, intravenska i intraarterijska primjena: 100 mg/dan u ležećem položaju, tokom 5 min; i.v. inf: početna doza 100 mg u 250 ml fiziološkog rastvora u toku 90-180 min. doza održavanja 30-50 mg na sat, ukupna dnevna doza 800-1200 mg; kod vrlo teških stanja infuzija treba da traje 24 sata (treba početi sa dozom od 0,6 mg/kg tjelesne mase/čas), ukupna dnevna doza 1200 mg; injekcija intravenska ili intraarterijska, 100 mg se ubrizga sporo (tokom perioda dužeg od 5 min.)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DAMATON - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp	tableta sa produženim oslobađanjem [400 mg/1 tableta] 20 tableta sa produženim oslobađanjem (2 PVC//ALU/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji

PENTILIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp	tableta s produženim oslobađanjem [400 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
ZU	otopina za injekciju/ infuziju [100 mg/5 mL] 5 ampula sa po 5 mL otopine za injekciju/ infuziju, u kutiji

C05 **VAZOPROTEKTIVI**
C05A **Antihemoroidalni lijekovi za liječenje hemoroida i analnih raskuplina za lokalnu primjenu**

C05AA **Kortikosteroidi**

C05AA01 **hidrokortizon, lidokain**

Doziranje: pruritus u analnom i perianalnom predjelu, hemoroidalni bol i inflamacije, fisure analnog predjela, fistule, proktitis: rektalna primjena, u tankom sloju, nekoliko puta u toku dana, prema potrebi, a najduže u kontinuitetu 3 nedjelje; ako je potrebno liječenje duže od 3 nedjelje, potrebno je napraviti pauzu; dnevna doza ne treba prelaziti količinu od 6 g masti (oko 1/3 tube).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LIDOPROCT - BOSNALIJEK D.D.

BRp rektalna mast [2.5 mg/1 g+ < 50 mg/1 g] alu-tuba sa 20 g rektalne masti, u kutiji

C05AX **Ostali lijekovi za liječenje hemoroida i analnih raskuplina za lokalnu primjenu**

C05AX **lidokain, nifedipin**

Doziranje: hemoroidi, analne fisure (regade) i druga proktološka oboljenja povezana sa hipertrofijom analnih sfinktera: endorektalno i perianalno, 1 doza 1 cm kreme

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ANTROLIN - BIONIKA PHARMACEUTICALS D.O.O. SKOPLJE

Rp rektalna krema [1.5 g/100 g+ 0.3 g/100 g] 1 aluminijumska tuba sa 30 g rektalne kreme i 1 aplikator (PE) , u kutiji

C05AX03 **cinchokain, polikrezulen**

Doziranje: hemoroidi, sa pratećim zapaljenskim promjenama i sa krvarenjem, analne fisure, ragade, pruritus, analni ekcemi, liječenje rana nakon proktoloških operacija: mast 2-3 puta dnevno namazati u tankom sloju; supozitorije 1-2 u toku dana i 1 prije spavanja

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FAKTU - ORIFARM GENERICS A/S

BRp mast [10 mg/1 g+ 50 mg/1 g] 1 Alu tuba sa 20 g masti i aplikatorom, u kutiji

BRp supozitorija [2,5 mg/1 supozitorija+ 100 mg/1 supozitorija] 10 supozitorija (2 PVC/PE stripa sa po 5 supozitorija), u kutiji

C05AX03 **ihtamol, mentol, monohlorkarvakrol**

Doziranje: spoljašnji i unutrašnji hemoroidi, analne fisure, svrab u analnoj regiji: rektalna mast, 3 puta dnevno, kao i poslije svake stolice (kod spoljašnjih promjena mast se nanosi na oboljelo područje, a kod unutrašnjih hemoroida i fisura aplikuje se pomoću priložene kanile); unutrašnji hemoroidi, analne fisure, svrab u analnoj regiji: supozitorije, 1-2 puta dnevno, ujutro i uveče; obično je lokalna terapija hemoroida dugotrajna; ako se simptomi ne poboljšaju nakon 5 dana, treba uzeti u obzir druge načine liječenja

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HÄDENSA - MERZ PHARMA AUSTRIA GMBH

BRp supozitorija [4 mg/1 supozitorija+ 50 mg/1 supozitorija+ 1 mg/1 supozitorija] 5 supozitorija (1 blister sa 5 supozitorija), u kutiji

C05B **Antivarikozna terapija**
C05BA **Heparin ili heparinoidi za lokalnu primjenu**

C05BA03 **heparin**

Doziranje: tromboflebitis, prevarikozni sindrom, postflebitički sindrom, ulkus kruris; sportske i druge povrede (hematomi, iščašenja, uganuća); burzitis, tendovaginitis: mast ili gel 2-3 puta dnevno nanijeti na oboljelo mjesto i blago utrljati

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HEPALPAN - GALENIKA A.D. BEOGRAD

BRp gel [300 i.j./1 g] 40 g gela (1 alu-tuba sa 40 g gela) u kutiji
BRp krem [300 i.j./1 g] 40 g krema (1 alu-tuba sa 40 g krema) u kutiji

HEPALPAN 1000 - GALENIKA A.D. BEOGRAD

BRp gel [1000 i.j./1 g] 1 tuba sa 40 g gela u kutiji

HEPATHROMBIN - HEMOFARM A.D. VRŠAC

BRp gel [1000 i.j./1 g] 1 Al-tuba sa 40 g gela u kartonskoj kutiji
BRp gel [300 i.j./1 g] 40 g gela (Al-tuba sa 40 g gela) u kutiji
BRp gel [500 i.j./1 g] 40 g gela (Al-tuba sa 40 g gela) u kutiji
BRp krem [300 i.j./1 g] 40 g krema (Al-tuba sa 40 g krema) u kutiji
BRp krem [500 i.j./1 g] 40 g krema (Al-tuba sa 40 g krema) u kutiji

LIOTON 1000 - BERLIN-CHEMIE AG

BRp gel [1000 i.j./1 g] 1 Al tuba sa 20 g gela, u kutiji
BRp gel [1000 i.j./1 g] 1 Al tuba sa 30 g gela, u kutiji
BRp gel [1000 i.j./1 g] 1 Al tuba sa 50 g gela, u kutiji

C05BA53 **dekspantenol, dimetilsulfoksid, heparin**

Doziranje: *oboljenje vena, hematomi, uganuća:* 2 puta dnevno nanijeti gel na oboljelo mjesto bez utrljavanja; poslije primjene gela površinu kože ne treba pokrivati zavojem.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SINEDOL - HEMOFARM A.D. VRŠAC

BRp gel [25 mg/1 g+ 150 mg/1 g+ 500 i.j./1 g] Al - tuba sa 40 g, u kutiji

C05BA53 **dekspantenol, heparin**

Doziranje: *površinski tromboflebitis* (adjuvantna terapija), *površinske povrede mekih tkiva nastale tupom traumom (modrice, hematomi, nagnječenja):* nanosi se u tankom sloju na zahvaćeno područje, 2-4 puta na dan, bez utrljavanja u kožu; po potrebi površina se prekrije gazom i povije; trajanje terapije najčešće 1-2 nedjelje, a u ozbiljnijim slučajevima i više nedjelja; duža upotreba treba da bude pod lječarskim nadzorom.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BOSTROMBIN - BOSNALIJEK D.D.

BRp gel [2.5 mg/1 g+ 500 i.j./1 g] 1 Al - tuba sa 40 g gela i zatvaračem, u kutiji

HEPAN GEL - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

BRp gel [5 mg/1 g+ 500 i.j./1 g] Al - tuba sa 50 g gela, u kutiji

C05BA53 **escin, esencijalni fosfolipidi, heparin**

Doziranje: hronična venska insuficijencija; varikozne vene; superficijalni (površinski) tromboflebitis; dijabetička mikroangiopatija; venske ulceracije; kod povreda mekih tkiva uključujući i sportske povrede (istegnuća/uganuća i kontuzije): gel nanijeti u tankim slojevima 2-3 puta dnevno na zahvaćena područja

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VENOSAN - BOSNALIJEK D.D.

BRp gel [10 mg/1 g+ 10 mg/1 g+ 100 i.j./1 g] 40 g gela u Al-tubi, u kutiji

BRp gel [10 mg/1 g+ 10 mg/1 g+ 100 i.j./1 g] 80 g gela u Al-tubi, u kutiji

C05C **Vazoprotektivi** **C05CA** **Bioflavonoidi**

C05CA03 **diosmin**

Doziranje: *hronična venska insuficijencija:* 500-1000 mg u jednoj ili u dvije odvojene doze, liječenje mora trajati najmanje 4-5 nedjelja; *akutni hemoroidi:* tokom prva četiri dana liječenja dnevna doza je 3000 mg, podijeljeno u 2 doze; tokom sljedeća tri dana dnevna doza je 2000 mg, podijeljeno u dvije doze; doza održavanja je 1000 mg, podijeljeno u dvije doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FLEBAVEN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- BRp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji
- BRp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 60 tableta (4 PVC/PVDC/Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji
- BRp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 90 tableta (6 PVC/PVDC/Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji
- Rp tableta [1000 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [1000 mg/1 tableta] 60 tableta (6 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

FLEVENOL - LABORATORIOS CINFA S.A.

- BRp film tableta [500 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

PHLEBODIA - LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL

- BRp film tableta [600 mg/1 tableta] 15 film tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji
- BRp film tableta [600 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

C05CA04 **trokserutin**

Doziranje: simptomatsko liječenje insuficijencije venske i limfne cirkulacije, naročito u donjim ekstremitetima (osjećaj težine u nogama, bol, noćni grčevi, proširene vene na nogama), posttrombotički sindrom, varikozni čirevi (sa elastičnim povezom), ublažavanje simptoma povezanih s hemoroidima (otok rektalnog područja, svrbež, krvarenje, curenje); oralno, 300 mg 3 puta dnevno do povlačenja simptoma; terapija održavanja 300 mg dnevno 3-4 sedmice; terapija treba da traje najmanje 2-4 nedjelje; uzima se sa hranom; u kompleksnoj terapiji dijabetičke retinopatije: 1800-3000 mg u dvije podijeljene doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AVARICON - PHARMANOVA D.O.O.

- BRp kapsula, tvrda [300 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 kapsula) , u kutiji

C05CA53 **diosmin, hesperidin**

Doziranje: *simptomatsko liječenje hronične venske insuficijencije:* 2 puta dnevno 450 mg/50 mg dnevno (ujutro i uveče), ili jednom dnevno 900 mg/100 mg; *akutni hemoroidalni sindrom kod odraslih:* tri puta dnevno 900mg/100mg prva četiri dana, a sljedeća tri dana dva puta dnevno 900 mg/100 mg, doza održavanja dva puta dnevno 900 mg/100 mg, terapija traje do 7 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DETRALEX - LES LABORATOIRES SERVIER

- BRp filmom obložena tableta [450 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
- BRp filmom obložena tableta [450 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (4 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [450 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 120 filmom obloženih tableta (8 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [450 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 90 filmom obloženih tableta (6 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

FLAVOTHROMBIN FORTE - STADA ARZNEIMITTEL AG

- Rp tableta [900 mg/1 tableta+ 100 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

VENOSMIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- BRp tableta [900 mg/1 tableta+ 100 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ZEFLAVON - EXTRACTUMPHARMA CO LTD.

- Rp film tableta [900 mg/1 tableta+ 100 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Alu blistera sa 10 film tableta), u kutiji

C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA

C07A Blokatori beta-adrenergičkih receptora

C07AA Blokatori beta-adrenergičkih receptora, neselektivni

C07AA05 propranolol

Doziranje: hipertenzija: početna doza 80 mg 2 puta dnevno, povećavati je u nedeljnim intervalima do doze održavanja 160-320 mg dnevno; angina pectoris: početna doza 40 mg 2-3 puta dnevno, doza održavanja 120-240 mg dnevno, maks. do 320 mg dnevno; aritmije, hipertrofična kardiomiopatija, tireotoksikoza: 10-40 mg 3-4 puta dnevno; profilaksa poslije infarkta miokarda: 40 mg 4 puta dnevno tokom 2-3 dana, zatim 80 mg 2 puta dnevno, počev od 5. do 21. dana nakon infarkta; profilaksa migrene: 80-240 mg dnevno u podijeljenim dozama; esencijalni tremor: inicijalno 40 mg 2-3 puta dnevno, doza održavanja 80-160 mg dnevno; anksioznost sa simptomima kao što su palpitacija, znojenje i tremor: 40 mg jednom dnevno, zatim po potrebi povećati na 40 mg 3 puta dnevno; feohromocitom (samo sa alfa blokatorom): 60 mg dnevno u toku 3 dana prije operacije ili 30 mg dnevno u inoperabilnim slučajevima; profilaksa varikoznih krvarenja kod portne hipertenzije: početna doza 40 mg 2 puta dnevno, doza se može povećati na 80 mg 2 puta dnevno prema frekvenci srca, maksimalno 160 mg 2 puta dnevno. Djeca: aritmije, feohromocitom, tireotoksikoza: 0,25-0,5 mg/kg 3-4 puta dnevno; profilaksa migrene: za djecu mlađu od 12 god. 20 mg 2-3 puta dnevno, za deju stariju od 12 god, doziranje kao kod odraslih; tetralogija falo: doza zavisi od smanjenja opstrukcije izlaznog trakta desne komore; doziranje je individualno i navedene doze služe samo kao smjernica, oralno: do 1 mg/kg 3-4 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PROPRANOLOL GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- Rp tableta [40 mg/1 tableta] 50 tableta (5 Alu/PVC-PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

C07AA07 sotalol

Doziranje: *aritmije opasne po život uključujući ventrikularne tahiaritmije; supraventikularne aritmije (profilaksa ozbiljne supraventikularne tahiaritmije, održavanje normalnog sinusnog ritma nakon konverzije atrijalne fibrilacije ili treperenja atrija):* oralno, odrasli početna doza 80 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze, povećavati postepeno u intervalima od 2-3 dana do uobičajene doze 160-320 mg dnevno u 2 podijeljene doze; više doze od 480-640 mg dnevno primjenjuju se u tretmanu po život opasnih ventrikularnih aritmija pod supervizijom ljekara specijaliste

REGISTROVANI LIJEKOVI:**DAROB MITE - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH**

Rp tableta [80 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

C07AB Blokatori beta-adrenergičkih receptora, selektivni**C07AB02 metoprolol**

Doziranje: oralno, *hipertenzija:* tablete sa trenutnim oslobađanjem-početna doza 100 mg dnevno, povećavati ukoliko je neophodno do 200 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze; maks. 400 mg dnevno (ali visoke doze su rijetko potrebne); tablete sa modifikovanim oslobađanjem-200 mg jednom dnevno; *angina pectoris:* tablete sa trenutnim oslobađanjem-50-100 mg 2-3 puta dnevno; tablete sa modifikovanim oslobađanjem- 200-400 mg jednom dnevno; *aritmije:* tablete sa trenutnim oslobađanjem-uobičajeno 50 mg 2-3 puta dnevno; povećati na 300 mg dnevno u podijeljenim dozama ukoliko je neophodno; *profilaksa migrene:* tablete sa trenutnim oslobađanjem-100-200 mg dnevno u podijeljenim dozama; tablete sa modifikovanim oslobađanjem-200 mg jednom dnevno; *hipertireoidizam* (dodatak terapiji): 50 mg 4 puta dnevno; *infarkt miokarda:* 50 mg na svakih 6 sati u toku 48 sati, a najbolje u toku 12 sati poslije pojave prvih simptoma; terapija održavanja 200 mg dnevno u podijeljenim dozama; *funkcionalni poremećaji srca povezani sa lupanjem srca:* uobičajeno 50 mg 2 puta dnevno, po potrebi doza se može povećati na 100 mg 2 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**BLOXAN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO**

Rp tableta [100 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

CORVITOL 100 - BERLIN-CHEMIE AG

Rp tableta [100 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

CORVITOL 50 - BERLIN-CHEMIE AG

Rp tableta [50 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

MATHADOR - BOSNALIJEK D.D.

Rp tableta [100 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVdC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [50 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVdC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

MEKSENA - ALKALOID AD SKOPJE

Rp film tableta [100 g/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

METOCOR - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

Rp	tableta [100 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/ALU blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [50 mg/1 tableta] 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
PRESOLOL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA	
Rp	film tableta [100 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [50 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/Al blistera sa po 14 film tableta) u kutiji
Rp	film tableta [50 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/Al blistera sa po 14 film tableta) u kutiji

C07AB03 atenolol

Doziranje: hipertenzija: 25-50 mg dnevno (više doze su rijetko potrebne); *angina pectoris*: 100 mg dnevno u 1 ili 2 doze; *aritmije*: 50-100 mg jedanput dnevno ili podijeljeno u 2 doze; *infarkt miokarda-rana intervencija u akutnoj fazi*: konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AMINOL - BOSNALIJEK D.D.

Rp	tableta [50 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

ATENOLOL REMEDICA - REMEDICA LIMITED

Rp	film tableta [100 mg/1 tableta] 14 film tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji
Rp	film tableta [50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

ORMIDOL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp	filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC/Al blister), u kutiji

PRINORM - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp	tableta [100 mg/1 tableta] 14 tableta (2 blistera od ALU/PVC trake i tvrde PVC trake po 7 tableta), u kutiji

C07AB07 bisoprolol

Doziranje: hipertenzija, *angina pectoris*: oralno, odrasli, uobičajeno 10 mg jednom dnevno (5 mg može biti dovoljno kod nekih pacijenata), maks. 20 mg dnevno; *dodatak terapiji hronične srčane insuficijencije*: oralno, odrasli, početna doza 1,25 mg jednom dnevno (ujutro) tokom nedjelju dana, zatim ukoliko je podnošljivost dobra povećati na 2,5 mg jednom dnevno tokom jedne nedjelje, zatim 3,75 mg jednom dnevno tokom jedne nedjelje, zatim 5 mg jednom dnevno tokom 4 nedjelje, zatim 7,5 mg dnevno tokom 4 nedjelje, zatim 10 mg jednom dnevno; maks. 10 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BIPRESSO - ALKALOID AD SKOPJE

Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [2.5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

BISOCOR - KWIZDA PHARMA GMBH

Rp	tableta [5 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 60 tableta (6 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

BISOPROLOL GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

BISOPROLOL HF - STADA ARZNEIMITTEL AG

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3oPA/Alu/PVC//Alu blistera sa 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [2,5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 oPA/Alu/PVC//Alu blistera sa 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [3,75 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 oPA/Alu/PVC//Alu blistera sa 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3oPA/Alu/PVC//Alu blistera sa 10 tableta), u kutiji

BLOCOR - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji

BYOL - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 Al/Al/OPA/PVC blistera po 15 filmom obloženih tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera po 14 filmom obloženih tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera po 15 filmom obloženih tableta), u kutiji

CARDIOL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (1 Al/PVC/PVdC blister sa 30 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta] 30 tableta (1 Al/PVC/PVdC blister sa 30 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (1 Al/PVC/PVdC blister sa 30 tableta), u kutiji

CONCOR - MERCK HEALTHCARE KGAA

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji
- Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji

CONCOR COR - MERCK HEALTHCARE KGAA

- Rp film tableta [1,25 mg/1 tableta] 30 film tableta (1 PVC/Al blister sa 30 film tableta), u kutiji
- Rp film tableta [2,5 mg/1 tableta] 30 film tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji
- Rp film tableta [3,75 mg/1 tableta] 30 film tableta (1 PVC/Al blister sa 30 film tableta), u kutiji

PRESONAT - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta, (3 Al/PVC/PVdC blister sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC/PVdC blistera sa po 10 tableta) u kutiji

- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC/PVdC bliser sa po 10 tableta), u kutiji
- PROBILOL - BOSNALIJEK D.D.**
- Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- SOBYCOR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO**
- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [2.5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera po 15 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera po 15 tableta), u kutiji
- TENSEC - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA**
- Rp film tableta [1,25 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [2,5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [3,75 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

C07AB12 nebivolol

Doziranje: *hipertenzija:* 5 mg dnevno; stariji, početna doza 2,5 mg dnevno, povećavati ukoliko je neophodno do 5 mg dnevno; kod pacijenata sa oštećenjem bubrega preporučena početna doza iznosi 2,5 mg dnevno, zatim ukoliko je potrebno dnevna doza se povećava na 5 mg dnevno; *dodatak terapiji stabilne blage do umjerene srčane insuficijencije kod bolesnika preko 70 godina:* početna doza 1,25 mg jednom dnevno, zatim povećavati u intervalima od 1-2 nedjelje do 2,5 mg jednom dnevno, pa zatim na 5 mg jednom dnevno, i do maks. 10 mg jednom dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

- BARIOS - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA**
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 28 tableta (4 PVC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji
- CORRIGO - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.**
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC-Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- MASSIDO - ALKALOID AD SKOPJE**
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 28 tableta (2 Al/PVC blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- NEBICOR - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO**
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/PE/PVdC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- NEBIGAL - GALENIKA A.D. BEOGRAD**
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- NEBILET - BERLIN-CHEMIE AG**

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/Al blistera po 14 tableta) u kutiji

NIBEL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 28 tableta (4 OPA/Al/PVC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji

C07AG Blokatori alfa- i beta-adrenergičkih receptora

C07AG02 karvedilol

Doziranje: *hipertenzija:* početna doza 12,5 mg jednom dnevno; nakon 2 dana povećati do uobičajene doze od 25 mg jednom dnevno; ukoliko je neophodno doza se može dalje povećavati u intervalima od najmanje 2 nedjelje do maks. 50 mg dnevno u pojedinačnoj dozi ili u podijeljenim dozama, kod starijih pacijenata početna doza od 12,5 mg može dovesti do zadovoljavajuće kontrole; *angina pectoris:* početna doza 12,5 mg 2 puta dnevno; povećati nakon 2 dana na 25 mg 2 puta dnevno; *dodatak diureticima, digoksinu ili ACE inhibitorima u simptomatskoj hroničnoj srčanoj insuficijenciji:* početna doza 3,125 mg 2 puta dnevno, doziranje se postepeno udvostručuje svakih 14 dana, doza održavanja je 25 mg 2 puta dnevno; povećati na najvišu doza koja se podnosi, maks. 25 mg 2 puta dnevno kod pacijenata sa ozbiljnom srčanom insuficijencijom ili tjelesnom masom manjom od 85 kg i 50 mg 2 puta dnevno kod pacijenata preko 85 kg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CARVELOL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp tableta [12.5 mg/1 tableta] 30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 30 tableta), u kutiji
 Rp tableta [25 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa po 15 tableta) u kutiji
 Rp tableta [3.125 mg/1 tableta] 30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 30 tableta) u kutiji
 Rp tableta [6.25 mg/1 tableta] 30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister od 30 tableta) u kutiji

CORONIS - BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Rp tableta [12,5 mg/1 tableta] 28 tableta (2 Al/PVC/PVDC blistera po 14 tableta), u kutiji
 Rp tableta [6,25 mg/1 tableta] 28 tableta (2 Al/PVC/PVDC blistera po 14 tableta), u kutiji

CORYOL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp tableta [12,5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
 Rp tableta [25 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
 Rp tableta [6.25 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

DILATREND - BOSNALIJEK D.D.

Rp tableta [12.5 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/Al blistera po 14 tableta) u kutiji
 Rp tableta [25 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/Al blister po 14 tableta) u kutiji
 Rp tableta [6.25 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/Al blistera po 14 tableta) u kutiji

KARVEDIOL REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE

Rp tableta [12.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp	tableta [6.25 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
MILENOL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA	
Rp	tableta [12.5 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kartonskoj kutiji
Rp	tableta [25 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kartonskoj kutiji
Rp	tableta [6.25 mg/1 tableta] 28 tableta (4 OPA/Al/PVC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji
VEDICOR - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.	
Rp	tableta [12.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [25 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [6.25 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

C07B Beta-adrenergički blokatori i tiazidi
C07BB Selektivni beta-adrenergički blokatori i tiazidi

C07BB12 hidrohlorotiazid, nebivolol

Doziranje: esencijalna hipertenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lijekovima): 1 tbl. jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NEBILET PLUS 12,5 - BERLIN-CHEMIE AG

Rp film tableta [12.5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PP/COC/PP/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

NEBILET PLUS 25 - BERLIN-CHEMIE AG

Rp film tableta [25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PP/COC/PP/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

C07F Beta-adrenergički blokatori i drugi antihipertenzivi
C07FB Beta-adrenergički blokatori, selektivni, i drugi antihipertenzivi

C07FB07 amlodipin, bisoprolol

Doziranje: hipertenzija kod pacijenata kod kojih je već postignuta kontrola bolesti na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lijekovima: 1 tableta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SOBYCOMBI - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji

C08 **BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA**
C08C **Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa**
pretežno vaskularnim djelovanjem
C08CA **Derivati dihidropiridina**

C08CA01 **amlodipin**

Doziranje: hipertenzija, profilaksa angine pectoris: početna doza 5 mg jednom dnevno, maks. 10 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALPINOL - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (2 Al/PVC blister sa po 15 tableta) u kutiji
 Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/PVC blister sa po 10 tableta) u kutiji

AMLODIL - BOSNALIJEK D.D.

- Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 10 kapsula) u kutiji
 Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
 Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

AMLODIPIN ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji
 Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

AMLODIPIN FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (2 blistera po 15 tableta) u kutiji
 Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (1 Al/PVC blister sa 30 tableta), u kutiji

AMLOPIN 10 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji

AMLOPIN 5 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji

LOPRESS - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
 Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

NORVASC - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
 Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

TENOX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji

VAZOTAL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

VILPIN - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

C08CA05 nifedipin

Doziranje: hipertenzija, angina pectoris: 2 puta po 20 mg, maks. 60 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NIFEDIPINE-RETARD REMEDICA - REMEDICA LIMITED

Rp filmom obložena tableta s prilagođenim oslobađanjem [20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta sa prilagođenim oslobađanjem (3 Al//PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

C08CA06 nimodipin

Doziranje: profilaksa i liječenje ishemijskog neurološkog deficita nastalog nakon subarahnoidalne hemoragije izazvane rupturom aneurizme: na početku terapije, tokom prva 2 sata, i.v. inf. putem centralnog katetera 1 mg/h (do 0,5 mg/sat ukoliko je tjelesna masa ispod 70 kg ili kod osoba koje imaju nestabilan krvni pritisak); povećati nakon 2 sata na 2 mg/sat ukoliko nema značajnijeg sniženja krvnog pritiska; nastaviti tokom najmanje 5 dana (maks. 14 dana); ukoliko se u toku terapije izvor hemoragije hirurški sanira, nastaviti tokom najmanje 5 dana poslije hirurške intervencije: maks. ukupno trajanje terapije je 21 dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NIMOSAN - SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GMBH

ZU rastvor za infuziju [10 mg/50 mL] 10 bočica sa po 50 ml rastvora za infuziju, u kutiji

C08CA09 lacidipin

Doziranje: hipertenzija (kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivnim lijekovima): početna doza je 2 mg jednom dnevno, povećanje doze se vrši nakon 3 do 4 sedmice od početka terapije na 4 mg dnevno, maksimalno do 6 mg na dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LACIPIL - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

Rp filmom obložena tableta [2 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 Al/Al CRSF - blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [4 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 Al/Al CRSF - blistera po 7 tableta), u kutiji

MONOPIN - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Rp filmom obložena tableta [4 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

C08CA13 lerkandipin

Doziranje: blaga do srednje teška hipertenzija: početna doza 10 mg jedanput dnevno; povećati, ukoliko je neophodno, nakon najmanje 2 nedjelje na 20 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**CORNELIN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.****BANJA LUKA**

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVdC/Al blistera po 14 tableta) u kutiji
- Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji
- Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVdC/Al blistera po 14 tableta) u kutiji
- Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji

LENOCOR - BOSNALIJEK D.D.

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC//Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji
- Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC//Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji

LERCANIL 10 - BERLIN-CHEMIE AG

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (4 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 90 filmom obložena tableta (9 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

LERCANIL 20 - BERLIN-CHEMIE AG

- Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/ Al - blistera) u kutiji

PINOX - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVdC/Al blister), u kutiji

C08D ***Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim djelovanjem na srce***

C08DA ***Derivati fenilalkilamina***

C08DA01 verapamil

Doziranje: *paroksizmalne supraventrikularne tahikardije i smanjenje srčane frekvencije u atrijalnoj fibrilaciji/flateru:* oralno-liječenje i profilaksa, 40-120 mg 3 puta dnevno, sporom i.v. inj.-liječenje 5-10 mg, u trajanju od 2 min, dodatna doza od 5 mg se može dati nakon 5-10 min; *angina pectoris:* 80-120 mg 3 puta dnevno; *hipertenzija:* 120-160 mg 2-3 puta dnevno; kod starijih osoba, potrebne su niže doze, obično 3 puta po 40 mg/dan; *sekundarna prevencija reinfarkta kod pacijenata bez zatajenja srca i koji ne primaju diuretike (osim diuretika koji se doziraju u malim dozama kada se koriste za druge indikacije, a ne za zatajenje srca) i u slučajevima kada beta-blokatori nisu prikladni:* odrasli, oralno, liječenje se mora započeti najmanje 7 dana nakon akutnog infarkta miokarda, 360 mg dnevno i to 240 mg ujutro i 120 mg uveče; djeca: lijek se može primjenjivati kod djece preko 2 god. uz izuzetan oprez; oralno, uobičajene doze su 40-120 mg 2 ili 3 puta dnevno, u zavisnosti od uzrasta i terapijskog odgovora; parenteralno, djeca do 1 god. 0,75-2 mg (0,1-0,2 mg/kg); djeca 1-15 god. 2-5 mg (0,1-0,3 mg/kg), doza se po potrebi može ponoviti nakon 30 min.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ISOCOR - SOPHARMA AD**

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

△ ZU	rastvor za injekciju/infuziju [2.5 mg/1 mL] 10 ampula po 2 ml rastvora za injekciju/infuziju (1 PVC blister sa 10 ampula), u kutiji
VERAPAMIL ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE	
Rp	obložena tableta [40 mg/1 tableta] 30 obloženih tableta (2 Al/PVC blistera po 15 tableta), u kutiji
Rp	obložena tableta [80 mg/1 tableta] 30 obloženih tableta (2 Al/PVC blistera po 15 tableta), u kutiji
VERAPAMIL ALKALOID RETARD - ALKALOID AD SKOPJE	
Rp	tableta sa produženim oslobađanjem [240 mg/1 tableta] 20 tableta sa produženim oslobađanjem (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
VERAPAMIL HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA	
Rp	film tableta [40 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [80 mg/1 tableta] 50 film tableta (5 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
VERAPAMIL REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE	
Rp	obložena tableta [80 mg/1 tableta] 50 obloženih tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

C08DB *Derivati benzotiazepina*

C08DB01 *diltiazem*

Doziranje: profilaksa i liječenje angine pectoris, hipertenzija: početna doza 180-240 mg dnevno podijeljena u 2-3 pojedinačne doze; više doze od 480 mg/dan u podijeljenim dozama mogu biti od koristi kod pacijenata sa anginom, naročito nestabilnom anginom pectoris; doze od 360 mg/dan mogu biti od koristi kod hipertenzivnih pacijenata

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALDIZEM - ALKALOID AD SKOPJE

- Rp tableta sa produženim oslobađanjem [60 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta sa produženim oslobađanjem [90 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

CORTIAZEM RETARD - HEMOFARM A.D. VRŠAC

- Rp tableta sa modifikovanim oslobađanjem [90 mg/1 tableta] 30 tableta sa modifikovanim oslobađanjem (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

C09 *LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM*

C09A *Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni*

C09AA *ACE-inhibitori, monokomponentni*

C09AA01 *kaptopril*

Doziranje: hipertenzija: početna doza 2 puta po 12,5-25 mg oralno, doza se može postepeno povećavati u intervalima od po najmanje 2 nedjelje do maks. 150 mg dnevno; stariji, početna doza 6,25 mg 2 puta dnevno; kod osoba sa jako izraženom aktivnošću sistema renin-angiotenzin-aldosteron (hipovolemija, renovaskularna hipertenzija, srčana dekompenzacija), terapiju treba započeti primjenom doze od 6,25 mg ili 12,5 mg,

jedanput dnevno, terapiju treba započeti pod medicinskim nadzorom; doza se može postepeno povećavati do 50 mg dnevno, po potrebi do 100 mg dnevno; *srčana insuficijencija*: terapiju treba započeti pod medicinskim nadzorom, početna doza 6,25-12,5 mg 2-3 puta dnevno; dozu održavanja (75-150 mg dnevno) podešavati na osnovu terapijskog odgovora; doza se može postepeno povećavati u intervalima od najmanje po 2 nedjelje, maks. 150 mg dnevno; *dijabetesna nefropatija*: 75-100 mg/dan u podijeljenim dozama; *kratkotrajna terapija u toku 24 sata od infarkta miokarda kod klinički stabilnih bolesnika*, terapiju započeti u toku 24 sata od infarkta miokarda; početna doza je 6,25 mg, zatim poslije 2 sata 12,5 mg, a 12 sati kasnije 25 mg; ukoliko nema neželjenih hemodinamskih reakcija, nastaviti sa 50 mg 2 puta dnevno tokom 4 nedjelje; *profilaksa simptomatske srčane insuficijencije poslije infarkta miokarda kod klinički stabilnih pacijenata sa asimptomatskom disfunkcijom lijeve komore*, u početku 6,25 mg jednom dnevno, počevši 3-16 dana poslije infarkta pod bliskim medicinskim nadzorom, zatim 12,5 mg 3 puta dnevno tokom 2 dana, zatim 25 mg 3 puta dnevno, ukoliko nema neželjenih hemodinamskih reakcija; povećati postepeno na 75-150 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze (ukoliko se toleriše)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KAPTOPRIL KRKA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta [12.5 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp tableta [25 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

KAPTOPRIL REMEDICA - REMEDICA LIMITED

- Rp tableta [25 mg/1 tableta] 40 tableta (4 Al/PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

KATOPIL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- Rp tableta [25 mg/1 tableta] 40 tableta (4 blistera od Al/PVC trake i tvrde PVC/PVdC trake po 10 tableta), u kutiji
Rp tableta [50 mg/1 tableta] 40 tableta (4 blistera od Al/PVC trake i tvrde PVC/PVdC trake po 10 tableta), u kutiji

C09AA02 enalapril

Doziranje: *hipertenzija*: početna doza je 5 mg jednom dnevno oralno; ukoliko se uzima sa diuretikom, ili kod renalnog oštećenja, mogu biti potrebne niže početne doze; doza održavanja 20 mg dnevno u jednoj ili podijeljeno u dvije doze; maks. 40 mg dnevno; *simptomatska srčana insuficijencija* (dodatak), *prevencija simptomatske srčane insuficijencije kod pacijenata sa asimptomatskom disfunkcijom lijeve komore*: početna doza je 2,5 mg jednom dnevno oralno, pod strogim medicinskim nadzorom, koja se postepeno povećava do ciljane doze održavanja tokom 2-4 nedjelje do 10-20 mg dva puta dnevno u jednoj ili podijeljeno u 2 doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ENALAPRIL SANDOZ 10 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 20 tableta (2 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

ENALAPRIL SANDOZ 20 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp tableta [20 mg/1 tableta] 20 tableta (2 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

ENAP - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp tableta [10 mg/1 tableta] 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

Rp	tableta [20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [20 mg/1 tableta] 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [5 mg/1 tableta] 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
ENAZIL 10 MG - PLIVA HRVATSKA D.O.O.	
Rp	tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
ENAZIL 20 MG - PLIVA HRVATSKA D.O.O.	
Rp	tableta [20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
ENAZIL 5 MG - PLIVA HRVATSKA D.O.O.	
Rp	tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
KADRIL - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.	
Rp	tableta [10 mg/1 tableta] 20 tableta (2 Alu / Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera po 10 tableta) u kutiji
Rp	tableta [20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera po 10 tableta) u kutiji
Rp	tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera po 10 tableta) u kutiji
KONVERIL - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	
Rp	tableta [10 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PE//PVDC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [5 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PE//PVDC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji
PRILENAP - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA	
Rp	tableta [10 mg/1 tableta] 20 tableta (2 oPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al /PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [20 mg/1 tableta] 20 tableta (2 oPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

C09AA03 lizinopril

Doziranje: hipertenzija: početna doza 10 mg jednom dnevno; ukoliko se uzima sa diuretikom ili kod srčane dekompenzacije ili kod smanjenja volumena intravaskularne tečnosti, početna doza 2,5-5 mg jednom dnevno; uobičajena doza održavanja 20 mg jednom dnevno, maks. 80 mg jednom dnevno; *kongestivna srčana insuficijencija* (dodatak): početna doza 2,5 mg jednom dnevno pod strogim medicinskim nadzorom; povećavati po ne više od 10 mg u intervalima ne manjim od 2 nedjelje do maks. 35 mg jednom dnevno, ukoliko se podnosi; *kratkotrajna terapija poslije akutnog infarkta miokarda*: kod hemodinamski stabilnih bolesnika (sistolni krvni pritisak veći od 120

mmHg) terapiju lizinoprilom treba započeti unutar 24 h od početka simptoma; početna doza je 5 mg dnevno, tokom prva 2 dana, a zatim se povećava na 10 mg dnevno (doza održavanja) tokom 6 nedjelja; u slučaju nižeg sistolnog pritiska (100-120 mmHg), početna doza iznosi 2,5 mg jednom dnevno, a doza održavanja je 5 mg dnevno; ukoliko je krvni pritisak manji od 100 mmHg lijek se ne daje; *renalne komplikacije šećerne bolesti*: početnu dozu 2,5-5 mg jednom dnevno podešavati prema odgovoru; uobičajena doza održavanja 10-20 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HYPERIL - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

IRUMED - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji
- Rp tableta [20 mg/1 tableta] 30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji

LOPRIL - BOSNALIJEK D.D.

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [20 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 20 tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

OPTIMON - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji

SKOPRYL - ALKALOID AD SKOPJE

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 20 tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [20 mg/1 tableta] 20 tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 20 tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

VITOPRIL - STADA ARZNEIMITTEL AG

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera), u kutiji

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

C09AA04 perindopril

Doziranje: hipertenzija: uobičajena doza je 4 mg jednom dnevno, ujutro prije obroka, doza se može povećati na maksimalno 8 mg na dan; *srčana insuficijencija* (dodatak terapiji): početna doza od 2 mg ujutro, zatim 4 mg jednom dnevno (terapiju započeti pod nadzorom ljekara); *profilaksa kardiovaskularnih događaja nakon infarkta miokarda ili revaskularizacije kod pacijenata sa stabilnom arterijskom koronarnom bolešću*: početna doza 4 mg jednom dnevno-ujutro tokom dvije sedmice, zatim povećati na 8 mg jednom dnevno, ukoliko se podnosi; stariji pacijenti 2 mg jednom dnevno tokom jedne sedmice, zatim 4 mg jednom dnevno sljedeću sedmicu, prije povećanja doze do 8 mg jedanput na dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HYPRESSIN - BOSNALIJEK D.D.

Rp tableta [2 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [4 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji

PALLORIN - STADA ARZNEIMITTEL AG

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 PVC/PVCD/Al blistera sa 15 film tableta), u kutiji

Rp film tableta [2,5 mg/1 tableta] 30 film tableta (1 PVC/PVCD/Al blister sa 30 film tableta), u kutiji

Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 PVC/PVCD/Al blistera sa 15 film tableta), u kutiji

PRENESSA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp tableta [2 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [4 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

PRENESSANEO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, LABENA D.O.O, TESLOVA 30, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

PREXANIL A - LES LABORATOIRES SERVIER

Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku, u kutiji

Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku, u kutiji

RELIKA - ALKALOID AD SKOPJE

Rp tableta [2 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta; blisteri u kesici), u kutiji

Rp tableta [4 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta; blisteri u kesici), u kutiji

Rp tableta [8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta; blisteri u kesici), u kutiji

RONDO - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- Rp tableta [2 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [4 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

C09AA05 ramipril

Doziranje: *hipertenzija:* početna doza 1,25-2,5 mg jednom dnevno, po potrebi može se povećavati u intervalima 2-4 nedjelje do maksimalnih 10 mg jednom dnevno; *kongestivna srčana insuficijencija* (dodatak): početna doza 1,25 mg jednom dnevno, pod strogim medicinskim nadzorom, po potrebi se može povećavati u intervalima od 1-2 nedjelje do maks. 10 mg dnevno ukoliko je podnošljivost dobra (dnevne doze od 2,5 mg ili više mogu da se primjenjuju u jednoj ili 2 podijeljene doze); *profilaksa poslije akutnog infarkta miokarda:* (započeti najmanje 48 h poslije infarkta), početna doza 2,5 mg 2 puta dnevno, povećati nakon 3 dana na 5 mg 2 puta dnevno (napomena: ukoliko podnošljivost početne doze od 2,5 mg nije dobra, daje se 1,25 mg 2 puta dnevno prije povećanja na 2,5 mg 2 puta dnevno, zatim 5 mg 2 puta dnevno; ne davati lijek ukoliko doza ne može biti povećana na 2,5 mg 2 puta dnevno); *profilaksa kardiovaskularnih događaja kod pacijenata sa aterosklerotskom kardiovaskularnom bolešću ili sa dijabetes melitusom i još jednim dodatnim faktorom rizika za kardiovaskularnu bolest:* početna doza 2,5 mg jednom dnevno, povećati nakon 1-2 nedjelje na 5 mg jednom dnevno, zatim povećati nakon sljedećih 2-3 nedjelje na 10 mg jednom dnevno; *nefropatija:* početna doza 1,25 mg jednom dnevno, povećati nakon 2 nedjelje na 2,5 mg jednom dnevno, zatim povećati nakon sljedećih 2 nedjelje na 5 mg jednom dnevno ako se podnosi

REGISTROVANI LIJEKOVI:**AMPRIL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO**

- Rp tableta [1,25 mg/1 tableta] 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [1.25 mg/1 tableta] 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al blistera po 7 tableta), u kutiji
- Rp tableta [1.25 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//AL blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//AL blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [2,5 mg/1 tableta] 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [2.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//AL blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//AL blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

ENOX - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [2.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

PRILEN - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

PRILINDA - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp tableta [10 mg/1 tableta] 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 tableta) u kutiji

Rp tableta [2.5 mg/1 tableta] 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 tableta) u kutiji

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//al - blistera po 7 tableta) u kutiji

RAPRIL - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO

Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

TENPRIL - BOSNALIJEK D.D.

Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [2,5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

TRITACE - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

Rp tableta [10 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji

Rp tableta [2.5 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji

C09AA09 fosinopril

Doziranje: *hipertenzija:* oralno, odrasli početna doza je 10 mg/dan, povećati ukoliko je neophodno nakon 4 nedjelje; doza održavanja 10-40 mg/dan (doze preko 40 mg nisu pokazale povećanje efikasnosti); *kongestivna srčana insuficijencija* (dodatak terapiji): oralno, odrasli, početna doza 10 mg/dan pod strogim medicinskim nadzorom; povećavati postepeno do 40 mg jednom dnevno ukoliko se ta doza podnosi

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MONOPRIL - PHARMASWISS D.O.O.

Rp tableta [10 mg/1 tableta] 28 tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp tableta [20 mg/1 tableta] 28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji

C09AA10 trandolapril

Doziranje: *hipertenzija:* početna doza je 0,5 mg jedanput dnevno; dozu povećavati u intervalima od 2 do 4 nedjelje, uobičajena doza održavanja je 1 do 2 mg jedanput dnevno; maks. 4 mg dnevno; *profilaksa poslije infarkta miokarda* (kod pacijenata sa disfunkcijom lijeve komore): liječenje se može započeti već trećeg dana; početna doza je 0,5 mg jednom dnevno; postepeno povećavati do najviše 4 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DOLAP - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- Rp kapsula, tvrda [0.5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula, tvrdih), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [0.5 mg/1 kapsula] 60 kapsula, tvrdih (6 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula, tvrdih) u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [2 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula, tvrdih) u kutiji

GOPTEN - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- Rp kapsula, tvrda [0.5 mg/1 kapsula] 50 kapsula, tvrdih (5 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [2 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 14 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [4 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC/Al blistera po 14 kapsula), u kutiji

C09AA15 zofenopril

Doziranje: *blaga do umjerena esencijalna hipertenzija:* početi sa 15 mg jednom dnevno, povećavati po potrebi u intervalima od 4 nedjelje do postizanja optimalne kontrole krvnog pritiska; uobičajena doza 30 mg jednom dnevno, maks. doza 60 mg jednom dnevno ili podijeljeno u 2 doze; *akutni infarkt miokarda:* terapiju započeti u prvih 24 sata od pojave simptoma i to: 1. i 2. dan 7,5 mg na 12 sati, 3. i 4. dan 15 mg na 12 sati, od 5. dana 30 mg na 12 sati, kontinuirano 6 nedjelja, a nakon toga vršiti ponovnu procjenu za nastavak terapije; može se primjenjivati prije, u toku ili nakon obroka.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ZOFECARD - BERLIN-CHEMIE AG**

- Rp film tableta [30 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [7.5 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

C09B *Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), kombinacije***C09BA *ACE-inhibitori i diuretici*****C09BA02 enalapril, hidrohlorotiazid**

Doziranje: *esencijalna arterijska hipertenzija* (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lijekovima): 1 tableta dnevno (enalapril 10 mg sa hidrohlorotiazidom 12,5 mg/tableti ili enalapril 10 mg sa hidrohlorotiazidom 25 mg/tableti), po potrebi, 2 tablete

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ENALAPRIL HCT SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.**

- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji

ENAP-H - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta] 30 tableta (3 blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta] 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

ENAP-HL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

Rp	tableta [10 ml/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [10 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta] 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
ENAP-HL 20 - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO	
Rp	tableta [20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [20 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta] 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
KADRIL PLUS - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.	
Rp	tableta [10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta] 20 tableta (2 Alu / Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
Rp	tableta [20 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta] 20 tableta (2 Alu / Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera po 10 tableta) u kutiji
KONVERIL PLUS - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	
Rp	tableta [20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta] 20 tableta (2 Al-Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
PRILENAP H - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA	
Rp	tableta [10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
PRILENAP HL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA	
Rp	tableta [10 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al /PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

C09BA03 hidrohlorotiazid, lizinopril

Doziranje: *blaga do umjerena hipertenzija* (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lijekovima): najčešće 1 tableta na dan, doza se može povećati na 2 tablete jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HYPERIL PLUS - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

Rp	tableta [12.5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [12.5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

IRUZID 10 - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp	tableta [12.5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji

IRUZID 20 - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp	tableta [12.5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 tableta (1 Al/PVC/PVDC blister), u kutiji

IRUZID 20/25 - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp	tableta [25 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister), u kutiji

LOPRIL H - BOSNALIJEK D.D.

- Rp tableta [12.5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [12.5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [12.5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [12.5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

LOPRIL H PLUS - BOSNALIJEK D.D.

- Rp tableta [25 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp tableta [25 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

OPTIMON HCT - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- Rp tableta [12.5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

SKOPRYL PLUS - ALKALOID AD SKOPJE

- Rp tableta [12,5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [12.5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 20 tableta (2 blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [25 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [25 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

VITOPRIL H - STADA ARZNEIMITTEL AG

- Rp tableta [12.5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [12.5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

C09BA04 indapamid, perindopril

Doziranje: *esencijalna arterijska hipertenzija* (kada je potrebna kombinovana terapija): 1 tableta 8 mg/2,5 mg na dan, ujutro, prije jela; stariji pacijenti: početna doza perindopril/indapamid 2 mg/0,625 mg na dan; pacijenti sa insuficijencijom bubrega (kreatinin klirens 30-60 ml/min): maksimalna dnevna doza perindopril/indapamid 2 mg/0,625 mg; kontraindikovana je primjena kod teške renalne insuficijencije i kod bolesnika sa teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina ispod 30 ml/min); konsultovati literaturu proizvođača za više detalja kod doziranja

REGISTROVANI LIJEKOVI:**HYPRESSIN PLUS - BOSNALIJEK D.D.**

- Rp tableta [0,625 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [1,25 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji

HYPRESSIN PLUS L - BOSNALIJEK D.D.

- Rp tableta [2,5 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Alu/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji

PRENEWEL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta [0.625 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

- Rp tableta [1.25 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [2.5 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- PRENEWELNEO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO**
- Rp tableta [1,25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp tableta [2,5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- PREXANIL COMBI A 10 MG/2,5 MG - LES LABORATOIRES SERVIER**
- Rp filmom obložena tableta [2.5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku, u kutiji
- PREXANIL COMBI A 5 MG/1,25 MG - LES LABORATOIRES SERVIER**
- Rp filmom obložena tableta [1.25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku, u kutiji

C09BA05 hidrohlorotiazid, ramipril

Doziranje: *esencijalna arterijska hipertenzija* (kada je potrebna kombinovana terapija): početna doza za odrasle je 1 tableta dnevno (2,5 mg ramiprila sa 12,5 mg hidrohlorotiazida), ujutro; po potrebi doza se može povećati na 1 tabletu sa većom dozom (5 mg ramiprila sa 25 mg hidrohlorotiazida), maks. doza 10 mg ramiprila i 25 mg hidrohlorotiazida

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AMPRIIL HD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta [25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/AL/PVC//AL blistera po 10 tableta), u kutiji

AMPRIIL HL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta [12.5 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/AL/PVC//AL blistera po 10 tableta), u kutiji

PRILEN PLUS - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- Rp tableta [25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/OPA/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

PRILINDA PLUS - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp tableta [12,5 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/Al- blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/Al- blistera po 10 tableta), u kutiji

TENPRIL DUO - BOSNALIJEK D.D.

- Rp tableta [12,5 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

TRITAZIDE - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

- Rp tableta [12.5 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/Al blistera sa po 14 tableta) u kutiji
- Rp tableta [25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/Al blistera sa po 14 tableta) u kutiji

C09BA09 fosinopril, hidrohlorotiazid

Doziranje: liječenje esencijalne hipertenzije kod odraslih pacijenata kod kojih primjena monoterapije fosinoprilom ne reguliše krvni pritisak na adekvatan način: odrasli 1 tableta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**MONOPRIL PLUS - PHARMASWISS D.O.O.**

Rp tableta [20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta] 28 tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

C09BB ACE-inhibitori i blokatori kalcijumskih kanala**C09BB02 enalapril, lerkandipin**

Doziranje: esencijalna hipertenzija (kada se bolesnici prethodno stabilizuju na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lijekovima): 1 tabletu dnevno (najbolje ujutro) najmanje 15 minuta prije jela

REGISTROVANI LIJEKOVI:**CORNEPRIL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.****BANJA LUKA**

Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

C09BB03 amlodipin, lizinopril

Doziranje: esencijalna hipertenzija: odrasli, oralno 1 tableta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ALPINOL PLUS - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG**

Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/PVDC/Aluminijumski blister sa po 15 tableta)

Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Aluminijumski blister sa po 10 tableta) u kutiji

Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/PVDC/Aluminijumski blister 15 tableta) u kutiji

SKOPRYL COMBO - ALKALOID AD SKOPJE

Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 90 tableta (6 PVC/PVDC/Aluminijum blistera sa po 15 tableta) u kutiji

Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/PVDC/Aluminijum blistera po 15 tableta), u kutiji.

Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 90 tableta (9 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta)

Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta) u kutiji

Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 90 tableta (6 PVC/PVDC/Aluminijumski blister po 15 tableta) u kutiji

C09BB04 amlodipin, perindopril

Doziranje: hipertenzije i/ili stabilna koronarna bolest (kod bolesnika u kojih je već postignuta kontrola bolesti na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lijekovima): 1 tableta dnevno, preporučljivo ujutro prije jela

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AMLESSA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blister po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

AMLESSANEO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA /Al//PVC/ Al blistera sa 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

AMLOPRESSIN - BOSNALIJEK D.D.

- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 30 tableta (3 hladnoformirajuća Al/Al blistera sa 10 tableta) u kutiji
- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 hladnoformirajuća Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 30 tableta (3 hladnoformirajuća Al/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 hladnoformirajuća Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

NORPREXANIL 10 MG/10 MG TABLETA - LES LABORATOIRES SERVIER

- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem, u kutiji

NORPREXANIL 10 MG/5 MG TABLETA - LES LABORATOIRES SERVIER

- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem, u kutiji

NORPREXANIL 5 MG/10 MG TABLETA - LES LABORATOIRES SERVIER

- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem i sredstvom za sušenje, u kutiji

NORPREXANIL 5 MG/5 MG TABLETA - LES LABORATOIRES SERVIER

- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem i sredstvom za sušenje, u kutiji

PRIAMLO - ZENTIVA, K.S.

- Rp tableta [13,868 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 30 tableta (2 OPA/Alu PVC//Alu blistera po 15 tableta) u kutiji
- Rp tableta [13,868 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 30 tableta (2 OPA/ Alu PVC/Alu blistera po 15 tableta) u kutiji

- Rp tableta [6,934 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 30 tableta (2 OPA/Alu PVC/Alu blistera po 15 tableta) u kutiji
- Rp tableta [6,934 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 30 tableta (2 OPA/ Alu PVC/Alu blistera po 15 tableta) u kutiji

C09BB07 amlodipin, ramipril

Doziranje: hipertenzija kod pacijenata kod kojih je već postignuta kontrola bolesti na kombinovanoj terapiji pojedinačnim lijekovima: 1 kapsula dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**AMLOPIN COMBO - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.**

- Rp kapsula, tvrda [10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula] 28 kapsula tvrdih (4 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 7 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 7 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula] 28 kapsula tvrdih (4 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 7 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula+ 2.5 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 7 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 7 kapsula), u kutiji

AMORA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp kapsula, tvrda [10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (5 PA/Al/PVC//Al blistera sa po 6 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (5 PA/Al/PVC//Al blistera sa po 6 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (5 PA/Al/PVC//Al blistera sa po 6 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula+ 2,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (5 PA/Al/PVC//Al blistera sa po 6 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (5 PA/Al/PVC//Al blistera sa po 6 kapsula), u kutiji

PRILINDA DUO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp kapsula, tvrda [10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 Al/OPA/Al/PVC blister sa po 10 kapsula) u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 Al/OPA/Al/PVC blister sa po 10 kapsula) u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 Al/OPA/Al/PVC blistera sa po 10 kapsula) u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 Al/OPA/Al/PVC blister sa po 10 kapsula) u kutiji

RAMEAM - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp kapsula, tvrda [10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

C09BX **ACE-inhibitori, ostale kombinacije**

C09BX01 **amlodipin, indapamid, perindopril**

Doziranje: *esencijalna hipertenzija* kod pacijenata kod kojih je postignuta kontrola istovremenom primjenom perindopрила, indapamida i amlodipine: 1 tbl. dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AMLEWEL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA /Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

AMLEWELNEO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 1,25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

AMLOPRESSIN PLUS - BOSNALIJEK D.D.

- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 1,25 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 30 tableta (3 hladnoformirajuća Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 hladnoformirajuća Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 1,25 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 30 tableta (3 hladnoformirajuća Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 hladnoformirajuća Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

LOPRIDAM - ZENTIVA, K.S.

- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 1,25 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 30 tableta (2 OPA/Alu /PVC//Alu blistera sa po 15 tableta), u kutiji
- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 30 tableta (2 OPA/Alu /PVC//Alu blistera sa po 15 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 1,25 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 30 tableta (2 OPA/Alu /PVC//Alu blistera sa po 15 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 30 tableta (2 OPA/Alu /PVC//Alu blistera sa po 15 tableta), u kutiji

PAICOR - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 1,25 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 30 tableta (3 oPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 oPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 1,25 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta] 30 tableta (2 oPA/Al/PVC//Al blistera po 15 tableta), u kutiji
- Rp tableta [5 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 oPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

PALLORIN COMBO - STADA ARZNEIMITTEL AG

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 1,25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 OPA/Alu/PE-Alu blistera sa 15 film tableta) u kutiji
- Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 OPA/Alu/PE-Alu blistera sa 15 film tableta) u kutiji
- Rp film tableta [5 mg/1 tableta+ 1,25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 OPA/Alu/PE-Alu blistera sa 15 film tableta) u kutiji
- Rp film tableta [5 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 OPA/Alu/PE-Alu blistera sa 15 film tableta) u kutiji

TRIPLIXAM - LES LABORATOIRES SERVIER

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji

C09BX02 bisoprolol, perindopril

Doziranje: hipertenzija i/ili stabilna koronarna arterijska bolest srca (kod pacijenata koji su preboljeli infarkt miokarda i/ili kod revaskularizacije) i/ili stabilnog hroničnog zatajivanja srca sa smanjenom sistolnom funkcijom lijeve komore kod odraslih pacijenata koji su već dobro kontrolisani istovremenom primjenom bisoprolola i perindopрила u istim dozama: 1 tableta jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**COSYREL - LES LABORATOIRES SERVIER**

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (1 bijeli polipropilenski spremnik sa 28 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (1 bijeli polipropilenski spremnik sa 28 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (1 bijeli polipropilenski spremnik sa 28 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (1 bijeli polipropilenski spremnik sa 28 tableta), u kutiji

C09BX05 bisoprolol, ramipril

Doziranje: hipertenzija i/ili koegzistirajući hronični koronarni sindrom: jedna kapsula jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**PRILINDA COMBO - ADAMED PHARMA S.A.**

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

Rp	kapsula, tvrda [1,25 mg/1 kapsula+ 2,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PA/Al/PVC-Aluminijumski blistera) u kutiji
Rp	kapsula, tvrda [10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PA/Al/PVC-Aluminijumski blistera) u kutiji
Rp	kapsula, tvrda [2,5 mg/1 kapsula+ 2,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PA/Al/PVC-Aluminijumski blistera) u kutiji
Rp	kapsula, tvrda [2,5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PA/Al/PVC-Aluminijumski blistera) u kutiji
Rp	kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PA/Al/PVC-Aluminijumski blistera) u kutiji
Rp	kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PA/Al/PVC-Aluminijumski blistera) u kutiji

C09C Antagonisti receptora angiotenzina II, jednostavni **C09CA Antagonisti receptora angiotenzina II, jednostavni**

C09CA01 losartan

Doziranje: *hipertenzija* (uključujući smanjenje rizika od moždanog udara kod hipertenzije sa hipertrofijom lijeve komore), *dijabetička nefropatija* (dijabetes mellitus tip 2): oralno, odrasli, uobičajeno 50 mg jednom dnevno, ukoliko je neophodno, povećati nakon nekoliko nedjelja na 100 mg jednom dnevno; stariji (preko 75 god.) početna doza 25 mg dnevno, zatim povećati ukoliko je neophodno na 100 mg jednom dnevno; *hronična srčana insuficijencija* (kada su ACE inhibitori neodgovarajući ili kontraindikovani): oralno, odrasli, početna doza 12,5 mg jednom dnevno, po potrebi povećavati u intervalima od nedjelju dana do maks. 150 mg jednom dnevno ukoliko se podnosi; *hipertenzija u stanjima smanjenog intravaskularnog volumena*: oralno, odrasli, početna doza 25 mg jednom dnevno, ukoliko je neophodno, povećati nakon nekoliko nedjelja na 100 mg jednom dnevno;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ERYNORM - HEMOFARM A.D. VRŠAC

Rp	film tableta [100 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 14 tableta) u kutiji
Rp	film tableta [50 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 14 tableta) u kutiji

GALOSART - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp	film tableta [50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 blistera Al/PVC - PVC/PVdC sa po 10 film tableta) u kutiji

LORISTA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp	filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 14 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 14 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC blistera sa pokrovnom aluminijskom folijom po 14 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

LOTAR - ALKALOID AD SKOPJE

- Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 Al/PVC blistera po 15 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

SARGIN - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

- Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

TENLOP - BOSNALIJEK D.D.

- Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

C09CA03 valsartan

Doziranje: *hipertenzija:* uobičajeno 80 mg jednom dnevno (kod smanjenja intravaskularnog volumena početna doza 40 mg jednom dnevno); ukoliko je neophodno povećavati u intervalima od 4 nedjelje do maks. 320 mg dnevno; *hronična insuficijencija srca* kada ACE-inhibitori ne mogu biti upotrijebljeni ili kod pacijenata sa netolerancijom na beta-blokatore kao dodatna terapija uz ACE-inhibitore kada se antagonisti mineralokortikoidnog receptora ne mogu koristiti: početna doza 40 mg 2 puta dnevno, povećavati u intervalima od najmanje 2 nedjelje do maks. 160 mg 2 puta dnevno; *nedavni infarkt miokarda* kod klinički stabilnih pacijenata sa simptomatskom hroničnom insuficijencijom srca ili asimptomatskom sistolnom disfunkcijom lijevog ventrikula nakon nedavnog (12 sati) infarkta miokarda: početne doza 20 mg 2 puta dnevno, tokom idućih nekoliko nedjelja, dozu treba povećati na 160 mg dva puta dnevno ukoliko se podnosi

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ATENZIO - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.**

- Rp film tableta [160 mg/1 tableta] 30 film tableta (3PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [80 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

DIOVAN - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

- Rp film tableta [160 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 14 film tableta), u kutiji
- Rp film tableta [80 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 14 film tableta), u kutiji

OVERACT - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

- Rp film tableta [160 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [80 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PE/PVDC-Alu blistera po 14 tableta), u kutiji

VAL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp filmom obložena tableta [160 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 (PVC/PE/PVDC//Al) blistera sa 14 filmom obloženih tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [80 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (1 (PVC/PE/PVDC//Al) blister sa 28 filmom obloženih tableta), u kutiji

VALSACOR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp filmom obložena tableta [160 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC- Al blistera po 15 filmom obloženih tableta), u kutiji

- Rp filmom obložena tableta [320 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 14 filmom obloženih tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [40 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC- Al blistera po 15 filmom obloženih tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [80 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 15 filmom obloženih tableta), u kutiji

YANIDA - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp film tableta [160 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVdC-Al blistera po 14 tableta) u kutiji
- Rp film tableta [80 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVdC-Al blistera po 14 tableta), u kutiji

C09CA04 irbesartan

Doziranje: *hipertenzija:* početna doza 150 mg jednom dnevno, ukoliko je neophodno povećati na 300 mg jednom dnevno (kod bolesnika na hemodijalizi i kod starijih preko 75 godina, početna doza je 75 mg jednom dnevno); *terapija poremećaja bubrega kod bolesnika sa hipertenzijom i dijabetesom mellitus-om tipa 2, u okviru antihipertenzivne terapije:* početna doza 150 mg jednom dnevno, povećati do 300 mg jednom dnevno ukoliko pacijent tu dozu podnosi (kod bolesnika na hemodijalizi i kod starijih preko 75 godina, početna doza je 75 mg jednom dnevno)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IRACOR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp filmom obložena tableta [150 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [300 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji

IRBENIDA - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp film tableta [150 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC-Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp film tableta [300 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC-Al blistera po 10 tableta) u kutiji

IRDA - NOBEL ILAČ SANAYII VE TICARET A. Ş.

- Rp film tableta [150 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [300 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

C09CA06 kandesartan

Doziranje: *hipertenzija:* početna doza 8 mg (kod smanjenog intravaskularnog volumena 4 mg) jednom dnevno, povećavati ukoliko je neophodno u intervalima od 4 nedjelje do maks. 32 mg jednom dnevno, uobičajena doza održavanja 8 mg jednom dnevno; *hipertenzija kod djece i adolescenata 6-17 god.* (pod nadzorom specijaliste), tjelesne mase do 50 kg, početna doza 4 mg jednom dnevno, maks. 8 mg dnevno; *hipertenzija kod djece i adolescenata 6-17 god.* (pod nadzorom specijaliste), tjelesne mase preko 50 kg, početna doza 4 mg jednom dnevno, maks. 16 mg dnevno; *srčana insuficijencija* sa poremećenom sistolnom funkcijom lijeve komore kao dodatna terapija ACE inhibitorima (pod nadzorom specijaliste) ili kad ACE inhibitori nisu podnošljivi: početna doza 4 mg

jednom dnevno, povećavati u intervalima od najmanje 2 nedjelje do „ciljne“ doze od 32 mg jednom dnevno ili do maks. doze koju pacijent podnosi

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ANDESART - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp tableta [16 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

KARBIS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta [16 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- Rp tableta [32 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- Rp tableta [4 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- Rp tableta [8 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

C09CA07 telmisartan

Doziranje: hipertenzija: početna doza 20-40 mg jednom dnevno tokom najmanje 4 nedjelje, ukoliko je neophodno povećati do maks. 80 mg jednom dnevno; *prevencija kardiovaskularnih događaja* kod pacijenata sa utvrđenim aterosklerotskim kardiovaskularnim oboljenjem ili tip 2 dijabetes mellitus-om sa ciljano oštećenim organima: 80 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TEZEO - ZENTIVA, K.S.

- Rp tableta [40 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [80 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

TOLURA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta [40 mg/1 tableta] 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji
- Rp tableta [80 mg/1 tableta] 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera), u kutiji

C09CA08 olmesartan medoksomil

Doziranje: hipertenzija: odrasli, oralno, početna doza 10 mg jednom dnevno; ukoliko je neophodno povećati na 20 mg jednom dnevno; maks. 40 mg dnevno; djeca 6-18 god. oralno, 10 mg jednom dnevno, po potrebi povećati na 20 mg jednom dnevno, po potrebi doza se može povećati kod djece koja imaju više od 35 kg na 40 mg jednom dnevno, dok kod djece koja imaju težinu manju od 35 kg, dnevna doza ne smije biti veća od 20 mg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MENARTAN - BERLIN-CHEMIE AG

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 laminirano poliamid/aluminijum/polivinil hlorid/aluminijum blister pakovanja po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 laminirano poliamid/aluminijum/polivinil hlorid/aluminijum blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [40 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 laminirano poliamid/aluminijum/polivinil hlorid/aluminijum blistera po 14 tableta), u kutiji

OLMETEC - DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH

Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 slojevita blistera od poliamida/aluminija/polivinil hlorida/aluminija sa 14 film tableta), u kutiji

Rp film tableta [40 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 slojevita blistera od poliamida/aluminija/polivinil hlorida/aluminija sa po 14 film tableta), u kutiji

C09D Antagonisti receptora angiotenzina II, kombinacije

C09DA Antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici

C09DA01 hidrohlorotiazid, losartan

Doziranje: hipertenzija: uobičajeno 1 tableta na dan (50 mg losartana i 12,5 mg hidrohlorotiazida); ako se ne postigne očekivani rezultat doza se može povećati na 100 mg losartana i 25 mg hidrohlorotiazida

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GALOSART PLUS - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp film tableta [12.5 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/PVC - PVC/PVdC blistera po 10 tableta), u kutiji

LORISTA H - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp filmom obložena tableta [12.5 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

LORISTA HD - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta+ 100 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

TENLOP H - BOSNALIJEK D.D.

Rp film tableta [12.5 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

Rp film tableta [25 mg/1 tableta+ 100 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

C09DA03 indapamid, valsartan

Doziranje: esencijalna hipertenzija kod pacijenata čija je bolest već dobro kontrolisana istovremenom primjenom valsartana i indapamida: odrasli, jedna tableta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VALOMINDO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp tableta s prilagođenim oslobađanjem [1,5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 30 tableta s prilagođenim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji.

Rp tableta s prilagođenim oslobađanjem [1,5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 30 tableta s prilagođenim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji.

C09DA03 hidrohlorotiazid, valsartan

Doziranje: hipertenzija (kada monoterapija sa valsartanom ili hidrohlorotiazidom nije dovoljna): 1 tableta na dan (80 mg valsartana sa 12,5 mg hidrohlorotiazida); kod nekih bolesnika potrebne su veće doze, 160 mg valsartana sa 12,5 mg hidrohlorotiazida ili 160 mg valsartana sa 25 mg hidrohlorotiazida

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ATENZIO PLUS - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.**

- Rp film tableta [12.5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [12.5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [25 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji

CO-DIOVAN - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

- Rp film tableta [12.5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVDC blistera po 14 tableta) u kutiji
- Rp film tableta [12.5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVDC blistera po 14 tableta) u kutiji

VAL PLUS - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp filmom obložena tableta [12.5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 (PVC/PE/PVDC//Al blistera) sa 14 filmom obloženih tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [12.5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 (PVC/PE/PVDC//Al) blistera sa 14 filmom obloženih tableta), u kutiji.

VALSACOMBI - KRKA, TOVARNA ZDRAVLJ, D.D., NOVO MESTO

- Rp filmom obložena tableta [12.5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [12.5 mg/1 tableta+ 320 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [12.5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta+ 320 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji

YANIDA H - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp film tableta [12.5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVdC-Al blistera po 14 tableta), u kutiji

YANIDA HL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp film tableta [12.5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVdC-Al blistera po 14 tableta), u kutiji

C09DA04 hidrohlorotiazid, irbesartan

Doziranje: hipertenzija (kada monoterapija sa ibersartanom ili hidrohlorotiazidom nije dovoljna): 1 tableta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**CO-IRDA - NOBEL ILAČ SANAYII VE TICARET A. Ş.**

- Rp film tableta [12.5 mg/1 tableta+ 300 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

- Rp film tableta [12.5 mg/1 tableta+ 150 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al - blistera po 14 tableta), u kutiji
- IFIRMACOMBI - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO**
- Rp filmom obložena tableta [12,5 mg/1 tableta+ 150 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [12,5 mg/1 tableta+ 300 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- IRBENIDA H - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA**
- Rp film tableta [12.5 mg/1 tableta+ 150 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC- Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- IRBENIDA HL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA**
- Rp film tableta [12.5 mg/1 tableta+ 300 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

C09DA07 indapamid, telmisartan

Doziranje: *esencijalna hipertenzija:* 1 tableta jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

YLPPIO - PRO.MED.CS PRAHA A.S.

- Rp tableta [2,5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 100 tableta (10 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp tableta [2,5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji

C09DA07 hidrohlorotiazid, telmisartan

Doziranje: *hipertenzija* (kada monoterapija sa telmisartanom ili hidrohlorotiazidom nije dovoljna): 1 tableta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TEZEO HCT - ZENTIVA, K.S.

- Rp tableta [12,5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

TOLUCOMBI - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta [12.5 mg/1 tableta+ 40 mg/1 tableta] 30 tableta (3 blistera OPA/Al/PVC folija//Al folija po 10 tableta) u kutiji
- Rp tableta [12.5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 30 tableta (3 blistera OPA/Al/PVC folija//Al folija po 10 tableta) u kutiji
- Rp tableta [25 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 30 tableta (3 blistera OPA/Al/PVC folija//Al folija po 10 tableta) u kutiji

C09DA08 hidrohlorotiazid, olmesartan medoksomil

Doziranje: *esencijalna hipertenzija:* jednu tabletu jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OLMETEC PLUS - DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH

- Rp film tableta [12,5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 slojevit blistera od poliamida/aluminija/polivinil hloriga/aluminija po 14 film tableta), u kutiji
- Rp film tableta [12,5 mg/1 tableta+ 40 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 slojevit blistera od poliamida/aluminija/polivinil hloriga/aluminija po 14 film tableta), u kutiji

- Rp film tableta [25 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 slojevita blistera od poliamida/aluminija/polivinil hlorida/aluminija po 14 film tableta).

C09DB Antagonisti receptora angiotenzina II i blokatori kalcijumskih kanala

C09DB01 amlodipin, valsartan

Doziranje: *esencijalna hipertenzija* (kada monoterapija sa amlodipinom ili valsartanom nije dovoljna): 1 tableta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VALICA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 oP/Al/PVC//Al blister sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 oP/Al/PVC//Al blister sa po 10 tableta) ,u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 30 tableta(3 OP/Al/PVC//Al blister sa po 10 tableta) ,u kutiji

WAMLOX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 blistera OPA/Al/PVC-Al folija, sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 320 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 blistera OPA/Al/PVC-Al folija, sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 blistera OPA/Al/PVC-Al folija, sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 320 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 blistera OPA/Al/PVC-Al folija, sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 blistera OPA/Al/PVC-Al folija, sa po 10 tableta), u kutiji

YANIDA COMBO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/TE/PVdC//Al blistera po 10 film tableta) u kutiji
- Rp film tableta [5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/TE/PVdC//Al blistera po 10 film tableta) u kutiji
- Rp film tableta [5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/TE/PVdC//Al blistera po 10 film tableta) u kutiji

C09DB02 amlodipin, olmesartan medoksomil

Doziranje: *esencijalna hipertenzija:* jedna tableta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SEVIKAR - DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 40 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blister sa 14 film tableta), u kutiji
- Rp film tableta [5 mg/1 tableta+ 40 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa 14 film tableta), u kutiji

C09DX Angiotenzin II antagonisti, druge kombinacije

C09DX01 amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan

Doziranje: esencijalna hipertenzija: 1 tbl. dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FLIRKANO - ALKALOID AD SKOPJE

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta]
28 film tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta) u kutiji
- Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 28
film tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta) u kutiji
- Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 320 mg/1 tableta] 28
film tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta) u kutiji
- Rp film tableta [5 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta]
28 film tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta) u kutiji
- Rp film tableta [5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 28
film tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta) u kutiji

VALICA COMBI - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp film tableta [5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 30
filmom obloženih tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta) u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta+ 160
mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/Al blistera sa po 10
tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 160
mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/Al blistera sa po 10
tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 mg+ 160 mg/1
mg] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta) u
kutiji

VALTRICOM - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta+ 160
mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al
blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 160
mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al
blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta+ 160
mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al
blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 160
mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al
blistera sa po 10 tableta), u kutiji

YANIDA TRIO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta]
28 film tableta (2 PVC/TE/PVdC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [5 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta]
28 film tableta (2 PVC/TE/PVdC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 28
film tableta (2 PVC/TE/PVdC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

C09DX03 amlodipin, hidrohlorotiazid, olmesartan medoksomil

Doziranje: esencijalna hipertenzija: jednu tabletu dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**SEVIKAR HCT - DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH**

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta+ 40 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 slojevita poliamid/aluminijum/polivinilhlorid/aluminijum blister po 14 film tableta), u kutiji
- Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 40 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 slojevita poliamid/aluminijum/polivinilhlorid/aluminijum blistera po tableta), u kutiji
- Rp film tableta [5 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta+ 40 mg/1 tableta] 28 tableta (2 slojevita poliamida/aluminijum/polivinilhlorid/aluminijum blistera po 14 film tableta), u kutiji
- Rp film tableta [5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 40 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 slojevita poliamid/aluminijum/polivinilhlorid/aluminijum blistera po 14 film tableta), u kutiji

C09DX04**sakubitril, valsartan**

Doziranje: *simptomatska hronična srčana insuficijencija sa smanjenom ejekcionom frakcijom* (kod pacijenata koji trenutno ne uzimaju ACE inhibitor ili antagonistu angiotenzin II receptora): odrasli preko 18 god. 51/49 mg dva puta dnevno; ukoliko se dobro podnosi dozu treba povećati u intervalima od 2-4 sedmice na 103/97 mg dva puta dnevno; razmotriti mogućnost davanja početne doze 26/24 mg dva puta dnevno ukoliko je sistolni krvni pritisak manji od 100 mmHg (napomena: doza je izražena kao valsartan/sakubitril); *srčana insuficijencija kod djece:* za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:**UPERIO - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG**

- Rp filmom obložena tableta [24 mg/1 tableta+ 26 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [49 mg/1 tableta+ 51 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [97 mg/1 tableta+ 103 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

C10**SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)****C10A****Sredstva koja smanjuju lipide u serumu (hipolipemici), monokomponentni****C10AA****Inhibitori HMG CoA reduktaze****C10AA01****simvastatin**

Doziranje: primarna hiperholesterolemija, kombinovana hiperlipidemija kod pacijenata koji nisu adekvatno odgovorili na dijetu i druge odgovarajuće mjere: 10-20 mg/dan, uveče, podešavati u intervalima od najmanje 4 nedjelje; maks. 80 mg jednom dnevno, uveče; homozigotna porodična hiperholesterolemija kod pacijenata koji nisu adekvatno odgovorili na dijetu i druge odgovarajuće mjere: početna doza 40 mg/dan, uveče, podešavati u intervalima od najmanje 4 nedjelje; maks. 80 mg jednom dnevno uveče;

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

prevencija kardiovaskularnih događaja kod pacijenata sa aterosklerotskom kardiovaskularnom bolešću ili dijabetes melitusom: početna doza 20-40 mg jednom dnevno, uveče; podešavati u intervalima od najmanje 4 nedjelje; maks. 80 mg jednom dnevno, uveče, maks. doza samo za pacijente sa teškom hiperholesterolemijom i sa visokim rizikom od kardiovaskularnih komplikacija

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CHOLIPAM - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.

BANJA LUKA

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

HOLLESTA - ALKALOID AD SKOPJE

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [40 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 15 tableta) u kutiji

LIPEX - N.V. ORGANON

Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al-blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [40 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al-blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [80 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al-blistera po 14 tableta), u kutiji

PROTECTA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (1 Al/PVC/PE/PVDC blister sa 28 filmom obloženih tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/PE/PVDC blistera po 14 filmom obloženih tableta), u kutiji

VASILIP - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 PVC/PE/PVDC//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 PVC/PE/PVDC//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji

C10AA05

atorvastatin

Doziranje: primarna hiperholesterolemija kod pacijenata koji nisu adekvatno odgovorili na dijetu i druge odgovarajuće mjere, kombinovana (miješana) hiperlipidemija kod pacijenata koji nisu adekvatno odgovorili na dijetu i druge odgovarajuće mjere: odrasli preko 18 god. uobičajeno 10 mg jednom dnevno; ukoliko je neophodno može se povećati u intervalima od najmanje 4 nedjelje na maks. 80 mg jednom dnevno; porodična hiperholesterolemija kod pacijenata koji nisu adekvatno odgovorili na dijetu i druge odgovarajuće mjere: odrasli preko 18 god. početna doza 10 mg dnevno, povećati u intervalima od najmanje 4 nedjelje na maks. 40 mg jednom dnevno; ukoliko je neophodno, dalje povećavati na maks. 80 mg jednom dnevno; primarna prevencija kardiovaskularnih događaja kod pacijenata sa visokim rizikom od prvog kardiovaskularnog događaja: 20 mg jednom dnevno, po potrebi doza se može

povećavati; sekundarna prevencija kardiovaskularnih događaja: odrasli 80 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ATORVOX - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 PA/Al/PVC/Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji

ATEROZ - BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ATOLIP - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ATORIS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp film tableta [30 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [40 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

ATORVASTATIN REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

ATORVOX - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 PA/Al/PVC/Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji

AVASTA - ALKALOID AD SKOPJE

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 blistera PVC/PVDC i aluminijumska folija po 10 tableta) u kutiji

Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 blistera PVC/PVDC i aluminijumska folija po 10 tableta) u kutiji

Rp film tableta [40 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 blistera PVC/PVDC i aluminijumska folija po 15 tableta) u kutiji

Rp film tableta [80 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 blistera PVC/PVDC i aluminijumska folija po 10 tableta) u kutiji

HYPOLIP - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [40 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

KOLESTAN - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

Rp	filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [40 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC blistera sa po 15 tableta), u kutiji
LIPOSTAT - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO	
Rp	filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [40 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta) u kutiji
LIPTIN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.	
Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
Rp	film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
Rp	film tableta [40 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
SORTIS - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH	
Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PA/Al/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji
Rp	film tableta [40 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PA/Al/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji
Rp	film tableta [80 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PA/Al/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji
TOZAR - BOSNALIJEK D.D.	
Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
Rp	film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

C10AA07 rosuvastatin

Doziranje: primarna hiperholesterolemija (tip IIa uključujući heterozigotnu porodičnu hiperholesterolemiju), mješovita dislipidemija (tip IIb), ili homozigotna porodična hiperholesterolemija kod pacijenata koji nisu adekvatno odgovorili na dijetu i drugim odgovarajućim mjerama: početna doza 5-10 mg jednom dnevno, povećati ukoliko je neophodno u intervalu od najmanje 4 nedjelje na 20 mg jednom dnevno, povećati nakon naredne 4 nedjelje na 40 mg dnevno samo u slučaju teških hiperholesterolemija sa visokim kardiovaskularnim rizikom pod kontrolom ljekara specijaliste; stariji od 70 god, početna doza 5 mg jednom dnevno; za doziranje u pedijatrijskoj populaciji konsultovati literaturu proizvoda; prevencija kardiovaskularnih događaja: 20 mg jednom dnevno, stariji od 70 god. 5 mg jednom dnevno, po potrebi povećati na maks. 20 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BENEFIT - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 film tableta) u kutiji
Rp	film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

Rp film tableta [40 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 film tableta) u kutiji

Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

LIVERCOL - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 film tableta), u kutiji

Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 film tableta), u kutiji

PARAVANO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Opa-Alu-PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Opa-Alu-PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Opa-Alu-PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

ROPUIDO - ALKALOID AD SKOPJE

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [40 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ROSIX - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PA/Al/PVC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 PA/Al/PVC//Al blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PA/Al/PVC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji

ROSSTAT - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO

Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ROSUCARD - ZENTIVA, K.S.

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 Al/Al blistera sa 15 tableta), u kutiji

Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [40 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

ROSWERA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [15 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC - blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp filmom obložena tableta [15 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

Rp	filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [30 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [40 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 OPA/Al/PVC//Al blistera po 7 filmom obloženih tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [40 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ROTIN - BOSNALIJEK D.D.	
Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
RUPILIP - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.	
Rp	filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
RUSOVAS - GALENIKA A.D. BEOGRAD	
Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/PVC/OPA/Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/PVC/OPA/Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
STAGE - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	
Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 28 film tableta (4 Alu/Alu blistera po 7 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [20 mg/1 tableta] 28 film tableta (4 Alu/Alu blistera po 7 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [40 mg/1 tableta] 28 film tableta (4 Alu/Alu blistera po 7 tableta), u kutiji

C10AA08 pitavastatin

Doziranje: povišen nivo ukupnog holesterola (ukupni-H), LDL-holesterola (LDL-H) kod odraslih, adolescenata i djece uzrasta 6 god. i starije sa primarnom hiperholesterolemijom uključujući porodičnu hiperholesterolemiju (heterozigotna varijanta) ili kombinovane (mješovite) dislipidemije kada odgovor na dijetu i druge nefarmakološke mjere nije adekvatan: oralno, 1 mg jednom dnevno, prilagođavanje doze vršiti u intervalima od 4 sedmice, maksimalna dnevna doza 4 mg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PRATIN - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

Rp	filmom obložena tableta [2 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera sa 15 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [4 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera sa 15 tableta), u kutiji

C10AB Fibrati**C10AB05 fenofibrat**

Doziranje: dodatak dijeti i drugim odgovarajućim mjerama u mješovitim hiperlipidemijama ako su statini kontraindikovani ili se ne podnose, ili kod teških hipertrigliceridemija; dodatak statinima u mješovitom hiperlipidemijama ukoliko su trigliceridi i HDL-holesterol neadekvatno kontrolisani kod pacijenata sa visokim kardiovaskularnim rizikom: preporučena doza je 1 kapsula (tableta); kapsulu (tabletu) treba progutati cijelu, tokom jela

REGISTROVANI LIJEKOVI:**LIPIDIL - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH**

- Rp filmom obložena tableta [145 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [160 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PE/PVDC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

LIPOFEN SR - NOBEL ILAČ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

- Rp kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda [250 mg/1 kapsula] 30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih (2 PVC-Al blistera po 15 kapsula) u kutiji

ZYGLIP - ALKALOID AD SKOPJE

- Rp tableta [145 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

C10AX Ostala sredstva koja smanjuju lipide u serumu**C10AX09 ezetimib**

Doziranje: dodatak dijeti i tretmanu statinima kod primarne hiperholesterolemije; dodatak dijeti i tretmanu statinima kod homozigotne porodične hiperholesterolemije; primarna hiperholesterolemija (ukoliko statini nisu primjereni ili ukoliko ih pacijent ne podnosi); dodatak dijeti kod homozigotne sitosterolemije: odrasli i djeca preko 10 god, 10 mg jednom dnevno; prevencija kardiovaskularnih događaja (kod pacijenata sa koronarnom ishemijskom bolešću i akutnim koronarnim sindromom, u kombinaciji sa statinima): odrasli 10 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ELANIX - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.**

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 28 tableta (4 Al/Al blistera po 7 tableta), u kutiji
- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 28 tableta (4 PVC/PVDC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji

EZOLETA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

JARAMERA - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PE/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

C10AX14 aliokumab

Doziranje: primarna hiperholesterolemija ili mješovita dislipidemija i kod pedijatrijskih pacijenata od 8 godina i starijih sa heterozigotnom familijarnom hiperholesterolemijom koji nisu adekvatno odgovorili drugim odgovarajućim mjerama (u kombinaciji sa statinima,

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

ili sa statinima i drugim terapijama koje snižavaju lipide ili samostalno ukoliko su statini kontraindikovani ili se ne podnose); *utvrđena aterosklerotska kardiovaskularna bolest* (u kombinaciji s maksimalnom podnošljivom dozom statina sa ili bez drugih terapija za snižavanje lipida, ili sa drugim terapijama za snižavanje lipida ili samostalno ukoliko su statini kontraindikovani ili se ne podnose; odrasli s.c. inj. odrasli početna doza 75 mg svake 2 nedjelje; po potrebi povećati na 150 mg svake 2 nedjelje, alternativno 300 mg svake 4 nedjelje, pacijentima kojima je potrebno veće sniženje vrijednosti LDL-C od 60% mogu početi liječenje dozom od 150 mg svake 2 nedjelje ili 300 mg svake 4 nedjelje; podešavanje doze treba raditi u intervalima od 4 do 8 nedjelja; pedijatrijski pacijenti od 8 godina i stariji, tjelesne težine manje od 50 kg 150 mg jednom svake 4 nedjelje, 50 kg ili više, 300 mg jednom svake 4 nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PRALUENT - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

- Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [150 mg/1 mL] 2 napunjena pena sa po 1 ml rastvora za injekciju (za jednokratnu upotrebu), u kutiji
- Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [75 mg/1 mL] 2 napunjena pena sa po 1 ml rastvora za injekciju (za jednokratnu upotrebu), u kutiji

C10AX16

inklisiran

Doziranje: *primarna hiperholesterolemija ili miješana dislipidemija* (u kombinaciji sa statinom, ili sa statinom i drugim terapijama za snižavanje lipida, sam ili u kombinaciji sa drugim terapijama za snižavanje lipida ukoliko su statini kontraindikovani ili se ne podnose): s.c. početi sa 284 mg u jednoj dozi, ponovo nakon 3 mjeseca 284 mg u jednoj dozi, zatim 284 mg svakih 6 mjeseci

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LEQVIO - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

- ZU rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [284 mg/1 šprica] 1 staklena šprica sa 1,5 ml rastvora za injekciju (šprica s iglom i čvrstim poklopcem igle, te štitnikom igle), u kutiji
- ZU rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [284 mg/1 šprica] 1 staklena šprica sa 1,5 ml rastvora za injekciju (šprica s iglom i čvrstim poklopcem igle), u kutiji

C10B *Sredstva koja smanjuju lipide u serumu (hipolipemici), kombinacije*

C10BA *Kombinacije različitih agenasa za modifikaciju lipida*

C10BA05

atorvastatin, ezetimib

Doziranje: *hiperholesterolemija i/ili koronarna bolest srca; homozigotna nasljedna hiperholesterolemija:* oralno, 10/10 do 10/80 mg dnevno, dozu prilagođavati u vremenskim razmacima od najmanje 4 nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ATORIS COMBI - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [40 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [80 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

AVASTA PLUS - ALKALOID AD SKOPJE

Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

Rp film tableta [20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

Rp film tableta [40 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

Rp film tableta [80 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 film tableta (5 OPA/Al/PVC//Al blistera po 6 film tableta), u kutiji

SORTIS PLUS - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [40 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [80 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

C10BA06 ezetimib, rosuvastatin

Doziranje: primarna hiperholesterolemija/homozigotna familijarna hiperholesterolemija, prevencija kardiovaskularnih događaja: 1 tableta odgovarajuće jačine, nezavisno od obroka

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ELANIX COMBO - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PA/Al/PVC/Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji

Rp tableta [10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PA/Al/PVC/Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji

EZRUSTA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

PARAVANO DUO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 40 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

REFIDORO - ALKALOID AD SKOPJE

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

Rp	film tableta [10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/AL/PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [10 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/AL/PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [10 mg/1 tableta+ 40 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/AL/PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

REFIDORO - ALKALOID AD SKOPJE

Rp	film tableta [10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/AL/PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

ROSIX COMBI - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp	tableta [10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [10 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PA/Al/PVC//Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji

ROSIX COMBI - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp	tableta [10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 tableta (2 oPA/Al/PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

ROSWERA COMBI - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp	filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 40 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

C10BX *Sredstva za modifikaciju lipida u kombinaciji sa drugim lijekovima*

C10BX03 *amlodipin, atorvastatin*

Doziranje: sprečavanje kardiovaskularnih događaja kod pacijenata koji boluju od hipertenzije te imaju tri prateća faktora kardiovaskularnog rizika, normalan do blago povišen nivo holesterola, bez klinički izražene koronarne bolesti srca, te kod kojih se smatra prihvatljiva kombinovana primjena amlodipina i niske doze atorvastatina: uobičajena početna doza je 5 mg/10 mg jednom na dan; u slučaju potrebe doza se može povećati na 10 mg/10 mg; tablete se uzimaju u bilo koje doba dana sa hranom ili bez nje.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LIRTONEN - ALKALOID AD SKOPJE

Rp	film tableta [10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 90 film tableta (9 Al/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 90 film tableta (9 Al/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

C10BX05 *acetilsalicilna kiselina, rosuvastatin*

Doziranje: sekundarna prevencija kardiovaskularnih događaja: 1 kapsulu dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ROSUXAN - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula] 30 kapsula (3 PA/AL/PVC(laminat)//Al blistera po 10 kapsula) u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula+ 20 mg/1 kapsula] 30 kapsula (3 PA/AL/PVC(laminat)//Al blistera po 10 kapsula) u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula] 30 kapsula (3 PA/AL/PVC(laminat)//Al blistera po 10 kapsula) u kutiji

STARTINA - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PA-ALU-PVC/ALU blistera sa po 10 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula+ 20 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PA-ALU-PVC/ALU blistera sa po 10 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PA-ALU-PVC/ALU blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

C10BX06 acetilsalicilna kiselina, atorvastatin, ramipril

Doziranje: sekundarna prevencija kardiovaskularnih događaja kao zamjena za terapiju kod odraslih pacijenata kod kojih je postignuta adekvatna kontrola istovremenom primjenom pojedinačnih komponenti ovoga lijeka u identičnim terapijskim dozama: odrasli iznad 18 god, 1 kapsula dnevno, po mogućnosti nakon obroka

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TRINOMIA - FERRER INTERNATIONAL, SA

- Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula+ 20 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 OPA/Al/PVC - blistera sa po 7 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula+ 20 mg/1 kapsula+ 2.5 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 OPA/Al/PVC blistera sa po 7 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula+ 20 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kap] 28 kapsula, tvrdih (4 OPA/Al/PVC blistera sa po 7 kapsula), u kutiji

C10BX10 rosuvastatin, valsartan

Doziranje: hipertenzija kod pacijenata kod kojih postoji visoki rizik od prvog kardiovaskularnog događaja ili kod pacijenata sa primarnom hiperholesterolemijom (tip IIa, uključujući heterozigotnu porodičnu hiperholesterolemiju) ili mješovitom dislipidemijom (tip II b) ili homozigotnom porodičnom hiperholesterolemijom: 1 tbl. dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VALAROX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

C10BX11 amlodipin, atorvastatin, perindopril

Doziranje: esencijalna hipertenzija i/ili stabilna koronarna arterijska bolest, s pridruženom primarnom hiperholesterolemijom ili miješanom hiperlipidemijom kao zamjenska terapija kod odraslih čija je bolest već dobro kontrolisana istovremenom primjenom atorvastatina, perindoprila i amlodipina u istim dozama kao u fiksnoj kombinaciji : 1 tableta jedanput dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LIPERTANCE - LES LABORATOIRES SERVIER

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta u PP spremniku, u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 40 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta u PP spremniku, u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta u PP spremniku, u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta u PP spremniku, u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta u PP spremniku, u kutiji

C10BX13 indapamid, perindopril, rosuvastatin

Doziranje: terapija hipertenzije i jednog od sljedećih stanja: hiperholesterolemija ili kada je potrebna prevencija za veće kardiovaskularne događaje , kod pacijenata za koje se procjenjuje da imaju visok rizik od prvog kardiovaskularnog događaja: jedna tableta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ROXIPER - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp film tableta [1,25 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [1,25 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [2,5 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

C10BX14 amlodipin, perindopril, rosuvastatin

Doziranje: hipertenzija i primarna hiperholesterolemija ili mješovita dislipidemija/homozigotna porodična hiperholesterolemija: 1 tableta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ROXAMPEX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 jedinica+ 8 mg/1 jedinica+ 10 mg/1 jedinica] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

C10BX17 ramipril, rosuvastatin

Doziranje: esencijalna hipertenzija sa primarnom hiperholesterolemijom ili mješovitom dislipidemijom ili homozigotnom porodičnom hiperholesterolemijom ili kod pacijenata za koje se procjenjuje da imaju visok rizik od prvog kardiovaskularnog događaja, za prevenciju velikih kardiovaskularnih događaja, kao dodatak korekciji drugih faktora rizika: oralno, jedna kapsula dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ROSUPRIL - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

- Rp kapsula, tvrda [10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC//AL blistera po 10 kapsula, tvrdih), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [10 mg/1 kapsula+ 20 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 kapsula, tvrdih), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC//AL blistera po 10 kapsula, tvrdih), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula+ 20 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC//AL blistera po 10 kapsula, tvrdih), u kutiji

D KOŽA I POTKOŽNO TKIVO
D01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU
D01A Antimikotici za lokalnu primjenu
D01AA Antibiotici

D01AA01 nistatin

Doziranje: *kutane i mukokutane mikotične infekcije izazvane Candida albicans i drugim sojevima Candide:* 2 puta na dan premazati oboljelo mjesto u tankom sloju, do potpunog ozdravljenja

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NYSTATIN HF - HEMOFARM A.D. VRŠAC

BRp mast [100000 i.j./1 g] Al - tuba sa 20 g masti, u kutiji

D01AC Derivati imidazola i triazola

D01AC01 klotrimazol

Doziranje: gljivične infekcije kože i sluzokože (uzrokovane dermatofitima, kvasnicama, pljesnima i dr.), eritrazme, kandidni vulvitis, kandidni balanitis: krem ili rastvor nanose se u tankom sloju i utrljavaju na oboljela mjesta 2 puta na dan; nakon nestanka kliničkih znakova treba nastaviti primjenu lijeka još najmanje 2 nedjelje.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CANESTEN - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT

BRp krema [10 mg/1 g] 1 tuba sa 20 g kreme (Al - tuba), u kutiji

BRp otopina za kožu [10 mg/1 mL] 20 mL otopine u plastičnoj bočici sa kapaljkom i PE zatvaračem na navoj, u kutiji

MIKOTEN - BOSNALIJEK D.D.

BRp krema [10 mg/1 g] 1 aluminijska tuba od 20 g s membranom i bijelim zatvaračem, u kutiji

PLIMYCOL - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

BRp krema [10 mg/1 g] 20 g kreme u aluminijskoj tubi, u kutiji

D01AC02 mikonazol

Doziranje: *mikoze:* krem se primjenjuje utrljavanjem na oboljelo mjesto 2 puta na dan, ujutro i uveče; nanositi sve do potpunog izlječenja (najmanje 2-6 nedjelja) i poslije nestanka simptoma treba nastaviti liječenje još najmanje nedjelju dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DAKTANOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

BRp krema [20 mg/1 g] Al - tuba sa 30 g kreme, u kutiji

ROJAZOL 20 MG/G KREMA - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

BRp krema [20 mg/1 g] 1 Alu tuba sa 20 g kreme, u kutiji

D01AC08 ketokonazol

Doziranje: *liječenje seboreičnog dermatitisa, peruti i Pityriasis versicolor:* šampon se nanosi na zahvaćenu regiju i nakon 3-5 minuta ispere se vodom; kod Pityriasis versicolor primjenjuje se jednom dnevno maksimum 5 dana, a u liječenju seboreičnog dermatitisa i peruti, dva puta nedjeljno tokom 2-4 nedjelje; *prevencija* - perut i seboreični dermatitis: jednom svake 1-2 sedmice; tinea versicolor: jednom dnevno, maksimalno 5 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MYCOSEB - HEMOFARM A.D. VRŠAC

BRp šampon [20 mg/1 g] 1 plastična (HDPE) bočica sa 100 ml šampona sa kapaljkom (LDPE), u kutiji

REKONAZOL - REPLEK AD SKOPJE

BRp šampon [20 mg/1 g] 1 HDPE plastična boca sa 120 ml šampona, u kutiji

D01AC10 bifonazol

Doziranje: liječenje kožnih mikoza izazvanih dermatofitima, kvasnim gljivicama, plijesnima i drugim gljivicama, uključujući liječenje kože, izloženog ležišta nokta nakon uklanjanja inficiranog dijela nokta kod keratolitičkog liječenja onihomikoza, liječenje eritrazme izazvane bakterijom *Corynebacterium minutissimum*: na oboljeli dio kože nanese se tanki sloj kreme i utrlja, 1 put dnevno, najbolje uveče prije spavanja, a trajanje terapije je od 2 do 4 sedmice

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CANESPOR - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

BRp krema [10 mg/1 g] 1 Alu tuba sa 15 g kreme, u kutiji

D01AC20 diflukortolon, izokonazol

Doziranje: početno ili privremeno liječenje površinskih gljivičnih infekcija dijelova kože bez dlaka i prekrivenih sa dlakama, kod kojih su prisutne jake upalne ili ekcematozne promjene na koži: odrasli, djeca starija od 2 god. i adolescenti, 2 puta dnevno nanijeti na oboljeli dio kože; primjenu prekinuti nakon smirivanja upalnih i ekcematoznih promjena na koži, ili nakon dvije sedmice neprekidne primjene, tretman nastaviti preparatima koji ne sadrže kortikosteroide.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TRAVAZOL - BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Rp krema [0.015 g/15 g+ 0.15 g/15 g] 15 g kreme u aluminijskoj tubi s HDPE zatvaračem, u kartonskoj kutiji

UNIKORT - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Rp krema [1 mg/1 g+ 10 mg/1 g] 15 g kreme u cilindričnoj aluminijskoj tubi koja je zatvorena plastičnim zatvaračem, u kutiji

D01AE Ostali antimikotici za lokalnu primjenu

D01AE15 terbinafin

Doziranje: krema-*tinea pedis*: 1-2 puta dnevno tokom 1 nedjelje; *tinea corporis*, *tinea cruris*: 1 puta dnevno tokom 1 nedjelje; *kožna kandidijaza*, *Pytiasis versicolor*: 1-2 puta dnevno tokom 1 do 2 nedjelje; povlačenje kliničkih simptoma obično nastupa unutar nekoliko dana; neredovna upotreba ili prerano prekidanje liječenja nose sa sobom rizik recidiva; ukoliko nakon dvije sedmice nema znakova poboljšanja, pacijent se treba posavjetovati sa svojim ljekarom; sprej za kožu, rastvor-*tinea pedis*, *tinea cruris*: jednom dnevno tokom 1 nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MYCOCUR - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

BRp krema [10 mg/1 g] 1 Al tuba sa 15 g kreme i HDPE zatvaračem sa navojem, u kutiji

BRp sprej za kožu, otopina [10 mg/1 g] 30 mL otopine u HDPE - bočici sa HDPE - poklopcem, u kutiji

D01AE16 amorolfin

Doziranje: onihomikoze uzrokovane dermatofitima, kvascima i plijesnima: lak primijeniti 1-2 puta sedmično na prethodno očišćene i osušene nokte, trajanje terapije najčešće 6

mjeseci za nokte na rukama, a 9-12 mjeseci za nokte na nogama, procjena liječenja se preporučuje u intervalima od 3 mjeseca.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FUNGILAC - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

Rp lijekoviti lak za nokte [50 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 2,5 ml
lijeikovitog laka za nokte i 10 plastičnih špatula u zajedničkom
spremniku, u kutiji

D01AE22 naftifin

Doziranje: gljivične infekcija stopala, mikoza kože ili kožnih nabora (tinea corporis, tinea inguinalis), interdigitalna forma mikoze (tinea manum, tinea pedum), mikoza noktiju (onikomikoze), kandidijaze kože, pitirijaza versikolor, upalne dermatomikoze (sa ili bez svraba): 1 put dnevno na opranu i pažljivo osušenu oštećenu kožu i okolno područje; za gljivično oboljenje noktiju, preporučuje se primjena 2 puta dnevno; terapiju nastaviti u istom doznom režimu najmanje 2 sedmice nakon kliničkog poboljšanja; rastvor za kožu je posebno pogodan za liječenje mikoze na kosmatom dijelu glave

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DERMIFIN - FARMA-TEK ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

BRp sprej za kožu, rastvor [10 mg/1 mL] 20 ml rastvora u bočici, u kutiji

EXODERIL - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

BRp krema [10 mg/1 g] 15 g kreme (1 aluminijska tuba sa 15 g kreme),
u kutiji

BRp rastvor za kožu [10 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 10 ml rastvora
za kožu, u kutiji

FUNGISOL - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

BRp otopina za kožu [10 mg/1 mL] 10 ml otopine za kožu u staklenoj
bočici s nastavkom za kapanje i čepom, u kutiji

D01B *Antimikotici za sistemsku primjenu*

D01BA *Antimikotici za sistemsku primjenu*

D01BA02 terbinafin

Doziranje: gljivične infekcije kože i noktiju prouzrokovane gljivicom Trichophyton (npr. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis i Epidermophyton floccosum: odrasli, 250 mg jednom dnevno; trajanje liječenja je različito u zavisnosti od indikacije i ozbiljnosti infekcije: Tinea pedis: 2-6 nedjelja; Tinea corporis: 4 nedjelje; Tinea cruris: 2-4 nedjelje; onihomikoze: 6-12 nedjelja i duže; ne preporučuje se za upotrebu kod djece.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LAMISIL - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp tableta [250 mg/1 tableta] 14 tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji

MYCOCUR - NOBEL ILAČ SANAYII VE TICARET A.Ş.

Rp tableta [250 mg/1 tableta] 14 tableta (2 PVC-PE-PVDC-Al blister sa
po 7 tableta), u kutiji

D03 *LIJEKOVI ZA LIJEČENJE RANA I ULCERACIJA*

D03A *Lijekovi za terapiju ožiljaka*

D03AX *Ostali lijekovi za terapiju ožiljaka*

D03AX alantoin, heparin, vodeni ekstrakt luka

Doziranje: *tretman ožiljaka nakon zatvaranja rane:* više puta u toku dana gel nanijeti i blago umasirati u ožiljno tkivo; ako se radi o starim, tvrdim ožiljcima ostaviti lijek da djeluje preko noći pokriven zavojem.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CONTRACTUBEX - MERZ PHARMACEUTICALS GMBH

BRp gel [1 g/100 g+ 5000 i.j./100 g+ 10 g/100 g] 1 Al tuba sa 20 g gela i HDPE - zatvaračem, u kutiji

D03AX03 dekspantenol

Doziranje: *tretman površinskih rana bilo koje vrste i prevencija ojedene, ispucale i oštećene kože:* nanosi se 1 ili više puta na dan, po potrebi; *njega dojki kod dojilja:* nanosi se na bradavice nakon svakog dojenja; *njega djeteta:* nanosi se nakon svake promjene pelena; *liječenje oštećene sluzokože cerviksa:* nanosi se 1 ili više puta dnevno ili kako je preporučeno od strane ljekara;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PANTHENOL - HEMOFARM A.D. VRŠAC

BRp mast [50 mg/1 g] alu-tuba sa 30 g masti, kutija sa alu-tubom, 30 g masti

**D04 ANTIPRURITICI (SREDSTVA PROTIV SVRABA),
UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I
SL.**

**D04A Antipruritici, uključujući antihistaminike,
anestetike i sl.**

D04AA Antihistaminici za lokalnu primjenu

D04AA09 hloropiramin

Doziranje: *ubodi insekata, koprivnjača:* nanijeti u tankom sloju na oboljeli dio kože i blago utrljati 2-3 puta na dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SYNOPEN - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

BRp mast [10 mg/1 g] 1 Al tuba sa 20 g masti, u kutiji

D04AA13 dimetinden

Doziranje: pruritus povezan s dermatozama, urtikarijom, ubodima insekata, opekotinama od sunca i površinskim opekotinama: gel se može nanijeti na kožu 2-4 puta na dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BETIDEN GEL - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

BRp gel [1 mg/1 g] 30 g gela u aluminijskoj tubi, u kutiji

FENISTIL GEL - HALEON HUNGARY KFT

BRp gel [1 mg/1 g] 1 Al tuba sa 30 g gela, u kutiji

FLENTY - ALKALOID AD SKOPJE

BRp gel [1 mg/1 g] 1 aluminijska tuba sa polietilenskim zatvaračem od 30 g, u kutiji

ZIDENAC - GALENICA S.A

BRp gel [1 mg/1 g] 1 aluminijska tuba sa 30 g gela u kutiji

D06 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU**D06A Antibiotici za lokalnu primjenu****D06AX Ostali antibiotici za lokalnu primjenu****D06AX bacitracin, neomicin**

Doziranje: epidermalna piodermija; epidermokutane piodermije; sekundarno inficirane površinske rane, opekotine, čirevi: mast, na oboljelo mjesto nanijeti u tankom sloju 2-4 puta na dan; bakterijske infekcije kože ograničene veličine, prevencija infekcija pupčanika kod novorođenčadi, nakon hirurških zahvata: prašak, primjenjuje se 2 do 4 puta dnevno na oboljelo mjesto; hirurški zahvati: lokalno preventivno kod post-operativnih i drugih rana, kod abrazije kože, transplantacije kože, opekotina 1. i 2. stepena ograničenog opsega, dehiscencija furunkula i apscesa; dermatologija: za lokalno liječenje trofičnih čireva, zastoynog dermatitisa, dekubitisa, hroničnih inficiranih dermatoza poput ekcema, dermatomikoze: sprej, 2-3 puta dnevno raspršiti na inficirano područje

REGISTROVANI LIJEKOVI:**BANEOCIN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.**

Rp prašak za kožu [250 i.j./1 g+ 5000 i.j./1 g] 1 PE kontejner sa 10 g praška za kožu, u kutiji

BIVACYN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Rp mast [500 i.j./1 g+ 3500 i.j./1 g] 30 g masti u aluminijskoj tubi, u kutiji

VIOPLEX-T - MEDICAIR BIOSCIENCE LABORATORIES S.A.

BRp sprej za kožu, prašak [103,8 i.j./1 g+ 1338,22 i.j./1 g] Višedozni aluminijski spremnik sa zaštitnim lakom i PE ventilom sa 121,4 g proizvoda, pod pritiskom, u kutiji

D06AX01 fusidinska kiselina

Doziranje: primarne (impetigo contagiosa, folliculitis superficialis, sycosis barbae, paronychia, erythrasma) i sekundarne (ekcematoidni dermatitis, kontaktni dermatitis, posjekotine/abrazije) infekcije kože izazvane osjetljivim sojevima *Staphylococcus aureus*-a, *Streptococcus* spp i *Corynebacterium minutissimum*: na oboljelo mjesto 3-4 puta dnevno u tankom sloju (rjeđe ako se primjenjuje sa zavojem); pedijatrijska populacija: 3-4 puta dnevno do 7 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:**STANICID - HEMOFARM A.D. VRŠAC**

Rp mast [20 mg/1 g] 10 g masti (u alu-tubi), u kutiji

D06AX07 gentamicin

Doziranje: primarne i sekundarne bakterijske kožne infekcije; inficirane kožne ulceracije; inficirane promrzline i opekotine: mast se lagano namaže na inficirano područje 3-4 puta na dan i po potrebi pokrije gazom; kod odraslih liječenje traje 7-10 dana, a kod djece 5-7 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:**GENTAMICIN BOSNALIJEK - BOSNALIJEK D.D.**

Rp mast [1 mg/1 g] 1 Al tuba sa 15 g masti, u kutiji

GENTAMICIN GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp mast [1 mg/1 g] 1 Alu-tuba sa 15 g masti, u kutiji

D06AX08 tiortricin

Doziranje: *liječenje manjih, površinskih, umjereno vlažnih rana:* prašak za kožu, lagano se posipa 1-2 puta dnevno; gel, nanosi se 2-3 puta dnevno, primjenjuje se u tankom sloju na oštećene dijelove kože i, ako je potrebno, pokriti zavojem

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TYROSUR - ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG

- BRp gel [1 mg/1 g] 5 g gela u aluminijskoj tubi sa plastičnim zatvaračem, u kutiji
BRp prašak za kožu [1 mg/1 g] 5 g praška za kožu u plastičnoj bočici sa umetkom za posipanje i plastičnim zatvaračem, u kutiji

D06AX09 mupirocin

Doziranje: primarne bakterijske infekcije kože (impetigo, folikulitis, furunkuloza); sekundarne bakterijske infekcije (inficirane dermatoze (npr. ekcem), inficirani traumatske lezije (abrazije, ugrizi insekata, manje rane i opekotine): nanosi se u tankom sloju na oboljeli dio kože 2-3 puta na dan tokom 5-10 dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BETRION - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- Rp mast [20 mg/1 g] 15 g masti u aluminijskoj tubi, u kutiji

MIROBACT MAST - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

- Rp mast [20 mg/1 g] 1 aluminijska tuba sa 15 g masti, u kutiji

D06B Hemioterapeutici za lokalnu primjenu
D06BA Sulfonamidi

D06BA01 sulfadiazin-srebro

Doziranje: *profilaksa i tretman infekcija rana i opekotina; tretman toplotnih i hemijskih ozljeda kože:* krema se nanosi jednom dnevno, u sloju debljine 2 do 3 mm; nanošenje kreme se može vršiti direktno ili kremom namazati sterilnu gazu i pokriti zahvaćeno područje kože; prije svakog nanošenja kreme, potrebno je odstraniti ostatke prethodnog sloja kreme; najčešće se primjenjuje 10 do 14 dana, zavisno od indikacije.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ARGEDIN - BOSNALIJEK D.D.

- BRp krema [10 mg/1 g] Al - tuba sa 40 g kreme, u kutiji

D06BB Antivirolici (antivirusni lijekovi)

D06BB03 aciklovir

Doziranje: *herpes simpleks:* u početnoj fazi, kad bolesnik osjeća samo bol i svrab, oboljela područja mažu se 5 puta na dan (svaka 4 sata), izostavljajući primjenu tokom noći; liječenje treba započeti što prije i treba da traje najmanje 4 dana, ukoliko ne dođe do zacjeljenja, nastaviti još 6 dana (sve ukupno 10 dana od početka terapije)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HERNOVIR - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

- Rp krem [50 mg/1 g] Al - tuba sa 10 g kreme, u kutiji

HERPLEX - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- BRp krema [50 mg/1 g] 2 g kreme u aluminijskoj tubi, u kutiji
Rp krema [50 mg/1 g] 10 g kreme u aluminijskoj tubi, u kutiji
Rp krema [50 mg/1 g] 5 g kreme u aluminijskoj tubi, u kutiji

D06BB07 lizozim

Doziranje: pomoćni lokalni tretman kožnih lezija herpesnog porijekla; pomoćni lokalni tretman manjih rana i povreda; pomoćni lokalni tretman dekubitusa, dijabetičnih kožnih ulkusa i potkoljeničnih ulkusa nastalih usljed poremećaja venske cirkulacije; ublažavanje simptoma izazvanih opekotinama od sunca: 2-3 puta dnevno na ranu/leziiju (prethodno očišćenu)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LYSODERM - BOSNALIJEK D.D.

Bp krema [20 mg/1 g] 1 Al tuba sa 15 g kreme, u kutiji

D06BB10 imikvimod

Doziranje: *bradavice (spoljašnje genitalne i perianalne):* nanijeti u tankom sloju 3 puta sedmično pred spavanje dok lezije ne nestanu (maks. 16 sedmica); *površinski karcinom bazalnih ćelija:* nanijeti na lezije i 1 cm iznad, 5 dana sedmično tokom 6 sedmica; procijeniti odgovor 12 sedmica nakon završetka terapije; *aktinične keratoze:* nanijeti na leziiju 3 puta sedmično tokom 4 sedmice; procijeniti odgovor nakon tretmana tokom 4 sedmice-interval bez lijeka; ponoviti 4-sedmičnu terapiju ukoliko lezije još uvijek postoje; maks. dvije 4-sedmične terapije. Napomena: trebalo bi da se nanese i da se omogući da ostane na tretiranoj oblasti tokom 6-10 sati kod bradavica ili tokom 8 sati kod karcinoma bazalnih ćelija i aktiničnih keratoza, zatim oprati blagim sapunom i vodom (neobrezani muškarci koji liječe bradavice prepucijuma trebaju površinu oprati dnevno). Kremu treba sprati prije seksualnog kontakta.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALDARA - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

Rp krema [5 g/100 g] 12 kesica (poliesterske/aluminijumske folije) po 250 mg kreme, u kutiji

D06BX Ostali hemioterapeutici za lokalnu primjenu
D06BX01 metronidazol

Doziranje: *acne rosacea; rozaceiformni steroidni dermatitis:* prije nanošenja kreme, kožu treba oprati, krema se u tankom sloju nanosi na zahvaćena područja kože 2 puta na dan, ujutro i uveče i blago utrlja; liječenje se provodi 3-4 mjeseca

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ROZAMET - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

Rp krema [10 mg/1 g] 1 alu- tuba sa 25 g kreme, u kutiji

D07 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
D07A Kortikosteroidi, monokomponentni
D07AA Kortikosteroidi, slabog djelovanja (grupa I)
D07AA02 hidrokortizon

Doziranje: ekcem (atopijski, infantilni, diskoidni, stazni), prurigo nodularis, neurodermatose, seboroični dermatitis, intertrigo i kontaktne reakcije senzitivnosti; ubodi insekata; inflamatorna oboljenja sluzokože: pažljivo očistiti oboljelo mjesto na koži, a zatim nanijeti tanak sloj masti, 2 do 3 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HYDROCORTISON GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp mast [25 mg/1 g] 1 alu-tuba sa 5 g masti, u kutiji

D07AB Kortikosteroidi, srednje jakog djelovanja (grupa II)

D07AB10 alklometazon

Doziranje: *akutne i hronične dermatoze (atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis, seboreični dermatitis, psorijaza):* 2-3 puta na dan mazati oboljelo mjesto i blago utrljati; prekinuti liječenje nakon što je postignuta remisija bolesti; površina kože na koju se nanosi alklometazon ne smije se prekrivati zbog mogućnosti pojačane apsorpcije ispod okluzije, osim u liječenju teških i rezistentnih dermatoza; mast je pogodna za liječenje hroničnih dermatoza, tj. suhih, skvamoznih, hiperkeratotičnih promjena, a krema za liječenje akutnih, vlažnih dermatoza.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AFLODERM - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp krem [0.5 mg/1 g] 1 alu-tuba sa 20 g kreme, u kutiji
Rp mast [0.5 mg/1 g] 1 alu-tuba sa 20 g masti, u kutiji

D07AC Kortikosteroidi, jakog djelovanja (grupa III)

D07AC01 betametazon

Doziranje: *lokalno liječenje dermatoza osjetljivih na primjenu kortikosteroida:* krem ili mast se nanosi na oboljelu kožu u što tanjem sloju 1 do 2 puta dnevno, lagano utrljavajući, ne duže od 3 nedjelje; krema se primjenjuje u liječenju akutnih vlažnih lezija kože, a mast je pogodna za liječenje hroničnih dermatoza; otopinu nanijeti na kožu 2 puta dnevno, te nježno i potpuno umasirati

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BELODERM - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp krema [0.5 mg/1 g] aluminijska tuba sa 15 g kreme, u kutiji
Rp krema [0.5 mg/1 g] aluminijska tuba sa 30 g kreme, u kutiji
Rp mast [0.5 mg/1 g] aluminijska tuba sa 15 g masti, u kutiji
Rp mast [0.5 mg/1 g] aluminijska tuba sa 30 g masti, u kutiji
Rp otopina za kožu [0.5 mg/1 g] 1 PE bočica sa 50 ml otopine za kožu u kutiji

BETAZON - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

- Rp krema [0.5 mg/1 g] 25 g kreme u aluminijskoj tubi, u kutiji

BETHANAT - BOSNALIJEK D.D.

- Rp mast [0.5 mg/1 g] 1 aluminijska tuba sa 15 g masti, u kutiji

D07AC04 fluocinolon acetonid

Doziranje: *inflamatorna, pruritička i alergijska oboljenja kože:* 1-2 puta dnevno mazati oboljelo mjesto i blago utrljati, terapija obično traje 1 do 4 nedjelje; lijek se ne smije primjenjivati duže od 7 dana bez nadzora ljekara, a 5 dana ukoliko se koristi na licu ili u prevojima kod djece; lijek se primjenjuje kod odraslih i djece starije od godinu dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SINODERM - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- Rp gel [0,25 mg/1 g] 30 g gela u alu-tubi, u kutiji

D07AC13 mometazon

Doziranje: *inflamatorne i pruritičke dermatoze (psorijaza, atopijski dermatitis); dermatoze sa izraženim svrabom:* krema ili mast, jednom dnevno u tankom sloju namazati oboljelo mjesto; rastvor za kožu, jednom dnevno nekoliko kapi utrljati na oboljeli dio kosmatog dijela glave.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ELOCOM - N.V. ORGANON

Rp krema [1 mg/1 g] 1 Al/tuba sa 30 g kreme, u kutiji
Rp mast [1 mg/1 g] 1 Al/tuba sa 30 g masti, u kutiji

D07AD Kortikosteroidi, vrlo jakog djelovanja (grupa IV)

D07AD01 klobetazol

Doziranje: psorijaza (isključujući tip sa raširenim plakovima-„plaque psoriasis“), rekalcitrantne dermatoze, lichen planus, diskoidni eritematozni lupus (lupus rythematosus); kratkotrajna terapija jako rezistentnih inflamatornih oboljenja kože koja ne reaguju na manje potentne kortikosteroide: mast, nanijeti u tankom sloju 1-2 puta dnevno tokom 4 nedjelje; maks. 50 g 0,05% preparata nedjeljno; lokalna terapija umjerene psorijaze vlasišta: šampon, pola supene kašike (oko 7,5 ml) direktno na suho vlasište, vodeći računa da se lezije doro pokriju i masiraju, držati na vlasištu bez pokrivanja glave u periodu do 15 min, zatim temeljno isprati vodom; maksimalno 50 g nedjeljno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CUTIBEL - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

Rp šampon [500 µg/1 g] 1 HDPE bočica sa 125 ml šampona, u kutiji.
Rp šampon [500 µg/1 g] 1 HDPE bočica sa 60 ml šampona, u kutiji

DERMOVATE - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

Rp mast [0.5 mg/1 g] tuba sa 25 g masti u kutiji

D07C Kortikosteroidi, kombinacije sa antibioticima D07CA Kortikosteroidi slabog djelovanja, kombinacije sa antibioticima

D07CA01 hidrokortizon, oksitetraciklin

Doziranje: primarno i sekundarno inficirane dermatoze: mast, nanosi se na oboljeli dio kože u tankom sloju 2-4 puta na dan; sprej, poprskati 2-4 puta dnevno u jednakim vremenskim razmacima; ne primjenjivati duže od 7 dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HYDROCYCLIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp mast [10 mg/1 g+ 30 mg/1 g] 1 alu-tuba sa 20 g masti u kutiji

OXYCORT - TARCHOMINSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLFA” SPÓŁKA AKCYJNA

Rp sprej za kožu, suspenzija [3.1 mg/1 g+ 9.3 mg/1 g] 32,25 g spreja za kožu, suspenzije u aluminijskom spremniku pod pritiskom s raspršivačem i PP zatvaračem, u kutiji

D07CC Kortikosteroidi jakog djelovanja, kombinacije sa antibioticima

D07CC01 betametazon, gentamicin

Doziranje: inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože: 1-2 puta na dan mazati oboljelo mjesto u tankom sloju, laganim utrljavanjem; krema je namijenjena za primjenu na masnoj koži i za liječenje vlažnog ekcema, a mast se koristi kod suhe kože.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BELOGENT - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp krema [0.5 mg/1 g+ 1 mg/1 g] 15 g kreme u aluminijskoj tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji

Rp mast [0.5 mg/1 g+ 1 mg/1 g] 15 g masti u aluminijskoj tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji

BETHAGEN - BOSNALIJEK D.D.

Rp krema [0.5 mg/1 g+ 1 mg/1 g] 15 g kreme u Alu tubi, u kutiji

DIDERMAL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp krem [0,5 mg/1 g+ 1 mg/1 g] 1 Alu-tuba sa 15 g kreme, u kutiji

Rp mast [0.5 mg/1 g+ 1 mg/1 g] 1 Alu-tuba sa 15 g masti, u kutiji

DIPROGENTA - N.V. ORGANON

Rp mast [0.5 mg/1 g+ 1 mg/1 g] 1 Al tuba sa 15 g masti, u kutiji

D07CC02 fluocinolon acetonid, neomicin

Doziranje: *inflamatorne promjene na koži:* 2-3 puta dnevno nanijeti na oboljelo mjesto i blago utrljati

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SINODERM N - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp mast [0.25 mg/1 g+ 3.3 mg/1 g] 1 alu-tuba sa 15 g masti, u kutiji

D07X Kortikosteroidi, ostale kombinacije

D07XC Kortikosteroidi jakog djelovanja, ostale kombinacije

D07XC01 betametazon, gentamicin, klotrimazol

Doziranje: *dermatoze osjetljive na kortikosteroide* ukoliko je došlo do pojave sekundarne infekcije mikroorganizmima osjetljivim na gentamicin ili klotrimazol: 2 puta dnevno nanijeti tanak sloj kreme ili masti na oboljelo mjesto, tokom 7-10 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TRIDERM - N.V. ORGANON

Rp krem [0.5 mg/1 g+ 1 mg/1 g+ 10 mg/1 g] 1 Al tuba sa 15 g kreme, u kutiji

D07XC01 betametazon, salicilna kiselina

Doziranje: *subakutne i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom:* 1-2 puta na dan nanijeti mast, rastvor ili sprej za kožu na oboljelo mjesto i blago utrljati.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BELOSALIC - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp mast [0.5 mg/1 g+ 30 mg/1 g] 30 g masti u aluminijskoj tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji

Rp rastvor za kožu [0.5 mg/1 g+ 20 mg/1 g] 1 polietilenska bočica sa 100 ml rastvora za kožu (sa pumpicom s nastavkom za raspršivanje), u kutiji

Rp rastvor za kožu [0.5 mg/1 g+ 20 mg/1 g] 50 ml rastvora za kožu u polietilenskoj bočici s polietilenskim zatvaračem i umetkom s rupom za doziranje, u kutiji

BETHASAL - BOSNALIJEK D.D.

Rp mast [0.5 mg/1 g+ 30 mg/1 g] 1 Al tuba sa 30 g masti, u kutiji

D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI

D08A Antiseptici i dezinficijensi

D08AC Bigvanidi i amidini

D08AC02 hlorheksidin

Doziranje: HIBIBOS G - antiseptičko sredstvo za intaktnu kožu pacijenta prije medicinskih ili hirurških invazivnih procedura; za dnevno pranje kože pacijenta, posebno

u jedinicama intenzivne njege; kao topikalni antimikrobni agens u veterinarskoj dermatologiji; za čuvanje i dezinfekciju čistih instrumenata: samo za spoljnu primjenu, primjenjuje se isključivo razblažen, a razblaživanje se vrši destilovanom vodom; HIBIBOS T - preoperativna dezinfekcija kože prije provođenja manjih hirurških procedura: samo za spoljnu primjenu, primjenjuje se nerazblažen

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HIBIBOS G - BOSNALIJEK D.D.

- BRp otopina za kožu [5 g/100 mL] 1000 ml otopine (bijela polietilenska boca sa 1000 ml otopine sa zatvaračem)
- BRp otopina za kožu [5 g/100 mL] 1000 ml otopine (polietilenska boca sa zatvaračem)
- BRp otopina za kožu [5 g/100 mL] 5000 ml otopine (polietilenski kanister sa 5000 ml otopine sa zatvaračem)

HIBIBOS T - BOSNALIJEK D.D.

- BRp otopina za kožu [0,5 g/100 mL] 1000 ml otopine (bijela polietilenska boca od 1000 ml otopine sa dozatorom)
- BRp otopina za kožu [0,5 g/100 mL] 1000 ml otopine (polietilenska boca sa zatvaračem)
- BRp otopina za kožu [0,5 g/100 mL] 500 ml otopine (bijela polietilenska boca od 500 ml otopine sa dozatorom)
- BRp otopina za kožu [0,5 g/100 mL] 5000 ml otopine (polietilenski kanister od 5000 ml otopine sa zatvaračem)

D08AC02 **dekspantenol, hlorheksidin**

Doziranje: *prevencija infekcije i poticanje zacjeljivanja površinskih rana i lezija kože:* lokalno, na oboljelo područje kože 1-2 puta dnevno, a po potrebi i češće.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BEPANTHEN PLUS - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT

- BRp krema [50 mg/1 g + < 5 mg/1 g] 1 Al- tuba sa 30 g kreme, u kutiji

D08AG **Preparati sa jodom**

D08AG02 **povidon jod**

Doziranje: rastvor za kožu 10 g/100 ml, sprej za kožu 10 g/100 ml - *dezinfekcija intaktna kože i sluzokože, neposredno prije hirurške intervencije, biopsije, injekcije, punkcije, uzimanja krvi i kateterizacije mokraćnog mjehura (jednokratno); dezinfekcija rana (npr. dekubitusa ili varikoznih ulkusa), opekotina, inficiranih ili superinficiranih dermatoza: premazati više puta na dan ili staviti vlažan oblog i ostaviti 1-10 min. da se osuši; rastvor za kožu i sprej za kožu- primjenjuje se nerazblažen, izloženost rastvoru treba trajati 1-10 min; mast - profilaksa mikrobiološke kontaminacije kod opekotina, rana, incizija i drugih lokalnih lezija; liječenje primarnih i sekundarnih topičkih bakterijskih, mikotičkih i virusnih infekcija; inficiranih hirurških lezija; inficiranih ulceracija dekubitusa i statičnih ulceracija; piodermija; sekundarno inficiranih dermatoza, inficiranih traumatskih lezija, hitno liječenje laceracija i abrazija: direktno na oboljelo mjesto -3 puta dnevno; rastvor za kožu 7,5 g/100 ml - preoperativno i postoperativno pranje ruku osoblja u operacionim salama; preoperativna priprema kože pacijenata, uključujući i postoperativnu primjenu na incizije u cilju prevencije infekcija; upotreba u jedinicama primarne zdravstvene zaštite, kada ljekar ili medicinsko osoblje treba mikrobicidno sredstvo za dezinfekciju ruku ili pripremanje kože pacijenta za hirurške zahvate: za doziranje i način primjene konsultovati literaturu proizvođača; pjena za kožu 7,5 g/100 ml - preoperativna dezinfekcija ruku hirurškog tima, dezinfekcija mjesta operativnog reza odmah prije samog elektivnog hirurškog zahvata: za doziranje i način primjene konsultovati literaturu proizvođača;*

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BETADINE - ALKALOID AD SKOPJE

- BRp mast [100 mg/1 g] aluminijumska tuba sa polipropilenskim zatvaračem na navoj, sa 20 g masti, u kutiji
- BRp rastvor za kožu [10 g/100 mL] 1 smeđa polipropilenska bočica sa 100 ml rastvora za kožu, u kutiji
- BRp rastvor za kožu [10 g/100 mL] plastična, polietilenska boca bijele boje sa plastičnim polietilenskim zatvaračem na navoj, sa 1000 ml rastvora za kožu
- BRp rastvor za kožu [7.5 g/100 mL] plastična, polietilenska boca bijele boje sa plastičnim polietilenskim zatvaračem na navoj, sa 1000 ml rastvora za kožu

IZOSEPT D - BOSNALIJEK D.D.

- BRp otopina za kožu [10 g/100 mL] 1000 mL otopine za kožu u polietilenskoj boci sa cap to cap - zatvaračem
- BRp sprej za kožu, otopina [100 mg/1 mL] 100 mL otopine za kožu u polietilenskoj boci sa sprej pumpicom i zaštitnom kapicom, u kutiji

JODOKOMP - ZOREX PHARMA D.O.O. ŠABAC

- BRp pjena za kožu [7,5 g/100 mL] 500 ml pjene za kožu u poluprozirnoj boci od polietilena sa zatvaračem i aplikatorom
- BRp rastvor za kožu [10 g/100 mL] 100 ml rastvora za kožu u poluprozirnoj boci od polietilena sa zatvaračem i aplikatorom, u kutiji
- BRp rastvor za kožu [10 g/100 mL] 500 ml rastvora za kožu u poluprozirnoj boci od polietilena sa zatvaračem i aplikatorom

POVIDON JOD HF - HEMOFARM A.D. VRŠAC

- BRp rastvor za kožu [10 g/100 mL] 1 HDPE boca sa 100 mL rastvora za kožu sa LDPE kapaljkom i PP zatvaračem, u kutiji
- BRp rastvor za kožu [10 g/100 mL] 1 HDPE boca sa 500 mL rastvora za kožu sa PP zatvaračem

D08AJ

Kvarterna amonijum jedinjenja

D08AJ57

fenoksietanol, oktenidin

Doziranje: antiseptički tretman sluznice i okolne kože prije dijagnostičkih i hirurških zahvata u anogenitalnom području, prije kateterizacije mokraćnog mjehura i u usnoj šupljini; podržavajuća terapija interdigitalnih gljivičnih infekcija; adjuvantni antiseptički tretman rana: nanositi jedanput dnevno na sluzokožu i okolnu kožu tupferom namočenim u preparat, dok se potpuno ne nakvasi tretirano područje ili raspršivanjem; nakon primjene treba osigurati najmanje jednu do dvije minute kontaktnog vremena; za tretman upalnih procesa u usnoj šupljini oko 20 ml otopine se intenzivno grglja tokom 20 sekundi; za podržavajuću terapiju u slučajevima interdigitalnih gljivičnih infekcija proizvod treba raspršiti na zahvaćena područja ujutro i uveče.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OCTENISEPT - SHULKE & MAYR GMBH

- BRp otopina za kožu [2 g/100 mL+ 0.1 g/100 mL] 1000 ml otopine u polietilenskoj boci sa plastičnim zatvaračem
- BRp otopina za kožu [2 g/100 mL+ 0.1 g/100 mL] 250 ml otopine u polietilenskoj bočici sa raspršivačem
- BRp otopina za kožu [2 g/100 mL+ 0.1 g/100 mL] 50 ml otopine u polietilenskoj bočici sa raspršivačem, u kutiji

D10 PREPARATI PROTIV AKNI
D10A Lijekovi protiv akni za lokalnu primjenu
D10AD Retinoidi protiv akni za lokalnu primjenu

D10AD03 adapalen

Doziranje: *blago do umjereno izražene akne (acne vulgaris), gdje prevladavaju komedoni, papule i pustule:* lokalno, na područja zahvaćena aknama jedanput na dan, naveče prije spavanja, na čistu i suhu kožu (pogodan za primjenu na područje lica-izbjegavajući područja oko očiju i usta, prsnog koša i leđa).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SONA - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

- Rp gel [1 mg/1 g] 30 g gela u aluminijskoj tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji
 Rp krema [1 mg/1 g] 1 Al tuba sa 30 g kreme, u kutiji

D10AD53 adapalen, benzoil-peroksid

Doziranje: *acne vulgaris kada su prisutni komedoni, papule i pustule:* jednom dnevno, uveče oko 2,5 cm gela nanijeti na čistu i suhu kožu zahvaćenu aknama

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SONA DUO - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

- Rp gel [1 mg/1 g+ 25 mg/1 g] 30 g, u kutiji

D10AF Antiinfektivni protiv akni za lokalnu primjenu

D10AF01 klindamicin

Doziranje: *acne vulgaris:* 2 puta na dan nanosi se tanki sloj otopine na kožu; smanjenje upalnih lezija postaje vidljivo za 6 nedjelje, a maksimalno smanjenje postiže se nakon 12 nedjelja.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AKNET - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

- Rp otopina za kožu [10 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa kapaljkom sa 30 ml otopine za kožu, u kutiji

D10AF51 benzoil-peroksid, klindamicin

Doziranje: *blage do umjerene akne vulgaris, posebno s upalnim lezijama:* odrasli i adolescenti preko 12 god, jednom dnevno, naveče, na zahvaćena područja kože koja su prethodno dobro očišćena, isprana toplom vodom i pažljivo osušena.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AKNET DUO - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

- Rp gel [50 mg/1 g+ 10 mg/1 g] 25 g gela u aluminijskoj tubi zatvorenoj bijelim plastičnim zatvaračem, u kutiji.
 Rp gel [50 mg/1 g+ 10 mg/1 g] 30 g gela u aluminijskoj tubi zatvorenoj bijelim plastičnim zatvaračem, u kutiji.
 Rp gel [50 mg/1 g+ 10 mg/1 g] 50 g gela u aluminijskoj tubi zatvorenoj bijelim plastičnim zatvaračem, u kutiji.
 Rp gel [50 mg/1 g+ 10 mg/1 g] 60 g gela u aluminijskoj tubi zatvorenoj bijelim plastičnim zatvaračem, u kutiji.

D10B *Preparati protiv akni za sistemsku upotrebu*
D10BA *Retinoidi za liječenje protiv akni*

D10BA01 *izotretinoin*

Doziranje: teški oblici akni (otporne na odgovarajuću primjenu standardnih načina liječenja pomoću sistemskih antibakterijskih lijekova i lokalne terapije): odrasli i djeca iznad 12 god: 0,5 mg/kg dnevno (u 1 ili 2 odvojene doze), moguće je povećanje doze i do 1 mg/kg, ako je neophodno; da bi se postigla remisija obično je dovoljno trajanje liječenja od 16 do 24 sedmice (obzirom da je poboljšanje stanja akni moguće primjetiti i do 8 sedmica nakon završetka liječenja, nastavak liječenja ne treba razmatrati prije nego što prođe bar to razdoblje); uočeno je da se ne može očekivati dodatni efekat lijeka iznad kumulativne doze, koja je maks. 150 mg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ISOSKIN - GAP S.A.

- Rp kapsula, meka [10 mg/1 kapsula] 30 kapsula, mekih (3 blistera PVC/TE/PVdC/Aluminium sa po 10 mekih kapsula), u kutiji
Rp kapsula, meka [20 mg/1 kapsula] 30 kapsula, mekih (3 blistera PVC/TE/PVdC/Aluminium sa po 10 mekih kapsula), u kutiji

ROACCUTANE - CHEPLAPHARM SCHWEIZ GMBH

- Rp kapsula, meka [10 mg/1 kapsula] 30 kapsula, mekih (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

D11 *OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI*
D11A *Ostali dermatološki preparati*
D11AH *Lijekovi za liječenje dermatitisa, isključujući kortikosteroide*

D11AH02 *pimekrolimus*

Doziranje: kratkotrajni tretman umjerenog do jakog atopijskog dermatitisa (ekcema) kada se terapija topikalnim kortikosteroidima ili ne preporučuje ili nije moguća: zahvaćenu kožu mazati u tankom sloju dva puta dnevno, do povlačenja simptoma (terapiju prekinuti ako ne dođe do poboljšanja nakon 6 sedmica, ili u slučaju pogoršanja bolesti); doziranje je isto za dojenčad (3-23 mjeseca), djecu (2-11 godina), adolescente (12-17 godina) i odrasle

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ELIDEL - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- Rp krema [10 mg/1 g] 15 g krema u aluminijskoj tubi, u kutiji

D11AH08 *abrocitinib*

Doziranje: *umjereni do teški atopijski ekcem:* oralno, odrasli 200 mg jednom dnevno, smanjena početna doza od 100 mg se preporučuje za pacijente koji će manje tolerisati liječenje, razmisliti o prekidu terapije ukoliko nema odgovora nakon 12 nedjelja kod svih pacijenata; za prilagođavanje doze, prekid ili prekid zbog kliničkog odgovora ili neželjenih efekata konsultovati informacije o lijeku, maksimalno 200 mg dnevno; stariji, početi sa 100 mg jednom dnevno, povećati na 200 mg jednom dnevno ukoliko je neophodno, razmisliti o prekidu terapije ukoliko nema odgovora nakon 12 nedjelja kod svih pacijenata; za prilagođavanje doze, prekid ili prekid zbog kliničkog odgovora ili neželjenih efekata konsultovati informacije o lijeku, maksimalno 200 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CIBINQO - PFIZER INC.

- Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 PVDC/AL blistera po 7 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 PVDC/AL blistera po 7 tableta), u kutiji

D11AX Ostali dermatološki preparati

D11AX01 minoksidil

Doziranje: *androgena alopecija kod muškaraca*: muškaraci 18-65 godina; ujutro i uveče priloženim dozatorom nanijeti po 1 ml rastvora na suhu čelavu površinu, te blago utrljavati od središta ka krajevima; ukupna dnevna doza ne smije biti veća od 2 ml; trajanje terapije zavisi od rezultata; nakon nanošenja rastvora oprati ruke.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PILFUD - BOSNALIJEK D.D.

- BRp sprej za kožu, otopina [20 mg/1 mL] 1 bijela polietilenska bočica sa 60 ml otopine za kožu i raspršivačem, u kutiji
- BRp sprej za kožu, otopina [50 mg/1 mL] 1 bijela polietilenska bočica sa 60 ml otopine za kožu i raspršivačem, u kutiji

G **GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI**
G01 **GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI**
G01A **Antiinfektivni i antiseptici, isključujući kombinacije sa kortikosteroidima**
G01AA **Antibiotici**

G01AA01 **nistatin**

Doziranje: vulvovaginalna kandidijaza: po 1 vaginaleta (prethodno ovlažena vodom) uveče tokom 6 uzastopnih dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NYSTATIN HF - HEMOFARM A.D. VRŠAC

BRp vaginalna tableta [100000 i.j./1 tableta] bočica sa 15 vaginalnih tableta, u kutiji

G01AA10 **klindamicin**

Doziranje: bakterijska vaginoza: uobičajena doza iznosi 1 vagoitorija uveče pred spavanje, 3 uzastopna dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KLINDAVAG - VERISFIELD SINGLE MEMBER S.A.

Rp vagitorija [100 mg/1 vagitorija] 3 vagitorije (1 blister) u kutiji

STULIPOR - VERISFIELD SINGLE MEMBER S.A.

Rp vagitorija [100 mg/1 vagitorija] 7 vagitorija u PVC-PE traci, u kutiji

G01AA51 **nifuratel, nistatin**

Doziranje: lokalno liječenje upale vagine i vanjskih polnih organa uzrokovano patogenim mikroorganizmima osjetljivim na kombinaciju nifuratel-nistatin: kapsule: 1 vaginalna kapsula, uveče; krema: 2,5 g vaginalne kreme jednom ili dva puta dnevno ujutro i/ili uveče.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MACMIROR COMPLEX - POLICHEM S.A.

Rp vaginalna kapsula, meka [500 mg/1 kapsula+ 200000 i.j./1 kapsula] 12 vaginalnih kapsula u Al/PVC/PVDC blisteru, u kutiji

Rp vaginalni krem [100 mg/1 g+ 40000 i.j./1 g] 30 g vaginalnog kreme u alu-tubi i plastični aplikator, u kutiji

G01AA51 **nistatin, oksitetraciklin**

Doziranje: lokalno liječenje vulvovaginitisa i cervicitisa uzrokovanih Candidom albicans i ostalim gljivicama i bakterijama osjetljivima na nistatin i oksitetraciklin: 1 vaginaleta duboko u rodnici, tokom 6 dana, po potrebi 12 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GEONISTIN - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Rp vaginalna tableta [100000 i.j./1 tableta+ 100 mg/1 tableta] 6 vaginalnih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera po 3 vaginalne tablete), u kutiji

G01AA51 **neomicin, nistatin, polimiksin B sulfat**

Doziranje: prevencija i liječenje vaginalnih infekcija: 1 kapsula dnevno duboko u vaginu, u toku 12 dana (ne prekidati za vrijeme menstruacije)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

POLYGYNAX - LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL

- Rp vaginalna kapsula, meka [35000 i.j./1 kapsula+ 100000 i.j./1 kapsula+ 35000 i.j./1 kapsula] 12 vaginalnih kapsula, mekih (2 PVC/PVDC/Al blistera po 6 kapsula), u kutiji
- Rp vaginalna kapsula, meka [35000 i.j./1 kapsula+ 100000 i.j./1 kapsula+ 35000 i.j./1 kapsula] 6 vaginalnih kapsula, mekih (1 PVC/PVDC/ Al blister), u kutiji

G01AF Derivati imidazola

G01AF01 metronidazol

Doziranje: bakterijski vaginitis uzrokovan *Gardnerellom vaginalis*, trihomonijaze uzrokovane *Trichomonasom vaginalis*: svaku več, duboko u rodnicu, jedna vaginaleta prethodno namočena nekoliko sekundi u vodi; terapija se primjenjuje tokom 10 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MEDAZOL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp vaginalna tableta [500 mg/1 tableta] 10 vaginalnih tableta (1 PVC/Al blister) u kutiji

ORVAGIL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- Rp vagitorija [500 mg/1 vagitorija] 10 vagitorija (2 PVC/PE stripa po 5 vagitorija), u kutiji

G01AF02 klotrimazol

Doziranje: infekcije genitalnog područja (vaginitis) izazvane gljivicama (*Candida*) i superinfekcije izazvane bakterijama osjetljivim na klotrimazol: vaginalete-3 večeri za redom jednu vaginaletu (200 mg) umetnuti u vaginu ili jednokratno, jednu vaginaletu (500 mg) umetnuti u vaginu; krema, vaginalna primjena- 3 večeri za redom istisnuti punjenje 1 aplikatora; infekcije stidnih usana i područja oko njih, upala glavića i kože penisa (kandidni vulvitis, kandidni balanitis): krema se nanese u tankom sloju na oboljele dijelove (od vanjskih genitalnih organa do anusa kod žena, glavić i kožicu kod muškarca) 2 do 3 puta na dan i nježno utrlja; uobičajeno vrijeme liječenja 1-2 nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CANESTEN 1 - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT

- BRp kapsula za rodnicu, meka [500 mg/1 kapsula] 1 kapsula za rodnicu, meka u blisteru (PVC/PVdC/PVC)/ Al i 1 PP-aplikator, u kutiji
- BRp vaginalna tableta [500 mg/1 tableta] 1 PA/mekani Al/PVC/Al - blister sa 1 vaginalnom tabletom i aplikator, u kutiji

CANESTEN 3 - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT

- BRp vaginalna krema [20 mg/1 g] 1 Al tuba sa 20 g vaginalne kreme i 3 aplikatora (PE), u kutiji
- BRp vaginalna tableta [200 mg/1 tableta] 3 vaginalne tablete (1 PA/PVC/Al - blister), u kutiji

PLIMYCOL - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- BRp vaginalna tableta [200 mg/1 tableta] 3 vaginalne tablete (PVC/Al - blister), u kutiji

G01AF04 mikonazol

Doziranje: vaginalna kandidijaza, vulvovaginitis: 1 vaginaleta svako več u toku 7 dana, i za vrijeme menstruacije, ukoliko je tada prisutna infekcija (Miko penotran: 1 vaginaletu uveče, dozu ponoviti ukoliko je potrebno nakon 3 dana)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GINO-DAKTANOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- Rp vagitorij [200 mg/1 tableta] 1 strip (PVC/PE) sa 7 vagitorija u kutiji

MIKO-PENOTRAN - EXELTIS ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI

Rp vagitorija [1200 mg/1 vagitorija] 1 vagitorija u PVC/LDPE dvoslojnoj traci s kućištem, u kutiji

ROJAZOL 200 MG VAGITORIJI - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

Rp vagitorija [200 mg/1 vagitorija] 1 Al/PE strip sa 7 vagitorija, u kutiji

G01AF12 fentikonazol

Doziranje: vaginalna kandidijaza: 600 mg jednom uveče prije spavanja; po potrebi ponoviti nakon 3 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LOMEXIN - RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA & FARMACEUTICA S.P.A.

BRp vaginalna kapsula, meka [600 mg/1 kapsula] 1 vaginalna kapsula, meka u Al PVC/PVdC blisteru, u kutiji

G01AF20 metronidazol, mikonazol

Doziranje: vaginalna kandidijaza, bakterijske vaginoze, mješovite vaginalne infekcije: po 1 vagitoriju uveče, duboko u vaginu, tokom 7 dana; kod ponovljenih slučajeva tretman treba da traje 14 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NEO-PENOTRAN FORTE - EXELTIS ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI

Rp vagitorija [750 mg/1 vagitorija+ 200 mg/1 vagitorija] 7 vagitorija (1 PVC/LDPE dvoslojna folija sa 7 vagitorija) u kutiji

G01AX Ostali antiinfektivni i antiseptički, isključujući kombinacije sa kortikosteroidima

G01AX11 povidon jod

Doziranje: nespecifični vaginitis, vaginitis prouzrokovan kandidom, vaginitis prouzrokovan trihomonomasom, mješovite infekcije: 1 vagitoriju staviti duboko u vaginu uveče prije spavanja, tokom 14 dana; liječenje se ne prekida za vrijeme menstruacije.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BETADINE - ALKALOID AD SKOPJE

BRp vagitorija [200 mg/1 globula] 2 blistera (standardni strip od polivinil-hlorida/polietilena, u obliku alveolea), sa po 7 vagitorija, u kutiji

POVIDON JOD HF - HEMOFARM A.D. VRŠAC

BRp vagitorija [200 mg/1 vagitorija] 14 vagitorija (2 PVC/PE - blistera po 7 vagitorija), u kutiji

G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI
G02A Uterotonic (lijekovi za kontrakciju uterus)
G02AB Ergot alkaloidi (alkaloidi ražene glavnice)

G02AB01 metilergometrin

Doziranje: hemoragija zbog atonije uterus poslije porođaja i pobačaja: u puerperijumu, kod subinvolucije uterus i kasnih krvavljenja poslije porođaja, 10-15 kapi tri puta dnevno; maks. dužina trajanja liječenja je nedjelju dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

METHYLERGOMETRIN - HEMOFARM A.D. VRŠAC

Rp oralne kapi, rastvor [0.25 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 10 ml oralnih kapi, rastvora, u kutiji

G02AD Prostaglandini

G02AD02 dinoproston

Doziranje: *indukcija poroda:* 1 vaginalna tableta (3 mg) visoko u posteriorni forniks (vagine), druga tableta može biti aplikovana poslije 6-8 sati, ukoliko ne nastupi porođaj; maks. ili ukupna doza za 24 sata je 6 mg; *sazrijevanje cerviksa (omekšavanje i dilatacija) u terminu ili blizu termina kada postoje medicinske ili akušerske indikacije:* početna doza 0,5 mg gela, ukoliko ne postoji adekvatna cervikalna/uterine reakcija, doza od 0,5 mg se može ponavljati u intervalima od 6 sati; najveća preporučena kumulativna doza iznosi 1,5 mg u toku 24 časa.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PREPIDIL - PFIZER INC.

ZU gel za cerviks [0.5 mg/3 g] 1 aplikator (plastična šprica sa nastavkom za primjenu) sa 3 g (2,5 ml) gela za cerviks u zaštitnom spremniku, u kutiji

G02B Kontraceptivi za lokalnu primjenu

G02BA Intrauterini kontraceptivi

G02BA03 levonorgestrel

Doziranje: *kontracepcija, idiopatska menoragija, zaštita od hiperplazije endometrijuma za vrijeme supstitucione terapije estrogenima:* intrauterini uložak ugrađuje se u matericu gdje se levonorgestrel postepeno otpušta (efikasnost tokom 8 godina u indikaciji kontracepcije i 5 godina u indikacijama idiopatske menoragije i zaštite od hiperplazije endometrijuma za vrijeme supstitucione terapije estrogenima).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MIRENA - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Rp intrauterini umetak [52 mg/1 aplikator] 1 intrauterini umetak, u kutiji

G02C Ostali ginekološki lijekovi

G02CB Inhibitori prolaktina

G02CB01 bromokriptin

Doziranje: *parkinsonizam:* 1,25 mg pred spavanje tokom prve nedjelje, druge nedjelje 2,5 mg pred spavanje, treće nedjelje 2,5 mg dva puta dnevno; četvrta nedjelja 2,5 mg tri puta dnevno; dalje 3 puta dnevno sa povećanjem 2,5 mg svakih 3-14 dana u zavisnosti od terapijskog odgovora, uobičajeno optimalno 10-30 mg dnevno; *prevencija laktacije:* 2,5 mg prvog dana od porođaja a zatim 2,5 mg 2 puta dnevno tokom 14 dana; *supresija laktacije:* 2,5 mg u toku 2-3 dana, zatim povećavati na 2 puta po 2,5 mg tokom 14 dana; *hipogonadizam, galaktoreja, infertilitet:* u početku 1-1,25 mg uveče pred spavanje, povećati postepeno; uobičajena doza 7,5 mg dnevno u podijeljenim dozama, po potrebi povećati na maks. 30 mg dnevno, uobičajena doza kod infertiliteta bez hiperprolaktinemije, 2,5 mg dva puta dnevno; *akromegalija:* početna doza 1-1,25 mg uveče pred spavanje, povećati postepeno na 5 mg svakih 6 sati; *prolaktinemija:* u početku 1-1,25 mg uveče pred spavanje; povećati postepeno na 5 mg svakih 6 sati (uobičajeno je potrebno do 30 mg dnevno); *prolaktinomi:* djeca 7-17 god. 1,25 mg dva puta dnevno, postepeno povećavati, maksimalno 5 mg kod djece 7-12 god, maksimalno 20 mg kod djece 13-17 god; *gigantizam (akromegalija):* početnu dozu odrediti u skladu sa nivoom hormona rasta u krvi, maksimalno 10 mg kod djece 7-12 god, maksimalno 20 mg kod djece 13-17 god.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BROMOKRIPTIN ZDRAVLJE - ZDRAVLJE AD LESKOVAC

△ Rp tableta [2.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta),
u kutiji

G02CX *Ostali ginekološki lijekovi***G02CX01 atosiban**

Doziranje: smanjenje kontrakcija uterusa radi odlaganja prijevremenog porođaja između 24. i 33. nedjelje trudnoće: inicijalna bolus doza 6,75 mg tokom 1 min, zatim i.v. inf. 18 mg/sat tokom 3 sata, zatim 6 mg/sat tokom 45 sati; maks. trajanje terapije 48 sati

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ATOSIBAN - BIONIKA PHARMACEUTICALS D.O.O. SKOPLJE**

ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [7,5 mg/1 mL] 1 bočica sa 5 ml
koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

ATOSIBAN - BIONIKA PHARMACEUTICALS D.O.O. SKOPLJE

ZU otopina za injekciju [6,75 mg/0.9 mL] 1 bočica sa 0,9 ml otopine za
injekciju, u kutiji

TRACTOCILE - FERRING GMBH

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [7.5 mg/1 mL] bočica sa 5 ml
koncentrata za rastvor za infuziju

ZU rastvor za injekciju [7.5 mg/1 mL] bočica sa 0,9 ml rastvora za
injekciju, u kutiji

**G03 *POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG
SISTEMA*****G03A *Hormonski kontraceptivi za sistemsku primjenu***
G03AA *Progesteroni i estrogeni, fiksne kombinacije***G03AA07 etinilestradiol, levonorgestrel**

Doziranje: oralna kontracepcija i ginekološke indikacije gdje je estrogensko-progesteronska kombinacija opravdana: 1 tableta ujutro od 1.-og dana menstrualnog krvarenja 21 dan, pa 7 dana pauze.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**MICROGYNON 30 - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**

Rp obložena tableta [0.03 mg/1 tableta+ 0.15 mg/1 tableta] 21
obložena tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji

G03AA10 etinilestradiol, gestoden

Doziranje: oralna kontracepcija: 1 tableta ujutro od 1.-og dana menstrualnog krvarenja 21 dan, pa 7 dana pauze.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**LOGEST - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**

Rp obložena tableta [0.02 mg/1 tableta+ 0.075 mg/1 tableta] 21
obložena tableta (1 PVC/Al - blister), u kutiji

G03AA12 drospirenon, etinilestradiol

Doziranje: oralna kontracepcija: 1 tableta ujutro od 1.-og dana menstrualnog krvarenja 21 dan, pa 7 dana pauze. **Adrienne, Cricea, Nyssiela, Yaz** : uzimati po 1 tabletu dnevno, počevši od prvog dana ciklusa, svih 28 dana uzastopno, prema uputstvu.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CRICEA - ALKALOID AD SKOPJE

Rp film tableta [3 mg/1 tableta+ 0,02 mg/1 tableta] 28 film tableta (1 PVC/PVdC/Al blister sa 24 aktivne tablete i 4 placebo tablete), u kutiji

CRYPINEO - ALKALOID AD SKOPJE

Rp film tableta [3 mg/1 tableta+ 0,03 mg/1 tableta] 21 film tableta (1 PVC/PVdC/Al blister sa 21 tabletom), u kutiji

YASMIN - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Rp film tableta [3 mg/1 tableta+ 0.03 mg/1 tableta] 21 film tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji

YAZ - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Rp film tableta [3 mg/1 tableta+ 0.02 mg/1 tableta] 28 film tableta (prozirni PVC/Al blister sa 24 svijetloružičaste + 4 bijele tablete, u kartonskom omotu), u kutiji

G03AB Progesteroni i estrogeni, sekvencijalni preparati

G03AB dienogest, estradiol

Doziranje: oralna kontracepcija; liječenje teškog menstrualnog krvarenja kod žena bez organske patologije a koje žele koristiti oralnu kontracepciju: 1 tabletu dnevno tokom 28 dana počev od prvog dana ciklusa sa aktivnom tabletom (krvarenje se pojavljuje tokom uzimanja inaktivnih tableta), tablete se uzimaju neprekidno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

QLAIRA - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Rp film tableta [2 mg/1 tableta+ 3 mg/1 tableta+ 1 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta+ 3 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta] 28 film tableta (1 blister sa 28 film tableta), u kutiji

G03AD Urgentna kontracepcija

G03AD01 levonorgestrel

Doziranje: hitna kontracepcija: 1 tableta što prije, po mogućnosti unutar 12 sati nakon nezaštićenog odnosa, ali ne kasnije od 72 sata (3 dana) nakon odnosa

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NEBREMEL - ALKALOID AD SKOPJE

BRp tableta [1,5 mg/1 tableta] 1 tableta (1 PVC/PVdC//Al blister sa 1 tabletom), u kutiji

G03AD02 ulipristal

Doziranje: hitna kontracepcija nakon nezaštićenog seksualnog odnosa: 1 tableta što je moguće prije ali ne kasnije od 120 sati (5 dana) nakon nezaštićenog seksualnog odnosa.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ELLAONE - LABORATOIRE HRA PHARMA

BRp tableta [30 mg/1 tableta] 1 tableta (1 PVC/PE/PVdC//Al - blister sa 1 tabletom), u kutiji

G03B Androgeni
G03BA Derivati 3-androsten-4-on-a

G03BA03 testosteron

Doziranje: *hipogonadizam kod muškaraca:* odrasli i stariji muškarci, i.m. 250 mg/1 ml, (radi stimulacije nerazvijenih androgeno-zavisnih organa ili za inicijalno liječenje simptoma deficijencije) svake 2-3 nedjelje, a u terapiji održavanja svakih 3-6 nedjelja, u zavisnosti od individualnih potreba; nije indikovano za primjenu kod djece i adolescenata (muškaraca) mlađih od 18 god.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TESTOSTERON DEPO - GALENIKA A.D. BEOGRAD

ZU rastvor za injekciju [250 mg/1 mL] 5 ampula sa po 1 ml rastvora za injekciju, u kutiji

G03C ESTROGENS
G03CA Natural and semisynthetic estrogens, plain
Prirodni i polusintetski estrogeni,
jednokomponentni

G03CA03 estradiol

Doziranje: znakovi i simptomi prirodnog ili hirurški izazvanog nedostatka estrogena (naleti vrućine, poremećaji spavanja, urogenitalna atrofija, promjene raspoloženja, astenija, gubitak kostiju); prevencija osteoporoze kod žena u postmenopauzi sa visokim rizikom od budućih preloma koji ne tolerišu druge odobrene alternative za prevenciju osteoporoze ili kod kojih su one kontraindikovane: dermalno, za informacije o doziranju i načinu primjene konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OESTRACLIN - SEID.S.A.

Rp gel [0,6 mg/1 g] 80 g gela u aluminijskoj tubi, u kutiji

G03D Progesteroni
G03DA Derivati pregnena

G03DA04 progesteron

Doziranje: **kapsula** - oralno, *luteinska insuficijencije* (predmenstrualni sindrom, poremećaji menstrualnog ciklusa, premenopauza, benigna mastopatija): tokom 10 dana po ciklusu, obično od 17-og uključujući 26-ti dan ciklusa; *hormonsko nadomjesno liječenje menopauze:* ne preporučuje se terapija isključivo estrogenom, pa se progesteron dodaje posljednje dvije nedjelje svakog terapijskog ciklusa; *opasnosti od prijevremenog poroda:* 300-400 mg progesterona na svakih 6-8 sati, u zavisnosti od kliničkih rezultata tokom akutne faze, nakon čega slijedi doza održavanja (npr. 3 x 200 mg na dan) do 36. sedmice trudnoće; *vaginalno, kod djelimičnog nedostatka luteinske faze* (neredovna ovulacija, poremećaji menstrualnog ciklusa) liječenje treba provesti tokom 10 dana po ciklusu, obično od 17-og do 26-og dana ciklusa, uz dozu od 200 mg progesterona na dan; *u slučaju neplodnosti s potpunim nedostatkom luteinske faze (u programu donacije jajnih ćelija):* 100 mg na dan 13-og i 14-og dana ciklusa prenosa, zatim 100 mg ujutro i naveče od 15-og do 25-og dana ciklusa, od 26-og dana ciklusa, u slučaju pojave trudnoće, dozu treba povećati svake sedmice za 100 mg progesterona na dan, do maksimalne doze od 600 mg progesterona na dan, podijeljeno u 3 doze, do 60-og dana trudnoće; *kod dopune luteinskoj fazi tokom IVF,* liječenje treba početi u veće izvršenog

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

prenosa, sa 600 mg progesterona na dan, podijeljeno u 3 doze (ujutro, u podne, naveče); *prijeteci pobačaj ili sprečavanja ponovljenih pobačaja zbog nedostatka luteinske faze*: preporučena dnevna doza je 200 do 400 mg progesterona, podijeljena u dvije pojedinačne doze, sve do 12. sedmice trudnoće; **Crinone gel - liječenje neplodnosti zbog neadekvatne lutealne faze kod odraslih osoba kao dio ART (potpomognuta reproduktivna tehnologija) procedure**: od dana embrionalnog transfera 1,125 g gela (90 mg progesterona) aplikovati u vaginu 1 put dnevno i nakon potvrde trudnoće nastaviti tretman 30 dana;

Darstin gel - benigna bolest dojke (mastodinija); bolni pritisak u grudima, izolovan ili povezan sa kontraceptivnom terapijom, predmenstrualnim sindromom, početkom trudnoće, benignom mastopatijom: dermalno, 5 g gela na kožu dojke dnevno (2,5 g na svaku dojku)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CRINONE - MERCK HEALTHCARE KGAA

Rp vaginalni gel [90 mg/1.125 g] 15 aplikatora sa 1,125 g vaginalnog gela, u kutiji

DARSTIN - SEID.S.A.

Rp gel [10 mg/1 g] 80 g gela u aluminijskoj tubi, u kutiji

SEIDIGESTAN - SEID.S.A.

Rp kapsula, meka [< 200 mg/1 kapsula] 15 kapsula, mekih (1 PVC/Al blister po 15 kapsula, mekih), u kutiji

Rp kapsula, meka [100 mg/1 kapsula] 30 kapsula, mekih (2 PVC/Al blistera po 15 kapsula, mekih), u kutiji

Rp kapsula, meka [200 mg/1 kapsula] 60 kapsula, mekih (4 PVC/Al blistera po 15 kapsula, mekih), u kutiji

UTROGESTAN - LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL S.A.S.

Rp kapsula, meka [100 mg/1 kapsula] 30 kapsula, mekih (2 PVC/Al blistera po 15 kapsula), u kutiji

G03DB

Derivati pregnadiena

G03DB01

didrogesteron

Doziranje: *dismenoreja*: 10 do 20 mg na dan od 5. do 25. dana ciklusa; *endometrioza*: 10 do 30 mg na dan od 5. do 25. dana ciklusa ili kontinuirano; *disfunkcionalna krvarenja (za zaustavljanje krvarenja)*: 10 mg dva puta dnevno tokom 5 do 7 dana; *disfunkcionalna krvarenja (za sprečavanje krvarenja)*: na početku liječenja da bi se zaustavilo krvarenje 20 do 30 mg na dan u trajanju od 10 dana; za kontinuirano liječenje 10 ili 20 mg na dan tokom druge polovine menstrualnog ciklusa; *amenoreja*: estrogen jednom dnevno od 1. do 25. dana ciklusa, zajedno sa 10 mg didrogesterona dva puta na dan od 11. dana do 25. dana ciklusa; *premenstruacijski sindrom*: 10 mg dva puta dnevno od 11. dana do 25. dana ciklusa; *neredovan ciklus*: 10 mg dva puta dnevno od 11. dana do 25. dana ciklusa; *prijeteci pobačaj*: 40 mg odjednom, a zatim 10 mg svakih 8 sati do povlačenja simptoma; *habitualni pobačaj*: 10 mg dva puta dnevno do 12. sedmice trudnoće; *neplodnost uzrokovana insuficijencijom žutog tijela*: 10 mg dnevno od 14. dana do 25. dana ciklusa; liječenje mora trajati najmanje tokom tri uzastopna ciklusa; *hormonsko nadomjesno liječenje: u kombinaciji sa kontinuiranom estrogenskom terapijom*, 10 mg na dan tokom 14 uzastopnih dana u 28-dnevnom ciklusu; *u kombinaciji sa cikličnom estrogenskom terapijom sa intervalima u kojima se lijek uzima i intervalima bez terapije*, obično 21 dan sa terapijom, pa 7 dana bez; 10 mg didrogesterona na dan tokom posljednjih 12-14 dana estrogenske terapije; u zavisnosti od odgovora doziranje se može povećati na 20 mg didrogesterona na dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DUPHASTON - THERAMEX HQ UK LIMITED

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (2PVC/AL blistera po15 tableta) u kutiji

G03DC**Derivati estrena****G03DC02****noretisteron**

Doziranje: *disfunkcionalno krvarenje:* 1 tbl. tri puta dnevno tokom 10 dana; krvarenje obično nestaje unutar 1 do 3 dana; krvarenje usljed prekida je kao uobičajena menstruacija, a javlja se u roku 2-4 dana nakon prekida liječenja; *profilaksa rekurence disfunkcionalnog krvarenja:* ako nema znakova vraćanja normalne funkcije jajnika (u drugoj polovini ciklusa nema povišenja jutarnje temperature, koja treba da se mjeri svakodnevno) treba da se očekuje rekurencija; ciklično krvarenje treba da se uspostavi sa 1 tbl. 2 puta dnevno od 16.-tog do 25.-tog dana ciklusa (prvi dan ciklusa = prvi dan zadnjeg krvarenja)); *primarna i sekundarna amenoreja:* prije početka liječenja endometrij stimulirati estrogenom (14 dana), zatim 10 dana uzimati 1 tbl. jednom ili dva puta dnevno, prelomno krvarenje se javlja nekoliko dana nakon uzimanja zadnje tablete; kod žena kod kojih je postignuta zadovoljavajuća proizvodnja endogenih estrogena, može se prekinuti liječenje estrogenom i izazvati ciklično krvarenje uzimanjem 1 tbl. dva puta dnevno od 16. do 25. dana ciklusa; *premenstrualni sindrom, ciklična mastopatija:* 1 tbl. 1-3 puta dnevno od 19.-26. dana ciklusa; liječenje treba da se ponovi tokom više ciklusa; kada se liječenje prekine, pacijentkinja može da bude bez simptoma tokom više mjeseci; *odlaganje menstruacije:* u slučajevima veoma učestalog menstrualnog krvarenja i pod posebnim okolnostima (operacije, putovanja): 3 puta dnevno 1 tbl. počevši 3 dana prije očekivane menstruacije; normalna menstruacija treba da se javi 2-3 dana pošto se prestane sa uzimanjem tbl; *endometrioza:* liječenje je potrebno početi između 1. i 5. dana ciklusa sa 1 tbl. 2 puta dnevno; u slučaju tačkastog krvarenja, doza se može povećati na 4, a ako je potrebno na 5 tableta dnevno; nakon što krvarenje prestane, početna doza je obično dovoljna; trajanje liječenja: 4-6 mjeseci u kontinuitetu ili duže ako je potrebno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**PRIMOLUT-NOR - BAYER AKTIENGESellschaft**

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

G03G**Gonadotropini i drugi stimulatori ovulacije****G03GA****Gondotropini****G03GA02****humani menopauzalni gonadotropin**

Doziranje: indukcija ovulacije u slučaju anovulacije uključujući policistični ovarijalni sindrom kod žena koje nisu reagovala na klomifen; kontrolisana hiperstimulacija jajnika u okviru tehnologije medicinski potpomognute oplodnje; s.c. ili i.m individualno u zavisnosti od kliničkog odgovora

REGISTROVANI LIJEKOVI:**MENOPUR - FERRING GMBH**

ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [75 i.j./1 bočica] 10 staklenih bočica sa praškom i 10 staklenih ampula sa 1 ml rastvarača (0,9 % rastvor natrijum-hlorida), u kutiji

G03GA05**folitropin alfa**

Doziranje: *žene sa anovulacijom (uključujući policistični ovarijalni sindrom PCOS):* kod pacijentkinja koje imaju menstruaciju sa terapijom se počinje u toku prvih sedam dana menstrualnog ciklusa, uobičajena početna doza 75-150 i.j., povećava se za 37,5 ili 75 i.j.

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

u 7-dnevnim ili poželjno 14-dnevnim intervalima po potrebi, maks. 225 mg dnevno; kada se dobije optimalan odgovor, 24-48 sati nakon posljednje inj. Gonala-f daje se 250 mcg. rekombinantnog humanog horigonadotropina alfa (r-hCG) ili 5000 do 10 000 i.j. hCG; pacijentici se preporučuje da ima seksualni odnos na dan i sljedećeg dana nakon primjene hCG; alternativno, može se izvesti intrauterina inseminacija; *žene koje su podvrgnute ovarijalnoj stimulaciji radi razvoja multiplih folikula prije in vitro fertilizacije ili druge asistirane reproduktivne tehnologije*: 150-225 i.j. od 2. ili 3. dana ciklusa, maks. 450 i.j. dnevno, odgovarajući folikularni razvoj se postiže u prosjeku 10. dana terapije (opseg 5-20 dana); nakon 24-48 h od posljednje injekcije Gonala-f daje se 250 mcg. rekombinantnog humanog horigonadotropina alfa (r-hCG) ili 5000 do 10 000 i.j. hCG; *žene sa anovulacijom usljed teške LH i FSH deficijencije*: budući da su pacijentkinje amenoreične terapija počinje bilo kada, Gonal -f se daje u seriji dnevnih inj. zajedno sa lutropinom alfa; *muškarci sa hipogonadotropnim hipogonadizmom*: 150 i.j. 3 puta sedmično, istovremeno sa hCG, min. 4 mjeseca a po potrebi i duže

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GONAL-F - MERCK HEALTHCARE KGAA

- Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [300 i.j./0.48 mL] Jedan napunjeni pen sa 0,48 ml rastvora za injekciju i 8 igala, u kutiji
- Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [450 i.j./0.72 mL] Jedan napunjeni pen sa 0,72 ml rastvora za injekciju i 12 igala, u kutiji
- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [900 i.j./1.44 mL] Jedan napunjeni pen sa 1,44 ml rastvora za injekciju i 20 igala, u kutiji

GONAL-F 150 - MERCK HEALTHCARE KGAA

- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [150 µg/0.24 mL] 1 napunjeni pen 0,24 mL i 4 igle, u kutiji

G03GA07 lutropin alfa

Doziranje: stimulisanje razvoja folikula kod odraslih žena sa ozbiljnim deficitom luteinizirajućeg hormona (LH) u kombinaciji sa preparatom folikulostimulirajućeg hormona (FSH): s.c. u kombinaciji sa folikulostimulirajućim hormonom prema odgovoru; počinje se sa 75 i.j. lutropina alfa dnevno i 75-150 i.j. FSH

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LUVERIS - MERCK HEALTHCARE KGAA

- Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [75 i.j./1 bočica] 1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju i 1 bočica sa 1 ml rastvarača (voda za injekcije), u kutiji

G03GA08 horigonadotropin alfa

Doziranje: terapija žena koje podliježu superovulaciji prije asistirane reproduktivne tehnike kao što je in vitro fertilizacija (IVF) - da pokrene finalno sazrijevanje folikula i luteinizaciju nakon stimulacije rasta folikula; terapija anovulatornih ili oligo-ovulatornih žena - da pokrene ovulaciju i luteinizaciju kod anovulatornih ili oligo-ovulatornih pacijenata nakon stimulacije rasta folikula: s.c.za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OVITRELLE - MERCK HEALTHCARE KGAA

- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom špricu [250 µg/0.5 mL] 1 napunjeni injekcioni špric sa 0,5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

G03GA10 folitropin delta

Doziranje: kontrolisana stimulacija jajnika u cilju razvoja multiplih folikula kod žena koje su podvrgnute postupcima medicinski potpomognute oplodnje (kao što su in vitro potpomognuta oplodnja ili ciklus intraplazmatske injekcije sperme): određivanje inicijalne

doze se radi na osnovu koncentracije anti-Müllerovog hormona u serumu pacijentice i njene tjelesne težine

REGISTROVANI LIJEKOVI:

REKOVELLE - FERRING GMBH

- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [12 µg/0.36 mL] 1 višedozni napunjeni injekcioni pen i 3 igle za injekciju, u kutiji
- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [36 µg/1.08 mL] 1 višedozni napunjeni injekcioni pen i 9 igala za injekciju, u kutiji
- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [72 µg/2.16 mL] 1 višedozni napunjeni injekcioni pen i 15 igala za injekciju, u kutiji

G03GA30 folitropin alfa, lutropin alfa

Doziranje: *stimulacija razvoja folikula kod odraslih žena sa teškim deficitom LH i FSH: s.c. odrasli (žene), za informacije o doziranju, konsultovati informacije o lijeku*

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PERGOVERIS - MERCK HEALTHCARE KGAA

- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [300 i.j./0.48 mL+ 150 i.j./0.48 mL] 1 napunjeni injekcioni pen, 5 igala za injekciju u kutiji
- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [450 i.j./0.72 mL+ 225 i.j./0.72 mL] jedan napunjeni injekcioni pen, 7 igala za injekciju, u kutiji
- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [900 i.j./1.44 mL+ 450 i.j./1.44 mL] jedan napunjeni injekcioni pen, 14 igala za injekciju, u kutiji

G03H Antiandrogeni

G03HA Antiandrogeni, monokomponentni

G03HA01 ciproteron

Doziranje: primjena kod muškaraca: *hiperseksualnost muškaraca:* 50 mg 2 puta dnevno poslije jela; *inoperabilni karcinom prostate:* 2-3 puta dnevno po 2 tbl. (200-300 mg); *u početku za sprečavanje neželjenih posljedica i komplikacija koje mogu biti izazvane sa agonistima liječenja sa agonistima luteinizirajućeg oslobađajućeg hormona početnim povećanjem testosterona u serumu:* 2 tablete dvaput dnevno (= 200 mg) u periodu od 5 do 7 dana, a zatim 2 tablete dvaput dnevno u trajanju od 3 do 4 sedmice zajedno sa agonistom luteinizirajućeg oslobađajućeg hormona u dozi preporučenoj od strane proizvođača; *za liječenje napada vrućine (valunga), koji se pojavljuju tokom liječenja sa agonistima luteinizirajućeg oslobađajućeg hormona ili nakon orihktomije:* 1 do 3 tablete (50 do 150 mg) dnevno. Doza se može povećati do 2 tablete 3 puta dnevno (= 300 mg), kada je potrebno; **primjena kod žena:** *teški do veoma teški simptomi androgenizacije (teški oblici povećane dlakavosti lica i tijela izazvane sa androgenima, teški oblici gubitka kose vlašiša često praćena sa teškim oblicima akni i/ili seboreje): kod spolno zrelih žena (reproduktivni period) liječenje od prvog do desetog dana ciklusa uzimaju se dvije tablete lijeka (= 100 mg) dnevno u isto vrijeme, uz pogodni estrogen ili pogodnu kombinaciju progestogen-estrogen sa najmanjim mogućim sadržajem etinilestradiola, kao što je 30 ili 35 µg, koji se mora uzimati svaki dan od 1. do 21. dana menstrualnog ciklusa, kako bi se stabilizirao ciklus pacijentice i osigurala potrebna kontracepcijska zaštita. Nakon kliničkog poboljšanja, dnevna doza lijeka se može smanjiti tokom prvih 10 dana kombinovanog liječenja na 1 tabletu (= 50 mg) ili pola tablete (= 25 mg); žene nakon histerektomije ili u postmenopauzi: u zavisnosti od težine poremećaja,*

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

doza je pola tablete do jedna tableta (= 25 do 50 mg) dnevno, prema rasporedu uzimanja tableta od 21 dana i prekidu u uzimanju tableta od 7 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ANDROCUR - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

△ Rp tableta [50 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

G03HB Antandrogeni i estrogeni

G03HB01 ciproteron, etinilestradiol

Doziranje: umjereno do teški oblici akni kod žena u reproduktivnom periodu nakon neuspjeha topikalne terapije ili sistemskog liječenja antibioticima; umjereni do teški oblici hirzutizma; 1 tbl. dnevno tokom 21 dan (uzeti prvog dana ciklusa); svako sljedeće pakovanje počinje se uzimati nakon sedmodnevne pauze, tokom koje obično dolazi do krvarenja, koje obično počinje dva ili tri dana nakon uzimanja posljednje tablete i ne mora završiti prije početka uzimanja sljedećeg pakovanja; vrijeme za ublažavanje simptoma je najmanje 3 mjeseca; redovno provjeravati da li još postoji potreba za liječenjem

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DIANE 35 - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Rp obložena tableta [2 mg/1 tableta+ 0.035 mg/1 tableta] 63 obložene tablete (3 PVC/Al - blistera po 21 tableta), u kutiji

G04 UROLOŠKI LIJEKOVI

G04B Urološki lijekovi

G04B suhi ekstrakt medvjedkinog lista

Doziranje: ublažavanje simptoma blage rekurentne infekcije donjeg urinarnog trakta kod žena kao što je osjećaj žarenja tokom mokrenja i/ili učestalo mokrenje, nakon što ljekar isključi druga ozbiljnija stanja: odrasle žene, 1-2 tablete 2-4 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

UROFEM - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

BRp filmom obložena tableta [476 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

G04BC Lijekovi za rastvaranje bubrežnog kamenca

G04BC alfa pinen, anetol, beta pinen, borneol, cineol, fenhon, kamfen

Doziranje: liječenje urolitijaze: odrasli, 1 kapsula 4 do 5 puta na dan prije jela; djeca 6-14 god. 1 do 2 kapsule 2 puta na dan prije jela; djeca 14 do 18 god. 1 kapsula 4 do 5 puta na dan prije jela

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ROWATINEX - ROWA PHARMACEUTICALS LTD

BRp želučanootporna kapsula, meka [24,8 mg/1 kapsula+ 4 mg/1 kapsula+ 6,2 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula+ 4 mg/1 kapsula+ < 15 mg/1 kapsula] 50 želučanootpornih kapsula, mekih (5 PVC/Al blistera po 10 kapsula) u kutiji

G04BD Lijekovi za učestalo mokrenje i inkontinenciju**G04BD07 tolterodin**

Doziranje: simptomatsko liječenje urgentne inkontinencije i/ili povećane učestalosti i potrebe za mokrenjem: odrasli i stariji bolesnici, 1 put dnevno 4 mg, neovisno o obroku

REGISTROVANI LIJEKOVI:**TOLDEX - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO**

- △ Rp kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda [4 mg/1 kapsula] 28 kapsula s produženim oslobađanjem, tvrdih (2 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 14 kapsula), u kutiji

G04BD08 solifenacin

Doziranje: simptomatsko liječenje inkontinencije i/ili povećane učestalosti nagona za mokrenjem kod pacijenata sa sindromom prekomjerno aktivne mokraćne bežike: odrasli preko 18 god. 5 mg dnevno, po potrebi dozu povećati na 10 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**SAURUS - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.****BANJA LUKA**

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC-Alu blistera), u kutiji
Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC-Alu blistera), u kutiji

SOLIX - TECNIMEDE – SOCIEDADE TECNICO MEDICINAL S.A.

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3PVC/PVDC/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji
Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3PVC/PVDC/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji

VESIFIX - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Aclar/PVdC/PVC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Aclar/PVdC/PVC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ZEVESIN - ZENTIVA, K.S.

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 15 film tableta), u kutiji
Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji

G04BD09 trospijum

Doziranje: oralno, funkcionalni i postoperativni spazam glatke muskulature gastrointestinalnog trakta, žučne kese, bilijarnog trakta i urogenitalnog sistema; urgentne inkontinencije i/ili učestalo mokrenje ili žurnost kakva se može javiti kod pacijenata sa povećanom aktivnošću mokraćnog mjehura (npr. idiopatska ili neurološka povećana detrusorska aktivnost): 1-2 tbl. 3 puta dnevno, ili 4 tbl. 2 puta dnevno; maks. 45 mg dnevno;

REGISTROVANI LIJEKOVI:**SPASMEX FORTE - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.**

- Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

G04BD12 mirabegron

Doziranje: simptomatska terapija neodložne potrebe za mokrenjem, povećane učestalosti mokrenja i/ili urgentne inkontinencije, koje se mogu javiti kod odraslih pacijenata sa sindromom hiperaktivne mokraćne bešike: oralno, 50 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MINKONTI - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

Rp tableta s produženim oslobađanjem [50 mg/1 tableta] 30 tableta s produženim oslobađanjem (3 Al-OPA/ Al/ PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji.

MIRACALM - STADA ARZNEIMITTEL AG

Rp tableta sa produženim oslobađanjem [50 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 Alu-OPA/Alu/PVC- skraćeno Al/Al, blistera sa po 10 tableta), u kutiji

G04BE Lijekovi za liječenje erektilne disfunkcije

G04BE03 sildenafil

Doziranje: *erektilna disfunkcija:* oralno, odrasli, u početku 50 mg 1 sat prije seksualnog odnosa, naknadne doze prilagoditi odgovoru na 25-100 mg kao pojedinačne doze, maks. 1 doza u 24 sata (maks. pojedinačna doza 100 mg); početak dejstva može biti odložen ukoliko se lijek uzme sa hranom; *Revatio: pulmonalna arterijska hipertenzija:* odrasli, 20 mg 3 puta dnevno; djeca 1-17 god. tjelesne mase manje od 20 kg, 10 mg tri puta dnevno; tjelesne mase veće od 20 kg, tri puta na dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ADDAMO - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO

△ Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 4 filmom obložene tablete (1 PVC/PVDC/Al blister sa 4 tablete), u kutiji

DINAMICO - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

△ Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 4 filmom obložene tablete (1 PVC/PVDC//Al blister), u kutiji

△ Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 4 filmom obložene tablete (1 PVC/PVDC//Al blister), u kutiji

RETOMIN - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

△ Rp prašak za oralnu suspenziju [10 mg/1 mL] 1 staklena boca sa 32,27 g praška za oralnu suspenziju, u kutiji

REVATIO - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

△ Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 90 filmom obloženih tableta (6 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

SILDENA - HEMOFARM A.D. VRŠAC

△ Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 1 film tableta (1 PVC/PVDC/Al blister), u kutiji

△ Rp film tableta [25 mg/1 tableta] 1 film tableta (1 PVC/PVDC-Al blister), u kutiji

△ Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 1 film tableta (1 PVC/PVDC/Al blister), u kutiji

SINEGRA - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

△ Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 4 film tablete (1 PVC/PE/PVDC-Al blister), u kutiji

△ Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 4 film tablete (1 PVC/PE/PVDC-Al blister), u kutiji

VIAGRA - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- △ Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 1 filmom obložena tableta (PVC/Al - blister), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 4 filmom obložene tablete (1 PVC/Al - blister), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 1 filmom obložena tableta (PVC/Al - blister), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 4 filmom obložene tablete (1 PVC/Al - blister), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 1 filmom obložena tableta (PVC/Al - blister), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 4 filmom obložene tablete (1 PVC/Al - blister), u kutiji

VIZARSIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVLJ, D.D., NOVO MESTO

- △ Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 1 filmom obložena tableta (1 PVC/ Al blister), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 4 filmom obložene tablete (1 PVC/ Al blister), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 1 filmom obložena tableta (1 PVC/ Al blister), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 4 filmom obložene tablete (1 PVC/ Al blister), u kutiji
- △ Rp raspadljiva tableta za usta [100 mg/1 tableta] 1 raspadljiva tableta za usta (1 OPA/Alu/PVC//PET/Alu blister sa 1 tabletom), u kutiji
- △ Rp raspadljiva tableta za usta [100 mg/1 tableta] 4 raspadljive tablete za usta (1 OPA/Alu/PVC//PET/Alu blister sa 4 tablete), u kutiji
- △ Rp raspadljiva tableta za usta [50 mg/1 tableta] 1 raspadljiva tableta za usta (1 OPA/Alu/PVC//PET/Alu blister sa 1 tabletom), u kutiji
- △ Rp raspadljiva tableta za usta [50 mg/1 tableta] 4 raspadljive tablete za usta (1 OPA/Alu/PVC//PET/Alu blister sa 1 tabletom), u kutiji

G04BE08 tadafafil

Doziranje: *erektilna disfunkcija:* odrasli preko 18 god. početna doza 10 mg najmanje pola sata prije seksualne aktivnosti; sljedeće doze podešavati prema odgovoru, do 20 mg kao pojedinačna doza; maks. 1 doza u toku 24 sata; kod pacijenata koji očekuju seksualnu aktivnost najmanje 2 puta sedmično, uzimanje najniže doze jednom dnevno može biti primjereno (5 mg jednom dnevno, može se smanjiti na 2,5 mg jednom dnevno prema odgovoru); *benigna hiperplazija prostate:* odrasli 5 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BLISSERIGO - ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

- Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 2 filmom obložene tablete (1 PVC/PVdC-Alu blister sa 2 tablete), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC-Alu blister sa 14 tableta), u kutiji

CIALIS - ELI LILLY EXPORT S.A.

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 4 filmom obložene tablete (2 Al/PVC blistera po 2 tablete, u kutiji)
- Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 2 filmom obložene tablete (1 Al/PVC blister, u kutiji)

LIFTA - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

- Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 2 film tablete (1 PVC/PVDC-Alu blister sa 2 tablete), u kutiji

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

Rp	film tableta [20 mg/1 tableta] 2 film tablete (1 PVC/PVDC-Alu blister sa 2 film tablete), u kutiji
Rp	film tableta [20 mg/1 tableta] 4 film tablete (1 PVC/PVDC-Alu blister sa 4 film tablete), u kutiji
Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 14 film tableta (1 PVC/PVDC-Alu blister sa 14 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PVDC-Alu blistera sa 14 tableta), u kutiji
TADALAFIL HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA	
Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 4 film tablete (1 PVC/PCTFE/PVC//AI blister sa 4 tablete), u kutiji
Rp	film tableta [20 mg/1 tableta] 2 film tablete (1 PVC/PCTFE/PVC//AI blister sa 2 tablete), u kutiji
Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PCTFE/PVC//AI blistera sa po 10 tableta), u kutiji
TADILECTO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO	
Rp	filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 4 tablete (1 OPA//AI/PVC//AI blister sa 4 tablete), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 2 tablete (1 OPA//AI/PVC//AI blister sa 2 tablete), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 4 tablete (1 OPA//AI/PVC//AI blister sa 4 tablete), u kutiji

G04BX *Ostali urološki lijekovi*

G04BX *vođeno-etanolni ekstrakt herbe zlatice, herbe gusije trave i herbe rastavica*

Doziranje: tradicionalna upotreba za ispiranje mokraćnih puteva i povećanje protoka urina; zajedno sa obilnim unosom tečnosti (2 litra) može se koristiti u sprečavanju taloženja mokraćnog pijeska u bubrežima i stvaranja mokraćnog kamenca; kod blagih zapaljenja urinarnog trakta kao dodatna terapija: u slučaju odsustva drugih medicinskih indikacija odrasli i djeca starija od 12 god. 20-30 kapi tri puta dnevno (30 kapi odgovara 1,4 ml), uzima se sa obilnim unosom tečnosti u toku dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SOLIDAGOREN - DR. GUSTAV KLEIN GMBH & CO.KG

BRp oralna tečnost [7.9 ml/10 mL+ 7.9 ml/10 mL+ 7.9 ml/10 mL] 20 ml oralne tečnosti u staklenoj bočici, u kutiji

G04C *Lijekovi za liječenje benigne hipertrofije prostate* **G04CA** *Antagonisti alfa-adrenergičkih receptora*

G04CA02 *tamsulosin*

Doziranje: benigna hiperplazija prostate: 400 mcg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALMIK - SYNTHON B.V.

Rp tableta sa produženim oslobađanjem [0,4 mg/1 tableta] 30 tableta s produženim oslobađanjem, u kutiji

APERTO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda [0.4 mg/1 kapsula]
30 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem (3 blistera po 10 kapsula), u kutiji
- BAZETHAM - PLIVA HRVATSKA D.O.O.**
- Rp tableta s produženim oslobađanjem [0.4 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- FLOSIN - BERLIN-CHEMIE AG**
- Rp kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda [0.4 mg/1 kapsula] 30 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem (3 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 10 kapsula), u kutiji
- FOKUSIN - ZENTIVA S.A.**
- Rp kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda [0.4 mg/1 kapsula] 30 kapsula s modificiranim oslobađanjem (2 PVC/PVDC-Al blistera po 15 kapsula) u kutiji
- Rp kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda [0.4 mg/1 kapsula] 30 kapsula s modificiranim oslobađanjem (3 PVC/PVDC-Al blistera po 10 kapsula) u kutiji
- TAMLOS - ALKALOID AD SKOPJE**
- Rp kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda [0.4 mg/1 kapsula] 30 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih (3 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji
- TAMOSIN - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO**
- Rp kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda [0.4 mg/1 kapsula] 30 kapsula sa produženim oslobađanjem (2 Al/PVC/PVDC blistera po 15 kapsula), u kutiji
- TAMSAL - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO**
- Rp kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda [0.4 mg/1 kapsula] 30 kapsula sa modifikiranim oslobađanjem, tvrdih (3 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 10 kapsula u), u kutiji
- TAMSOLIN - STADA ARZNEIMITTEL AG**
- Rp kapsula, tvrda [0.4 mg/1 kapsula] 30 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih (3 PVC/PVdC-Al blistera sa 10 kapsula), u kutiji
- TANYZ - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO**
- Rp kapsula s prilagođenim oslobađanjem, tvrda [0.4 mg/1 kapsula] 30 kapsula sa prilagođenim oslobađanjem, tvrdih (3 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji
- TANYZ ERAS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO**
- Rp tableta s produženim oslobađanjem [0.4 mg/1 tableta] 30 tableta s produženim oslobađanjem (3 blistera PVC/Aclar, Al folija po 10 tableta) u kutiji
- TANYZ ERAS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO**
- Rp tableta s produženim oslobađanjem [0.4 mg/1 tableta] 30 tableta s produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- Rp tableta s produženim oslobađanjem [0.4 mg/1 tableta] 30 tableta s produženim oslobađanjem (3 PVC/PVDC, Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- TAZIN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.**
- Rp kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda [0.4 mg/1 kapsula] 30 kapsula (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula) u kutiji

G04CA52 dutasterid, tamsulosin

Doziranje: benigna hiperplazija prostate, redukcija rizika od nastanka akutne urinarne retencije (AUR) i operacije kod pacijenata sa umjerenim do teškim simptomima BPH: 1 kapsula uz glavni obrok svaki dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

**DATUST DUO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA
D.O.O. BANJA LUKA**

Rp kapsula, tvrda [0,5 mg/1 kapsula+ 0,4 mg/1 kapsula] 30 kapsula,
 tvrdih u HDPE bočici; u kutiji

DUODART - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

Rp kapsula, tvrda [0,5 mg/1 kapsula+ 0,4 mg/1 kapsula] 30 kapsula,
 tvrdih u HDPE bočici, u kutiji

DUSTER DUO - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

Rp kapsula, tvrda [0,4 mg/1 kapsula+ 0,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula,
 tvrdih u HDPE bočici, u kutiji

DUTAMERA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp kapsula, tvrda [0,5 mg/1 kapsula+ 0,4 mg/1 kapsula] 30 kapsula,
 tvrdih u plastičnoj bočici; u kutiji

DUTAPROST COMBO - LABORATORIOS LEON FARMA S.A.

Rp kapsula, tvrda [0,5 mg/1 kapsula+ 0,4 mg/1 kapsula] 1 HDPE
 bočica sa 30 kapsula, tvrdih, u kutiji

TAMLOS DUOD - ALKALOID AD SKOPJE

Rp kapsula, tvrda [0,5 mg/1 kapsula+ 0,4 mg/1 kapsula] 30 kapsula,
 tvrdih u HDPE boci, u kutiji

TAMOSIN DUO - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

Rp kapsula, tvrda [0,5 mg/1 kapsula+ 0,4 mg/1 kapsula] 30 kapsula,
 tvrdih u HDPE bočici od 100 ml, u kutiji

VERION DUO - BOSNALIJEK D.D.

Rp kapsula, tvrda [0,5 mg/1 kapsula+ 0,4 mg/1 kapsula] 30 kapsula u
 HDPE bočici sa polipropilenskim zatvaračem, u kutiji

G04CA53 solifenacin, tamsulosin

Doziranje: simptomi zadržavanja mokraće (neodgodiva potreba za mokrenjem, povećana učestalost mokrenja), simptomi pražnjenja mokraćne bešike udruženi sa benignom hiperplazijom prostate kod muškaraca koji nisu adekvatno odgovorili na monoterapiju: oralno, odrasli muškarci, jedna tableta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PROSTULOSIN - ADAMED PHARMA S.A.

Rp tableta sa modifikovanim oslobađanjem [6 mg/1 tableta+ 0,4 mg/1
 tableta] 30 tableta sa modifikovanim oslobađanjem (2 PA/Al/PVC
 blistera sa po 15 tableta), u kutiji

SAURUS COMBO - STADA ARZNEIMITTEL AG

Rp tableta sa modifikovanim oslobađanjem [6 mg/1 tableta+ 0,4 mg/1
 tableta] 30 tableta sa modifikovanim oslobađanjem (3 oPA/Al/PVC-
 Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

SOLITAM - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO

Rp tableta sa modifikovanim oslobađanjem [6 mg/1 tableta+ 0,4 mg/1
 tableta] 30 tableta sa modificiranim oslobađanjem (3 oPA/Al/PVC/Al
 blistera po 10 tableta), u kutiji

TANCER - ADAMED PHARMA S.A.

Rp tableta s prilagođenim oslobađanjem [6 mg/1 tableta+ 0,4 mg/1 tableta] 30 tableta s prilagođenim oslobađanjem (2 PA/Aluminijuma/PVC/Aluminijum blistera sa 15 tableta), u kutiji

G04CB Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze

G04CB01 finasterid

Doziranje: *benigna hiperplazija prostate:* oralno, odrasli, 5 mg dnevno, razmotriti terapiju nakon 3-6 mjeseci, a zatim svakih 6-12 mjeseci (može biti potrebno nekoliko mjeseci terapije do postizanja poboljšanja).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EPROSTA - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO

Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC blistera sa 14 filmom obloženih tableta), u kutiji

FINASTERID HEMOFARM - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji

FINPROS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC//Al - blistera po 14 tableta), u kutiji

MOSTRAFIN - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 PVC/PVdC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji

G04CB02 dutasterid

Doziranje: *benigna hiperplazija prostate;* smanjenje rizika od nastanka akutne urinarne retencije i hirurškog zahvata kod pacijenata sa umjerenim do teškim simptomima benigne hiperplazije prostate: 1 kapsula na dan (500 mcg); razmotriti efikasnost terapije nakon 3-6 mjeseci liječenja, a zatim svakih 6-12 mjeseci; može biti potrebno i do 6 mjeseci prije nego što se postigne adekvatan terapijski odgovor

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AVODART - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

Rp kapsula, meka [0,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, mekih (3 PVC/PVdC blistera po 10 kapsula), u kutiji

DATUST - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp kapsula, meka [0,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, mekih (3 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

DUSTER - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Rp kapsula, meka [0,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, mekih (3 PVC/PVdC//Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

DUTAPROST - LABORATORIOS LEON FARMA S.A.

Rp kapsula, meka [0,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, mekih (2 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 15 kapsula), u kutiji

DUTRYS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp kapsula, meka [0,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, mekih (2 PVC-PE-PVDC/Al blistera sa po 15 kapsula), u kutiji

LESTEDON - ALKALOID AD SKOPJE

Rp kapsula, meka [0,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, mekih (2 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 15 kapsula), u kutiji

VERION - BOSNALIJEK D.D.

Rp kapsula, meka [0,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, mekih (2 Al//PVC/PE/PVDC blistera sa po 15 kapsula), u kutiji

G04CX Ostali lijekovi za liječenje benigne hipertrofije prostate

G04CX02 ekstrakt ploda testeraste palme

Doziranje: *poteškoće pri mokrenju koje nastaju zbog povećane prostate:* jedanput dnevno po jedna kapsula, poslije jela.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PROSTAMOL UNO - BERLIN-CHEMIE AG

BRp kapsula, meka [320 mg/1 kapsula] 15 kapsula, mekih (1 PVC/PVDC//Al blister), u kutiji
BRp kapsula, meka [320 mg/1 kapsula] 30 kapsula, mekih (2 PVC/PVDC//Al blistera po 15 kapsula), u kutiji
BRp kapsula, meka [320 mg/1 kapsula] 60 kapsula, mekih (4 PVC/PVDC//Al blistera po 15 kapsula), u kutiji
BRp kapsula, meka [320 mg/1 kapsula] 90 kapsula, mekih (6 PVC/PVDC//Al blistera sa po 15 kapsula) u kutiji

H **HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE**

H01 **HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI**

H01A **Hormoni prednjeg režnja hipofize i analozi**

H01AC **Somatropin i agonisti somatropina**

H01AC01 **somatropin**

Doziranje: *izostanak rasta usljed nedostatka hormona rasta:* 0,025-0,035 mg/kg dnevno (odnosno 0,7-1,0 mg/m² dnevno); *izostanak rasta kod djevojčica usljed disgeneze gonada (Turnerov sindrom):* 0,045-0,050 mg/kg dnevno (odnosno 1,4 mg/m² dnevno); *retardacija rasta kod djece u pretpubertetu usljed hronične bubrežne bolesti:* 0,045-0,050 mg/kg dnevno (odnosno 1,4 mg/m² dnevno); *poremećaj rasta kod niske djece koja su rođena premala za gestacijsku dob:* 0,035 mg/kg dnevno (odnosno 1 mg/m² dnevno); *Prader-Willi sindrom za poboljšanje rasta i oblikovanja tijela kod djece:* 0,035 mg/kg dnevno (odnosno 1 mg/m² dnevno), maks. 2,7 mg dnevno, ne smije se primjeniti kod djece s brzinom rasta manjom od 1 cm godišnje; *nedostatak hormona rasta kod odraslih:* ako je nedostatak nastupio u djetinjstvu, 0,2-0,5 mg na dan; ako je nedostatak nastao u odrasloj dobi inicijalno 0,15-0,30 mg dnevno, dozu postepeno povećavati ukoliko je potrebno do maks. 1 mg dnevno, koristiti minimalnu efikasnu dozu (potrebe se mogu smanjiti sa godinama);

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GENOTROPIN - PFIZER INC.

- ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu [12 mg/1 mL] 1 napunjeni injekcioni pen GoQuick sa praškom i rastvaračem za rastvor za injekciju (uložak sa odjeljkom sa praškom i odjeljkom sa 1 ml rastvarača), u kutiji
- ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu [5,3 mg/1 mL] 1 napunjeni injekcioni pen GoQuick sa praškom i rastvaračem za rastvor za injekciju (uložak sa odjeljkom sa praškom i odjeljkom sa 1 ml rastvarača), u kutiji

OMNITROPE - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- ZU/Rp rastvor za injekciju u patroni [10 mg/1.5 mL] 1 patrona sa 1,5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

SAIZEN - MERCK HEALTHCARE KGAA

- ZU/Rp rastvor za injekciju [5,83 mg/1 mL] 1 uložak sa 1,03 ml rastvora za injekciju, u kutiji
- ZU/Rp rastvor za injekciju [8 mg/1 mL] uložak sa 1,5 ml rastvora za injekciju, u kutiji
- ZU/Rp rastvor za injekciju [8 mg/1 mL] uložak sa 2,5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

H01AC08 **somatrogen**

Doziranje: *deficit hormona rasta:* s.c. djeca 3-17 god. 0,66 mg/kg jednom nedjeljno, doza se daje istog dana svake sedmice i podešava prema odgovoru, za titraciju doze i evaluaciju terapije ili prekid liječenja - konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NGENLA - PFIZER INC.

- Rp otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici [24 mg/1.2 mL] 1 napunjena brizgalica sa 1,2 ml otopine za injekciju, u kutiji

Rp otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici [60 mg/1.2 mL] 1 napunjena brizgalica sa 1,2 ml otopine za injekciju, u kutiji

H01B Hormoni zadnjeg režnja hipofize

H01BA Vazopresin i analozi

H01BA02 dezmopresin

Doziranje: sprej - *diabetes insipidus*: odrasli 10-40 mcg dnevno (u 1-2 podijeljene doze); djeca 5-20 mcg/dan; odojčad mogu zahtijevati niže doze; *dijabetes insipidus, dijagnostifikovanje:* odrasli i djeca 20 mcg (ograničiti unos tečnosti na 500 ml tokom 1 sat prije i 8 sati poslije primjene lijeka); *testiranje bubrežna funkcije* (isprazniti bešiku u vrijeme administracije i ograničiti unos tečnosti na 500 ml u periodu 1 sat prije do 8 sati poslije davanja), odrasli 40 mcg; odojčad do 1 god. 10 mcg (ograničiti unos tečnosti na 50% kod sledeća 2 hranjenja da bi se izbjeglo preopterećenje tečnošću), djeca 1-15 god. 20 mcg; **tablete - *centralni diabetes insipidus*:** odrasli i djeca, početna doza je 0,1 mg 3 puta na dan; doza održavanja 0,1-0,2 mg 3 puta na dan; *primarna nokturnalna enureza:* odrasli (ispod 65 god.) i djeca preko 5 god. 0,2 mg prije spavanja, doza se može povećati do 0,4 mg samo ukoliko niže doze nisu efikasne; evaluaciju daljnje potrebe tretmana treba provesti nakon 3 mjeseca, sa prekidom tretmana u trajanju najmanje jedne sedmice; *nikturija:* početna doza je 0,1 mg prije spavanja; u slučaju izostanka efikasnosti nakon jedne sedmice primjene, dozu lijeka treba povećati na 0,2 mg, a potom na 0,4 mg kao sedmično povećanje; **oralni liofilizat-primarna noćna enureza:** sublingvalno, početna doza 120 mcg prije odlaska na spavanje, po potrebi povećati na 240 mcg (ograničiti unos tečnosti); *nikturija sa noćnom poliurijom:* sublingvalno, početna doza 60 mcg prije odlaska na spavanje, po potrebi povećati na 120 mcg, pa na 240 mcg; povećanje doze se vrši u nedjeljnim intervalima (ograničiti noćni unos tečnosti); *centralni diabetes insipidus:* sublingvalno, odrasli i djeca, početna doza 60 mcg 3 puta dnevno, doza održavanja 60-120 mcg 3 puta dnevno, dnevna doza 120-720 mcg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MINIRIN - FERRING INTERNATIONAL CENTER SA

Rp sprej za nos, rastvor [10 µg/0.1 mL] 1 bočica (smeđe staklo tip I) sa 5 mL rastvora na kojoj je ugrađena plastična sprej-pumpa i nazalni aplikator, u kutiji

Rp tableta [0.2 mg/1 tableta] 30 tableta u HDPE - bočici, u kutiji

MINIRIN MELT - FERRING GMBH

Rp oralni liofilizat [120 µg/1 Liofilizat] 30 oralnih liofilizata u blisteru, u kutiji

H01BB Oksitocin i analozi

H01BB02 oksitocin

Doziranje: sprej-promocija ejekcije mlijeka kod pacijenata koji imaju poteškoće u dojenju ili izdavanju mlijeka; prevencija i tretman nakupljanja mlijeka u grudima, prevencija mastitisa: jedan sprej (izmjerena doza od 4 i.j. oksitocina) data 2-5 min. prije nego što se beba spusti na grudi ili se mlijeko ispumpava; rastvor za injekciju/infuziju-indukcija porođaja iz medicinskih razloga, stimulacija porođaja kod kontraktilne inertnosti muskulature uterusa: i.v.inf. 0,001-0,004 i.j./min, ne treba davati prije nego što prođe 12 sati od vaginalne primjene prostaglandina, doze povećavati u intervalima od najmanje 30 min. do maks. 3-4 kontrakcije svakih 10 min. (0,01 i.j./min je često dovoljno) do maks. 0,02 i.j./min. ukoliko se regularne kontrakcije ne uspostave nakon ukupno 5 i.j., prestati sa pokušajem indukcije (može se ponoviti sljedeći dan, početi ponovo sa 0,001-0,004 i.j./min.); carski rez: 5 i.j. odmah nakon porođaja; prevencija postpartalnog uterusnog

Hormonski preparati za sistemsku primjenu, isključujući polne hormone i insuline

krvarenja: 5 i.j. (5 i.j. rastvoreno u fiziološkom rastvoru se daje u vidu infuzije kap po kap ili još bolje putem infuzione pumpe sa promjenljivom brzinom infundovanja preko 5 min.); ukoliko je porođaj ubrzan ili indukovao oksitocinom, infuziju treba povećanom brzinom nastaviti tokom treće faze porođaja i nekoilko sati nakon toga; terapija postpartalnog uterušnog krvarenja: 5 i.j. (5 i.j. rastvoreno u fiziološkom rastvoru se daje u vidu infuzije kap po kap ili još bolje putem infuzione pumpe sa promjenljivom brzinom infundovanja preko 5 min.); terapija teških slučajeva postpartalnog krvarenja: terapiju nastaviti infuzijom rastvora 5-20 i.j. u 500 ml fiziološkog rastvora, a brzina infundovanja mora spriječiti pojavu atonije uterusa; nepotpuni, prijeteci ili spontani pobačaj: početna doza spora i.v. inj. 5 i.j, praćena (i.v. infuzijom) 0,02-0,04 i.j./min. ukoliko je potrebno brzina inf. može biti veća

REGISTROVANI LIJEKOVI:**SYNTOCINON - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH**

Rp sprej za nos, rastvor [40 i.j./1 mL] 1 staklena bočica sa raspršivačem sa 5 mL rastvora, u kutiji

H01C**Hormoni hipotalamusa****H01CB****Somatostatin i analozi****H01CB02****oktreotid**

Doziranje: *Sandostatin-simptomi povezani sa karcinoidnim tumorima sa karakteristikama karcinoidnog sindroma, VIP-oma, glukagonoma:* s.c. inj. početna doza 50 mikrograma jednom ili dva puta dnevno, postepeno povećavati prema odgovoru na 200 mikrograma 3 puta dnevno (veće doze su potrebne izuzetno rijetko); doze održavanja su promjenljive; kod karcinoidnog tumora prekinuti upotrebu nakon 1 nedjelje, ako nema efekta; ako je potrebno brzo reagovanje, početna doza se daje i.v. inj. (sa EKG monitoringom i nakon razblaživanja do koncentracije 10-50% sa 0,9% natrijum-hloridom); *akromegalija, kratkotrajna terapija prije operacije hipofize ili dugotrajna terapija kod pacijenata kod kojih je neadekvatno kontrolisana drugom terapijom ili do postizanja potpune efikasnosti radioterapije:* s.c. inj, 100-200 mikrograma 3 puta dnevno; terapiju treba prekinuti ako nema poboljšanja u roku od 3 mjeseca; *prevencija komplikacija nakon operacija na pankreasu:* konsultovati literaturu proizvođa; **Sandostatin Lar, Oktreotid Teva-** *akromegalija:* i.m. inj. u glutealni mišić 20 mg u intervalu od 4 nedjelje tokom 3 mjeseca; *gastro-entero-pankreatički endokrini tumori:* dubokom i.m. inj. u glutealni mišić, početna doza 20 mg svake 4 nedjelje tokom 3 mjeseca, a zatim dozu podešavati prema odgovoru; maks. 30 mg svake 4 nedjelje; *za akromegaliju,* početi sa depo oktreotidom 1 dan nakon poslednje doze subkutanog oktreotida (za operaciju hipofize dati poslednju dozu depo oktreotida najmanje 3 nedjelje prije operacije); *uznapredovali neuroendokrini tumori srednjeg crijeva, ili tumori nepoznatog primarnog porijekla gdje su sajtovi n-srednjeg crijeva bili isključeni:* dubokom i.m. inj. 30 mg svake 4 nedjelje; *liječenje adenoma koji luče TSH:* početna doza 20 mg u intervalima od 4 nedjelje tokom 3 mjeseca, zatim se doza podešava na osnovu odgovora TSH-a i hormona štitnjače

REGISTROVANI LIJEKOVI:**OKTREOTID TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.**

ZU prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju s produženim oslobađanjem [20 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom za suspenziju za injekciju s produženim oslobađanjem, 1 šprica sa 2 ml rastvarača, 1 adapter za bočicu i 1 sigurnosna igla; u kutiji

ZU prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju s produženim oslobađanjem [30 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom za suspenziju za injekciju s produženim oslobađanjem, 1 šprica sa 2 ml rastvarača, 1 adapter za bočicu i 1 sigurnosna igla; u kutiji

SANDOSTATIN - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

ZU rastvor za injekciju/ infuziju [0.1 mg/1 mL] 5 ampula sa po 1 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

SANDOSTATIN LAR - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

ZU prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju [20 mg/1 viala] 1 bočica sa 20 mg praška, 1 napunjena šprica sa 2 ml tečnosti za pripremu suspenzije, adapterom za bočicu i sigurnosna igla za injekciju, u kutiji

ZU prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju [30 mg/1 viala] 1 staklena bočica sa 30 mg praška i 1 napunjena šprica sa 2 ml tečnosti za pripremu suspenzije, adapterom za bočicu i sigurnosna igla za injekciju, u kutiji

H01CC Antagonisti gonadotropin oslobađajućeg hormona

H01CC02 cetoreliks

Doziranje: prevencija prijevremene ovulacije kod pacijenata koji su podvrgnuti kontrolisanoj ovarijalnoj stimulaciji, praćenoj punkcijom oocita i pomoćnim reproduktivnim tehnikama (dodatak u liječenju ženske neplodnosti (pokrenut uz specijalistički nadzor): s.c.inj. u donji dio trbušnog zida, žene 250 mikrograma ujutro, počevši od petog ili šestog dana stimulacije sa gonadotropinima (ili svaku več, počevši od petog dana stimulacije jajnika); nastaviti tokom cjelokupnog tretmana sa gonadotropinima uključujući i dan indukcije ovulacije (ili več prije indukcije ovulacije)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CETROTIDE - MERCK HEALTHCARE KGAA

ZU/Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [0,25 mg/1 mL] 1bočica sa praškom za rastvor za injekciju, 1 napunjeni injekcioni špric sa 1 ml rastvarača, 2 injekcione igle, u kutiji

H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

**H02A Kortikosteroidi za sistemsku primjenu,
monokomponentni**

H02AB Glukokortikoidi

H02AB01 betametazon

Doziranje: davanje u zglob: reumatoidni artritis, ankilozirajući spondilitis, psorijatični artritis-oligoartikularna zahvaćenost i tendosinovitis, nakupljanje kalcijum pirofosfat-dihidrata ili druge zglobne upale koje uzrokuju kristali, monoartritis (nakon pražnjenja zglobova) kod degenerativnih bolesti zglobova (samo kod sinovitisa i izljeva), kod upale sluzne vrećice (burzitis) nakon pražnjenja vrećice; davanje u leziju: sklerozirajući folikulitis, keloidi, anularni granulom, kožne sarkoidoze, lokalizovane hipertrofične infiltrirane upaljene lezije kod lichen planusa, psorijatičnih plakova, anularnog granuloma lichen simplex chronicusa (neurodermitis), diskoidni eritematozni lupus, lipidna dijabetička nekrobioza, kod alopecije areate; cistični tumor aponeuroze ili tetiva (ganglija); sistemsko liječenje (i.m. davanje) neki oblici alergijskih bolesti (sezonski ili hronični rinitis, hipersenzitivna reakcija);

intraartikularno i periartikularno (1 amp=1 ml): doziranje prilagoditi stepenu upale i veličini zglobova: vrlo veliki zglob (kuk): 1-2 ml; veliki zglob (koljeno, rame) 1-2 ml; srednje veliki zglob (lakat): 0,5-1 ml; mali zglobovi: 0,25-0,5 ml; tokom godine ne bi trebalo injicirati intraartikularno više od 2 injekcije;

Hormonski preparati za sistemsku primjenu, isključujući polne hormone i insuline

intralezijski (intradermelno): pojedinačna doza: 0,2 ml/cm², ukupna sedmična doza za sveukupna bolesna mjesta ne smije biti veća od 1 ml;
lokalna infiltracija: burzitis: 0,25-1 ml (u akutnom stanju do 2 ml); *tendosinovitis i tendinitis*: 0,5 ml; *sinovijska cista*: 0,25-0,5 ml; *fibrozitis*: 0,5-1 ml; ako je potrebno, doza se ponovi nakon 4 sedmice;
sistemski: isključivo jednokratna i.m. injekcija u glutealni mišić: 1-2 ml.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**FLOSTERON - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO**

ZU suspencija za injekciju [5 mg/1 mL+ 2 mg/1 mL] 5 staklenih ampula po 1 ml suspencije za injekciju, u kutiji

H02AB02**deksametazon**

Doziranje: respiratorna oboljenja, endokrinološka, alergijska oboljenja, oftalmološka oboljenja, dermatološka oboljenja, edematozna stanja (idiopatski nefrotski sindrom, Lupus nefritis), gastrointestinalna (Crohn-ova bolest, ulcerozni kolitis), reumatološka oboljenja i kolagenoze, hematološka oboljenja, cerebralni edem udružen sa primarnim ili metastatskim tumorima mozga, mučnina i povraćanje kod hemioterapije, dijagnostički test za hiperfunkciju kore nadbubrežne žlijezde: **tablete**, početna oralna doza je 0,5-10 mg jednom dnevno, ujutro; pri hroničnom doziranju ne treba preći 1,5 mg dnevno; kod djece: doza varira od 0,01 do 0,1 mg/kg dnevno, doziranje se može svesti na pojedinačnu dozu svaki drugi dan sa ciljem smanjenja usporavanja rasta i supresije osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlijezda; **rastvor za injekcije** se može primijeniti u vidu intramuskularne, intraartikularne i intravenske injekcije, intravenske infuzije, injekcije u meka tkiva ili intralezione injekcije; intramuskularna i intravenska primjena: primijenjene doze kortikosteroida zavise od težine bolesti i odgovora pacijenta na terapiju, od momenta kada je bolest pod kontrolom, dozu treba redukovati do najnižeg odgovarajućeg nivoa uz stalni medicinski nadzor pacijenta, u slučajevima kada je pacijent akutno životno ugrožen (npr. anafilaksa, akutna teška astma), neophodno je da se primijene značajno više doze: moždani edem (odrasli): početna doza 8-16 mg i.v., nakon čega se prelazi na 5 mg i.v. ili i.m. na svakih 6 sati, dok se ne postigne zadovoljavajući terapijski odgovor; lokalna primjena (intraartikularno, intraburzalno, u tetivnu ovojnicu): 0,3 do 3 mg, injekcije se mogu primijenjivati u rasponu od svakih 3 - 5 dana do svake 2 - 3 nedjelje; lokalna aplikacija u rektum u slučaju ulceroznog kolitisa: 4 mg rastvoreno u 120 ml rastvora; doze za djecu: potrebe za dozama su različite i mogu se mijenjati u zavisnosti od individualnih potreba djeteta; uobičajene doze su 0,2 mg/kg do 0,4 mg/kg tjelesne mase; liječenje Covid-19 kod odraslih pacijenata i djece starije od 12 god (tjelesne težine preko 40 kg) kojima je potrebna dodatna terapija kiseonikom: oralno ili i.v.inj. 6 mg jednom dnevno tokom najviše 10 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:**DEXAMETHASON KRKA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO**

Rp tableta [0.5 mg/1 tableta] 1 blister (OPA/Al/PVC/-Al) sa 10 tableta, u kutiji
 Rp tableta [20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
 Rp tableta [20 mg/1 tableta] 20 tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
 Rp tableta [4 mg/1 tableta] 20 tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
 Rp tableta [4 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
 Rp tableta [40 mg/1 tableta] 20 tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

Rp	tableta [40 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [8 mg/1 tableta] 20 tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	tableta [8 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ZU	otopina za injekciju [4 mg/1 mL] 25 ampula po 1 ml otopine za injekciju (4 mg/1 ml) u kutiji
DEXASON - GALENIKA A.D. BEOGRAD	
Rp	tableta [0.5 mg/1 tableta] 50 tableta (5 tvrdih PVC/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
ZU	rastvor za injekciju [4 mg/1 mL] 25 ampula po 1 ml rastvora za injekciju/infuziju (5 blistera po 5 ampula) u kutiji

H02AB04 metilprednizolon

Doziranje: supresija različitih inflamatornih i alergijskih poremećaja; teška inflamatorna oboljenja crijeva; cerebralni edem uzrokovan malignitetom; dermatološka stanja; reumatološki poremećaji i kolagene bolesti: oralna doza iznosi 4-40 mg dnevno, početna doza kod akutnih teških stanja može biti i veća, do 100 mg dnevno; djeca starija od 6 god. 0,8-1,2 mg/kg/dan; u intenzivnoj njezi i hitnim stanjima, daje se parenteralno i.m. ili i.v. uobičajena doza 10-500 mg dnevno; veće doze (preko 250 mg) daju se lagano u toku 30 minuta; kod i.v. infuzije metilprednizolon se daje sa 5% rastvorom glukoze ili 0,9% rastvorom natrijum-hlorida; kod djece, parenteralne doze 1-30 mg/kg tjelesne mase i daju se i.m. ili i.v. ne više od 1 g dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEPO MEDROL - PFIZER INC.

ZU suspenzija za injekciju [40 mg/1 mL] 1 staklena bočica (tip I) sa gumenim čepom (butilna guma) i metalnim zatvaračem, u kutiji

LEMOSOLU - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [20 mg/1 bočica] 15 bočica praška i 15 ampula po 1 ml rastvarača (voda za injekciju), u kutiji

ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [40 mg/1 bočica] 15 bočica praška i 15 ampula po 1 ml rastvarača (voda za injekciju), u kutiji

ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [500 mg/1 viala] 1 bočica sa praškom i 1 ampula sa rastvaračem (voda za injekciju), u kutiji

MEDROL - PFIZER INC.

Rp tableta [16 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/Al- blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [4 mg/1 tableta] 30 tableta u HDPE – bočici sa polipropilenskim „child-resistant“ - čepom, u kutiji

METILPREDNIZOLON NORMON - LABORATORIOS NORMON S.A.

ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju [-] 1 staklena bočica s liofiliziranim praškom i 1 staklena ampula sa vodom za injekcije u kartonskoj kutiji

PDSOLONE - SWISS PARENTERALS LIMITED.

ZU prašak za rastvor za injekciju [500 mg/1 bočica] 1 staklena bočica od 10 ml sa praškom za rastvor za injekciju, u kutiji

PDSOLONE 40 MG - SWISS PARENTERALS LIMITED.

ZU prašak za rastvor za injekciju [40 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za injekciju, u kutiji

SUCCINEX-M - WELCURE REMEDIES

Hormonski preparati za sistemsku primjenu, isključujući polne hormone i insuline

ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [40 mg/1 bočica] 1 bočica
sa praškom za rastvor za injekciju i 1 ampula sa rastvaračem (voda
za injekciju), u kutiji

H02AB07 prednizon

Doziranje: bolesti kod kojih je neophodno sistemsko liječenje s glukokortikoidima (alergijske, endokrine, gastrointestinalne, maligne i reumatske bolesti; kolagenoze...): doziranje zavisi od vrste i težine bolesti, kao i od individualnog odgovora bolesnika; obično se inicijalno primjenjuju relativno visoke doze koje su kod težih akutnih oblika znatno više nego kod hroničnih bolesti; u zavisnosti od kliničkih simptoma i individualne reakcije bolesnika, doza se može smanjiti do najniže moguće granice održavanja (5-15 mg dnevno) u različitim vremenskim intervalima; hronične bolesti često zahtijevaju dugotrajno liječenje niskim dozama; supstituciona terapija (nakon perioda rasta): 5-7,5 mg/dnevno podijeljeno u dvije pojedinačne doze (ujutro i u podne, kod adrenogenitalnog sindroma ujutro i uveče); u stanjima stresa nakon dugotrajnog liječenja glukokortikoidima: primjena viših doza do 50 mg dnevno, nakon toga postepeno smanjivanje doze tokom nekoliko dana; visoka doza 80-100 (250) mg/dan, srednja doza 40-80 mg/dan; niska 10-40 mg/dan; vrlo niska 1,5-7,5 mg (10) mg/dan; po pravilu, ukupna dnevna doza se uzima rano ujutro između 6.00 i 8.00 sati (cirkadijalno liječenje); visoke doze se mogu podijeliti u 2 do 4 individualne doze, a srednje dnevne doze u 2 do 3 individualne doze, zavisno od bolesti koja se liječi; za više informacija o doziranju konsultovati literaturu proizvođa; tablete sa modifikovanim oslobađanjem koje se koriste kod reumatoidnog artritisa, posebno kod oblika koji je praćen jutarnjom ukočenošću, se uzimaju prije spavanja (oko 22 sata), budući da oslobađaju aktivnu supstancu sa zakašnjenjem od približno 4-6 sati

REGISTROVANI LIJEKOVI:**NIZON - BOSNALIJEK D.D.**

Rp tableta [5 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji
Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta),
u kutiji

PRONISON - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp tableta [20 mg/1 tableta] 20 tableta (2 blistera od Alu/PVC i tvrde
PVC trake sa 10 tableta), u kutiji

H02AB09 hidrokortizon

Doziranje: endokrini poremećaji (primarna ili sekundarna adrenikortikalna insuficijencija), kolagene bolesti (sistemski lupus eritematosus), dermatološke bolesti (teški multiformni eritem (Stevens-Johnsonov sindrom)), elergijska stanja (bronhijalna astma, anafilaktičke reakcije), probavne bolesti (ulcerozni kolitis, Cronova bolest), respiratorna oboljenja (aspiracija gastričnog sadržaja), hitna medicinska stanja (terapija šoka sa sekundarnom adrenokortikalnom insuficijencijom ili šok udružen sa adrenokortikalnom insuficijencijom na koji ne djeluje konvencionalna terapija): i.v.inj, i.v.inf. ili i.m. za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:**PHARMCORTI - SKYMAP PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED**

ZU prašak za rastvor za injekciju/infuziju [100 mg/1 bočica] 1 bezbojna
staklena bočica, u kutiji

H02AB09 hidrokortizon

Doziranje: endokrini poremećaji, reumatske bolesti, kolagenoze, dermatološka oboljenja, alergijska stanja, oftalmološke bolesti, respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji, hematološki premećaji, maligne bolesti, edematozna stanja, gastrointestinalni poremećaji, poremećaji drugačijeg porijekla (tuberkulozni meningitis sa

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

subarhnoidalnim blokom ili u svrhu sprečavanja nastanka tog bloka, zajedno sa propisanom antituberkuloznom hemoterapijom), urgentna stanja (stanje šoka prouzrokovano insuficijencijom nadbubrega, kao i stanje šoka nakon neuspjeha konvencionalne terapije kada postoji mogućnost postojanja insuficijencije nadbubrega): intravenski (i.v.) u vidu spore intravenske injekcije i intravenske infuzije ili intramuskularno (i.m.); kod hitnih stanja, preparat se može primijeniti i.v. u toku nekoliko minuta. Nakon toga, treba razmotriti prelazak na neki od dugodjelujućih preparata ili na oralne oblike. Odrasli, 100-500 mg u zavisnosti od težine i ozbiljnosti oboljenja, u vidu i.v. injekcije tokom 1-10 min. doza se može ponoviti u intervalima od 2, 4 ili 6 časova u zavisnosti od odgovora pacijenta na terapiju i njegovog kliničkog stanja; velike doze se daju samo dok se stanje bolesnika ne stabilizuje i ne duže od 48-72 sata; djeca, doze za odojčad i djecu treba smanjiti, ali je neophodno više voditi računa o težini kliničkog stanja, nego o uzrastu i tjelesnoj masi djeteta, doza ne bi trebalo da bude manja od 25 mg dnevno; tablete: početna doza je 20-240 mg dnevno, individualno u zavisnosti od specifičnosti i težine bolesti

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CORTEF - PFIZER INC.

Rp tableta [10 mg/1 tableta] 1 HDPE bočica sa 100 tableta, u kutiji

HIDROKORTIZON HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [100 mg/1 viala] 1 bočica
sa praškom i 1 ampula sa rastvaračem, u kutiji

H03 **LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI TIREOIDEJE (** **ŠTITNE ŽLIJEZDE)**

H03A **Preparati tireoideje**

H03AA **Tireoidni hormoni**

H03AA01 **levotiroksin-natrijum**

Doziranje: *hipotireoza:* odrasli preko 18 god, inicijalna doza ne bi trebalo da pređe 25-50 µg dnevno (treba je uzeti prije doručka); doza bi trebalo da se povećava u intervalima 2-4 nedjelje za 25-50 µg; uobičajena doza održavanja je 100-200 µg i daje se jednom dnevno; kod pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjima, inicijalno 25-50 µg jednom dnevno, podešavati postepeno po 25 µg svake 4 nedjelje prema odgovoru (uobičajena doza održavanja 50-200 µg jednom dnevno); dojenčad i djeca: *u liječenju kongenitalnog hipotireoidizma i juvenilnog miksedema*, doze tiroksina bi trebalo titrirati prema kliničkom odgovoru, procjeni rasta i mjerenju nivoa tiroksina i TSH u plazmi; kod djece do 1 mjeseca, inicijalna doza bi trebalo da iznosi 5-10 µg/kg dnevno; kod djece starije od 1 mjeseca, 5 µg/kg dnevno, prilagođeno titriranju od 25 µg svake 2-4 nedjelje dok se ne pojave blagi toksični simptomi, a onda bi dozu trebalo postepeno redukovati; *profilaksa ponovnog javljanja strume; benigna struma sa eutireoidnom funkcijom:* 75-200 µg; *dodatna terapija tireostatskom liječenju hipertireoidizma:* 50-100 µg; *nakon tiroidektomije zbog maligniteta štitnjače:* 150-300 µg; *u dijagnostičke svrhe kod testa supresije štitne žlijezde:* 150-200 µg (tokom 14 dana dok se ne napravi scintigram)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EUTHYROX - MERCK HEALTHCARE KGAA

Rp tableta [100 µg/1 tableta] 100 tableta (4 blistera po 25 tableta) u
kutiji

Rp tableta [100 µg/1 tableta] 30 tableta (1 blister po 30 tableta) u kutiji

Rp tableta [25 µg/1 tableta] 100 tableta (4 blistera po 25 tableta) u kutiji

Hormonski preparati za sistemsku primjenu, isključujući polne hormone i insuline

Rp tableta [25 µg/1 tableta] 30 tableta (1 blister po 30 tableta) u kutiji
 Rp tableta [50 µg/1 tableta] 100 tableta (4 blistera po 25 tableta) u kutiji
 Rp tableta [50 µg/1 tableta] 30 tableta (1 blister), u kutiji

LETROX 100 - BERLIN-CHEMIE AG

Rp tableta [100 µg/1 tableta] 100 tableta (4 Al/Al blister po 25 tableta), u kutiji

LETROX 50 - BERLIN-CHEMIE AG

Rp tableta [50 µg/1 tableta] 100 tableta (4 Al/Al blistera po 25 tableta), u kutiji

H03B Antitireoidni lijekovi**H03BA Tiouracili****H03BA02 propiltiouracil**

Doziranje: *hipertireoidizam, Graves-ova bolest:* inicijalno 300 - 450 mg/dan, a kod *teže hipertireoze* 600 mg/dan; doza održavanja iznosi 100-150 mg/dan; dnevna doza se primjenjuje u 3 pojedinačne doze (na 8 sati); *tireotoksične krize:* 600 - 1200 mg/dan sa postepenim smanjenjem doze u zavisnosti od kliničkog stanja; djeca 6-10 god, 50-150 mg/dan; djeca iznad 10 god, 150-300 mg/dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**PTU - ALKALOID AD SKOPJE**

Rp tableta [100 mg/1 tableta] 45 tableta (3 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji
 Rp tableta [50 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

H03BB Derivati imidazola koji sadrže sumpor**H03BB02 tiamazol**

Doziranje: *hipertireoza:* odrasli, početna doza 10-40 mg dnevno; maks. 40 mg dnevno; doza održavanja 5-20 mg dnevno u kombinaciji sa levotiroksinom u cilju izbjegavanja hipotireoidizma ili kao monoterapija 5-10 mg dnevno; djeca, prosječna početna doza 0,5 mg/kg tjelesne mase dnevno; dodatna terapija levotiroksinom može biti potrebna da bi se izbjegao hipotireoidizam; *profilaksa kod pacijenata sa rizikom od nastanka hipertireoidizma* (kao posljedica primjene supstanci koje sadrže jod u dijagnostičke svrhe): 10-20 mg dnevno i 1 g perhlorata, 10 dana (kod primjene kontrastnih sredstava koji se izlučuju renalno), trajanje terapije zavisi od vremenskog perioda tokom kojeg se supstanca koja sadrži jod zadržava u tijelu

REGISTROVANI LIJEKOVI:**FAVISTAN - BOSNALIJEK D.D.**

Rp tableta [20 mg/1 tableta] 20 tableta (1 polistirenska fiola sa 20 tableta) u kutiji

H04 PANKREASNI HORMONI (HORMONI GUŠTERAČE)**H04A Glikogenolitički hormoni****H04AA Glikogenolitički hormoni****H04AA01 glukagon**

Doziranje: *teška hipoglikemija prouzrokovana insulinom:* s.c. ili i.m. odrasli i djeca preko 8 god. (ili teža od 25 kg) 1 mg; djeca ispod 8 god. (ili lakša od 25 kg) 0,5 mg; ako nema

kliničkog poboljšanja u toku 10 min, mora se dodati i.v. glukoza; *dijagnostički postupci-inhibicija pokretljivosti kod ispitivanja gastrointestinalnog trakta*: 0,2-0,5 mg i.v. inj. ili 1-2 mg i.m. doza varira u zavisnosti od dijagnostičke procedure i puta primjene

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GLUCAGEN HYPOKIT - NOVO NORDISK A/S

Rp prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [1 mg/1 viala] 1 staklena bočica sa praškom i 1 šprica sa 1 ml rastvarača (voda za injekcije), u plastičnoj kutiji

H05 LIJEKOVI ZA USPOSTAVLJANJE HOMEOSTAZE KALCIJUMA

H05A PARATIROIDNI HORMONI I ANALOZI

H05AA Paratiroidni hormoni i analozi

H05AA02 teriparatide

Doziranje: osteoporozu kod žena u postmenopauzi i kod muškaraca s povećanim rizikom od preloma; liječenje osteoporoze povezano s dugotrajnom terapijom sistemskim glukokortikoidima kod žena i muškaraca s povećanim rizikom od preloma: 20 mcg jednom dnevno; pacijenti trebaju uzimati suplemente kalcijuma i vitamina D; ukupno trajanje liječenja maks. 24 mjeseca i ne smije se ponoviti tokom života pacijenta

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MOVYMIA - GEDEON RICHTER PLC.

Rp rastvor za injekciju u ulošku [20 µg/80 µL] 1 uložak sa 2,4 ml rastvora za injekciju, što odgovara 28 doza od 20 mikrograma (na 80 mikrolitara)
Rp rastvor za injekciju u ulošku [20 µg/80 µL] 3 uložka sa po 2,4 ml rastvora za injekciju, što odgovara 28 doza od 20 mikrograma (na 80 mikrolitara)

H05B Antiparatiroidni hormoni

H05BX Ostali antiparatiroidni lijekovi

H05BX01 sinakalcet

Doziranje: sekundarni hiperparatiroidizam kod bolesnika s bolešću bubrega u terminalnoj fazi koji su na dijalizi: odrasli preko 18 god. početi sa 30 mg jednom dnevno, doza se može povećavati svake 2-4 sedmice do maks. 180 mg jednom dnevno; hiperkalcemija kod primarnog hiperparatiroidizma ili paratiroidnog karcinoma: odrasli preko 18 god. početi sa 30 mg dva puta dnevno, doza se može povećavati svake 2-4 sedmice do maks. 90 mg tri ili četiri puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CINACALCET ACCORDPHARMA - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O

Rp film tableta [30 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/Al prozirna blistera po 14 film tableta), u kutiji
Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/Al prozirna blistera po 14 film tableta), u kutiji

H05BX02 parikalcitol

Doziranje: prevencija i terapija sekundarnog hiperparatiroidizma kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom i hroničnim otkazivanjem bubrega koji su na hemodijalizi ili peritonealnoj dijalizi: oralno, odrasli - za doziranje konsultovati literaturu proizvođača; prevencija i terapija sekundarnog hiperparatiroidizma kod bolesnika sa

hroničnom bubrežnom insuficijencijom na hemodijalizi: odrasli, primjenjuje se putem pristupa hemodijalizi (konsultovati literaturu proizvođača)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

REXTOL - RAFARM S.A.

Rp	kapsula, meka [1 µg/1 kapsula] 28 kapsula, mekih (4 PVC/PVdC/Al blistera po 7 kapsula), u kutiji
Rp	kapsula, meka [2 µg/1 kapsula] 28 kapsula, mekih (4 PVC/PVdC/Al blistera po 7 kapsula), u kutiji
ZU	rastvor za injekciju [5 µg/1 mL] 5 ampula po 1 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU	rastvor za injekciju [5 µg/1 mL] 5 bočica po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

J	ANTIINFektivNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
J01	ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
J01A	Tetraciklini
J01AA	Tetraciklini

J01AA02 doksiciklin

Doziranje: liječenje različitih infekcija uzrokovanih osjetljivim sojevima Gram-pozitivnih i Gram-negativnih bakterija i nekim drugim mikroorganizmima (infekcije respiratornog trakta, infekcije urinarnog trakta, seksualno prenosive bolesti, infekcije kože, infekcije oka, rikecije; lijek drugog izbora u liječenju leptospiroze, gasne gangrene i tetanusa, gonoreje i sifilisa; koristi se u profilaksi sljedećih infekcija: tifusa koji se prenosi grinjama, putničke dijareje (izazvana enterotoksinom *Escherichiae coli*), leptospiroze, malarije i kolere; oralna upotreba, za većinu infekcija, prvi dan 200 mg (2 puta po 100 mg), a zatim 100 mg dnevno, u liječenju teških infekcija 200 mg dnevno; kontraindikovana je primjena kod trudnica, dojilja, djece mlađe od 12 godina.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DOKSICIKLIN HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 5 kapsula, tvrdih (1 PVC/Al - blister), u kutiji

DOVICIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 5 kapsula, tvrdih (1 blister od ALU/PVC i tvrde PVC trake) u kutiji

DOXYCYCLINE REMEDICA - REMEDICA LIMITED

Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/Al - blister), u kutiji

J01AA12 tigeciklin

Doziranje: komplikovane infekcije kože i mekih tkiva osim infekcija dijabetičkog stopala, komplikovane intraabdominalne infekcije (samo u situacijama gdje je poznato ili postoji sumnja da drugi alternativni lijekovi nisu primjenljivi): i.v. inf, odrasli preko 18 god: početna doza 100 mg, zatim 50 mg svakih 12 sati tokom 5-14 dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TIGECID - CENTURION ILAC SANAYI VE TIC. A.S.

ZU prašak za rastvor za infuziju [50 mg/1 bočica] 10 bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

TIGECIKLIN ANFARM - ANFARM HELLAS S.A.

ZU prašak za rastvor za infuziju [50 mg/1 bočica] 10 staklenih bocica (bočica od bezbojnog stakla tip I od 5 ml sa flip-off zatvaračem) u kutiji

TIGECIKLIN NORMON - LABORATORIOS NORMON S.A.

ZU prašak za rastvor za infuziju [50 mg/1 bočica] 10 staklenih bočica, u kutiji

TIGECYCLIN HF - TECNIMEDE SOCIEDADE TECNICI MEDICINAL S.A.

ZU prašak za rastvor za infuziju [50 mg/1 bočica] 10 staklenih (tip I) bočica zapremine 10 ml sa sivim čepom od bromobutil gume i aluminijumskim zatvaračem sa plastičnom flip-off kapičom, u kutiji

TIGILIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

ZU	prašak za rastvor za infuziju [50 mg/1 bočica] 1 bočica, staklena 10 kom, u kutiji
TYGACIL - PFIZER INC.	
ZU	prašak za otopinu za infuziju [50 mg/1 viala] 10 staklenih bočica sa 50 mg praška za otopinu za infuziju u kutiji
TYGEPOL - POLIFARMA ILAC SAN VE TIC.A.S.	
ZU	prašak za rastvor za infuziju [50 mg/1 bočica] Bezbojna staklena bočica (6 R tip I) prekrivena narandžastim plastičnim zatvaračem sa sivim čepom promjera 20 mm, u kutiji. Pakovanje sadrži 10 bočica.
TYGEX - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	
ZU	prašak za rastvor za infuziju [50 mg/1 bočica] 10 staklenih bočica praška za rastvor za infuziju, u kutiji

J01C Beta-laktamski antibiotici, penicilini **J01CA Penicilini širokog spektra**

J01CA01 ampicilin

Doziranje: infekcije urinarnog trakta, otitis media, sinusitis, bronhitis, lake i umjereno-teške stečene pneumonije, salmoneloze; oralno, 0,5 - 1 g svakih 6 sati; djeca starosti 1 mjesec-1 godine: 125 mg svakih 6 sati, povećati ukoliko je neophodno na 30 mg/kg svakih 6 sati; djeca starosti od 1 - 5 godina: 250 mg svakih 6 sati, povećati ukoliko je neophodno do 30 mg/kg svakih 6 sati; djeca starosti od 5 - 12 godina: 500 mg svakih 6 sati, povećati ukoliko je neophodno na 30 mg/kg (maks. 1g) svakih 6 sati; djeca starosti od 12 - 18 godina, 500 mg svakih 6 sati, teške infekcije 1 g svakih 6 sati; i.m. ili i.v. 500 mg svakih 4 - 6 sati; endokarditis (po potrebi u kombinaciji sa drugim antibioticima): i.v.inf. odrasli preko 18 god, 2 g svaka 4 sata; listeriaalni meningitis (u kombinaciji sa drugim antibioticima): i.v.inf. odrasli preko 18 god. 2 g svaka 4 sata

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AMPICILIN ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

Rp kapsula, tvrda [500 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 Al/PVC blistera po 8 kapsula) u kutiji

AMPICILLIN ANTIBIOTICE - ANTIBIOTICE S.A.

ZU prašak za rastvor za injekciju [1 g/1 viala] 50 staklenih bočica sa praškom za rastvor za injekciju, u kutiji

PENTREXYL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp kapsula, tvrda [500 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 Al/PVC blistera po 8 kapsula, tvrdih), u kutiji

SOLICILLIN - INJECT CARE PARENTERALS PVT. LTD.

ZU prašak za rastvor za injekciju/infuziju [1 g/1 bočica] 1 staklena bočica sa 1g praška za rastvor za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU prašak za rastvor za injekciju/infuziju [500 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju, u kutiji

SWISSCILLIN - SWISS PARENTERALS LIMITED.

ZU prašak za rastvor za injekciju/infuziju [1 g/1 bočica] 1 staklena bočica od 10 ml, u kutiji

J01CA04 amoksisicilin

Doziranje: infekcije urinarnog trakta, otitis media, sinusitis, akutni streptokokni tonzilitis i faringitis, bronhitis, slabe do umjereno jake pneumonije stečene u zajednici, invazivne salmoneloze, endokarditis, dodatak terapiji kod listeriaalnog meningitisa, oralne infekcije, Lajmska bolest, antraks, profilaksa pneumokoknih infekcija, eradikacija Helicobacter pylori; oralno, 500 mg svakih 8 sati, duplirati dozu u slučaju teških infekcija; djeca 1 mjesec-1 god: 125 mg svakih 8 sati, povećati ukoliko je neophodno na 30 mg/kg svakih

8 sati; djeca 1-5 god: 250 mg svakih 8 sati, povećati na 30 mg/kg (maks. 1 g) svakih 8 sati; djeca 5-12 god: 500 mg svakih 8 sati, povećati do 30 mg/kg svakih 8 sati; djeca 12-18 god: 500 mg svakih 8 sati, teške infekcije, 1 g svakih 8 sati.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALMACIN - ALKALOID AD SKOPJE

Rp kapsula, tvrda [500 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 Al/PVC blistera po 8 kapsula), u kutiji

Rp prašak za oralnu suspenziju [250 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 33,75 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije, u kutiji

AMOKSICILIN HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp granule za oralnu suspenziju [250 mg/5 mL] 1 staklena boca sa 40 g granula za pripremu 100 mL oralne suspenzije, u kutiji

Rp kapsula, tvrda [500 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al - blistera po 8 kapsula), u kutiji

AMOXIBOS - BOSNALIJEK D.D.

Rp kapsula, tvrda [500 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC/Al blistera po 8 kapsula), u kutiji

AMOXICILLIN REMEDICA - REMEDICA LIMITED

Rp kapsula, tvrda [500 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 Al/PVC/PE/PVDC blistera po 8 kapsula, tvrdih), u kutiji

HICONCIL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 8 kapsula), u kutiji

Rp kapsula, tvrda [500 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 8 kapsula), u kutiji

SINACILIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp kapsula, tvrda [500 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 blistera od Alu/PVC trake i tvrde PVC trake po 8 kapsula), u kutiji

Rp prašak za oralnu suspenziju [250 mg/5 mL] 1 staklena bočica (sa kašičicom za doziranje ili špricom za doziranje) sa 51,93 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije, u kutiji

J01CE

Penicilini osjetljivi na beta laktamaze

J01CE02

fenoksimetilpenicilin

Doziranje: *oralne infekcije, otitis media:* oralno, djeca 1-11 mjeseci 62,5 mg 4 puta dnevno, povećati ukoliko je neophodno do 12,5 mg/kg 4 puta dnevno; djeca 1-5 god. 125 mg 4 puta dnevno, povećati ukoliko je neophodno do 12,5 mg/kg 4 puta dnevno; djeca 6-11 god. 250 mg 4 puta dnevno, povećati ukoliko je neophodno do 12,5 mg/kg 4 puta dnevno; djeca 12-17 god, 500 mg 4 puta dnevno, povećati ukoliko je neophodno do 1 g 4 puta dnevno; odrasli, 500 mg na 6 sati, povećati ukoliko je neophodno do 1g svakih 6 sati; *akutno zapaljenje grla:* oralno, djeca 1-11 mjeseci 62,5 mg 4 puta dnevno, alternativno 125 mg 2 puta dnevno tokom 5-10 dana; djeca 1-5 god. 125 mg 4 puta dnevno, alternativno 250 mg 2 puta dnevno tokom 5-10 dana; djeca 6-11 god. 250 mg 4 puta dnevno, alternativno 500 mg 2 puta dnevno tokom 5-10 dana; djeca 12-17 god, 500 mg 4 puta dnevno, alternativno 1000 mg 2 puta dnevno tokom 5-10 dana; odrasli, 500 mg 4 puta dnevno, alternativno 1000 mg 2 puta dnevno tokom 5-10 dana; *prevencija rekurentnog celulitisa i erizipela:* oralno, odrasli 250 mg 2 puta dnevno; *prevencija rekurentne reumatske groznice:* oralno, djeca 1 mjesec-5 godina: 125 mg 2 puta dnevno; djeca 6-17 god. 250 mg 2 puta dnevno; *prevencija sekundarnih slučajeva infekcija izazvanih streptokokama grupe A:* oralno, djeca 1-11 mjeseci 62,5 mg svakih 6 sati

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

tokom 10 dana, djeca 1-5 god. 125 mg svakih 6 sati tokom 10 dana; djeca 6-11 god. 250 mg svakih 6 sati tokom 10 dana; djeca 12-17 god. 250-500 mg svakih 6 sati tokom 10 dana; odrasli 250-500 mg svakih 6 sati tokom 10 dana; *prevencija pneumokoknih infekcija kod asplenijske ili kod pacijenata sa srpastim ćelijama*: oralno, djeca 1-11 mjeseci 62,5 mg 2 puta dnevno; djeca 1-4 god. 125 mg 2 puta dnevno; djeca 5-17 god. 250 mg 2 puta dnevno; odrasli 250 mg 2 puta dnevno; *akutni sinuzitis*: oralno, djeca 1-11 mjeseci 62,5 mg 4 puta dnevno tokom 5 dana; djeca 1-5 god. 125 mg 4 puta dnevno tokom 5 dana; djeca 6-11 god. 250 mg 4 puta dnevno tokom 5 dana; djeca 12-17 godina 500 mg 4 puta dnevno tokom 5 dana; odrasli 500 mg 4 puta dnevno tokom 5 dana;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LARGOCILIN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA

D.O.O. BANJA LUKA

- Rp film tableta [1000 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC-PvdC/Alu blistera sa po 10 tableta), u kartonskoj kutiji
- Rp film tableta [660 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC-PvdC/Alu blistera sa po 10 tableta), u kartonskoj kutiji
- Rp prašak za oralni rastvor [250 mg/5 mL] 1 HDPE bočica od 100 mL sa praškom za oralni rastvor i kašičica za doziranje, u kutiji

OSPEN K 1 MIU - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp filmom obložena tableta [1000000 i.j./1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera) u kutiji

OSPEN 750 - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp oralna suspenzija [750000 i.j./5 mL] 1 staklena bočica sa 60 mL oralne suspenzije, u kutiji

OSPEN K 1,5 MIU - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp filmom obložena tableta [1500000 i.j./1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

PENOPEN - REMEDICA LIMITED

- Rp film tableta [1000 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Alu-OPA/Alu/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [800 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Alu-OPA/Alu/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

J01CE30

benzilpenicilin-kalijum, benzilpenicilin-prokain

Doziranje: ozbiljne infekcije uzrokovane osjetljivim sojevima streptokoka (uključujući *S.pneumoniae*) - septikemija, empiema, upala pluća, perikarditis, endokarditis, meningitis: 12-24 miliona jedinica/dan u zavisnosti od infekcije i njene ozbiljnosti, primjenjeno u podjednako podijeljenim dozama svakih 4-6 sati; ozbiljne infekcije uzrokovane osjetljivim sojevima stafilocoka - septikemija, empiema, upala pluća, torakalna i abdominalna bolest: 5-24 miliona jedinica/dan u zavisnosti od infekcije i njene ozbiljnosti, primjenjeno u podjednako podijeljenim dozama svakih 4-6 sati; antraks: minimalno 8 miliona jedinica/dan u podijeljenim dozama svakih 6 sati, mogu biti potrebne veće doze u zavisnosti od osjetljivosti organizma; aktinomikoza, cervikofacijalna bolest, torakalna i abdominalna bolest: 1-6 miliona jedinica/dan, 10-20 miliona jedinica/dan; klostridijske infekcije, botulizam (dopunska terapija antitoksinu), gasna gangrena (debridement i/ili operacija), tetanus (dopunska terapija humanom imunoglobulinu tetanusa): 20 miliona jedinica/dan; difterija (dopunska terapija antitoksinu i za prevenciju stanja nosača): 2-3 miliona jedinica/dan u podijeljenim dozama 10-12 dana; erizipelotriks endokarditis: 12-20 miliona jedinica/dan 4-6 sedmica; fusospirohetoza (teške infekcije orofarinksa (Vincentonova infekcija), donjeg respiratornog trakta i genitalnog područja: 5-10 miliona jedinica/dan; infekcije izazvane listerijom, meningitis, endokarditis: 15-20 miliona jedinica/dan 2 sedmice, 15-20 miliona jedinica/dan 4 sedmice; pasteurella infekcije, uključujući bakterijemiju i meningitis: 4-6 miliona jedinica/dan 2 sedmice;

haverhill groznica, groznica ugriza (*Spirillum minus* ili *Streptobacillus moniliformis*): 12-20 miliona jedinica/dan 3-4 sedmice; diseminarne gonokokne infekcije kao što su meningitis, endokarditis, artritis itd, uzrokovane organizmima osjetljivim na penicilin: 10 miliona jedinica/dan; trajanje terapije zavisi od tipa infekcije; sifilis (*neurosyphilis*): 12-24 miliona jedinica/dan; 2-4 miliona jedinica svaka 4 sata 10-14 dana; meningokokni meningitis i/ili septikemija: 24 miliona jedinica/dan; 2 miliona jedinica svaka 2 sata

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEVAPEN - DEVA HOLDING A.S.

ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [200000 i.j./1 bočica+ 600000 i.j./1 bočica] 1 staklena bočica praška i 1 ampula (2 ml) rastvarača, u kutiji

J01CE30 **benzilpenicilin-natrijum, benzilpenicilin-prokain**

Doziranje: liječenje i profilaksa infekcija izazvanih mikroorganizmima osjetljivim na penicilin (infekcije izazvane bakterijom *Streptococcus pyogenes*, kao što su umjereno teške infekcije respiratornog trakta, tonzilitis, faringitis, erizipel, šarlah, infekcije kože i struktura kože, nekomplikovani slučajevi pneumokokne pneumonije, difterija, gonoreja, sifilis), u terapiji antraksa; odrasli, 600 000 i.j.-1 200 000 i.j./ dan; dojenčad/djeca 25000-50000 i.j./kg/dan; ne preporučuje se primjena kod novorođenčadi i odojčadi; za više informacija o doziranju konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PANCILLIN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.

BANJA LUKA

ZU prašak za suspenziju za injekciju [200000 i.j./1 boca+ 600000 i.j./1 boca] 50 staklenih bočica sa praškom za suspenziju za injekciju, u kutiji

J01CF **Penicilini rezistentni na beta laktamaze**

J01CF02 **kloksacilin**

Doziranje: infekcije kože i mekih tkiva (karbunkuli), endokarditis, infekcije centralnog nervnog sistema, infekcije donjeg respiratornog trakta, opekotine ili komplikacije operacija s iscjetkom gnoja, osteoartritis (uglavnom postraumatski), sepsa: i.m. i.v.inj. i.v.inf. ili intrapleuralna injekcija, odrasli 1-2 g svakih 6 sati, maksimalno 12 g dnevno; djeca, 100-200 mg/kg/dan svakih 6 sati, kod teških infekcija doza se može povećati na 100-300 mg/kg/dan u 4-6 podijeljenih doza; za više informacija o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SYNTARPEN - TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLFA”

SPÓŁKA AKCYJNA

ZU/Rp prašak za rastvor za injekciju/infuziju [1 g/1 bočica] 1 staklena bočica od 20 mL sa 1 g praška za rastvor za injekciju/infuziju, u kutiji

J01CR **Kombinacija penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaza**

J01CR01 **ampicilin, sulbaktam**

Doziranje: infekcije gornjih i donjih respiratornih puteva uključujući sinuzitis, otitis media, epiglositis, bakterijska pneumonija; infekcije urinarnog trakta, pyelonephritis; intra-abdominalne infekcije, uključujući peritonitis, ginekološke infekcije (cholecystitis,

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

endometritis i karlični celulitis; infekcije kože i mekih tkiva; osteoartikularne infekcije; gonokokne infekcije; profilaksa postoperativnih infekcija nakon hirurških zahvata na abdomenu i karlici, bakterijemija u vezi sa ili u vezi sa sumnjom na bilo koju naprijed navedenu infekciju: 1,5 g - 12 g podjeljeno na 3-4 doze (svakih 6-8 sati); maks. dnevna doza 4 g; kod blažih infekcija lijek se može primjeniti u dvije doze (na svakih 12 sati).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AMPICILIN/SULBAKTAM APTAPharma - APTA Medica International D.O.O.

- ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [1 g/1 bočica+ 0,5 g/1 bočica] 10 staklenih bočica od 20ml, u kutiji
- ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [2 g/1 bočica+ 1 g/1 bočica] 10 staklenih bočica od 20ml, u kutiji

J01CR02 amoksisicilin, klavulanska kiselina

Doziranje: infekcije izazvane mikroorganizmima koji proizvode beta-laktamaze (gdje nije moguća primjena samog amoksisicilina) uključujući infekcije respiratornog trakta, kostiju i zglobova, genito-urinarne i abdominalne infekcije, celulitis, ujedi životinja, teške dentalne infekcije sa raširenim celulitisom ili dentalne infekcije koje ne odgovaraju na prvu liniju antibiotika; oralno, djeca 12-17 god. izraženo kao co-amoxiclav, 1 tbl jačine 250/125 svakih 8 sati; povećati kod teških infekcija na jednu tbl. jačine 500/125 svakih 8 sati; novorođenčad 0,25 ml/kg oralne suspenzije 125/31 svakih 8 sati; djeca 1 mjesec-1 god. 0,25 ml/kg oralne suspenzije 125/31 svakih 8 sati, kod teških infekcija dozu udvostručiti; djeca 1-6 god. 5 ml suspenzije 125/31 svakih 8 sati ili 0,25 ml/kg oralne suspenzije 125/31 svakih 8 sati, kod teških infekcija dozu udvostručiti; djeca 6-12 god. 5 ml oralne suspenzije 250/62 svakih 8 sati ili 0,15 ml/kg oralne suspenzije 250/62 svakih 8 sati, kod teških infekcija dozu udvostručiti; doze za suspenziju 400/57- djeca 2-23 mjeseca 0,15 ml/kg 2 puta dnevno, udvostručiti u slučaju teških infekcija, djeca 2-6 god (tjelesne mase 13-21 kg) 2,5 ml 2 puta dnevno, udvostručiti u slučaju teških infekcija; djeca 7-12 god. (tjelesne mase 22-40 kg) 5 ml 2 puta dnevno, udvostručiti u slučaju teških infekcija; djeca 12-17 god. (tjelesne mase 41 kg i više) 10 ml 2 puta dnevno; ukoliko je neophodno povećati na 10 ml 3 puta dnevno, u slučaju teških infekcija; odrasli, 10 ml 2 puta dnevno; ukoliko je neophodno povećati na 10 ml 3 puta dnevno, u slučaju teških infekcija; akutni otitis media: oralno, doza za suspenziju 125/31: djeca 1-11 mjeseci 0,25 ml/kg 3 puta dnevno tokom 5-7 dana, djeca 1-5 god. 5 ml 3 puta dnevno tokom 5-7 dana, alternativno 0,25 ml/kg 3 puta dnevno tokom 5-7 dana; doza za suspenziju 250/62: djeca 6-11 god. 5 ml 3 puta dnevno tokom 5-7 dana, alternativno 0,15 ml/kg 3 puta dnevno tokom 5-7 dana; oralno, tablete, djeca 12-17 god. 250/125 mg 3 puta dnevno tokom 5-7 dana, alternativno 500/125 3 puta dnevno tokom 5-7 dana; i.v.inj. tokom 3-4 min. ili i.v. inf. izraženo kao co-amoxiclav, 1,2 g svakih 8 sati, novorođenčad 30 mg/kg svakih 12 sati; djeca 1-3 mjeseca 30 mg/kg svakih 12 sati; djeca 3 mjeseca-18 god. 30 mg/kg (maks. 1,2 g) svakih 8 sati; hirurška profilaksa: izraženo kao co-amoxiclav, 1,2 g do 30 min. prije zahvata; kod visokorizičnih zahvata daju se još 2-3 doze od 1,2 g svakih 8 sati

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AMOKLAVIN-BID - DEVA Holding A.S.

- Rp filmom obložena tableta [875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (2 Al-Al blistera sa 5 tableta), u kutiji

AMOKLAVIN-BID 400/57 MG FORTE - DEVA Holding A.S.

- Rp prašak za oralnu suspenziju [400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL] 1 bočica praška za pripremu 70 ml suspenzije, u kutiji

AMOKSICILIN/KLAVULANSKA KISELINA APTAPharma - APTA Medica International D.O.O.

- ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [1000 mg/1 bočica+ 200 mg/1 bočica] 10 staklenih bočica sa praškom za rastvor za injekciju

ili infuziju od 20ml sa gumenim čepom i aluminijumskom kapicom, u kutiji

AMOKSIKLAV SANDOZ 2X - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp filmom obložena tableta [875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (2 Al/Al - blistera po 5 tableta), u kutiji
- Rp prašak za oralnu suspenziju [400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL] Staklena bočica sa polimernim zatvaračem i sa praškom za pripremu 70 mL oralne suspenzije, u kutiji

AMOXIPLUS 1,2 G - ANTIBIOTICE S.A.

- ZU prašak za rastvor za injekciju/infuziju [1000 mg/1 viala+ 200 mg/1 viala] 50 staklenih bočica sa 1,2 g praška za rastvor za injekciju/infuziju, u kutiji

AUGMENTIN - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

- Rp filmom obložena tableta [875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta u Al/PVC/PVdC - blisteru (2 blistera po 7 tableta) uloženi u zaštitne aluminijske vrećice sa sredstvom za sušenje, u kutiji

BETAKLAV - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 Al/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister sa po 10 tableta), u kutiji

DUOCLAV - BOSNALIJEK D.D.

- Rp film tableta [500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 15 film tableta (3 Al/Al - blistera po 5 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 10 film tableta (2 Al/Al - blistera po 5 tableta), u kutiji
- Rp prašak za oralnu suspenziju [400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa praškom za pripremu 70 ml oralne suspenzije, u kutiji

KLAVAMOX - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO

- Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 15 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 5 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
- Rp prašak za oralnu suspenziju [400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL] 1 staklena bočica od 100 ml (staklo tip III) za pripremu 70 ml oralne suspenzije, u kutiji

KLAVOCIN BID - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- Rp filmom obložena tableta [875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 14 filmom obložena tableta (2 Al/Al - blistera sa 7 tableta), u kutiji
- Rp prašak za oralnu suspenziju [400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 10,5 g-11,6 g g praška za pripremu 70 mL oralne suspenzije i odmerna šprica od 5 mL, u kutiji

PANKLAV - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.

BANJA LUKA

- Rp film tableta [500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 1 staklena bočica sa 20 film tableta, u kutiji
- Rp film tableta [500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 15 film tableta u staklenoj bočici, u kutiji
- Rp prašak za oralnu suspenziju [125 mg/5 mL+ 31.25 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 11,5 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije, u kutiji

PANKLAV 2X - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA

D.O.O. BANJA LUKA

- Rp film tableta [875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 1 staklena bočica sa 14 film tableta, u kutiji
- Rp film tableta [875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 10 film tableta u staklenoj bočici, u kutiji
- Rp prašak za oralnu suspenziju [400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL] 1 staklena boca sa 15 g praška za pripremu 70 ml oralne suspenzije, kutija sa bocom i plastičnom kašikom

PANKLAV FORTE - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA

D.O.O. BANJA LUKA

- Rp prašak za oralnu suspenziju [250 mg/5 mL+ 62.5 mg/5 mL] 1 staklena bočica braon boje (staklo tip III hidrolitičke otpornosti) sa 16,5 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije, sa CRC (Child Resistant Closure) zatvaračem i mjernom kašikom, u kutiji.

PHARMOX CV - INJECT CARE PARENTERALS PVT. LTD.

- ZU prašak za rastvor za injekciju/infuziju [1000 mg/1 bočica+ 200 mg/1 bočica] 10 staklenih bočica sa 1.2 g praška za rastvor za injekciju /infuziju, u kutiji
- ZU prašak za rastvor za injekciju/infuziju [500 mg/1 bočica+ 100 mg/1 bočica] 10 staklenih bočica sa 600 mg praška za rastvor za injekciju, u kutiji

XICLAV - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp film tableta [500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 15 film tableta , 3 Al/Al blistera po 5 film tableta, u kutiji

XICLAV 1,2 G - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- ZU prašak za rastvor za injekciju [1000 mg/1 viala+ 200 mg/1 viala] 10 bočica sa praškom za rastvor za injekciju, u kutiji

XICLAV 2X - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp filmom obložena tableta [875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera po 5 tableta), u kutiji
- Rp prašak za oralnu suspenziju [400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa praškom za pripremu 70 ml oralne suspenzije i dozirna šprica od 5 ml, u kutiji

J01CR05 piperacilin, tazobaktam

Doziranje: *teške pneumonije* (uključujući bolnički stečenu pneumoniju i pneumonije uzrokovane mehaničkom ventilacijom), *komplikovane infekcije urinarnog trakta* (uključujući pijelonefritis), *komplikovane intra-abdominalne infekcije*, *komplikovane infekcije kože i mekih tkiva* (uključujući infekcije kod dijabetičkog stopala): odrasli i djeca preko 12 god. i.v. inf. 4,5 g svakih 8 sati, povećati na 4,5 g svakih 6 sati kod teških infekcija; *bakterijemija, praćena ili se sumnja da je praćena bilo kojom od naprijed navedenih infekcija*; *infekcije kod pacijenata sa neutropenijom*: odrasli i djeca preko 12 god. 4,5 g svakih 6 sati, djeca 2-12 god, 90 mg/kg (maks. 4,5 g) svakih 6 sati;

komplikovane intra-abdominalne infekcije, i.v. inf. djeca 2-12 god. 112,5 mg/kg (maks. 4,5 g) svakih 8 sati;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI 4 G/0,5 G - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

ZU prašak za rastvor za infuziju [4 g/1 bočica+ 0,5 g/1 bočica] Staklena bočica, pakovanje od 10 staklenih bočica zapremine 50 ml sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

PIPERACILIN/TAZOBAKTAM KALCEKS - AS KALCEKS

ZU prašak za rastvor za infuziju [4 g/1 bočica+ 0,5 g/1 bočica] 10 bezbojnih staklenih bočica od 50 mL, u kutiji

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM PANPHARMA - PANPHARMA S.A.

ZU prašak za rastvor za infuziju [4 g/1 viala+ 0,5 g/1 viala] 10 bočica po 4,5 g praška, u kutiji

TAVOCTAME - COOPER S.A.

ZU prašak za rastvor za infuziju [4 g/1 bočica+ 0,5 g/1 bočica] 1 bezbojna staklena bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

J01D

Ostali beta-laktamski antibakterijski lijekovi

J01DB

Cefalosporini, prva generacija

J01DB01

cefaleksin

Doziranje: infekcije respiratornog trakta, infekcije urinarnog trakta koje ne reaguju na druge lijekove ili u trudnoći, otitis media, sinusitis, infekcije kože i mekih tkiva; odrasli, 250 mg svakih 6 h ili 500 mg svakih 8 ili 12 h; kod teških infekcije povećati na 1-1,5 g svakih 6-8 h; djeca 25-50 mg/kg u podijeljenim dozama, kod teških infekcija dozu udvostručiti, maks. 100 mg/kg dnevno; djeca ispod 1 god. 125 mg svakih 12 h, djeca 1-5 god. 125 mg svakih 8 h, djeca 5-12 god. 250 mg svakih 8 h; profilaksa rekurentnih urinarnih infekcija, 125 mg uveče.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CEFALEKSIN HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp granule za oralnu suspenziju [250 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 40 g granula za pripremu 100 mL oralne suspenzije, u kutiji

Rp kapsula, tvrda [500 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 8 kapsula), u kutiji

CEFALEXIN ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

Rp kapsula, tvrda [500 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 Al/PVC blistera po 8 kapsula), u kutiji

Rp prašak za oralnu suspenziju [250 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 65,4 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije i mjerna kašičica od 5 ml, u kutiji

CEFALEXIN REMEDICA - REMEDICA LIMITED

Rp kapsula, tvrda [500 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 Al/PVC blistera po 8 kapsula), u kutiji

PALITREX - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp kapsula, tvrda [500 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 ALu/PVC blistera po 8 kapsula, tvrdih), u kutiji

J01DB04

cefazolin

Doziranje: *hirurška profilaksa:* spora i.v. inj. i.v. inf. ili duboka i.m.inj. odrasli 1 g 30-60 min. prije operacije, zatim ukoliko je potrebno 0,5-1 g tokom operacije (kod procedura

koje traju 2 sata ili više); *infekcije kože i mekog tkiva, infekcije kostiju i zglobova*: spora i.v. inj. i.v. inf. ili duboka i.m.inj. 1-2 g dnevno u 2-3 podijeljene doze kod osjetljivih bakterija; povećati na 3-4 g dnevno u 3-4 podijeljene doze kod umjereno osjetljivih bakterija; povećati ukoliko je neophodno na 6 g dnevno u 3-4 podijeljene doze, kod teških infekcija pojedinačne doze više od 1g treba dati i.v.inf; *infekcije respiratornog trakta* uzrokovane sa *S.pneumoniae*, *Klebsiella*, *H.influenzae*, *Staph. aureus* (sojevi osjetljivi na penicilin i sojevi rezistentni na penicilin) i grupom A beta-hemolitičkih streptokoka; *infekcije urinarnog i genitalnog trakta* uzrokovane sa *Escherichia coli*, *P.mirabilis*, *Klebsiella* vrstama; *infekcije bilijarnog trakta* uzrokovane *E.coli*, raznim vrstama streptokoka, *P.mirabilis*, *Klebsiella* sp i *S.aureus*; *endokarditis* uzrokovan sa *S.aureus* (sojevi osjetljivi na penicilin i sojevi rezistentni na penicilin): spora i.v. inj. i.v. inf. ili duboka i.m.inj. 1-2 g dnevno u 2-3 podijeljene doze kod osjetljivih bakterija; povećati na 3-4 g dnevno u 3-4 podijeljene doze kod umjereno osjetljivih bakterija; povećati ukoliko je neophodno na 6 g dnevno u 3-4 podijeljene doze, kod teških infekcija pojedinačne doze više od 1g treba dati i.v.inf;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CEFAZOLIN QILU - QILU PHARMA SPAIN SL

ZU prašak za rastvor za injekciju/infuziju [1 g/1 bočica] 100 staklenih bočica (bezbojno staklo tipa II) u kutiji

CEFAZOLIN REYOUNG - REYOUNG PHARMACEUTICAL CO. LTD.

ZU prašak za rastvor za injekciju [1 g/1 bočica] 50 staklenih bočica sa praškom za rastvor za injekciju, u kutiji

CEFAZOLIN-BCPP - SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE `BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL PHARMACEUTICAL PLANT` PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

ZU prašak za otopinu za injekciju/infuziju [1000 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa 1000 mg praška, u kutiji

IESPOR - MENARINI SAGLIK VE ILAC SANAYII TIC. A.S.

ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju [1 g/1 bočica] 1 staklena bočica s praškom i 1 ampula s rastvaračem, u kutiji

J01DC Cefalosporini, druga generacija

J01DC02 cefuroksim

Doziranje: *akutni tonzilitis i faringitis, akutni bakterijski sinuzitis*: odrasli i djeca preko 40 kg, 250 mg dva puta dnevno; djeca do 40 kg, 10 mg/kg dva puta dnevno do maksimalnih 125 mg dva puta dnevno; *akutni otitis media*: odrasli i djeca preko 40 kg, 500 mg dva puta na dan; djeca do 40 kg, 15 mg/kg dva puta dnevno do maksimalnih 250 mg dva puta dnevno; *akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa*: odrasli i djeca preko 40 kg, 500 mg dva puta na dan; *cistitis*: odrasli i djeca preko 40 kg, 250 mg dva puta na dan; djeca do 40 kg, 15 mg/kg dva puta dnevno do maksimalnih 250 mg dva puta dnevno; *pielonefritis*: odrasli i djeca preko 40 kg, 250 mg dva puta dnevno; djeca do 40 kg, 15 mg/kg dva puta dnevno do maksimalnih 250 mg dva puta dnevno u trajanju od 10-14 dana; *nekomplikovane infekcije kože i mekog tkiva*: odrasli i djeca preko 40 kg, 250 mg dva puta dnevno; djeca do 40 kg, 15 mg/kg dva puta dnevno do maksimalnih 250 mg dva puta dnevno; *Lajmska bolest*: odrasli i djeca preko 40 kg, 500 mg dva puta na dan u trajanju od 14 dana (10-21 dan); djeca do 40 kg, 15 mg/kg dva puta dnevno do maksimalnih 250 mg dva puta dnevno u trajanju od 14 dana (10-21 dan); i.m.inj. ili i.v.inj. ili inf. 750 mg svakih 6-8 h, 1,5 g svakih 6-8 h kod teških infekcija; pojedinačne doze preko 750 mg se daju jedino i.v.putem; kod djece uobičajena doza 60 mg/kg dnevno (opseg doza 30-100 mg/kg/dnevno) u 3-4 podijeljene doze (2-3 podijeljene doze kod novorođenčadi); *hirurška profilaksa*, 1,5 g i.v. inj. do 30 min. prije zahvata; do 3 doze od 750 mg mogu biti date i.m. ili i.v svakih 8 h kod visoko-rizičnih

zahvata; otvoreni prelomi, profilaksa, i.v. inj. ili inf. 1,5 g svakih 8 h do zatvaranja mekih tkiva (maks. trajanje 72 sata); *izvanbolnički stečene pneumonije i akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa, infekcije mekih tkiva (celulitis, erizipel i infekcije rana), intraabdominalne infekcije*: i.v. ili i.m. 750 mg svakih 8 sati; *komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis*: i.v. ili i.m. 1,5 g svakih 8 sati

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AKSEF - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 bijeli neprozirni PVC-TE-PVDC/Al blister), u kutiji

CEFAKS - DEVA HOLDING A.S.

Rp filmom obložena tableta [250 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 5 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 5 tableta), u kutiji

Rp granule za oralnu suspenziju [125 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa granulama za pripremu 50 ml oralne suspenzije, sa kašikom za doziranje i mjernom čašicom, u kutiji

ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju [750 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za rastvor injekciju/infuziju i 1 ampula sa 6 ml vode za injekcije, u kutiji

CEFUROKSIM APTAPHARMA - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O.

ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [1500 mg/1 bočica] 10 staklenih bočica sa praškom za rastvor za injekciju ili infuziju, u kutiji

ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [750 mg/1 bočica] 10 staklenih bočica sa praškom za rastvor za injekciju ili infuziju, u kutiji

CEFUROXIME-BCPP - SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE `BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL PHARMACEUTICAL PLANT` PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

ZU prašak za otopinu za injekciju/infuziju [1.5 g/1 viala] 5 staklenih bočica sa praškom za otopinu za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU prašak za otopinu za injekciju/infuziju [750 mg/1 viala] 5 staklenih bočica sa praškom za otopinu za injekciju/infuziju, u kutiji

FUREXTIL - ALKALOID AD SKOPJE

Rp film tableta [250 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 Alu-Alu blister sa 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 Alu-Alu blister sa 10 tableta), u kutiji

ZINNAT - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Rp filmom obložena tableta [125 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al - blister), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [250 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al - blister) u kutiji

Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al - blister) u kutiji

Rp granule za oralnu suspenziju [125 mg/5 mL] 1 staklena boca sa 100 mL oralne suspenzije sa plastičnom odmjernom čašicom i kašikom u kutiji

Rp granule za oralnu suspenziju [125 mg/5 mL] 1 staklena boca sa 50 ml oralne suspenzije sa plastičnom odmjernom čašicom i doznom kašikom u kutiji

J01DC04 cefaklor

Doziranje: infekcije urinarnog trakta, infekcije respiratornog trakta, otitis media, sinusitis, infekcije kože i mekih tkiva; 250 mg svakih 8 h, kod teških infekcija dozu udvostručiti, maks. 4 g dnevno; djeca preko 1 mjesec, 20 mg/kg dnevno u 3 podijeljene doze, kod teških infekcija dozu udvostručiti, maks. 1 g dnevno; ili 1 mjesec-1 god. 62,5 mg svakih 8 h; 1-5 god. 125 mg; preko 5 god. 250 mg; kod teških infekcija dozu udvostručiti

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CEFACLOR ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

- Rp granule za oralnu suspenziju [125 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 30 g granula za pripremu 60 ml oralne suspenzije i plastična građuirana kašičica, u kutiji
- Rp granule za oralnu suspenziju [250 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 40 g granula za pripremu 60 ml oralne suspenzije i plastična građuirana kašičica , u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [500 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVdC-Al blistera po 8 kapsula), u kutiji

J01DD Cefalosporini, treća generacija

J01DD01 cefotaksim

Doziranje: infekcije respiratornog trakta, urinarnog trakta, mekih tkiva, kostiju i zglobova, obstruktivne i ginekološke infekcije, meningitis, hirurška profilaksa: i.m., i.v. ili i.v. inf. odrasli i djeca starija od 12 god: 1 g svakih 12 sati; povećati kod teških infekcija (npr. meningitis) na 8 g dnevno u 4 podijeljene doze; mogu biti zahtijevane više doze (do 12 g dnevno u 3-4 podijeljene doze); novorođenčad 50 mg/kg dnevno u 2-4 podijeljene doze povećati na 150-200 mg/kg dnevno kod teških infekcija; djeca 100-150 mg/kg dnevno u 2-4 podijeljene doze, povećati na 200 mg/kg dnevno kod veoma teških infekcija; nekomplikovana gonoreja: 500 mg kao pojedinačna doza

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CEFOTAKSIM APTAPHARMA - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O.

- ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [1 g/1 bočica] 10 staklenih bočica (Tip III) sa praškom za rastvor za injekciju ili infuziju od 10 ml, u kutiji

CEFOTAKSIM APTAPHARMA - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O.

- ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [2 g/1 bočica] 10 staklenih bočica (Tip III) sa praškom za rastvor za injekciju ili infuziju od 20 ml, u kutiji

J01DD02 ceftazidim

Doziranje: nozokomijalna pneumonija, bronho-pulmonalne infekcije kod cistične fibroze, bakterijski meningitis, hronično supurativno zapaljenje srednjeg uha (otitis media), maligni otitis eksterna (nekrotizirajući otitis), komplikovane infekcije urinarnog trakta, komplikovane infekcije kože i mekih tkiva, komplikovane intraabdominalne infekcije, infekcije koštano-zglobnog sistema, peritonitis povezan sa dijalizom kod pacijenata na kontinuiranoj ambulantnoj peritonealnoj dijalizi (KAPD), bakterijemija povezana sa navedenim infekcijama, febrilna neutropenija (kad se sumnja na bakterijsku infekciju), peri - operativna profilaksa: i.v. inj. ili inf. (ili duboka i.m. inj. ukoliko i.v. put administracije nije moguć) 1-2 g svakih 8 h; kod meningitisa, septikemije, bolnički stečenih pneumonija, ili kod febrilnih pacijenata sa neutropenijom, 2 g svakih 8 h, pojedinačna doza preko 1 g se daje samo i.v.; stariji preko 80 god, uobičajeno maks. 3 g; komplikovane urinarne infekcije, 1-2 g svakih 8-12 sati; pojedinačne doze preko 1 g se daju samo i.v.; stariji preko

80 god. uobičajeno maks. 3 g dnevno; pesudomonasne infekcije pluća u cističnoj fibrozi, odrasli 100-150 mg/kg dnevno (maks. 9 g dnevno) u 3 podijeljene doze; pojedinačne doze preko 1 g se daju samo i.v.; profilaksa transuretralne resekcije prostate, 1 g do 30 min. prije procedure, ukoliko je neophodno ponoviti kada se kateter ukloni

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CEFTAZIDIM APTAPharma - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O.

ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [1000 mg/1 bočica] 10 bočica (1 staklena bočica sa po 10 ml rastvora) u kutiji

ZACEF - SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE 'BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL PHARMACEUTICAL PLANT' PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

ZU prašak za rastvor za injekciju [1 g/1 bočica] 1 staklena bočica od 10 ml sa praškom za rastvor za injekcije, u kutiji

J01DD04 ceftriakson

Doziranje: pneumonija (stečena u bolničkim ili vanbolničkim uslovima), intra-abdominalne infekcije, komplikovane infekcije urinarnog trakta, akutna egzacerbacija hronične opstruktivne plućne bolesti: i.v.inf. tokom najmanje 30 min. ili i.v.inj. tokom 5 min. ili duboka i.m. inj. 1-2 g jednom dnevno; doze od 2 g se upotrebljavaju kod pneumonija stečenih u bolničkim uslovima i kod teških slučajeva; doze veće od 1 g koje se daju i.m. trebaju biti raspoređene na više od jednog mjesta; komplikovane infekcije kože i mekih tkiva, infekcije kostiju i zglobova, i.v.inf. tokom najmanje 30 min. ili i.v.inj. tokom 5 min. ili duboka i.m. inj. 2 g jednom dnevno; doze veće od 1 g koje se daju i.m. trebaju biti raspoređene na više od jednog mjesta; liječenje pacijenata sa neutropenijom koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu za koju se sumnja da je zbog bakterijske infekcije: i.v.inf. tokom najmanje 30 min. ili i.v.inj. tokom 5 min. ili duboka i.m. inj. 2-4 g jednom dnevno, najviše doze preporučenog opsega samo za teške slučajeve; doze veće od 1 g koje se daju i.m. trebaju biti raspoređene na više od jednog mjesta; doze preko 2 g se daju samo i.v. putem; bakterijski meningitis, bakterijski endokarditis: i.v.inf. tokom najmanje 30 min. ili i.v.inj. tokom 5 min. ili duboka i.m.inj. 2-4 g jednom dnevno, najviše doze preporučenog opsega samo za teške slučajeve; doze veće od 1 g koje se daju i.m. trebaju biti raspoređene na više od jednog mjesta; doze preko 2 g se daju samo i.v. putem; doze 1 mjesec-12 god. ispod 50 kg, i.v.inf. tokom najmanje 30 min. ili duboka i.m.inj. 80-100 mg/kg jednom dnevno (za endokarditis doza 100 mg/kg); maks. 4 g dnevno; doze veće od 1 g koje se daju i.m. trebaju biti raspoređene na više od jednog mjesta; doze preko 2 g se daju samo i.v. putem; djeca 12-18 god. ili preko 50 kg, doze za odrasle; sifilis: i.v.inf. tokom najmanje 30 min. ili i.v. inj. tokom 5 min. ili duboka i.m. inj. 0,5-1 g jednom dnevno, povećati na 2 g jednom dnevno kod neurosifilisa, tokom 10-14 dana; doze veće od 1 g koje se daju i.m. trebaju biti raspoređene na više od jednog mjesta; diseminovana Lajmska boreliozna (rani stadijum II i kasni stadijum III), i.v.inf. tokom najmanje 30 min. ili i.v.inj. ili i.v.inj. tokom 5 min. ili duboka i.m.inj. 2 g jednom dnevno tokom 14-21 dan; doze veće od 1 g koje se daju i.m. trebaju biti raspoređene na više od jednog mjesta; preporučeno trajanje liječenja je različito i u obzir se trebaju uzeti nacionalne ili lokalne smjernice; nekomplikovana gonoreja: duboka i.m.inj. 500 mg kao pojedinačna doza; hirurška profilaksa: i.v.inf. tokom najmanje 30 min. ili duboka i.m.inj. ili i.v. inj. tokom 5 min. 2 g dato 30-90 min. prije procedure; doze veće od 1 g koje se daju i.m. trebaju biti raspoređene na više od jednog mjesta; akutni otitis media: duboka i.m.inj. 1-2 g kao pojedinačna doza; u slučajevima teške bolesti ili tamo gdje je prethodna terapija pokazala neuspjeh daje se i.m. 1-2 g dnevno tokom 3 dana, doze veće od 1 g koje se daju i.m. trebaju biti raspoređene na više od jednog mjesta

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AZARAN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

ZU	prašak za rastvor za injekciju/infuziju [1 g/1 viala] 50 bočica sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju, u kutiji
CEFRIDEM - PHARMADA ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	
ZU	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [1 g/1 bočica] 1 bočica praška za rastvor za injekciju i 1 ampula rastvarača
CEFTRIAXON APTAPharma - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O.	
ZU	prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [1 g/1 bočica] 10 staklenih bočica od 10 mL, u kutiji
ZU	prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [2 g/1 bočica] 10 staklenih bočica od 50 mL, u kutiji
CEFTRIAXON PONTUS - VENUS PHARMA GMBH	
ZU	prašak za koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju [2 g/1 bočica] 10 staklenih bočica, u kutiji
ZU	prašak za otopinu za injekciju/infuziju [1 g/1 bočica] 10 staklenih bočica, u kutiji
CEFTRIAXON QILU - QILU PHARMA SPAIN SL	
ZU	prašak za rastvor za injekciju/infuziju [1 g/1 bočica] 100 staklenih bočica (bezbojno staklo tip III), u kutiji
CEFTRIAZONE-BCPP - SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE `BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL PHARMACEUTICAL PLANT` PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY	
ZU	prašak za otopinu za injekciju/infuziju [1000 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za otopinu za injekciju/infuziju, u kutiji
LONGACEPH - GALENIKA A.D. BEOGRAD	
ZU	prašak za rastvor za injekciju/infuziju [1 g/1 bočica] 10 staklenih bočica, u kutiji

J01DD08 cefiksim

Doziranje: akutne infekcije gornjih i donjih disajnih puteva; akutne upale srednjeg uha; infekcije urinarnog trakta: odrasli i djeca starija od 10 god. 200-400 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze; djeca preko 6 mjeseci 8 mg/kg dnevno u 1-2 podijeljene doze ili 6 mjeseci-1 god. 75 mg dnevno; 1-4 god. 100 mg dnevno; 5-9 god. 200 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CEFAPAN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.

BANJA LUKA

- Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 10 film tableta, kutiji
- Rp prašak za oralnu suspenziju [100 mg/5 mL] tamna staklena bočica, "moulded type III" sa polipropilenskim bijelim CR zatvaračem sa "pilfer proof" zaštitom, u kartonskoj kutiji

CEFDIA - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

- Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 10 film tableta (2 PVC/Al blistera sa po 5 film tableta), u kutiji

NEOCEF - LABORATÓRIOS ATRAL, S.A.

- Rp obložena tableta [400 mg/1 tableta] 8 obloženih tableta (2 Al/Al blistera sa po 4 obložene tablete), u kutiji
- Rp prašak za oralnu suspenziju [100 mg/5 mL] 1 staklena bočica (120 ml) sa praškom za oralnu suspenziju i kašikom za doziranje od 5 ml, u kutiji
- Rp prašak za oralnu suspenziju [100 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa praškom za pripremu 60ml oralne suspenzije i kašikom za doziranje od 5 ml, u kutiji

PANCEF - ALKALOID AD SKOPJE

- Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 10 film tableta (2 PVC/PVDC/Al - blistera po 5 tableta) u kutiji
- Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 5 film tableta (1 PVC/PVDC/Al - blister) u kutiji
- Rp granule za oralnu suspenziju [100 mg/5 mL] 1 boca sa 32 g praška za pripremu 60 mL oralne suspenzije sa plastičnom graduisanom pipetom za doziranje, u kutiji
- Rp granule za oralnu suspenziju [100 mg/5 mL] 1 boca sa 53 g praška za pripremu 100 mL oralne suspenzije sa plastičnom graduisanom pipetom za doziranje, u kutiji

TRYCCEF - BOSNALIJEK D.D.

- Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 10 film tableta (2 PVC/PVDC/AL blistera sa 5 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 5 film tableta (1 PVC/PVDC/AL blister sa 5 tableta), u kutiji
- Rp prašak za oralnu suspenziju [100 mg/5 mL] 1 smeđa staklena bočica sa gravurom za oznaku volumena 100 ml bijelim i plastičnim navojnim zatvaračem sa sigurnosnim prstenom i kašikom za doziranje, u kutiji.

J01DD13 cefpodoksim

Doziranje: infekcije grla, nosa i uha (tonzilitis, faringitis), infekcije donjih respiratornih puteva (uključujući bronhitis i pneumoniju), infekcije paranasalnog sinusa (sinusitis), infekcije kože i mekih tkiva, nekomplikovane infekcije urinarnog trakta (pijelonefritis, cistitis kod žena, akutni gonokokni uretritis kod žena i muškaraca): odrasli, 100 - 200 mg dva puta dnevno; djeca i novorođenčad (4 nedjelje do 12 god.)- oralna suspenzija 8-12 mg/kg tjelesne težine/dan primijenjeno u dvije podijeljene doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:**CEFPODOXIM SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.**

- Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/PE/PVDC/Alu blister sa 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/PE/PVDC/Alu blister sa 10 tableta), u kutiji
- Rp prašak za oralnu suspenziju [40 mg/5 mL] 1 smeđa staklena boca sa 40 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije i šprica od 10 ml za doziranje sa adapterom, u kutiji

FOXERO - ALKALOID AD SKOPJE

- Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 Al/Al - blister), u kutiji
- Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 Al/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [200 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 Al/Al - blister), u kutiji
- Rp film tableta [200 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 Al/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp prašak za oralnu suspenziju [40 mg/5 mL] HDPE bočica (PP zatvaračem i zaštitnom folijom) sa 64,8 g praška za pripremu 100 mL oralne suspenzije, u kutiji

SEFPOTEC - NOBEL ILAČ SANAYII VE TİCARET A. Ş.

- Rp prašak za oralnu suspenziju [100 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 24 g praška za pripremu 60 ml oralne suspenzije i plastična kašika za doziranje, u kutiji

Rp	prašak za oralnu suspenziju [100 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 40 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije i plastična kašika za doziranje, u kutiji

J01DD52 avibaktam, cefprozid

Doziranje: komplikovane intraabdominalne infekcije, komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis, bolnička pneumonija, uključujući pneumoniju kod pacijenata na mehaničkoj ventilaciji; liječenje odraslih pacijenata sa bakterijemijom kada se sumnja da je povezana sa bilo kojom od naprijed navedenih infekcija; infekcije uzrokovane aerobnim gram negativnim mikroorganizmima kod odraslih i pedijatrijskih pacijenata od njihovog rođenja sa ograničenim mogućnostima liječenja: za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ZAVICEFTA - PFIZER INC.

ZU	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [0,5 g/1 bočica+ 2 g/1 bočica] 10 providnih staklenih bočica od 20 ml (staklo tip I), u kutiji

J01DE Cefalosporini, četvrta generacija

J01DE01 cefepim

Doziranje: nekomplikovane i komplikovane infekcije urinarnog trakta uključujući pijelonefritis, infekcije donjeg dijela respiratornog trakta, kože i mekih tkiva, bilijarnog trakta, intraabdominalne infekcije (peritonitis), septicemije/bakterijemije, infekcije u ginekologiji, bakterijski meningitis kod djece, empirijska terapija febrilne neutropenije, profilaksa kod intraabdominalnih hirurških zahvata: odrasli i djeca iznad 12 godina: i.v. ili i.m. primjena, 1-2 g na svakih 12 sati; kod leukopeničnih pacijenata sa infekcijom pseudomonasom 2 g svakih 8 sati; djeca 2 mjeseca-12 god. starosti tjelesne mase do 40 kg: 50 mg/kg na 8-12 h

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CEBOPIM - SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE `BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL PHARMACEUTICAL PLANT` PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

ZU	prašak za rastvor za injekciju [1 g/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za injekciju, u kutiji

CEFEPIM HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

ZU	prašak za rastvor za injekciju/infuziju [1000 mg/1 bočica] 1000 mg praška za rastvor za injekciju/infuziju u staklenoj bočici, u kutiji

CEFEPIM QILU - QILU PHARMA SPAIN SL

ZU	prašak za rastvor za injekciju/infuziju [1 g/1 bočica] 10 staklenih bočica od 20 mL po 1 g praška za rastvor za injekciju/infuziju, u kutiji
ZU	prašak za rastvor za injekciju/infuziju [1 g/1 bočica] 50 staklenih bočica od 20 mL po 1 g praška za rastvor za injekciju/infuziju, u kutiji

J01DH Karbapenemi

J01DH02 meropenem

Doziranje: teške pneumonije (uključujući bolničke i pneumoniju povezanu sa mehaničkom ventilacijom), bronhopulmonalne infekcije kod cistične fibroze, komplikovane infekcije urinarnog trakta, komplikovane intra-abdominalne infekcije, intra i post-partalne infekcije, komplikovane infekcije kože i mekih tkiva, akutni bakterijski meningitis; može se koristiti kod bolesnika sa febrilnom neutropenijom, kada se

pretpostavlja da je povišena temperatura izazvana bakterijskom infekcijom: i.v.inj. tokom 5 min. ili i.v.inf. 0,5-1 g svakih 8 sati; djeca 3 mjeseca-12 god. 10-20 mg/kg svakih 8 sati; djeca tjelesne mase preko 50 kg koriste dozu za odrasle; egzacerbacija hronične infekcije donjih respiratornih puteva u cističnoj fibrozi, meningitis, 2 g svakih 8 sati; djeca 3 mjeseca-12 god. 40 mg/kg svakih 8 sati; djeca tjelesne mase preko 50 kg koriste dozu za odrasle; uzeti u obzir zvanične smjernice za odgovarajuću upotrebu antibakterijskih lijekova!

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ARCHIFAR - MEDOCHEMIE LTD

- ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [1000 mg/1 bočica] 10 staklenih bočica od 30 ml sa praškom za rastvor za injekciju ili infuziju, u kutiji
- ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [500 mg/1 bočica] 10 staklenih bočica od 20 ml sa praškom za rastvor za injekciju ili infuziju, u kutiji

MAXIPENEM - MENARINI SAGLIK VE ILAC SANAYII TIC. A.S.

- ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [1000 mg/1 bočica] 1 staklena bočica od 25 ml sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [500 mg/1 bočica] 1 staklena bočica od 25 ml sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju, u kutiji

MEROBOCID - SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE `BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL PHARMACEUTICAL PLANT` PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

- ZU prašak za rastvor za injekciju [500 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju, u kutiji
- ZU prašak za rastvor za injekciju/infuziju [1000 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa 1000 mg praška za rastvor za injekciju/infuziju, u kutiji

MEROPENEM APTAPharma - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O.

- ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [1000 mg/1 bočica] 10 staklenih bočica od 20 ml sa praškom za rastvor za injekciju ili infuziju, u kutiji
- ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [500 mg/1 bočica] 10 staklenih bočica od 20 ml sa praškom za rastvor za injekciju ili infuziju, u kutiji

MEROPENEM PANPharma - PANPharma S.A.

- ZU prašak za rastvor za injekciju/infuziju [1000 mg/1 viala] Bezbojna staklena bočica sa 1348 mg praška za rastvor za injekciju/ infuziju, zatvorena halobutyl gumenim čepom i Al - kapičom. Kutija sa 10 bočica.

MEROPENEM STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG

- ZU prašak za rastvor za injekciju/infuziju [1000 mg/1 bočica] 10 bezbojnih staklenih bočica (staklo tip I) od 30 ml, u kutiji
- ZU prašak za rastvor za injekciju/infuziju [500 mg/1 bočica] 10 bezbojnih staklenih bočica (staklo tip I) od 20 ml, u kutiji

MEROPENEM VENUS - VENUS PHARMA GMBH

- ZU prašak za rastvor za injekciju/infuziju [1 g/1 bočica] 10 staklenih bočica sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU prašak za rastvor za injekciju/infuziju [500 mg/1 bočica] 10 staklenih bočica sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju, u kutiji

J01DH03 ertapenem

Doziranje: abdominalne infekcije, akutne ginekološke infekcije, izvanbolnički stečena pneumonija, infekcije kože i mekog tkiva kod dijabetičkog stopala kod bolesnika koji boluju od dijabetesa: i.v. inf. odrasli i adolescenti preko 13 god. 1 g jednom dnevno; djeca 3 mjeseca-12 god, 15 mg/kg svakih 12 sati (maks. 1 g dnevno); profilaksa kod kolorektalnog zahvata: 1 g u obliku jednokratne intravenske doze 1 sat prije operacije.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ERTAPENEM APTAPHARMA - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O.

ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [1 g/1 bočica] 10
staklenih bočica od 20 ml sa praškom za koncentrat za rastvor za
infuziju, u kutiji

ERTA ZNA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [1 g/1 bočica] 10
bezbojnih staklenih bočica (20 mL), u kutiji

J01DH51 cilastatin, imipenem

Doziranje: komplikovane intraabdominalne infekcije, teške pneumonije, uključujući bolnički stečenu pneumoniju i pneumoniju povezanu sa mehaničkom ventilacijom, porođajne i poslije porođajne infekcije, komplikovane infekcije urinarnog trakta, komplikovane infekcije kože i mekih tkiva; može se koristiti za liječenje bolesnika sa neutropenijom praćenom povišenom tjelesnom temperaturom za koju se sumnja da je nastala zbog bakterijske infekcije; odrasli i adolescenti: i.v.inf. računato kao imipenem, 500 mg svakih 6 sati ili 1 g svakih 8 sati; infekcije prouzrokovane Pseudomonasom ili drugim manje osjetljivim organizmima, životno ugrožavajuće infekcije ili empirijska terapija infekcija kod febrilnih pacijenata sa neutropenijom 25 mg/kg (maks. 1 g) svakih 6 sati; djeca starija od 1 god. 15 mg/kg (maks. 500 mg) svakih 6 sati; uzeti u obzir zvanične smjernice za pravilnu upotrebu antibakterijskih lijekova!

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IMIBACID - SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE `BORSHCHAHIVSKIY CHEMICAL

PHARMACEUTICAL PLANT` PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

ZU prašak za rastvor za infuziju [500 mg/1 bočica+ 500 mg/1 bočica] 1
bočica od 30 ml sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

IMIPENEM CILASTATINE PANPHARMA - PANPHARMA S.A.

ZU prašak za rastvor za infuziju [500 mg/1 viala+ 500 mg/1 viala]
Bezbojna staklena bočica sa 1,08 g praška za rastvor za infuziju,
zatvorena bromobutil gumenim čepom. Kutija sa 10 bočica.

IMIPENEM/CILASTATIN APTAPHARMA - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O.

ZU prašak za rastvor za infuziju [500 mg/1 bočica+ 500 mg/1 bočica]
10 staklenih bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

IMIPENEM/CILASTATIN KABI 500 MG/500 MG - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

ZU prašak za rastvor za infuziju [500 mg/1 bočica+ 500 mg/1 bočica]
10 staklenih bočica zapremine 20 ml sa praškom za rastvor za
infuziju, u kutiji

J01DH56 cilastatin, imipenem, relebaktam

Doziranje: bolnička pneumonija, uključujući pneumoniju povezanu sa mehaničkom ventilacijom; bakterijemija koja je povezana ili se sumnja da je povezana sa bolničkom pneumonijom ili pneumonijom povezanom sa mehaničkom ventilacijom; liječenje infekcija uzrokovanih aerobnim gram-negativnim organizmima kod odraslih pacijenata sa ograničenim mogućnostima liječenja: 500 mg svakih 6 sati, trajanje treba da bude prilagođeno mjestu infekcije - konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

RECARBIO - MERCK SHARP & DOHME BV

ZU prašak za rastvor za infuziju [500 mg/1 bočica+ 500 mg/1 bočica+ 250 mg/1 bočica] 25 bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

J01DI Ostali cefalosporini i penemi**J01DI54 ceftolozan, tazobaktam**

Doziranje: komplikovane intraabdominalne infekcije: i.v.inf. odrasli 1/0,5 g svakih 8 sati tokom 4-14 dana; komplikovane infekcije urinarnog trakta, akutni pijelonefritis: i.v.inf. odrasli 1/0,5 g svakih 8 sati tokom 7 dana; bolnička pneumonija, pneumonija povezana sa mehaničkom ventilacijom: i.v.inf. odrasli 2/1 g svakih 8 sati tokom 8-14 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ZERBAXA - MERCK SHARP & DOHME BV**

ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [1 g/1 bočica+ 0,5 g/1 bočica] 10 bočica sa praškom za koncentrat za rastvor za infuziju, u kutiji

J01E Sulfonamidi i trimetoprim**J01EE Kombinacije sulfonamida i trimetoprima, uključujući derivate****J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim**

Doziranje: liječenje infekcija uzrokovanih bakterijom *Pneumocystis jirovecii* i prevencija infekcija izazvanih sa *Pneumocystis jirovecii*, u imunokompromitovanih pacijenata, može se upotrebljavati i u liječenju urinarnih infekcija; otitisa i sinusitisa (isključivo nakon bakteriološke evaluacije), određenih bronhopulmonalnih infekcija; gastrointestinalnih infekcija i tifoidne groznice; odrasli 960 mg svakih 12 sati; djeca 12-17 god, 960 mg svakih 12 sati; 6 nedjelja-5 mjeseci, 120 mg svakih 12 sati; 6 mjeseci-5 god. 240 mg svakih 12 sati; 6-12 god, 480 mg svakih 12 sati; liječenje pneumonije uzrokovane sa *Pneumocystis jirovecii* (*P. carinii*), 120 mg/kg dnevno u 2-4 podijeljene doze tokom 14-21 dan; profilaksa pneumonije prouzrokovane sa *Pneumocystis jirovecii* (*P. carinii*), 960 mg jednom dnevno (može biti smanjeno na 480 mg jednom dnevno da bi se poboljšala tolerancija) ili 960 mg svaki drugi dan (3 puta nedjeljno) ili 960 mg dva puta dnevno svaki drugi dan (3 puta nedjeljno); djeca 6 nedjelja-5 mjeseci, 120 mg 2 puta dnevno 3 uzastopna dana ili svaki drugi dan u nedjelji (ili na 7 dana u nedjelji); 6 mjeseci-5 god. 240 mg; 6-12 god. 480 mg

REGISTROVANI LIJEKOVI:**BACTRIM - GALENIKA A.D. BEOGRAD**

Rp tableta [400 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 20 tableta (2 AL/PVC-PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

ESBESUL - BOSNALIJEK D.D.

Rp sirup [200 mg/5 mL+ 40 mg/5 mL] 100 mL sirupa (smeđa staklena boca sa sigurnosnim (CRC/TE) zatvaračem) u kutiji

Rp tableta [400 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

J01F Makrolidi, linkozamidi i streptogamini
J01FA Makrolidi

J01FA01 eritromicin

Doziranje: liječenje infekcija kod pacijenata preosjetljivih na penicilin, oralne infekcije, campylobacter enteritis, sifilis, ne-gonokokni uretritis, infekcije respiratornog trakta (uključujući infekcije Legionellom), infekcije kože, hronični prostatitis, profilaksa difterije, infekcije izazvane streptokokom tipa A, pneumokokne infekcije, pertusis, akne vulgaris, rosacea, infekcije uha, nekomplikovana genitalna hlamidija, konjuktivitis, perioperativna priprema (za elektivni zahtjev na debelom crijevu): oralna primjena, odrasli i djeca iznad 8 god. 250-500 mg svakih 6 sati ili 0,5-1 g svakih 12 sati, kod teških infekcija do 4 g dnevno u podijeljenim dozama; novorođenčad: 12,5 mg/kg svakih 6 sati; djeca 1 mjesec-2 god. 125 mg svakih 6 sati ili 250 mg svakih 12 sati; djeca 2-8 god. 250 mg svakih 6 sati ili 500 mg svakih 12 sati; u slučaju teških infekcija udvostručiti dozu; profilaksa reumatske vrućice: 250 mg svakih 12 sati; profilaksa bakterijskog endokarditisa: 1 g 1 sat prije stomatološkog zahvata, odnosno hirurškog zahvata u području gornjeg dijela disajnih puteva, a zatim 500 mg eritromicina 6 sati kasnije

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ERITHROMYCIN REMEDICA - REMEDICA LIMITED

Rp prašak za oralnu suspenziju [250 mg/5 mL] 1 staklena boca sa 48 g praška za pripremu 100 mL oralne suspenzije, u kutiji

ERITROMICIN FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (1 PVC/Al blister sa 16 kapsula, tvrdih), u kutiji

ERITROMICIN HEMOFARM - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

J01FA06 roksitromicin

Doziranje: infekcije uho/grlo/nos (tonzilitis, faringitis, sinuzitis, otitis media), respiratorne infekcije (bronhitis, pneumonije) izazvane hlamidijama, mikoplazmama, legionelama, veliki kašalj; urogenitalne infekcije (uretritis, cervicitis, cervikovaginitis uzrokovan hlamidijama i mikoplazmama); infekcije kože (furunkuloza, piodermija, impetigo i erizipel kod pacijenata sa preosjetljivošću na β-laktamske antibiotike ili kada takvo liječenje ne odgovara iz nekog drugog razloga): odrasli i djeca tjelesne težine iznad 40 kg, 150 mg dva puta dnevno ili 300 mg jednom dnevno; ne preporučuje se kod djece mlađe od 6 god.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ROXIMISAN - SLAVIAMED D.O.O. BEOGRAD

Rp film tableta [150 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

J01FA09 klaritromicin

Doziranje: infekcije gornjih respiratornih puteva (tonzilo-faringitis, akutni sinusitis), infekcije donjih respiratornih puteva (akutno pogoršanje hroničnog bronhitisa i upala pluća), diseminovane ili lokalizovane mikobakterijske infekcije, prevencija diseminovane infekcije uzrokovane kompleksom bakterija Mycobacterium avium kod pacijenata inficiranih HIV-om sa brojem CD-4 limfocita manjim ili jednakim 100/mm³, infekcije kože i potkožnog tkiva, eradikacija Helicobacter pylori; oralna primjena, odrasli i djeca starija od 12 godina: 250 mg svakih 12 sati, povećati kod pneumonije ili jake infekcije na 500 mg svakih 12 sati; liječenje obično traje od 7 do 14 dana; djeca tjelesne težine iznad 8

kg, 7,5 mg/kg/dan na 12 sati; 8-11 kg, 62,5 mg na 12 sati; 12-19 kg, 125 mg na 12 sati; 20-29 kg, 187,5 mg na 12 sati; 30-40 kg, 250 mg na 12 sati; i.v. odrasli i djeca preko 12 god. 500 mg 2 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FROMILID - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp filmom obložena tableta [250 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/Al - blistera po 7 tableta) u kutiji
Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/Al - blistera po 7 tableta) u kutiji

FROMILID UNO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp tableta sa modifikovanim oslobađanjem [500 mg/1 tableta] 7 tableta sa modifikovanim oslobađanjem (1 PVC/PVDC/Al blister), u kutiji

KLACID - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 14 film tableta (2 PVC/PVdC/Al blistera po 7 film tableta), u kutiji

KLACID I.V. - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [500 mg/1 viala] 1 staklena bočica sa 500 mg praška, u kutiji

KLACID SR - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- Rp tableta s modifikiranim oslobađanjem [500 mg/1 tableta] 7 tableta sa modifikiranim oslobađanjem (1 PVC/PVDC/Al blister sa 7 tableta), u kutiji

KLARITROMICIN REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE

- Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 14 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji

MONOCLAR - BOSNALIJEK D.D.

- Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 14 film tableta (2 PVC/PVdC/Al blistera po 7 tableta), u kartonskoj kutiji

ZYMBAKTAR - HEMOFARM A.D. VRŠAC

- Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 14 film tableta (2 PVC/PVDC/-Al blistera po 7 tableta), u kutiji

J01FA10 azitromicin

Doziranje: *infekcija respiratornog trakta, otitis media, infekcije kože i mekih tkiva*; oralna primjena, odrasli i djeca preko 45 kg: 500 mg/dan u toku 3 dana (najmanje jedan sat prije jela ili dva sata nakon jela) ili 500 mg prvi dan, a zatim 250 mg jednom dnevno u toku 4 dana; djeca iznad 6 mjeseci: 10 mg/kg jednom dnevno tokom 3 dana ili tjelesne težine 15-25 kg, 200 mg jednom dnevno tokom 3 dana; 26-35 kg, 300 mg jednom dnevno tokom 3 dana; 36-45 kg, 400 mg jednom dnevno tokom 3 dana; *pneumonija stečena u zajednici, blaga do umjerena*, oralna primjena, odrasli iznad 18 god: 500 mg jednom dnevno tokom 3 dana ili 500 mg prvi dan, a zatim 250 mg jednom dnevno u toku 4 dana; *pneumonija stečena u zajednici, teška infekcija*, odrasli iznad 18 god. i.v. inf. 500 mg jednom dnevno, najmanje dva dana, onda oralno 500 mg jednom dnevno; ukupno trajanje terapije 7-10 dana; *nekomplikovane genitalne infekcije izazvane hlamidijom i ne gonokokni uretritis*; odrasli i djeca iznad 12 god: oralno, 1 g kao pojedinačna doza; *inflamatorne bolesti karlice*: i.v. 500 mg u toku jednog ili dva dana, zatim 250 mg jednom dnevno u trajanju do 7 dana; *Lajmska bolest*; odrasli iznad 18 god: 500 mg jednom dnevno, tokom 17 dana; infekcije želuca i dvanaestopalačnog crijeva uzrokovane s *Helicobacter pylori*: 1 g dnevno u kombinaciji sa antisekretornim lijekom i drugim lijekovima; hronični prostatitis uzrokovan *Chlamydom trachomatis*: jednom dnevno 500 mg tokom 3 dana, ponoviti tokom 3 uzastopne nedjelje (1,5 g nedjeljno, ukupna doza 4,5 g tokom 3 nedjelje)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AZAX - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 3 film tablete (1 PVC/PE/PVDC-Al blister), u kutiji

AZIBIOT - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 3 filmom obložene tablete (1 Al/PVC blister), u kutiji

AZID - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 3 film tablete (1 PVC/PVDC/Al - blister sa 3 tablete), u kutiji

AZINOCIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 3 film tablete (1 PVC-Alu/PVC blister sa 3 tablete), u kutiji

AZITRO - DEVA HOLDING A.S.

Rp filmom obložena tableta [250 mg/1 tableta] 6 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC/Al blister), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 3 filmom obložene tablete (1 PVC/PVDC/Al blister), u kutiji

AZOMEX - BOSNALIJEK D.D.

Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 3 film tablete (1 PVC/Al blister), u kutiji

Rp prašak za oralnu suspenziju [200 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa praškom za pripremu 15 ml oralne suspenzije i dozatorom, u kutiji

AZOMICIN - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp filmom obložena tableta [250 mg/1 tableta] 6 filmom obloženih tableta (1 PVC/PE/PVDC//Al blister), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 3 filmom obložene tablete (1 PVC/PE/PVDC//Al blister), u kutiji

HEMOMYCIN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 3 film tablete (1 PVC/Al blister po 3 tablete), u kutiji

Rp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 6 kapsula, tvrdih (1 PVC/Al blister sa 6 kapsula), u kutiji

Rp prašak za oralnu suspenziju [100 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 11,43 g praška za pripremu 20 mL oralne suspenzije, u kutiji

Rp prašak za oralnu suspenziju [200 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 10 g praška za pripremu 20 mL oralne suspenzije, kutija sa bočicom i mjericom

Rp prašak za oralnu suspenziju [200 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 15 g praška za pripremu 30 ml oralne suspenzije, u kutiji

ZU prašak za rastvor za infuziju [500 mg/1 viala] 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

SUMAMED - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 3 filmom obložene tablete (1 PVC/Al blister sa 3 tablete), u kutiji

SUMAMED 1200 - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Rp prašak za oralnu suspenziju [200 mg/5 mL] 1 HDPE bočica sa 29,295 g praška za pripremu 30 ml oralne suspenzije, sa graduiranom brizgalicom od 5 ml, u kutiji

SUMAMED FORTE - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Rp prašak za oralnu suspenziju [200 mg/5 mL] 1 HDPE bočica sa 16,74 g praška za pripremu 15 ml oralne suspenzije, sa graduiranom brizgalicom od 5 ml, u kutiji

ZITHROTEL - ANFARM HELLAS AP

ZU/Rp prašak za rastvor za infuziju [500 mg/1 bočica] 1 bezbojna staklena boca (staklo tipa I) u kutiji

J01FF**Linkozamidi****J01FF01****klindamicin**

Doziranje: teške infekcije respiratornog trakta, infekcija kože i mekih tkiva, akutni i hronični osteomijelitis, bakterijemija i septikemija, intraabdominalne infekcije, pelvične infekcije i infekcija genitalnog trakta kod žena; oralno: odrasli, 150 - 300 mg svakih 6 sati; kod teških infekcija 300-450 mg svakih 6 sati; djeca, teške infekcije: 8-16 mg/kg/dan podijeljeno na 6 ili 8 sati ili 3-6 mg/kg na 6 sati, veoma teške infekcije: 16-20 mg/kg/dan na 6 ili 8 sati; profilaksa bakterijskog endokarditisa: 600 mg (20 mg/kg za djecu) 1 sat prije raznih dentalnih, oralnih, ezofagealnih ili respiratornih procedura; liječenje toksoplazmoze u bolesnika koji ne podnose sulfonamide: 600 mg zajedno sa pirimetaminom svakih 6 sati u toku namjanje 3 sedmice, terapija održavanja 1200 mg/dan; liječenje toksoplazmotičnog encefalitisa izazvanog sa *Toxoplasma gondii* u bolesnika koji imaju AIDS: 600 mg klindamicina i 75 mg pirimetamina na 6 sati u toku 6 sedmica; parenteralno: 0,6-2,7 g dnevno podijeljeno u 2-4 doze (pojedinačna i.m. injekcija ne treba da pređe 600 mg, a i.v. infuzija 1,2 g tokom 60 minuta), djeca: 15-40 mg/kg dnevno, novorođenčad 15-20 mg/kg dnevno podijeljeno u 3-4 doze.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**CLINDAMYCIN ANFARM - ANFARM HELLAS S.A.**

ZU rastvor za injekciju/ infuziju [150 mg/1 mL] 10 bezbojnih staklenih ampula rastvora za injekciju/infuziju po 2 mL, u kutiji

DALACIN C - PFIZER LUXEMBOURG SARL

Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al - blistera po 8 kapsula), u kutiji

Rp kapsula, tvrda [300 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al - blistera po 8 kapsula), u kutiji

KLIMICIN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Rp kapsula, tvrda [300 mg/1 kapsula] 16 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVdC-Al blistera po 8 kapsula) u kutiji

ZU rastvor za injekciju/ infuziju [300 mg/2 mL] 10 staklenih ampula po 2 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

J01FF02**linkomicin**

Doziranje: infekcije gornjeg respiratornog trakta: hronični sinusitis izazvan anaerobnim bakterijama, hronično supurativno zapaljenja srednjeg uha ili kao dopunska terapija zajedno s antibiotikom aktivnim protiv aerobnih gram-negativnih organizama; infekcije donjeg respiratornog trakta, uključujući infekcijske egzacerbacije hroničnog bronhitisa i upale pluća; teške infekcije kože i mekog tkiva izazvane osjetljivim organizmima, kada penicilini nisu indikovani; infekcije kostiju i zglobova, uključujući osteomijelitis i septički artritis, septikemija i endokarditis: odrasli, oralno, 500 mg na 6 ili 8 sati; djeca: 30 do 60 mg/kg/dnevno na 6 ili 8 sati; lijek se primjenjuje 1 ili 2 sata prije ili poslije obroka s dovoljnom količinom vode; rastvor za injekciju, ne smije se davati intravenski nerazrijeđen kao bolus, već se treba primjenjivati infuzijom tokom perioda od najmanje jednog sata; i.v. inj. odrasli: 600 mg do 1 g svakih 8 do 12 sati, maks. 8 g dnevno; pedijatrijska populacija: i.v. inj. 10-20 mg/kg/dan podijeljeno u dozama.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**LINCOCIN - PFIZER INC.**

Rp	kapsula, tvrda [500 mg/1 kapsula] 12 kapsula, tvrdih (1 Al/PVC blister sa 12 kapsula, tvrdih), u kutiji
ZU	otopina za injekciju [300 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 2 ml otopine za injekciju, u kutiji

J01G Aminoglikozidni antibakterijski lijekovi

J01GB Ostali aminoglikozidi

J01GB01 tobramicin

Doziranje: hronične plućne infekcije uzrokovane bakterijom *Pseudomonas aeruginosa* kod bolesnika sa cističnom fibrozom: odrasli i djeca iznad 6 god. preporučena doza u jednodoznom spremniku (300 mg), dva puta dnevno (ujutro i naveče) tokom 28 dana; razmak između doza bi morao iznositi blizu 12 sati; nakon 28 dana liječenja bolesnici moraju prestati sa liječenjem tokom sljedećih 28 dana; naizmjenični ciklus od 28 dana aktivnog liječenja praćen sa 28 dana bez tretmana mora se poštovati (ciklus: 28 dana uzimanja lijeka i 28 dana ne-uzimanja)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BRAMITOB - CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH

Rp	rastvor za raspršivanje [300 mg/4 mL] 56 jednodoznih polietilenskih spremnika (14x4) sa po 4 ml rastvora za raspršivanje (po 4 spremnika u zaštitnoj vrećici), u kutiji

J01GB03 gentamicin

Doziranje: sepsa i druge sistemske infekcije, infekcije u abdomenu (peritonitis, apscesi, kolangitis, obično u kombinaciji s metronidazolom ili klindamicinom), teške neonatalne infekcije, infekcije mokraćnih i respiratornih organa, sekundarne infekcije opekotina, traumatskih i hirurških rana, tularemija, infekcije CNS-a, endokarditis (obično u kombinaciji s beta-laktamskim antibiotikom), profilaksa kod postoperativnih infekcija, nakon intraabdominalnih hirurških intervencija i hirurških infekcija urinarnog trakta: i.m. ili spora i.v. inj. najmanje 3 min. ili i.v. inf. 3-5 mg/kg dnevno, u jednoj pojedinačnoj dozi (preporučljivo) ili u dvije podijeljene doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GARAMYCIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

ZU	otopina za injekciju [80 mg/1 ampula] 10 ampula po 2 mL otopine za injekciju (2 blistera po 5 ampula), u kutiji

GENTAMICIN GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

ZU	rastvor za injekciju [80 mg/2 mL] 10 staklenih ampula po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

GENTAMICIN HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

ZU	rastvor za injekciju [120 mg/2 mL] 10 ampula po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU	rastvor za injekciju [80 mg/2 mL] 10 ampula po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

J01GB06 amikacin

Doziranje: teške infekcije izazvane Gram-negativnim uzročnicima koji su rezistentni na gentamicin (režim višestruke dnevne doze): i.m., i.v. ili i.v. inf. primjena, odrasli, 15 mg/kg/dan podijeljeno u dvije pojedinačne doze što odgovara dozi od 500 mg amikacina dva puta dnevno kod odraslih; kod teških infekcija povećati na 22,5 mg/kg dnevno u 3 podijeljene doze, maks. 1,5 g dnevno do 10 dana (maks. kumulativna doza 15 g); uobičajeno trajanje liječenja je 7 do 10 dana; djeca 4 sedmice starosti do 12 god, i.m. ili i.v. inf. 15-20 mg/kg jednom dnevno ili 7,5 mg dva puta dnevno; novorođenčad, 10 mg/kg

jednom dnevno, a zatim 7,5 mg/kg svakih 12 sati; nedonoščad, 7,5 mg/kg svakih 12 sati; *teške infekcije izazvane Gram-negativnim uzročnicima koji su rezistentni na gentamicin* (režim jednokratne dnevne doze): i.v.inf. odrasli, početna doza 15 mg/kg jednom dnevno (maks. po dozi 1,5 g jednom dnevno), doze treba podešavati prema koncentraciji amikacina u serumu, maks. 15 g; *akutni prostatitis, akutni pijelonefritis, infekcije urinarnog trakta-povezane sa primjenom katetera* (režim jednokratne dnevne doze): i.v.inf. ili spora i.v. inj. odrasli, početna doza 15 mg/kg jednom dnevno (maks. po dozi 1,5 g jednom dnevno), doze treba podešavati prema koncentraciji amikacina u serumu, maks. 15 g

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AMIKACIN GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

ZU rastvor za injekciju/ infuziju [500 mg/2 mL] 10 ampula po 2 mL
 rastvora za injekciju/infuziju u kutiji

AMIKACIN SOPHARMA - SOPHARMA AD

ZU otopina za injekciju/ infuziju [500 mg/2 mL] 10 ampula sa po 2 mL
 otopine za injekciju/infuziju u blisteru (PVC), u kutiji

AMIKAN - ANFARM HELLAS S.A.

ZU rastvor za injekciju [500 mg/2 mL] 1 staklena bočica sa 2 mL
 rastvora za injekciju, u kutiji

J01M

Hinolonski antibakterijski lijekovi

J01MA

Fluorohinoloni

J01MA02

ciprofloksacin

Doziranje: *infekcije respiratornog trakta:* oralno, odrasli, 500-750 mg dva puta dnevno; i.v. inf. odrasli 400 mg svakih 8-12 sati dato tokom 60 min; *pseudomonasne infekcije donjeg dijela respiratornog trakta u cističnoj fibrozi:* oralno, odrasli, 750 mg 2 puta dnevno; *infekcije urinarnog trakta:* oralno, odrasli, 250-750 mg dva puta dnevno; i.v. inf. odrasli 400 mg svakih 8-12 sati dato tokom 60 min; *akutni prostatitis:* oralno, odrasli, 500 mg dva puta dnevno tokom 14 dana, zatim uraditi procjenu i odlučiti o nastavku terapije tokom narednih 14 dana; i.v. inf. odrasli 400 mg svakih 8-12 sati; *gonoreja:* oralno odrasli 500 mg kao pojedinačna doza; *većina ostalih infekcija (infekcije gastrointestinalnog trakta, infekcije kože i mekih tkova, infekcije kostiju i zglobova pacijenti sa neutropenijom, invazivne infekcije uzrokovane bakterijom Neisseria meningitides):* oralno 500 mg dva puta dnevno (u slučajevima težih infekcija 750 mg dva puta dnevno), za više informacija o doziranju i dužini trajanja terapije konsultovati informacije o lijeku; i.v. inf. odrasli 400 mg svakih 8-12 sati dato tokom 60 min; *antraks (terapija i post-ekspozicijska profilaksa):* oralno, 500 mg dva puta dnevno; i.v. inf. 400 mg svakih 12 sati tokom 60 min; *hirurška profilaksa:* oralno, odrasli 750 mg uzeti 60 min. prije procedure; *akutni pijelonefritis, infekcije urinarnog trakta (u vezi sa kateterom):* oralno, odrasli 500 mg dva puta dnevno tokom 7 dana; i.v. inf. odrasli 400 mg svakih 8-12 sati; **djeca - komplikovane infekcije urinarnog trakta:** oralno, novorođenčad 10 mg/kg 2 puta dnevno; djeca 1 mjesec-18 god. 10 mg/kg 2 puta dnevno; kod teških infekcija dozu udvostručiti (maks. 750 mg 2 puta dnevno); i.v. inf. tokom 60 min. novorođenčad 6 mg/kg svakih 12 sati; djeca 1 mjesec-18 god. 6 mg/kg svakih 8 h; povećati na 10 mg/kg svakih 8 h kod teških infekcija (maks. 400 mg svakih 8 h); *teške infekcije respiratornog trakta; gastrointestinalne infekcije:* oralno, novorođenčad 15 mg/kg 2 puta dnevno; djeca 1 mjesec-18 god 20 mg/kg (maks. 750 mg 2 puta dnevno); i.v. inf. tokom 60 min. novorođenčad 10 mg/kg svakih 12 sati; djeca 1 mjesec-18 god. 10 mg/kg (maks. 400 mg svakih 8 h); *pseudomonasna infekcija donjeg dijela respiratornog trakta u cističnoj fibrozi:* oralno, djeca 1 mjesec-18 god. 20 mg/kg (maks. 750 mg) 2 puta dnevno; i.v. inf. tokom 60 min. djeca 1 mjesec-18 god. 10 mg/kg (maks. 400 mg) svakih 8 h; *gonoreja:* oralno, djeca 13-17 god. 500 mg kao pojedinačna doza; *antraks (terapija i post-ekspozicijska profilaksa):* oralno, djeca 1-18 god. 15 mg/kg

(maks. 500 mg 2 puta dnevno); i.v. inf. tokom 60 min. djeca 1 mjesec-18 god. 10 mg/kg (maks. 400 mg svakih 12 sati)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ARISTIN-C - ANFARM HELLAS S.A.

- △ ZU rastvor za infuziju [200 mg/100 mL] 1 staklena boca sa 100 ml rastvora za infuziju, u kutiji
- △ ZU rastvor za infuziju [400 mg/200 mL] 1 staklena boca sa 200 ml rastvora za infuziju, u kutiji

CIFLOX - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- △ Rp filmom obložena tableta [250 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC//Al blister), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC//Al blister), u kutiji

CIFLOXINAL - PRO.MED.CS PRAHA A.S.

- △ Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji

CIPRINOL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- △ Rp filmom obložena tableta [250 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/ PVDC// Al - blister), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/ PVDC// Al - blister), u kutiji
- △ ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [100 mg/10 mL] 5 staklenih ampula po 10 mL koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
- △ ZU otopina za infuziju [200 mg/100 mL] 1 staklena bočica sa 100 ml otopine za infuziju, u kutiji

CIPROFLOKSACIN REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE

- △ Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 10 film tableta (PVC-PVDC/Al folija-blistar sa 10 tableta), u kutiji

CIPROFLOXACIN BIOFARMA - BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S.

- △ Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC neprozirna blistera po 7 tableta), u kutiji

CIPROFLOXACINA BIOINDUSTRIA L.I.M. - BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.

- △ ZU rastvor za infuziju [200 mg/100 mL] 25 staklenih bočica (sa po 100 ml rastvora za infuziju), u kutiji
- △ ZU rastvor za infuziju [400 mg/200 mL] 25 staklenih bočica (sa po 200 ml rastvora za infuziju), u kutiji

CIPROL - BOSNALIJEK D.D.

- △ Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/Al - blister) u kutiji

CIPROZAD - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- △ Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PVDC/Al blister), u kutiji
- △ Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 14 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji

CITERAL - ALKALOID AD SKOPJE

- △ Rp film tableta [250 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 Al/PVC/PVdC blister), u kutiji
- △ Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 Al/PVC/PVdC blister), u kutiji
- △ ZU koncentrat za rastvor za infuziju [100 mg/10 mL] 5 ampula po 10 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

FLOTIC - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

△ ZU rastvor za infuziju [200 mg/100 mL] 1 staklena bočica (staklo tipa II) sa 100ml rastvora za infuziju, u kutiji

△ ZU rastvor za infuziju [400 mg/200 mL] 1 staklena bočica (staklo tipa II) sa 200ml rastvora za infuziju, u kutiji

MAROCEN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

△ Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 10 film tableta u blisteru (PVC/PVdC-Al), u kutiji

SIPROBEL - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

△ Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 14 film tableta (1 PVC/PE/PVDC//Al blister), u kutiji

J01MA06 norfloksacin

Doziranje: *infekcije donjih dijelova urinarnog trakta:* 400 mg dva puta dnevno, 7-10 dana (3 dana za liječenje nekomplikovanih infekcija kod žena); *hronične, ponovljene, infekcije urinarnog trakta:* 400 mg dva puta dnevno do 12 nedjelja; doza se može redukovati na 400 mg jednom dnevno u slučaju adekvatnog odgovora u toku prve 4 nedjelje; *hronični prostatitis:* 400 mg dva puta dnevno, 28 dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NOFLOX - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

△ Rp filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 10 filmom obloženih tableta) u kutiji

NOLICIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

△ Rp filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

NORFLOXACIN REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE

△ Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

J01MA12 levofloksacin

Doziranje: *oralno, akutni bakterijski sinusitis:* 500 mg jednom dnevno tokom 10-14 dana; *akutno pogoršanje hronične opstruktivne bolesti uključujući bronhitis:* 500 mg jednom dnevno tokom 7-10 dana; *vanbolnička pneumonija:* 500 mg jednom ili dva puta dnevno tokom 7-14 dana; *pijelonefritis:* 500 mg jednom dnevno tokom 7-10 dana; *komplikovane infekcije urinarnog trakta:* 500 mg jednom dnevno tokom 7-14 dana; *nekomplikovani cistitis:* 250 mg jednom dnevno tokom 3 dana; *hronični prostatitis:* 500 mg jednom dnevno tokom 28 dana; *komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva:* 500 mg jednom ili dva puta dnevno tokom 7-14 dana; *inhalacija antraksa (terapija i post-ekspozicijska profilaksa):* 500 mg jednom dnevno tokom 8 nedjelja; *i.v. inf.* (tokom najmanje 60 min. za 500 mg), *vanbolnički stečena pneumonija:* 500 mg jednom ili dva puta dnevno tokom 7-14 dana; *pijelonefritis:* 500 mg jednom dnevno tokom 7-10 dana; *komplikovane infekcije urinarnog trakta:* 500 mg jednom dnevno tokom 7-10 dana; *komplikovane infekcije urinarnog trakta:* 500 mg jednom dnevno tokom 7-10 dana; *komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva:* 500 mg jednom ili dva puta dnevno tokom 7-14 dana; *inhalacija antraksa (terapija i post-ekspozicijska profilaksa),* 500 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALVOLAMID T - PHARMATHEN S.A.

△ Rp film tableta [250 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PE/PVDC-Al blister), u kutiji

△ Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PE/PVDC-Al blister), u kutiji

FLOXILEVO - DEVA HOLDING A.S.

- △ ZU rastvor za infuziju [500 mg/100 mL] 1 bočica sa 100 ml rastvora za infuziju, u kutiji

FORTECA - COOPER PHARMACEUTICALS S.A.

- △ ZU rastvor za infuziju [500 mg/100 mL] 1 plastična boca od polipropilena od 100 ml, u kutiji
- △ Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 10 film tableta (2 PVC/Al blistera po 5 tableta) u kutiji

LEBEL - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

- △ Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 7 film tableta (1 PVC/PE/PVDC//Al - blister), u kutiji
- △ Rp film tableta [750 mg/1 tableta] 7 film tableta (1 PVC/PE/PVDC//Al - blister), u kutiji
- △ ZU otopina za infuziju [500 mg/100 mL] 1 staklena bočica sa 100 ml otopine za infuziju, u kutiji

LEFLOGAL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- △ Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC /Al blister sa 10 tableta) u kutiji

LEVALOX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- △ ZU otopina za infuziju [5 mg/1 mL] 1 bočica sa 100 ml otopine za infuziju, u kutiji

LEVOFLOXACINA BIOINDUSTRIA L.I.M. - BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.

- △ ZU rastvor za infuziju [5 mg/1 mL] 25 staklenih bočica (sa po 100 ml rastvora za infuziju) , u kutiji

LOVETROX - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

- △ ZU rastvor za infuziju [500 mg/100 mL] 1 bezbojna, staklena bočica (tip II) sa 100 ml rastvora za infuziju, u kutiji

NEVOTEK - BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S.

- △ Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 7 filmom obloženih tableta (1 PVC//Al blister sa 7 tableta) u kutiji

TAVANIC - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

- △ Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta) u kutiji

VLOFINOX - ANFARM HELLAS S.A.

- △ ZU rastvor za infuziju [5 mg/1 mL] 1 staklena boca (tipa I) od 100 ml otopine za infuziju, u kutiji

J01MA14 moksifloksacin

Doziranje: sinusitis, akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa, vanbolnički stečena pneumonija, blaga do umjerena inflamatorna bolest male karlice, komplikovane infekcija kože i mekih tkiva gdje je izostao odgovor na druge antibiotike ili kod pacijenata koji ne mogu primiti druge antibiotike: odrasli, oralno, 400 mg jednom dnevno; i.v. inf. 400 mg jednom dnevno tokom 60 min; preporučeno trajanje terapije: 10 dana kod vanbolničke stečene pneumonije, 5-10 dana kod egzacerbacije hroničnog bronhitisa, 7 dana kod sinusitisa, 14 dana kod pelvične inflamatorne bolesti, 7-21 dan kod komplikovanih infekcija kože i potkožnog tkiva

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CENOMAR - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.

BANJA LUKA

- △ Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 10 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa 5 tableta) u kutiji
- △ Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 7 film tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 7 tableta), u kutiji

- △ ZU rastvor za infuziju [400 mg/250 mL] 1 staklena boca sa 250 ml
rastvora za infuziju, u kutiji

FLAMIX - BOSNALIJEK D.D.

- △ Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 5 film tableta (1 PVC/PVDC/Al blister
sa 5 film tableta) u kutiji

MOKSINE - DEVA HOLDING A.S.

- △ Rp filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 7 filmom obloženih
tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 7 tableta), u kutiji

MOLOXIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- △ Rp filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 7 filmom obloženih
tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister), u kutiji

MOXI - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- △ Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 5 film tableta (1 PVC/PVDC/Alu
blister), u kutiji
△ Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 7 film tableta (1 PVC/PVDC/Alu
blister), u kutiji

MOXIFLOX - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- △ Rp filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih
tableta (2 PVC/PVDC(250/40)-Al blistera sa po 5 tableta), u kutiji
△ Rp filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 5 filmom obloženih
tableta (1 PVC/PVDC(250/40)-Al blister sa 5 tableta), u kutiji

MOXIFLOXACIN VIOSER - VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY

- △ ZU otopina za infuziju [400 mg/250 mL] 10 LDPE boca sa po 250 ml
otopine za infuziju u kartonskoj kutiji

**MOXIFLOXACIN-DARNYTSIA - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"PHARMACEUTICAL FIRM DARNYTSIA"**

- △ ZU rastvor za infuziju [400 mg/250 mL] 1 polipropilen boca sa 250 mL
rastvora za infuziju, u kutiji

MOXIRAL - ALKALOID AD SKOPJE

- △ Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 5 film tableta (1 OPA/Alu/PVC-Alu
blister sa 5 tableta), u kutiji
△ Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 7 film tableta (1 OPA/Alu/PVC-Alu
blister sa 7 tableta), u kutiji

J01X***Ostali antibakterijski lijekovi*****J01XA*****Glikopeptidni antibakterijski lijekovi*****J01XA01*****vankomicin***

Doziranje: komplikovane infekcije kože i mekog tkiva; infekcije kostiju i zglobova; vanbolnička pneumonija; bolnički stečena pneumonija, uključujući pneumoniju povezanu sa mehaničkom ventilacijom; infektivni endokarditis: i.v. odrasli i djeca starija od 12 god. 15-20 mg/kg svakih 8-12 sati (po dozi ne treba da prelazi 2 g); dojenčad i djeca od jednog mjeseca do manje od 12 god. starosti 10-15 mg/kg svakih 6 sati; hirurška profilaksa: 1g u jednoj dozi; infekcije izazvane sa *Clostridium difficile*: oralno, 125 mg svakih 6 sati tokom 10 dana, po potrebi povećati na 500 mg svakih 6 sati, tokom 10 dana, dozu povećati kod životno ugrožavajućih ili refraktornih infekcija

REGISTROVANI LIJEKOVI:**EDICIN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.**

- ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [1000 mg/1 boca] 1
staklena bočica sa 1000 mg praška za koncentrat za rastvor za
infuziju, u kutiji

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

ZU	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [500 mg/1 boca] 1 staklena bočica sa 500 mg praška za koncentrat za rastvor za infuziju, u kutiji
VAMYCIN - PHARMA ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM Sirketi	
ZU	prašak za rastvor za injekciju [500 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za injekciju, u kutiji
ZU	prašak za rastvor za injekciju [1000 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji
VANCOLIXIN - GUFIC BIOSCIENCES LIMITED	
ZU	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [1000 mg/1 bočica] 1 staklena bočica, u kutiji.
VANCOMAX - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM Sirketi	
ZU	prašak za rastvor za infuziju [1000 mg/1 bočica] 1 bočica praška za rastvor za infuziju, u kutiji
ZU	prašak za rastvor za infuziju [500 mg/1 bočica] 1 bočica praška za rastvor za infuziju, u kutiji
VANCOMYCIN MYLAN - MYLAN GERMANY GMBH	
ZU	prašak za rastvor za infuziju [1000 mg/1 bočica] 1 staklena bočica, u kutiji
ZU	prašak za rastvor za infuziju [500 mg/1 bočica] 1 staklena bočica, u kutiji
VANKAR 1000 - SAKAR HEALTHCARE LTD	
ZU	prašak za rastvor za infuziju [1000 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji
VANKAR 500 - SAKAR HEALTHCARE LTD	
ZU	prašak za rastvor za infuziju [500 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji
VANKOMICIN APTAPharma - APTA MEDICA INTERNATIONAL D.O.O.	
ZU	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [1000 mg/1 bočica] 10 bočica od 20 mL, u kutiji
ZU	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [500 mg/1 bočica] 10 bočica od 10 mL, u kutiji

J01XA02 teikoplanin

Doziranje: infekcije izazvane *Clostridium difficile*, komplikovane infekcije kože i mekog tkiva, infekcije kostiju i mekih zglobova, bolnička pneumonija, izvanbolnički stečena pneumonija, komplikovane infekcije mokraćnog sistema, infektivni endokarditis, peritonitis povezan sa kontinuiranom ambulantnom peritoneumskom dijalizom, bakterijemija koja se javi udružena sa bilo kojom od navedenih indikacija: i.v. ili i.m. za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PLANICID - CENTURION ILAC SANAYI VE TIC. A.S.

△ ZU	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [200 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju i 1 ampula sa 3 ml rastvarača (voda za injekcije), u kutiji
△ ZU	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [400 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju i 1 ampula sa 3 ml rastvarača (voda za injekcije), u kutiji

TEIKOPOL - POLIFARMA ILAC SAN VE TIC.A.S.

ZU	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju [200 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa 200 mg praška za rastvor za injekciju/infuziju i 1 ampula sa 3 mL rastvarača (voda za injekcije), u kutiji

- ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju [400 mg/1 bočica]
1 staklena bočica sa 400 mg praška za rastvor za injekciju/infuziju i
1 ampula sa 3 mL rastvarača (voda za injekcije), u kutiji
- TIZOLES - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.**
- △ ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju [200 mg/1 bočica]
1 bočica sa praškom i 1 ampula sa rastvaračem, u kutiji
- △ ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju [400 mg/1 bočica]
1 bočica sa praškom i 1 ampula sa rastvaračem, u kutiji

J01XB**Polimiksini****J01XB01****kolistin**

Doziranje: terapiju ozbiljnih infekcija uzrokovanih gram-negativnim bakterijama kod pacijenata sa ograničenim mogućnostima terapije, hronična plućna infekcija uzrokovana sa *Pseudomonas aeruginosa* kod pacijenata sa cističnom fibrozom: i.v. inf., odrasli 9 miliona i.j./dnevno podijeljeno u 2-3 doze, udarnu dozu od 9 miliona i.j. je potrebno primijeniti pacijentima čije je zdravstveno stanje kritično; udarna doza i doza održavanja od 12 miliona i.j. mogu biti potrebne kod nekih pacijenata, međutim, kliničko iskustvo sa primjenom takvih doza je vrlo ograničeno, te sigurnost nije ustanovljena; inhalaciono, odrasli, adolescenti i djeca 2-17 god. 1-2 miliona i.j. 2-3 puta dnevno, maks. 6 miliona i.j. dnevno; djeca do 2 god, 0,5-1 milion i.j. 2 puta dnevno, maks. 2 miliona i.j.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ALVOBAC - XELLIA PHARMACEUTICALS APS**

- △ ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [1000000 i.j./1 viala] 10
staklenih (tip I) bočica sa praškom za rastvor za injekciju ili infuziju,
u kutiji
- △ ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [2000000 i.j./1 viala] 10
staklenih (tip I) bočica sa praškom za rastvor za injekciju ili infuziju,
u kutiji

COLISTIN ALTAN - ALTAN PHARMACEUTICALS S.A.

- △ ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [1000000 i.j./1 bočica] 10
staklenih bočica, u kutiji

COLISTIN ALTAN - ALTAN PHARMACEUTICALS S.A.

- △ ZU prašak za rastvor za injekciju ili infuziju [2000000 i.j./1 bočica] 10
staklenih bočica, u kutiji

J01XD**Derivati imidazola****J01XD01****metronidazol**

Doziranje: *anaerobne infekcije:* odrasli 400-500 mg na 8h (7 dana ili 10-14 dana u slučaju infekcija izazvanih *Clostridium difficile*); djeca starosti 1-2 mjeseca: 7,5 mg/kg na 12 h; djeca starosti 2 mjeseca-12 god. 7,5 mg/kg (maks. 400 mg) svakih 8 sati; i.v. inf. tokom 20 min. 500 mg svakih 8 h tokom 7 dana (10-14 dana kod infekcija *Clostridium difficile*); *ulceracije na nogama i dekubitisi:* oralno, 400 mg svakih 8 sati, 7 dana; *bakterijske vaginoze:* oralno, 400-500 mg dva puta dnevno, 5-7 dana ili 2 g kao pojedinačna doza; *pelvična inflamatorna bolest:* oralno, 400 mg dva puta dnevno, 14 dana; *akutni ulcerozni gingivitis:* oralno, 200-250 mg na 8 sati, 3 dana; djeca od 1-3 god. 50 mg na 8 sati, 3 dana; djeca od 3-7 god. 100 mg na 12 sati; djeca od 7-10 god. 100 mg na 8 sati, 3-7 dana; *akutne oralne infekcije:* 400 mg na 8 sati, 3-7 dana; djeca 1-3 god. 50 mg na 8 sati, 3-7 dana; djeca 3-7 god. 100 mg na 12 sati; djeca 7-10 god. 100 mg na 8 sati; *operativna profilaksa:* oralno, 400-500 mg 2 sata prije operacije, za visoko rizične procedure mogu biti date 3 dodatne doze od 400-500 mg na svakih 8 sati; *intestinalna i hepatička amebijaza:* odrasli,

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

500 mg 3 puta dnevno, djeca 30-40 mg/kg/dan; *enterokolitis koji uzrokuje Clostridium difficile*: 400 mg 3 puta na dan, 10 dana; *lamblija*: 400 mg metronidazola 2 puta na dan, 5 dana; *eradikacija Helicobacter pylori*: 400 mg 2 puta dnevno 7-14 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EFLORAN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- △ Rp tableta [400 mg/1 tableta] 10 tableta u staklenoj bočici u kutiji
- △ ZU otopina za infuziju [500 mg/100 mL] 100 mL otopine za infuziju u staklenoj bočici u kutiji

METRONIDAZOL FRESENIUS - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

- △ ZU otopina za infuziju [500 mg/100 mL] 10 staklenih bočica po 100 ml otopine za infuziju, u kutiji

METRONIDAZOL VIOSER - VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY

- △ ZU otopina za infuziju [500 mg/100 mL] 10 LDPE boca po 100 mL otopine za infuziju, u kartonskoj kutiji

METRONIDAZOLE-DARNYTSIA - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "PHARMACEUTICAL FIRM DARNYTSIA"

- △ ZU rastvor za infuziju [5 mg/1 mL] 1 polipropilen bočica od 100 ml, u kutiji

ORVAGIL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- △ Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/Alu/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ ZU rastvor za infuziju [500 mg/100 mL] 1 staklena boca sa 100 ml rastvora za infuziju, u kutiji

POLGYL - POLIFARMA ILAC SAN VE TIC.A.S.

- △ ZU rastvor za infuziju [500 mg/100 mL] 1 polipropilenska vrećica sa 100 ml rastvora za infuziju, posebno upakovana u zatvorenu, prozirnu, zaštitnu vanjsku LHDPE plastičnu vrećicu ("twinbag")

J01XE Derivati nitrofurana

J01XE01 nitrofurantoin

Doziranje: *akutne nekomplikovane infekcije urinarnog trakta*: 50 mg svakih 6 sati, sa hranom, tokom 7 dana; *teške hronične rekurentne infekcije*: 100 mg četiri puta dnevno 7 dana; *dugotrajna supresivna terapija*: 50-100 mg jednom dnevno; *profilaksa infekcija mokraćnog sistema po kateterizaciji ili hirurškom zahvatu*: 4 puta po 50 mg/dan zahvata, te sljedeća 3 dana; dojenčad i djeca starija od 3 mjeseca - *akutne nekomplikovane infekcije mokraćnog sistema*: 3 mg/kg/dan podijeljeno u 4 pojedinačne doze kroz 7 dana; *supresivna terapija*: 1 mg/kg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FUNITRAL - WAVE PHARMA LIMITED

- Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC /Al blistera po 10 kapsula), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC /Al blistera po 10 kapsula), u kutiji
- Rp oralna suspenzija [25 mg/5 mL] 1 bočica, staklena, 300 mL sa oralnim graduisanim špricom do 5 mL, u kutiji
- Rp oralna suspenzija [50 mg/5 mL] 1 bočica, staklena, 300 mL sa oralnim graduisanim špricom od 5 mL, u kutiji

NIFURAN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

J01XX**Ostali antibakterijski lijekovi****J01XX01****fosfomicin**

Doziranje: akutne nekomplikovane infekcija donjih mokraćnih kanala; odrasli i adolescenti 12-18 god, oralno, granule za oralni rastvor, 1 doza od 3 g fosfomicina; profilaksa pri transuretralnim hirurškim i dijagnostičkim zahvatima: oralno, granule za oralni rastvor, prva doza 3 sata prije operacije (ili dijagnostičke procedure), a druga doza 24 sata poslije operacije (ili dijagnostičke procedure); uzima se na prazan želudac (1 sat prije ili 2 do 3 sata poslije obroka), a najbolje naveče pred odlazak na spavanje, nakon pražnjenja mokraćne bešike; infekcije kostiju i zglobova, pneumonija dobijena u bolnici uključujući pneumoniju povezanu sa respiratorom, komplikovane infekcije kože i mekog tkiva, komplikovane intraabdominalne infekcije, infektivni endokarditis, komplikovane infekcije urinarnog trakta, bakterijemija koja se javlja u vezi sa, ili se sumnja da je povezana sa bilo kojom od gore navedenih infekcija: i.v.inf. 12-24 g u 2-3 podijeljene doze; bakterijski meningitis: i.v.inf. 16-24 g u 3-4 podijeljene doze; pojedinačne doze ne smiju biti veće od 8 g;

REGISTROVANI LIJEKOVI:**FOMICYT - INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH**

- ZU prašak za rastvor za infuziju [40 mg/1 mL] 10 bočica od 30 ml sa 2,69 g praška za rastvor za infuziju, u kutiji
- ZU prašak za rastvor za infuziju [40 mg/1 mL] 10 bočica od 30 ml sa 5,38 g praška za rastvor za infuziju, u kutiji
- ZU prašak za rastvor za infuziju [40 mg/1 mL] 10 bočica od 50 ml sa 10,76 g praška za rastvor za infuziju, u kutiji

FOSTRON - LABIANA PHARMACEUTICALS S.L.U.

- Rp granule za oralni rastvor [3 g/1 kesica] 1 četveroslojna kesica (surlin/polietilen/aluminijum/papir) sa 8 g granula za oralni rastvor, u kutiji

MONURAL - ZAMBON S.P.A.

- Rp granule za oralni rastvor [3 g/1 kesica] 1 četveroslojna kesica (papir/PE/Al/PE) sa 8 g granula, u kutiji

J01XX08**linezolid**

Doziranje: liječenje infekcija izazvanih osjetljivim Gram-pozitivnim bakterijama, poslije urađenog antibiograma (bolnička i vanbolnička pneumonija, komplikovane infekcije kože i mekih tkiva): oralno, 600 mg na 12 sati 10-14 uzastopnih dana (maks. trajanje terapije je 28 dana); ne preporučuje se djeci ispod 18 god; i.v. inf. tokom 30-120 min. 600 mg svakih 12 sati, ne preporučuje se djeci ispod 18 god.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ANTIZOLID - COOPER S.A.**

- ZU rastvor za infuziju [2 mg/1 mL] 1 plastična boca od 300 mL rastvora za infuziju, u kutiji

LINEDOR - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

- ZU rastvor za infuziju [600 mg/300 mL] 1 staklena bočica sa 300 ml rastvora za infuziju, u kutiji

LINEZAN - ANFARM HELLAS S.A.

- ZU rastvor za infuziju [2 mg/1 mL] 10 infuzionih kesica sa po 300 ml rastvora za infuziju

ZENIX - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- ZU rastvor za infuziju [2 mg/1 mL] 1 staklena boca sa 300 ml rastvora za infuziju, u kutiji

J02	ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
J02A	Antimikotici za sistemsku primjenu
J02AA	Antibiotici

J02AA01	amfotericin B

Doziranje: teška invazivna kandidijaza, teške sistemske gljivične infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na amfotericin B gdje toksičnost ili oštećenje bubrega onemogućava primjenu konvencionalnog amfotericina B, uključujući invazivnu aspergilozu, kriptokokni meningitis i diseminovanu kriptokokozu kod HIV pozitivnih pacijenata: i.v.inf. test doza - dati tokom prvih 15 min. 1 mg rastvora za infuziju i promatrati pacijenta tokom 30 minuta, ukoliko nema znakova preosjetljivosti, nastaviti davati, odrasli i.v.inf. 5 mg/kg, brzinom od 2,5 mg/kg/sat u trajanju najmanje 14 dana; viscelarna lajšmanijaza: ukupna doza 21-30 mg/kg tokom 10-21 dana; empirijsko liječenje febrilne neutropenije: 3 mg/kg dnevno, liječenje treba trajati dok se zabilježena temperatura ne normalizuje tokom 3 uzastopna dana, liječenje treba prekinuti nakon najviše 42 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ABELCET LIPID COMPLEX - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

ZU	koncentrat za suspenziju za infuziju [5 mg/1 mL] 1 bočica sa 20 ml koncentrata za suspenziju za infuziju i jednokratna igla za filtriranje, u kutiji

AMPHOTERICIN B BHARAT - BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD.

ZU	prašak za rastvor za infuziju [50 mg/1 bočica] 1 staklena bočica od 20 ml sa praškom i sterilnim filterom za špricu od 5 mikrona, u kutiji

J02AC	Derivati triazola

J02AC01	flukonazol

Doziranje: *balanitis izazvan kandidom*: oralno, djeca 16-17 god. i odrasli, 150 mg u jednoj dozi; *vaginalna kandidazija*: oralno 150 mg kao pojedinačna doza; *vulvovaginalna kandidazija* (rekurentna): oralno, odrasli početna doza 150 mg svakih 72 sata za 3 doze, zatim 150 mg jednom nedjeljno tokom 6 mjeseci; *gljivične infekcije kože kao što je tinea corporis/tinea cruris/tinea pedis (uzrokovane dermatofitima), tinea versicolor ili dermalna kandidazija*: oralno 50 mg jednom dnevno tokom 2-6 sedmica; *mukozna kandidijaza (osim genitalne)*: oralno 50 mg dnevno tokom 7 do 14 dana kod orofaringealne kandidijaze (maks. 14 dana osim kod izuzetno imunokompromitovanih pacijenata; tokom 14 dana kod atrofične oralne kandidijaze povezane sa zubnim protezama; tokom 14-30 dana kod drugih mukoznih infekcija (npr. ezofagitis, kandidurija, neinvazivne bronhopulmonalne infekcije); povećati na 100 mg dnevno, samo u slučaju neuobičajeno teških infekcija); djeca 1 mjesec-11 god: oralno ili i.v. infuz. 3-6 mg/kg prvi dan, onda 3 mg/kg dnevno (maks. 100 mg po dozi) tokom 7-14 dana kod orofaringealne kandidijaze (maks. 14 dana osim kod izuzetno imunokompromitovanih osoba); tokom 14-30 dana kod drugih mukoznih infekcija (npr. ezofagitis, kandidurija, neinvazivne bronhopulmonalne infekcije); djeca 12-17 god. oralno 50 mg dnevno tokom 7 do 14 dana kod orofaringealne kandidijaze (maks. 14 dana osim kod izuzetno imunokompromitovanih pacijenata; tokom 14-30 dana kod drugih mukoznih infekcija (npr. ezofagitis, kandidurija, neinvazivne bronhopulmonalne infekcije); povećati na 100 mg dnevno, samo u slučaju neuobičajeno teških infekcija); *invazivne kandidijaze i kriptokokne infekcije (uključujući meningitis)*, oralno ili i.v.inf. odrasli 400 mg prvi dan, onda 200-400 mg dnevno, maks. 800 mg dnevno kod teških infekcija, terapiju nastaviti u zavisnosti od odgovora (najmanje 8 nedjelja kod kriptokoknog meningitisa), maks.dozu upotrebljavati kod teških infekcija; djeca: 6-12

mg/kg/dan (svaka 72 sata kod novorođenčadi do 2 nedjelje starosti, svakih 48 sati kod novorođenčadi 2-4 nedjelje starosti), maks. 800 mg dnevno; *prevencija relapsa kriptokokalnog meningitisa kod pacijenata inficiranih HIV-om*; oralno ili i.v. inf. 200 mg dnevno; *prevencija gljivičnih infekcija kod imunokompromitovanih pacijenata* (kod pacijenata sa visokim rizikom od sistemskih infekcija, npr. nakon transplantacije hematopoetskih matičnih ćelija); oralno ili i.v. 50-400 mg dnevno; djeca: u zavisnosti od dužine trajanja i obima neutropenije, 3-12 mg/kg/dan (svaka 72 sata kod novorođenčadi do 2 nedjelje starosti, svakih 48 sati kod novorođenčadi od 2-4 nedjelje), maks. po dozi 400 mg.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DIFLUCAN - PFIZER LUXEMBOURG SARL

- Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 7 kapsula, tvrdih (1 PVC/Al blister), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 1 kapsula, tvrda (1 PVC/Al blister), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 7 kapsula, tvrdih (1 PVC/Al blister), u kutiji

FLUCONAL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 1 kapsula, tvrda (1 PVC/PVdC/Al blister sa 1 kapsulom, tvrdom) u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 7 kapsula, tvrdih (1 PVC/PVdC/Al blister sa 7 kapsula, tvrdih), u kutiji
- ZU rastvor za infuziju [2 mg/1 mL] 1 boca sa 100 ml rastvora za infuziju, u kutiji

FLUCONAZOLE-DARNYTSIA - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "PHARMACEUTICAL FIRM DARNYTSIA"

- ZU rastvor za infuziju [2 mg/1 mL] 1 polipropilen bočica sa 100 ml rastvora za infuziju, u kutiji

FUNZOL - BOSNALIJEK D.D.

- Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 7 kapsula, tvrdih (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 1 kapsula, tvrda (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 7 kapsula, tvrdih (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji

J02AC02

itrakonazol

Doziranje: *vulvovaginalna kandidijaza*: 200 mg dva puta dnevno jedan dan; *Pityriasis versicolor*: 200 mg jednom dnevno tokom 7 dana; *Tinea corporis and tinea cruris*, ili 100 mg jednom dnevno tokom 15 dana ili 200 mg jednom dnevno tokom 7 dana; *Tinea pedis i tinea manuum*, ili 100 mg jednom dnevno tokom 30 dana ili 200 mg dva puta dnevno tokom 7 dana; *orofaringealna kandidijaza*: 100 mg jednom dnevno tokom 15 dana (zbog lošije resorpcije kod pacijenata sa AIDS-om ili kod pacijenata sa neutropenijom, potrebno je povećati dozu na 200 mg jednom dnevno tokom 15 dana); *onihomikoza*: ili 200 mg jednom dnevno tokom 3 mjeseca ili kurs od 200 mg dva puta dnevno tokom 7 dana, sljedeći kurs ponoviti nakon 21-dnevnih intervala; nokat prsta na ruci zahtijeva 2 kursa, a nokat prsta na nozi 3 kursa; *aspergiloza*: 200 mg dva puta dnevno (povećati dozu na 200 mg dva puta dnevno kod pacijenata koji imaju invazivnu ili diseminovanu bolest); *histoplazmoza*: 200 mg 3 puta dnevno tokom 3 dana, zatim 200 mg jednom ili dva puta dnevno; *sistemska kandidijaza i kriptokokoza uključujući kriptokokni meningitis* gdje su drugi antimikotici neodgovarajući ili neefikasni, 200 mg jednom dnevno (kandidijaza 100-

200 mg jednom dnevno) povećati kod invazivnog ili raširenog oboljenja i kriptokoknog meningitisa na 200 mg dva puta dnevno; doza održavanja kod pacijenata sa HIV-infekcijom za prevenciju relapse postojeće gljivične infekcije i profilaksa kod neutropenije kada je standardna terapija neodgovarajuća, 200 mg jednom dnevno, povećati na 200 mg dva puta dnevno ukoliko je plazma-koncentracija itraconazola niska

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KANAZOL - SLAVIAMED D.O.O. BEOGRAD

Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 10 kapsula, tvrdih (2 PVC/PE/PVDC -aluminijumski blister sa po 5 kapsula) u kutiji

J02AC03

vorikonazol

Doziranje: liječenje invazivne aspergiloze, liječenje kandidemije kod pacijenata bez neutropenije, liječenje teške invazivne infekcije flukonazol-rezistentnom kandidom (uključujući *C. krusei*), liječenje teške gljivične infekcije uzrokovane *Scedosporium* spp. i *Fusarium* spp., namijenjen je bolesnicima sa progredirajućim, moguće i po život opasnim infekcijama, profilaksa invazivnih gljivičnih infekcija kod primalaca alogernih transplantiranih hematopoetskih matičnih ćelija (HSCT) izloženih visokom riziku; odrasli: i.v., udarna doza (prva 24 sata) 6 mg/kg na 12 sati, doza održavanja (nakon prva 24 sata) 4 mg/kg dva puta dnevno; oralno, bolesnici sa 40 kg i više: udarna doza (prva 24 sata) 400 mg na 12 sati, doza održavanja (nakon prva 24 sata) 200 mg dva puta dnevno; oralno, bolesnici sa manje od 40 kg: udarna doza (prva 24 sata), 200 mg na 12 sati, doza održavanja (nakon prva 24 sata), 100 mg dva puta dnevno; djeca (2-12 god.) i mlađi adolescenti male tjelesne mase (12-15 god. i tjelesne mase manje od 50 kg): i.v. udarna doza (prva 24 sata), 9 mg/kg svakih 12 sati, oralno, doza održavanja (nakon prva 24 sata): 8 mg/kg dva puta dnevno, oralno: 9 mg/kg dva puta dnevno (maks. doza je 350 mg dva puta dnevno); djeca 12-15 god. tjelesne mase preko 50 kg doze kao za djecu 15-18 god. i tjelesne mase preko 40 kg; djeca 15-18 god. i tjelesne mase ispod 40 kg, oralno 200 mg svakih 12 sati za dvije doze zatim 100 mg svakih 12 sati, povećati ukoliko je neophodno na 150 mg svakih 12 sati; djeca 15-18 god. i tjelesne mase preko 40 kg, oralno 400 mg svakih 12 sati za dvije doze, zatim 200 mg svakih 12 sati, povećati ukoliko je neophodno na 300 mg svakih 12 sati; djeca 15-18 god. i.v.inf. 6 mg/kg svakih 12 sati za dvije doze, zatim 4 mg/kg svakih 12 sati (ukoliko se ova doza ne podnosi, smanjiti na 3 mg/kg svakih 12 sati) tokom maks. 6 mjeseci

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VFEND - PFIZER INC.

Rp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 Al/PVC/PVDC blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 Al/PVC/PVDC blistera po 7 tableta), u kutiji

VORAMOL - PHARMATHEN S.A.

ZU prašak za rastvor za infuziju [200 mg/1 bočica] jedna bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

VORAZYR - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

ZU prašak za rastvor za infuziju [200 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

J02AC04

posakonazol

Doziranje: invazivne aspergiloze: oralno, udarna doza 300 mg dva puta dnevno prvog dana, zatim 300 mg jednom dnevno tokom 6-12 nedjelja, preći sa i.v. na oralni put primjene kada je moguće; refraktorne invazivne aspergiloze/pacijenti s invazivnim gljivičnim infekcijama koji ne podnose itraconazol ili amfotericin B; fuzarioze kod pacijenata koji ne reaguju na liječenje amfotericinom B ili kod pacijenat koji ne podnose amfotericin B; hromblastomikoze i micetoma kod pacijenata koji ne reaguju na liječenje itraconazolom

ili kod pacijenata koji ne podnose itraconazol; kokcidioidomikoze kod pacijenata koji ne reaguju na liječenje amfotericinom B, itraconazolom ili flukonazolom ili kod pacijenata koji ne podnose ove lijekove: oralno, udarna doza 300 mg dva puta dnevno prvog dana, zatim 300 mg jenom dnevno, preči sa i.v. na oralni put primjene kada je moguće; profilaksa invazivnih gljivičnih infekcija kod pacijenata sa visokim rizikom koji se podvrgavaju imunosupresivnoj terapiji visokim dozama za transplantaciju hematopoetskih matičnih ćelija ili primaju hemoterapiju za akutnu mijeloidnu leukemiju ili mijelodisplastični sindrom i kod kojih se očekuje razvoj produžene neutropenije: oralno, udarna doza 300 mg dva puta dnevno prvog dana, zatim 300 mg jenom dnevno, za pacijente na hemoterapiji, početi nekoliko dana prije očekivanog početka neutropenije i nastaviti 7 dana nakon što broj neutrofila poraste iznad 500 ćelija/mm³, preči sa i.v. na oralni put primjene kada je moguće

REGISTROVANI LIJEKOVI:

POSAGIL - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp želučanootporna tableta [100 mg/1 tableta] 24 želučanootporne tablete (2 PVC/PE/PVdC-Al blistera sa 12 tableta), u kutiji

POSAKONAZOL MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED

ZU/Rp gastrozestentna tableta [100 mg/1 tableta] 24 gastrozestentne tablete (1 perforirani PVC/PE/PVdC-Alu blister sa 24 tablete), u kutiji.

ZU/Rp gastrozestentna tableta [100 mg/1 tableta] 24 gastrozestentne tablete (2 PVC/PE/PVdC-Alu blistera sa po 12 tableta), u kutiji.

ZU/Rp gastrozestentna tableta [100 mg/1 tableta] 96 gastrozestentnih tableta (1 perforirani PVC/PE/PVdC-Alu blister sa 96 tableta), u kutiji.

ZU/Rp gastrozestentna tableta [100 mg/1 tableta] 96 gastrozestentnih tableta (8 PVC/PE/PVdC-Alu blistera sa po 12 tableta), u kutiji.

J02AC05 izavukonazol

Doziranje: invazivne aspergiloze; mukormikoze kod pacijenata koji ne mogu uzimati amfotericin-B: oralno, i.v. inf. 200 mg svakih 8 sati tokom prvih 48 sati (6 primjena ukupno); zatim doza održavanja 200 mg jednom dnevno, počevši od 12 do 24 sata nakon posljednje početne doze; za liječenje koje traje duže od 6 mjeseci, potrebno je pažljivo razmotriti odnos koristi i rizika

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CRESEMBA - PFIZER INC.

ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [200 mg/1 bočica] 1 staklena bočica, u kutiji

ZU/Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 14 kapsula, tvrdih (2 Al blistera sa 7 kapsula), u kutiji

J02AX Ostali antimikotici za sistemsku primjenu

J02AX04 kaspofungin

Doziranje: invazivna kandidijaza, invazivna aspergiloza, empirijsko liječenje za pretpostavljene gljivične infekcije kod pacijenata sa neutropenijom: i.v. inf. odrasli, prvog dana jednokratna udarna doza od 70 mg, a zatim nastaviti sa dozom od 50 mg na dan (kod bolesnika tjelesne mase preko 80 kg, 70 mg jednom dnevno; pedijatrijski bolesnici (starosti od 12 mjeseci do 17 godina), za sve indikacije, prvog dana potrebno je dati jednokratnu udarnu dozu od 70 mg/m² (ne smije biti veća od 70 mg), a nakon toga terapija se nastavlja dozom od 50 mg/m² na dan (ne smije biti veća od 70 mg na dan); djeca 3

mjeseca-1 god. 50 mg/m² jednom dnevno; djeca 1 mjesec-3 mjeseca 25 mg/m² jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CASPOFUNGIN ANFARM - ANFARM HELLAS S.A.

- ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [50 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa 50mg praška za koncentrat za rastvor za infuziju, u kutiji
- ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [70 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa 70 mg praška za koncentrat za rastvor za infuziju, u kutiji

J05 ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

J05A Lijekovi sa direktnim djelovanjem na viruse
J05AB Nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze

J05AB01 aciklovir

Doziranje: *oralno, ne-genitalni herpes simplex*, terapija, 200 mg (400 mg kod imunokompromitovanih ili ako je apsorpcija oštećena) 5 puta dnevno, uobičajeno tokom 5 dana (ukoliko se nove lezije pojavljuju tokom terapije ili ukoliko je izlječenje nekompletno terapija duže traje); *djeca 1 mjesec-2 god. pola doze za odrasle, preko 2 god. doza za odrasle; genitalni herpes simplex*, terapija *prve epizode*, 200 mg 5 puta dnevno ili 400 mg 3 puta dnevno obično tokom 5 dana, ukoliko se nove lezije pojavljuju tokom terapije ili ukoliko je izlječenje nekompletno terapija duže traje (400 mg 5 puta dnevno tokom 7-10 dana kod imunokompromitovanih ili HIV-pozitivnih pacijenata); terapija *rekurentne infekcije*, 800 mg 3 puta dnevno tokom 2 dana ili 200 mg 5 puta dnevno tokom 5 dana ili 400 mg 3 puta dnevno tokom 3-5 dana (400 mg 3 puta dnevno tokom 5-10 dana kod imunokompromitovanih ili HIV-pozitivnih pacijenata); *herpes simplex, supresija*, 400 mg 2 puta dnevno ili 200 mg 4 puta dnevno; povećati na 400 mg 3 puta dnevno ukoliko dolazi do ponovnog javljanja kod standardne supresivne terapije ili kod supresije genitalnog herpesa tokom kasne trudnoće (od 36. nedjelje trudnoće); terapiju prekinuti svakih 6-12 mjeseci da se preispita frekvencija ponovnog javljanja - razmotriti ponovno otpočinjanje nakon dva ili više ponovnih javljanja; *herpes simplex, profilaksa kod imunokompromitovanih*, 200-400 mg 4 puta dnevno; *djeca 1 mjesec-2 god. pola doze za odrasle, preko 2 god. doza za odrasle; varicella i herpes zoster, terapija* 800 mg 5 puta dnevno tokom 7 dana (kod herpes zostera kod imunokompromitovanih terapiju nastaviti još 2 dana nakon pretvaranja lezija u krase); *djeca 1 mjesec-2 god. 200 mg 4 puta dnevno tokom 5 dana (kod herpes zostera kod imunokompromitovanih terapiju nastaviti još 2 dana nakon pretvaranja lezija u krase); djeca 2-6 god. 400 mg 4 puta dnevno tokom 5 dana (kod herpes zostera kod imunokompromitovanih nastaviti još 2 dana nakon pretvaranja lezija u krase); djeca 6-12 god. 800 mg 4 puta dnevno tokom 5 dana (kod herpes zostera kod imunokompromitovanih nastaviti još 2 dana nakon pretvaranja lezija u krase); i.v.inf. terapija herpes simplex*a kod imunokompromitovanih, teški genitalni herpes u početnoj fazi kod neimunokompromitovanih, 5 mg/kg svakih 8 sati obično tokom 5 dana, udvostručiti na 10 mg/kg svakih 8 sati ukoliko se očekuju rezistentni organizmi ili kod *simplex encephalitis* (daje se najmanje 14 dana kod encefalitisa (najmanje 21 dan ukoliko se radi o imunokompromitovanim pacijentima) - potvrditi da je cerebrospinalna tečnost negativna na herpes simplex virus prije prekida terapije); *terapija varicella-zoster, herpes zoster*: 5 mg/kg svakih 8 sati obično tokom 5 dana, udvostručiti na 10 mg/kg svakih 8 sati kod imunokompromitovanih ili kod

encefalitisa (daje se 10-14 dana kod encefalitisa, pogotovo ukoliko se radi o imunokompromitovanim pacijentima ili o teškim infekcijama); *profilaksa herpes simplex* kod imunokompromitovanih, 5 mg/kg svakih 8 sati

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ACICLOVIR ALTAN - ALTAN PHARMACEUTICALS S.A.

ZU prašak za rastvor za infuziju [250 mg/1 bočica] 50 staklenih bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

ASIRAX - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ

ZU liofilizat za rastvor za infuziju [250 mg/1 bočica] 1 bezbojna bočica od 15 ml (staklo tip I) sa liofilizacijskim čepom i plavim flip off zatvaračem, u kutiji,

HERNOVIR - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.Ş.

Rp tableta [200 mg/1 tableta] 25 tableta (5 prozirnih PVC/Al - blistera), u kutiji

Rp tableta [400 mg/1 tableta] 25 tableta (5 prozirnih PVC/Al - blistera po 5 tableta), u kutiji

HERPLEX - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 35 filmom obloženih tableta (5 PVC/Al blistera po 7 tableta) u kutiji

SAKLOVIR - SAKAR HEALTHCARE LTD

ZU prašak za rastvor za infuziju [250 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

J05AE

Inhibitori proteaza

J05AE30

nirmatrelvir, ritonavir

Doziranje: korona virusna bolest 2019 (COVID-19) kod odraslih pacijenata koji ne zahtijevaju kiseoničku potporu i koji su pod visokim rizikom za progresiju u težak oblik bolesti COVID-19: 300 mg nirmatrelvira (dvije tablete od 150 mg) sa 100 mg ritonavira (jedna tableta od 100 mg) dva puta dnevno tokom 5 dana, sa terapijom početi što prije nakon postavljanja dijagnoze bolesti COVID-19 a u roku od 5 dana od pojave simptoma bolesti; u svakoj dozi nirmatrelvir i ritonavir se uzimaju zajedno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PAXLOVID - PFIZER INC.

Rp filmom obložena tableta [150 mg/1 tableta+ 100 mg/1 tableta] 5 OPA/Al/PVC blistera po 6 filmom obloženih tableta (4 ružičaste tablete nirmatrelvira i 2 bijele tablete ritonavira), 30 filmom obloženih tableta

J05AF

Nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze

J05AF05

lamivudin

Doziranje: liječenje hroničnog hepatitisa B kod pacijenata s kompenzovanom bolešću jetre i dokazanom aktivnom replikacijom virusa, trajno povišenim nivoom alanin aminotransferaze (ALT) u serumu i histološki dokazanom aktivnom upalom jetre i/ili fibrozom kada terapija prve linije ne može biti upotrijebljena i dekompenzovanom bolešću jetre u kombinaciji s drugim lijekom bez ukrštene rezistencije na lamivudin: odrasli, 100 mg jednom dnevno;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MIVUX - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 blistera Al/Al sa po 14 tableta), u kutiji

ZEFFIX - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 blistera od Al - dvoslojne folije po 14 tableta), u kutiji

J05AF07 tenofovir disoprosil

Doziranje: liječenje HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lijekovima; hronična hepatitis B infekcija sa kompenzovanom bolešću jetre (sa dokazima o virusnoj replikaciji i histološki dokumentovanim aktivnim zapaljenjem jetre ili fibrozom) ili dekompenzovanom bolešću jetre: odrasli, 245 mg jednom dnevno; djeca 12-18 god. tjelesne mase preko 35 kg 245 mg jednom dnevno; ako se sa dozom kasni više od 12 sati, propuštenu dozu ne treba uzimati i sljedeću dozu treba uzeti u normalno vrijeme

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HIVERAC - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp film tableta [245 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

TENOFOVIR REMEDICA - REMEDICA LIMITED

Rp film tableta [245 mg/1 tableta] 30 film tableta, u kutiji

TENOVIRAL - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp film tableta [245 mg/1 tableta] 30 film tableta u HDPE boci, u kutiji

J05AF10 entekavir

Doziranje: liječenje hronične infekcije virusom hepatitisa B sa kompenzovanom bolesti jetre (i potvrđenom aktivnom replikacijom virusa, i histološki dokazanim aktivnim zapaljenjem ili fibrozom) kod pacijenata koji prethodno nisu liječeni analogima nukleozida: odrasli preko 18 god. 0,5 mg jednom dnevno s hranom ili bez nje; liječenje hronične infekcije virusom hepatitisa B sa kompenzovanom bolesti jetre (i potvrđenom aktivnom replikacijom virusa, i histološki dokazanim aktivnim zapaljenjem ili fibrozom) kod pacijenata sa bolešću refraktarnom na liječenje lamivudinom: odrasli preko 18 god. 1 mg jednom dnevno na prazan želudac; ukoliko nije postignut odgovor unutar 6 mjeseci, razmotriti druge terapijske opcije; liječenje hronične infekcije virusom hepatitisa B kod pacijenata sa dekompenzovanom bolesti jetre: odrasli preko 18 god. 1 mg jednom dnevno na prazan želudac

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ENTEVIEM - REMEDICA LIMITED

Rp film tableta [1 mg/1 tableta] 30 film tableta

FORTEVIR - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp film tableta [0,5 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 Al/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp film tableta [1 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 Al/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

VIRENTE - NOBEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp film tableta [0,5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [1 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

J05AG Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze

J05AG06 doravirin

Doziranje: HIV-1 infekcija u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lijekovima: oralno, odrasli 100 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**PIFELTRO - MERCK SHARP & DOHME BV**

Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 1 bočica sa 30 tableta, u kutiji

J05AJ Inhibitori integraze**J05AJ01 *raltegravir***

Doziranje: *HIV-1 infekcija:* oralno, odrasli 400 mg dva puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ISENTRESS - MERCK SHARP & DOHME BV**

Rp filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (PE - bočica sa polipropilenskim zatvaračem sa zaštitnim mehanizmom za djecu), u kutiji

J05AJ03 *dolutegravir*

Doziranje: HIV infekcija bez rezistencije na druge inhibitore HIV integraze u kombinaciji sa drugim antiretroviralnim lijekovima: oralno, odrasli 50 mg jednom dnevno; HIV infekcija kod pacijenata gdje se očekuje rezistencija na druge inhibitore HIV integraze u kombinaciji sa drugim antiretroviralnim lijekovima: oralno, odrasli 50 mg dva puta dnevno sa hranom; HIV infekcija u kombinaciji sa drugim antiretroviralnim lijekovima (istovremeno sa efavirenzom, nevirapinom, tipranavirom/ritonavinom ili rifampicinom): oralno, odrasli 50 mg dva puta dnevno, izbjegavati istovremenu upotrebu sa ovim lijekovima ukoliko se očekuje rezistencija na druge inhibitore HIV integraze

REGISTROVANI LIJEKOVI:**TIVICAY - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED**

Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 1 HDPE bočica sa 30 filmom obloženih tableta, u kutiji

J05AP Antivirusni lijekovi za liječenje HCV infekcija**J05AP55 *sofosbuvir, velpatasvir***

Doziranje: *infekcija virusom hroničnog hepatitisa C, sa ili bez ribavirina:* oralno, pacijenti starosti 12 godina i više ili pacijenti težine najmanje 30 kg, 400/100 mg jednom dnevno tokom 12 nedjelja (u određenim okolnostima terapija može trajati 24 nedjelje - konsultovati literaturu proizvođača)

REGISTROVANI LIJEKOVI:**EPCLUSA - GILEAD SCIENCES IRELAND UC**

Rp film tableta [400 mg/1 tableta+ 100 mg/1 tableta] 1 HDPE bočica sa 28 film tableta, u kutiji

J05AP57 *glekaprevir, pibrentasvir*

Doziranje: *hronični hepatitis C:* oralno, 300 mg/120 mg jedanput na dan; za dužinu trajanja terapije, konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:**MAVIRET - ABBVIE INC.**

ZU/Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta+ 40 mg/1 tableta] 84 filmom obložene tablete (4 kutije x 21 tableta u 7 PVC/PE/PCTFE- Al blistera po 3 tablete), u vanjskoj zbirnoj kutiji

J05AR Antivirusni lijekovi za liječenje HIV infekcija, kombinacije

J05AR01 lamivudin, zidovudin

Doziranje: HIV infekcije u kombinaciji s drugim antiretrovirusnim lijekovima: odrasli i djeca težine najmanje 30 kg, jedna tableta dva puta dnevno; djeca težine 21-30 kg, pola tablete ujutro i jedna tableta uveče; djeca težine 14-21 kg, pola tablete dva puta dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

COMBIVIR - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

Rp filmom obložena tableta [150 mg/1 tableta+ 300 mg/1 tableta] 60
filmom obloženih tableta (6 neprozirnih PVC/Al blistera po 10
tableta), u kutiji

J05AR02 abakavir, lamivudin

Doziranje: HIV infekcija u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lijekovima: odrasli tjelesne mase preko 25 kg, jedna tableta jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KIVEXA - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

Rp filmom obložena tableta [600 mg/1 tableta+ 300 mg/1 tableta] 30
filmom obloženih tableta (3 neprozirna bijela PVC/PVDC-Alu/papir
blistera(sigurnosni blister za djecu) sa po 10 tableta), u kutiji

J05AR03 emtricitabin, tenofovir disoprosil

Doziranje: HIV infekcije, predekspozicijska profilaksa: odrasli preko 18 god. i djeca u dobi 12-18 god. koji imaju najmanje 35 kg, 1 tbl. jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EXATRON - REMEDICA LIMITED

Rp film tableta [200 mg/1 tableta+ 245 mg/1 tableta] 30 film tableta
(HDPE boca sa bezbjednim zatvaranjem za djecu) u kutiji

TRUVADA - GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Rp film tableta [200 mg/1 tableta+ 245 mg/1 tableta] Bočica od
polietilena visoke gustine (HDPE) sa polipropilenskim sigurnosnim
zatvaračem za djecu koja sadrži 30 film tableta i silika-gel za
upijanje vlage, u kutiji

J05AR08 emtricitabin, rilvipirin, tenofovir disoprosil

Doziranje: HIV infekcija kod pacijenata sa plazma koncentracijom HIV-1 RNA manjom od 100 000 kopija/ml: odrasli preko 18 god. 1 tbl. jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EVIPLERA - GILEAD SCIENCES IRELAND UC

Rp film tableta [200 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 245 mg/1 tableta]
30 film tableta (1 HDPE bočica sa 30 film tableta), u kutiji

J05AR13 abakavir, dolutegravir, lamivudin

Doziranje: HIV infekcija: oralno, odrasli i djeca tjelesne težine najmanje 25 kg, 1 tableta jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TRIUMEQ - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

Rp filmom obložena tableta [600 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta+ 300
mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta u HDPE bočici, u kutiji

J05AR24 doravirin, lamivudin, tenofovir disoproksil**Doziranje:** HIV-1 infekcija: oralno, odrasli, jednu tabletu jednom dnevno**REGISTROVANI LIJEKOVI:****DELSTRIGO - MERCK SHARP & DOHME BV,**

Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta+ 300 mg/1 tableta+ 245 mg/1 tableta] 1 bočica sa 30 filmom obloženih tableta, u kutiji

J05AR25 dolutegravir, lamivudin**Doziranje:** HIV 1 infekcije: oralno, odrasli i djeca starija od 12 god. (tjelesne težine 40 kg i više), 300/50 mg jedanput dnevno**REGISTROVANI LIJEKOVI:****DOVATO - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED**

Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta+ 300 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta u HDPE bočici, u kutiji

J05AX Ostali antivirusni lijekovi**J05AX05 inozin acedoben dimepranol****Doziranje:** disfunkcija imuniteta i klinički simptomi povezani sa: gripa /virusne respiratorne infekcije, herpes simplex infekcije, herpes-zoster infekcije, aftozni stomatitis, infekcije papiloma virusom, virusni hepatitis, infekcije virusom Epstein-Barr, infekcije citomegalovirusom, subkutani sklerozni panencefalitis, rubeola i varicela, morbili, parotitis; odrasli i starije osobe 50 mg/kg tjelesne težine, obično 3 g na dan do najviše 4 g na dan; djeca starija od 1 godine 50 mg/kg podijeljeno u 3-4 jednake doze tokom dana; trajanje liječenja: akutne bolesti 5-14 dana, virusne bolesti dužeg razvoja 1-2 sedmice nakon popuštanja simptoma, za ponavljajuće bolesti i hronične bolesti konsultovati literaturu proizvođača**REGISTROVANI LIJEKOVI:****ISOPRINOSINE - LUSOMEDICAMENTA-SOCIEDADE TECNICA FARMACEUTICA S.A.**

Rp prašak za oralni rastvor [1000 mg/1 kesica] 24 kesice sa praškom za oralni rastvor, u kutiji

Rp sirup [50 mg/1 mL] 150 ml sirupa u staklenoj boci i kašika za doziranje, u kutiji

Rp tableta [500 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/PVdC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

J05AX10 maribavir**Doziranje:** citomegalovirusna bolest (kod pacijenata koji su bili podvrgnuti transplantaciji hematopoetskih matičnih ćelija ili transplantaciji čvrstih organa): oralno, odrasli, 400 mg dva puta dnevno tokom 8 nedjelja, po potrebi podesiti trajanje terapije prema individualnim potrebama pacijenta**REGISTROVANI LIJEKOVI:****LIVTENCITY - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG**

ZU/Rp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (1 HDPE-a bičica sa sigurnosnim zatvaračem), u kutiji.

ZU/Rp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (1 HDPE-a bičica sa sigurnosnim zatvaračem), u kutiji.

J05AX25 baloksavir marboksil**Doziranje:** liječenje gripe: oralno, djeca 12-17 god. (tjelesne mase do 79 kg), 40 mg u jednoj dozi, koju je neophodno uzeti što je prije moguće u roku od 48 sati od pojave

simptoma; djeca 12-17 god. (tjelesne mase veće od 80 kg), 80 mg u jednoj dozi, koju je neophodno uzeti što je prije moguće u roku od 48 sati od pojave simptoma; odrasli (tjelesne mase do 79 kg), 40 mg u jednoj dozi, koju je neophodno uzeti što je prije moguće u roku od 48 sati od pojave simptoma; odrasli (tjelesne mase veće od 80 kg), 80 mg u jednoj dozi, koju je neophodno uzeti što je prije moguće u roku od 48 sati od pojave simptoma; *post ekspozicijska profilaksa gripe*: oralno, djeca 12-17 god. (tjelesne mase do 79 kg), 40 mg u jednoj dozi, koju je neophodno uzeti što je prije moguće u roku od 48 sati nakon ekspozicije; djeca 12-17 god. (tjelesne mase veće od 80 kg), 80 mg u jednoj dozi, koju je neophodno uzeti što je prije moguće u roku od 48 sati nakon ekspozicije; odrasli (tjelesne mase do 79 kg), 40 mg u jednoj dozi, koju je neophodno uzeti što je prije moguće u roku od 48 sati nakon ekspozicije; odrasli (tjelesne mase veće od 80 kg), 80 mg u jednoj dozi, koju je neophodno uzeti što je prije moguće u roku od 48 sati nakon ekspozicije

REGISTROVANI LIJEKOVI:

XOFLUZA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

- Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 2 film tablete (1 OPA /aluminijumska folija/PVC blister zapečaćen aluminijumskom folijom), u kutiji
Rp film tableta [40 mg/1 tableta] 2 film tablete (1 OPA/aluminijumska folija/PVC blister zapečaćen aluminijumskom folijom), u kutiji

J06 IMUNOSERUMI i IMUNOGLOBULINI

J06B Imunoglobulini

J06BA Imunoglobulini, normalni humani

J06BA01 imunoglobulin, normalni humani za ekstravaskularnu primjenu

Doziranje: supstituciona terapija kod sindroma primarne imunodeficijencije, (poremećena proizvodnja antitijela), supstituciona terapija kod sekundarne imunodeficijencije: individualno za svakog bolesnika; odrasli, djeca i adolescenti (0-18 god.) s.c. početna doza 0,2-0,5 g/kg, doze održavanja u ponovljenim intervalima da bi se postigla kumulativna mjesečna doza 0,4-0,8 g/kg; imunomodulatorna terapija: s.c.infuzije mogu biti terapija održavanja nakon stabilizacije imunoglobulinima za intravensku primjenu

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CUTAQUIG - OCTAPharma AG

- ZU/Rp rastvor za injekciju [165 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 10 ml rastvora, u kutiji
ZU/Rp rastvor za injekciju [165 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 12 ml rastvora, u kutiji
ZU/Rp rastvor za injekciju [165 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 20 ml rastvora, u kutiji
ZU/Rp rastvor za injekciju [165 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 24 ml rastvora, u kutiji

J06BA02 imunoglobulin, normalni humani za intravaskularnu primjenu

Doziranje: samo za intravensku upotrebu; *primarna imunodeficijencija*: početna doza 0,4-0,8 g/kg koja se daje jednom, nakon toga minimalno 0,2 g/kg svake tri do četiri sedmice: doza koja je potrebna da se postigne nivo održavanja od 5-6 g/l je je 0,2-0,8 g/kg/mjesec; *hipogamaglobulinemija i ponovljene bakterijske infekcije kod pacijenata sa hroničnom limfocitnom leukemijom, kod kojih profilaksa antibioticima nije uspjela; hipogamaglobulinemija i ponovljene bakterijske infekcije u uzlaznoj fazi kod pacijenata sa multiplim mijelomom kod kojih nije došlo do odgovora na pneumokoknu imunizaciju,*

kongenitalni AIDS sa ponovljenim bakterijskim infekcijama; preporučena doza je 0,2-0,4 g/kg svake tri do četiri sedmice, *hipogamaglobulinemija kod pacijenata nakon transplantacije alogenihi hematopoetskih stem ćelija* preporučena doza je 0,2 do 0,4 g/kg svake tri do četiri sedmice; nivoi održavanja trebaju biti iznad 5 g/l; *primarna imuna trombocitopenija*: 0,8-1 g/kg koja se daje prvog dana; ova doza može biti ponovljena jednom u roku tri dana; 0,4 g/kg dnevno u toku dva do pet dana, tretman se može ponoviti ukoliko dođe do relapsa; *Gullian Barre sindrom*: 0,4 g/kg dnevno u periodu od 5 dana; *Kawasaki bolest*: 1,6-2,0 g/kg treba davati u podijeljenim dozama u periodu od dva do pet dana ili 2,0 g/kg kao jednokratnu dozu, pacijenti bi trebalo da istovremeno primaju i terapiju sa acetilsalicilnom kiselinom; *hronična inflamatorna demijelinizirajuća poliradikuloneuropatija*: 2 g/kg tokom najviše 5 uzastopnih dana, doza održavanja 1 g/kg tokom 1-2 uzastopna dana svake 3 sedmice; *multifokalna motorička neuropatija*: 2 g/kg tokom 2-5 uzastopnih dana, doza održavanja 1 g/kg svake 2-4 sedmice ili 2 g/kg svakih 4-8 sedmica, doza i interval doziranja treba da budu prilagođeni i u skladu sa individualnim kliničkim odgovorom; *dio kompleksne terapije za odrasle pacijente s teškom upalom pluća uzrokovanom infekcijom virusom COVID-19/SARS-CoV-2*: 0,8-1 g/kg dnevno tokom 2 dana (doza terapijskog ciklusa iznosi 1,6-2 g/kg tjelesne mase)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BIOVEN - BIOPHARMA PLASMA LLC

- ZU rastvor za infuziju [100 mg/1 mL] 1 staklena boca sa 100 ml
rastvora za infuziju, u kutiji
ZU rastvor za infuziju [100 mg/1 mL] 1 staklena boca sa 50 ml rastvora
za infuziju, u kutiji

BIOVEN MONO - BIOPHARMA PLASMA LLC

- ZU rastvor za infuziju [50 mg/1 mL] 1 staklena boca sa 100 ml rastvora
za infuziju, u kutiji
ZU rastvor za infuziju [50 mg/1 mL] 1 staklena boca sa 50 ml rastvora
za infuziju, u kutiji

IG VENA - KEDRION S.P.A.

- ZU rastvor za infuziju [10 g/200 mL] 1 staklena bočica sa 200 ml
rastvora za infuziju i vješalica za infuziju, u kutiji
ZU rastvor za infuziju [2.5 g/50 mL] 1 staklena bočica sa 50 ml rastvora
za infuziju i vješalica za infuziju, u kutiji
ZU rastvor za infuziju [5 g/100 mL] 1 staklena bočica sa 100 ml
rastvora za infuziju i vješalica za infuziju, u kutiji

OCTAGAM - OCTAPHARMA AG

- ZU rastvor za infuziju [50 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 100 ml
rastvora za infuziju, u kutiji
ZU rastvor za infuziju [50 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 200 ml
rastvora za infuziju, u kutiji
ZU rastvor za infuziju [50 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 50 ml rastvora
za infuziju, u kutiji

J06BB *Imunoglobulini, specifični*

J06BB01 *anti-D (Rho) imunoglobulin, humani*

Doziranje: *Immunorho postnatalna profilaksa*: 100 mcg – 300 mcg kao preporučena optimalna doza, što je prije moguće nakon porođaja, u roku od 72 sata, ako je prošlo više od 72 sata proizvod ne treba uskratiti nego ga dati što je prije moguće; *antenatalna profilaksa*: 50 mcg – 330 mcg (planirana antenatalna profilaksa - jedna doza u periodu 28. do 30. sedmice trudnoće ili dvije doze u periodu od 28. i 34. sedmice trudnoće; antenatalna profilaksa nakon komplikacija u trudnoći - jednu dozu treba dati što je

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

moгуće prije i u roku od 72 sata i po potrebi ponoviti u vremenskim intervalima 6-12 sedmica tokom trudnoće);

Rhesonativ - *postnatalna profilaksa*: 100 mcg - 300 mcg, uobičajeno 250 mcg, što je prije moguće nakon porođaja, unutar 72 sata; *profilaksa prije poroda*: primjenjivati doze u rasponu od 50-330 mcg; *planirana prenatalna profilaksa*: pojedinačna doza (npr. 250 mcg) između 28. i 30. sedmice trudnoće ili dvije doze u 28. i 34. sedmici; *prenatalna profilaksa nakon komplikacija u trudnoći*: prije 12-te sedmice trudnoće 125 mcg; poslije 12-te sedmice trudnoće 250 mcg, po mogućnosti što prije, unutar 72 h, a ukoliko je potrebno ponoviti u 6-12 sedmičnim intervalima u toku trudnoće; *nakon amniocenteze ili biopsije horiona*: pojedinačna doza od 250 mcg; *inkompatibilne transfuzije eritrocita*: 20 mcg po 2 ml Rh(D) - pozitivne krvi primjenjene transfuzijom ili po 1 ml koncentrata eritrocita. Maksimalna doza od 3000 mcg je dovoljna u slučaju većih inkompatibilnih transfuzija, nezavisno da li je volumen transfuzije bio veći od 300 ml Rh(D)- pozitivnih eritrocita

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IMMUNORHO - KEDRION S.P.A.

ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [300 µg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom i 1 staklena ampula sa 2 ml rastvarača (vode za injekciju), u kutiji

J06BB02 tetanus imunoglobulin

Doziranje: primjeniti intramuskularnim putem; *prevencija tetanusa poslije povređivanja*: 250 i.j. - 500 i.j., u slučaju rasprostranjenih opekotina preporučuje se primjena druge injekcije od 250 i.j. pošto eksudativna faza opekotine popusti (oko 36 sati od nastanka opekotine); *terapija klinički manifestiranog tetanusa*: 3000 do 6000 i.j.; učestalost, interval primjene injekcija i period ponavljanih terapijskih doza zavise od kliničke slike.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TETANUS GAMMA - KEDRION S.P.A.

ZU rastvor za injekciju [250 i.j./1 mL] 1 ml rastvora za injekciju u napunjenoj šprici, u kutiji

J06BB04 hepatitis B imunoglobulin, humani

Doziranje: *prevencija ponovne infekcije virusom hepatitisa B nakon transplantacije jetre kod otkazivanja jetre uzrokovanim hepatitisom B*: i.m. odrasli, 2 000 i.j. svakih 15 dana, u dugoročnom liječenju doza bi trebala biti usmjerena na održavanje serumskog nivoa anti HbsAg antitijela iznad 100 i.j./l kod HBV-DNA negativnih pacijenata i iznad 500 i.j./l kod HBV-DNK pozitivnih pacijenata; *imunoprofilaksa hepatitisa B: prevencija hepatitisa B u slučaju nenamjernog izlaganja neimuniziranih osoba*: i.m. najmanje 500 i.j., u zavisnosti od stepena izloženosti, što je prije moguće nakon izlaganja, a preporučuje se u toku 24-72 sata; *imunoprofilaksa hepatitisa B kod pacijenata na hemodijalizi*: i.m. 8-12 i.j. /kg do maksimalno 500 i.j. svaka 2 mjeseca do postizanja serokonverzije koja prati vakcinaciju; *prevencija hepatitisa B kod novorođenčadi, čije su majke nosioci virusa hepatitisa B*: i.m. 30-100 i.j./kg odmah nakon rođenja ili u najkraćem roku nakon poroda; primjena hepatitis B imunoglobulina može se ponavljati do postizanja serokonverzije vakcinacijom; u svim ovim slučajevima, vakcinacija protiv virusa hepatitisa B se strogo preporučuje; prva doza vakcine može se primijeniti istog dana kao i humani hepatitis B imunoglobulin, ali na različitim mjestima; kod osoba koje nisu pokazale imunološki odgovor (nema mjerljivih antitijela na hepatitis B), nakon vakcinacije a kod kojih je neophodna kontinuirana prevencija zbog stalnog rizika od infekcije hepatitisom B, preporučuje se primjena 500 i.j. za odrasle i 8 i.j. /kg (0,16 ml)/kg kod djece svaka 2 mjeseca; a minimalan titar zaštitnih antitijela iznosi 10 mi.j./ml.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IMMUNOHB5 - KEDRION S.P.A.

ZU	rastvor za injekciju [180 i.j./1 mL] 1 staklena bočica sa 1 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU	rastvor za injekciju [540 i.j./3 mL] 1 staklena bočica sa 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

J06BD Antivirusna monoklonska antitijela

J06BD01 palivizumab

Doziranje: prevencija teške bolesti donjeg respiratornog sistema koja zahtijeva hospitalizaciju, a uzrokovana je respiratornim sincicijskim virusom (RSV) kod djece s povećanim rizikom pojave RSV infekcije (djeca rođena u 35. sedmici gestacije ili ranije, koja su na početku sezone izbijanja RSV-a bila mlađa od 6 mjeseci; djeca mlađa od 2 godine koja su u proteklih 6 mjeseci liječena zbog bronhopulmonalne displazije; djeca mlađa od 2 godine s hemodinamski značajnom kongenitalnom bolesti srca): i.m. 15 mg/kg jedanput mjesečno tokom očekivanog perioda rizika obolijevanja od infekcije RSV-om (djeci podvrgnutoj operaciji ugradnje srčanih prenosnica, 15 mg/kg čim se postoperativno stanje stabilizuje, zatim jedanput mjesečno tokom očekivanog perioda rizika).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SYNAGIS - ASTRAZENECA AB

ZU	rastvor za injekciju [50 mg/0.5 mL] 1 bočica sa 0,5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

J07 VAKCINE

J07A Bakterijske vakcine

J07AH Vakcine protiv meningokoka

J07AH08 meningokokus A, C, Y, W-135, četverovalentni prečišćeni polisaharidni antigen konjugovani

Doziranje: aktivna imunizacija pacijenata starosti 6 mjeseci i starijih, protiv invazivnih meningokoknih bolesti uzrokovanih *Neisseria meningitidis* grupama A, C, W135 i Y: i.m. primarna vakcinacija dojenčadi u dobi od 6 sedmica do manje od 6 mjeseci, dvije doze, svaka od 0,5 ml treba primijeniti u intervalu od 2 mjeseca između doza; dojenčad starija od 6 mjeseci, djeca, adolescenti i odrasli, treba primijeniti jednokratnu dozu od 0,5 ml;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NIMENRIX - PFIZER INC.

ZU	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [5 µg/0.5 mL + 5 µg/0.5 mL + 5 µg/0.5 mL + 5 µg/0.5 mL] 1 bočica s liofiliziranim praškom i 1 napunjena šprica sa rastvaračem (1 doza) u kutiji

J07AL Vakcine protiv pneumokoka

J07AL01 pneumokokus, prečišćeni polisaharidni antigen

Doziranje: aktivna imunizacija protiv pneumokokne bolesti kod djece u dobi iznad 2 godine, adolescenata i odraslih: im. ili s.c. primarna vakcinacija jedna doza od 0.5 ml, revakcinacija jedna doza od 0.5 ml (i.m. ili s.c.); tačno vrijeme revakcinacije i potrebu za revakcinacijom odrediti u skladu sa dostupnim službenim preporukama; ne preporučuje se revakcinacija u periodu kraćem od 3 godine

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ZU rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [25 µg/0.5 mL] 1 napunjeni
injekcioni (stakleni) špric po 0,5 mL rastvora za injekciju sa 2
odvojene igle, u kutiji

J07AL02 pneumokokus, prečiščeni polisaharidni antigen konjugovani

Doziranje: aktivna imunizacija za prevenciju invazivne bolesti, upale pluća i akutne upale srednjeg uha izazvanih bakterijom *Streptococcus pneumoniae* kod dojenčadi i djece u dobi od 6 sedmica do 18 god; aktivna imunizacija za prevenciju invazivne bolesti i pneumonije uzrokovane bakterijom *Streptococcus pneumoniae* kod odraslih, starosti 18 godina i više: i.m. 0,5 ml; za više informacija o doziranju konsultovati informacije o lijeku i službene preporuke

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PREVENAR 20 - PFIZER INC.

ZU suspenzija za injekciju u napunjenju šprici [2,2 µg/0.5 mL + 2,2 µg/0.5 mL + 2,2 µg/0.5 mL + 4,4 µg/0.5 mL + 2,2 µg/0.5 mL + 2,2 µg/0.5 mL + 2,2 µg/0.5 mL + 2,2 µg/0.5 mL + 2,2 µg/0.5 mL + 2,2 µg/0.5 mL + 2,2 µg/0.5 mL + 2,2 µg/0.5 mL] 1 napunjena šprica (staklo tipa I) od 0.5 ml. u kutiji.

VAXNEUVANCE - MERCK SHARP & DOHME BV

ZU suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici [2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 4 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL] 1 napunjena šprica sa 0,5 ml suspenzije za injekciju i 2 odvojene igale, u kutiji

ZU suspenzija za injekciju u napunjenom špricu [2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 4 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL+ 2 µg/0.5 mL] 10 napunjenih šprica sa po 0,5 ml suspenzije za injekciju i 20 odvojenih igala, u kutiji

J07AM **Vakcine protiv tetanusa**

J07AM01 tetanus toksoid

Doziranje: prevencija tetanusa posebno za post-ekspozicijsku profilaksu svježih rana koje su potencijalno inficirane sporama uzročnika tetanusa u osoba koje nisu vakcinisane protiv tetanusa ili nisu dovršili primarnu seriju vakcinacije ili u kojih podaci o završenoj vakcinaciji nisu pouzdani: ukoliko je rana mala i čista i ukoliko je prošlo više od 10 god. od zadnje doze vakcine daje se tetanus toksoid 1 doza od 0,5 ml; ukoliko je rana velika i čista ili inficirana tetanusom i ukoliko je prošlo 5-10 god. od zadnje doze vakcine daje se tetanus toksoid 1 doza od 0,5 ml, a ukoliko je prošlo više od 10 god. od zadnje doze vakcine daje se humani tetanus imunoglobulin 250 IU u jednu ruku i tetanus toksoid 1 doza od 0,5 ml u drugu ruku; ukoliko je rana inficirana tetanusom-odgođeni ili nepotpuni debridement i ukoliko je prošlo 5-10 god. od posljednje doze vakcine daje se tetanus toksoid 1 doza od 0,5 ml i antibiotska terapija, a ukoliko je prošlo više od 10 god. daje se humani tetanus imunoglobulin 500 IU u jednu ruku, tetanus toksoid 1 doza od 0,5 ml u drugu ruku i antibiotska terapija; vakcinisanje treba završiti u skladu sa kalendrom vakcinacije; prevenciju neonatalnog tetanusa u nevakcinisanih žena fertile dobili trudnica: dvije sukcesivne doze u razmaku od najmanje četiri sedmice; prvu dozu preporučuje se primijeniti 90 dana ili više prije poroda; primarna vakcinacija: dvije sukcesivne doze u razmaku od mjesec dana ili dva mjeseca nakon kojih slijedi dovakcinacija 6 do 12 mjeseci nakon primljene druge doze; dalja dovakcinacija: 1 doza od 0,5 ml 10 godina nakon primarne vakcinacije i zatim jedna doza svakih deset godina;

preporučuje se intramuskularna primjena; preporučeno mjesto aplikacije je antero-lateralna regija bedra ili nadlaktice, vakcina se može primijeniti i duboko pod kožu.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TETAVAX - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

ZU suspenzija za injekciju u napunjenom špricu [≥ 40 i.j./0.5 mL] 0,5 ml (1 doza) vakcine u napunjenom špricu, u kutiji

J07AM51 tetanus toksoid, kombinacije sa difterija toksoidom

Doziranje: rutinska dodatna vakcinacija (booster) protiv difterije i tetanusa: 0,5 ml svakih 10 god; primarna vakcinacija: 3 uzastopne doze od po 0,5 ml koje se primaju u mjesečnim intervalima; profilaksa nakon izlaganja patogenu usljed nastanka rana podložnih tetanusu ukoliko je potrebna dodatna injekcija protiv difterije: za doziranje konsultovati literaturu proizvođača; preporučuje se i.m. primjena a može se dati i s.c.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IMOVAX DT ADULT - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

ZU suspenzija za injekciju u napunjenom špricu [20 i.j./0.5 mL + 2 i.j./0.5 mL] 1 napunjena šprica (staklo) sa 0,5 ml (1 doza) suspenzije za injekciju, u kutiji

J07B Virusne vakcine

J07BB Vakcine protiv influenza (gripa)

J07BB02 influenza, inaktivisana, fragmentisani virus ili površinski antigen

Doziranje: godišnja imunizacija protiv sezonskog gripa: i.m. ili s.c. odrasli 1 doza od 0,5 ml; djeca 6 mjeseci do 17 god. jedna doza od 0,5 ml; djeca mlađa od 9 godina koja nisu prethodno vakcinisana, nakon primjene prve doze vakcine potrebno je primijeniti drugu dozu nakon isteka perioda od najmanje 4 sedmice; kod djece mlađe od 6 mjeseci, efikasnost i bezbjednost vakcine nije ustanovljena

REGISTROVANI LIJEKOVI:

INFLUVAC TETRA - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

ZU suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici [15 µg/0.5 mL + 15 µg/0.5 mL + 15 µg/0.5 mL + 15 µg/0.5 mL] 1 napunjena šprica sa 0,5 ml suspenzije za injekciju, u kutiji

ZU suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici [15 µg/0.5 mL + 15 µg/0.5 mL + 15 µg/0.5 mL + 15 µg/0.5 mL] 10 napunjenih šprica sa po 0,5 ml suspenzije za injekciju, u kutiji

VAXIGRIP TETRA - SANOFI PASTEUR

ZU suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici [15 µg/0.5 mL + 15 µg/0.5 mL] 1 napunjena staklena šprica sa 0,5 ml suspenzije za injekciju sa priloženom iglom, u kutiji

J07BC Vakcine protiv hepatitisa

J07BC01 hepatitis B, prečišćeni antigen

Doziranje: aktivna imunizacija protiv infekcije virusom hepatitisa B (HBV), uzrokovana svim poznatim podtipovima: novorođenčad, dojenčad i djeca do 15 god. starosti uključujući i 15 god. starosti, 1 doza od 10 mcg (0,5 ml suspenzije); 2. doza, jedan mjesec nakon prve doze i 3. doza 6 mjeseci nakon prve doze; odrasli i djeca preko 16. god. 1 doza vakcine od 20 mcg (1 ml suspenzije), 2. doza, jedan mjesec nakon prve doze i 3. doza 6 mjeseci nakon prve doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ENGERIX B ZA DJECU - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

- ZU suspenzija za injekciju [10 µg/0.5 mL] 100 bočica sa 0,5 ml suspenzije za injekciju (1 doza), u kutiji
- ZU suspenzija za injekciju u napunjenom špricu [10 µg/0.5 mL] 1 napunjena šprica sa 0,5 mL suspenzije za injekciju (1 doza) u kutiji

ENGERIX B ZA ODRASLE - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

- ZU suspenzija za injekciju [20 µg/1 mL] 100 bočica sa po 1 mL suspenzije za injekciju (1 bočica sadrži 1 dozu), u kutiji
- ZU suspenzija za injekciju u napunjenom špricu [20 µg/1 mL] 1 napunjena šprica sa 1 ml suspenzije za injekciju (1 doza) u kutiji

EUVAX B - LG CHEM LTD

- ZU suspenzija za injekciju [10 µg/0.5 mL] 1 bočica sa 0,5 ml suspenzije za injekciju, u kutiji
- ZU suspenzija za injekciju [10 µg/0.5 mL] 10 staklenih bočica sa 0,5 mL suspenzije za injekciju (1 doza), u kutiji
- ZU suspenzija za injekciju [20 µg/1 mL] 1 bočica sa 1 ml suspenzije za injekciju, u kutiji
- ZU suspenzija za injekciju [20 µg/1 mL] 10 staklenih bočica sa 1 mL suspenzije za injekciju (1doza), u kutiji

J07BD Vakcine protiv morbila (malih boginja)

J07BD52 kombinovana vakcina protiv morbila, parotitisa i rubeole, živa, atenuisana

Doziranje: kombinovana vakcinacija sa ciljem prevencije morbila, parotitisa i rubeole: s.c. i i.m. za osobe starosti preko 12 mjeseci, prva doza sa 12 mjeseci, druga doza najmanje 4 nedjelje nakon prve doze (druga doza je namijenjena pojedincima koji iz bilo kog razloga nisu reagovali na prvu dozu)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

M-M-RVAXPRO - MERCK SHARP & DOHME BV

- ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [1000 TCID50/1 doza+ 1000 TCID50/1 doza+ 12500 TCID50/1 doza] 1 bočica sa praškom, 1 napunjena šprica sa rastvaračem i 2 priložene igle, u kutiji
- ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [1000 TCID50/1 doza+ 1000 TCID50/1 doza+ 12500 TCID50/1 doza] 10 bočica praška, 10 napunjenih šprica sa rastvaračem i 20 priloženih igala , u kutiji

PRIORIX - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

- ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [-] 100 bočica sa praškom, u kutiji i 100 ampula po 0,5 ml rastvarača (voda za injekciju) , u kutiji
- ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [3 Log10CCID50/0.5 mL+ 3 Log10CCID50/0.5 mL+ 3.7 Log10CCID50/0.5 mL] 1 staklena bočica sa liofiliziranim praškom i napunjenom špricom sa 0,5 ml rastvarača (vode za injekcije), u kutiji

J07BH**Vakcine protiv rota virusa koji izaziva dijareju****J07BH01** **rota virus, živi, atenuisani**

Doziranje: aktivna imunizacija dojenčadi starosti od 6. do 24. nedjelje života u cilju prevencije gastroenteritisa izazvanog infekcijom rota virusom; oralna upotreba, imunizacija se sastoji od dvije doze; prva doza se može dati počevši od šeste nedjelje života; minimalan interval između dvije doze treba da bude četiri nedjelje; vakcinaciju je poželjno završiti prije 16-te nedjelje života, ali se mora završiti zaključno sa navršene 24 nedjelje života; isti režim doziranja vakcine se može primijeniti kod prijevremeno rođene djece rođene nakon najmanje 27 nedjelja gestacijske dobi; vakcina se ne smije primjenjivati kod djece starije od 24 nedjelje života.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ROTARIX - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED**

ZU oralna suspenzija [≥ 10 megaCCID50/1.5 mL] oralni aplikator sa potisnim klipom i zaštitnim zatvaračem napunjen sa 1,5 mL oralne suspenzije, u kutiji

J07BH02 **rota virus, petovalentni, živi, "reassorted"**

Doziranje: aktivna imunizacija dojenčadi starosti od 6 do 32 sedmice radi prevencije gastroenteritisa uzrokovanog infekcijom rotavirusom: oralno, djeca starosti 6-32 sedmice, ciklus vakcinisanja se sastoji od tri doze; prva doza se može primijeniti u dobi od 6 sedmica, ali ne kasnije od 12 sedmica starosti djeteta; može se davati prijevremeno rođenoj dojenčadi pod uslovom da je period gestacije trajao najmanje 25 sedmica, dojenčad trebaju primiti prvu dozu vakcine najmanje šest sedmica nakon rođenja; razmak između doziranja treba biti najmanje 4 sedmice; preporučuje se da se ciklus vakcinacije od tri doze dovrši od 20. do 22. sedmice starosti djeteta, ako je potrebno, treća (posljednja) doza vakcine se može primijeniti do 32. sedmice starosti djeteta; nakon završetka ciklusa vakcinacije od 3 doze ne preporučuje se primjena daljih doza

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ROTATEQ - MERCK SHARP & DOHME BV**

ZU oralni rastvor [≥ 2.2 megainfektivna jedinica/1 doza+ ≥ 2.8 megainfektivna jedinica/1 doza+ ≥ 2.2 megainfektivna jedinica/1 doza+ ≥ 2 megainfektivna jedinica/1 doza+ ≥ 2.3 megainfektivna jedinica/1 doza] 1 napunjena tuba sa 1 dozom od 2 ml, u kutiji

J07BK**Vakcine protiv varičele zoster****J07BK01** **vakcina protiv varičele, živa**

Doziranje: imunizacija protiv infekcija izazvanih varičelom: s.c ili i.m. djeca 9-11 mjeseci, 0,5 ml u jednoj dozi, zatim 0,5 ml u jednoj dozi, koja se daje najmanje 12 nedjelja nakon početne doze; djeca 1-17 god, 0,5 ml u jednoj dozi, zatim 0,5 ml u jednoj dozi, koja se daje 4-8 nedjelja nakon početne doze; odrasli, 0,5 ml u jednoj dozi, zatim 0,5 ml u jednoj dozi, koja se daje 4-8 nedjelja nakon početne doze; *post-ekspozicijska profilaksa protiv infekcija izazvanih varičelom:* s.c ili i.m. djeca 9 mjeseci -17 god, 0,5 ml u jednoj dozi, zatim 0,5 ml u jednoj dozi, koja se daje 4-8 nedjelja nakon početne doze; odrasli, 0,5 ml u jednoj dozi, zatim 0,5 ml u jednoj dozi, koja se daje 4-8 nedjelja nakon početne doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:**VARIVAX - MERCK SHARP & DOHME BV**

ZU prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenoj injekcionoj šprici [≥ 1350 Pock Forming Units/0.5 mL] 1 bočica sa praškom, 1 napunjena šprica sa rastvaračem (0,75 ml vode za injekcije) i 2 igle, u kutiji

J07BM

Vakcine protiv papiloma virusa

J07BM01 papilomavirus (humani tipovi 6, 11, 16, 18)

Doziranje: sprečavanje nastanka premalignih genitalnih lezija i karcinoma grlića materice uzročno povezanog s humanim papiloma virusom (HPV); sprečavanje nastanka genitalnih bradavica (condyloma acuminata) uzročno povezano sa tipovima HPV virusa; i.m. uzrast 9-13 god. prema rasporedu za 2 doze (0,5 ml primijenjeno sa 0 i 6 mjeseci), ako se druga doza vakcine primjenjuje nakon manje od 6 mjeseci od prve doze mora se primjeniti i treća doza; prema rasporedu za 3 doze (0,5 ml primijenjeno sa 0, 2 i 6 mjeseci), drugu dozu primjeniti najmanje mjesec dana nakon prve doze, a treću dozu nakon što proteknu tri mjeseca od druge doze; sve tri doze primjeniti u roku od godine dana;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GARDASIL - MERCK SHARP & DOHME BV

- ZU suspenzija za injekciju [-] 1 bočica sa jednom dozom od 0,5 ml suspenzije za injekciju, u kutiji
- ZU suspenzija za injekciju [-] 10 bočica sa po 1 dozom od 0,5 ml suspenzije za injekciju, u kutiji
- ZU suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici [-] 1 napunjena šprica sa 1 dozom od 0,5 ml suspenzije za injekciju i 2 igle, u kutiji
- ZU suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici [-] 10 napunjenih šprica sa po 1 dozom od 0,5 ml suspenzije za injekciju i 20 igala, u kutiji

J07BM03 papilomavirus (humani tipovi 6,11,16,18,31,33,45,52,58)

Doziranje: imunizacija protiv HPV-om uzrokovanih premalignih lezija i kancera (cerviksa, vulve, vagine i anusa) i genitalnih bradavica: osobe u dobi 9-14 god. u vrijeme prve injekcije, i.m. deltoidna zona nadlaktice ili gornja anterolateralna zona bedra) prema rasporedu za 2 doze (0, 6 - 12 mjeseci), drugu dozu primjeniti između 5 i 13 mjeseci od prve doze; ukoliko se druga doza primjenjuje nakon manje od 5 mjeseci od primjene prve doze, mora se primjeniti i treća doza; prema rasporedu za 3 doze (0, 2, 6 mjeseci), drugu dozu primjeniti najmanje mjesec dana nakon prve doze, a treću dozu primjeniti najmanje 3 mjeseca nakon druge doze, sve tri doze se moraju primjeniti unutar perioda od godinu dana; osobe u dobi od 15 godina i starije u vrijeme prve injekcije, primjeniti prema rasporedu za 3 doze (0, 2, 6 mjeseci); drugu dozu primjeniti najmanje mjesec dana nakon prve doze, a treću dozu najmanje 3 mjeseca nakon druge doze, sve tri doze se moraju primjeniti unutar perioda od godinu dana;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GARDASIL 9 - MERCK SHARP & DOHME BV

- ZU suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici [20 µg/0.5 mL] 1 napunjena šprica sa 1 dozom od 0,5 ml suspenzije za injekciju i 2 igle, u kutiji
- ZU suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici [20 µg/0.5 mL] 10 napunjenih šprica sa po 1 dozom od 0,5 ml suspenzije za injekciju i 20 igala, u kutiji
- ZU suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici [20 µg/0.5 mL] 10 napunjenih šprica sa po 1 dozom od 0,5 ml suspenzije za injekciju, bez igala; u kutiji

J07C Bakterijske i virusne vakcine, kombinacija

J07CA Bakterijske i virusne vakcine, kombinacija

J07CA02 vakcina protiv difterije, pertusisa, poliomijelitisa, tetanusa

Doziranje: *prevencija difterije, tetanusa, velikog kašlja, poliomijelitisa kod djece od 2 mjeseca starosti*; i.m. primarna imunizacija 3 doze koje se daju u intervalima od jednog mjeseca, u skladu sa zvaničnim usvojenim protokolom, u dobi od 2, 3, 4 mjeseca; *dodatna vakcinacija*: u skladu sa informacijama o lijeku i zvaničnim protokolima

REGISTROVANI LIJEKOVI:

INFANRIX - IPV - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

ZU suspenzija za injekciju [25 µg/0.5 mL + 8 µg/0.5 mL + 40 i.j./0.5 mL + 40 AgU/0.5 mL + ≥ 8 AgU/0.5 mL + 32 AgU/0.5 mL] 1 napunjena šprica (PFS) sa 0,5 mL suspenzija za injekciju i 1 igla, u kutiji

TETRAxIM - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

ZU suspenzija za injekciju [25 µg/0.5 mL + 25 µg/0.5 mL + ≥ 40 mD'AG'U/0.5 mL + 29 D'AG'U/0.5 mL + 7 D'AG'U/0.5 mL + 26 D'AG'U/0.5 mL] 1 napunjena šprica sa 0,5 ml suspenzije za injekciju i 1 odvojene igle, u kutiji

J07CA06 vakcina protiv difterije, hemofilus influence B, pertusisa, poliomijelitisa, tetanusa

Doziranje: aktivna imunizacija djece starije od 2 mjeseca protiv difterije tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i Haemophilus influenzae tipa b; i.m. primarna imunizacija: dvije ili tri doze vakcine u skladu sa službenim preporukama; minimalan uzrast za prvu dozu 2 mjeseca starosti; interval između sljedećih doza primarnog ciklusa imunizacije najmanje četiri sedmice; ako primarna vakcinacija uključuje dvije doze, revakcinacija se vrši najmanje 6 mjeseci nakon druge doze, preporučljivo između 11. i 13. mjeseca života; ako primarna vakcinacija obuhvata 3 doze, mora se primjeniti doza revakcinacije vakcinom protiv Haemophilus influenzae tip b (monovalentnim ili kombinovanim); vrijeme revakcinacije prilagoditi službenim preporukama;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

INFANRIX IPV + HIB - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

ZU prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju [25 µg/0.5 mL + 8 µg/0.5 mL + ≥ 40 i.j./0.5 mL + 10 µg/0.5 mL + 40 AgU/0.5 mL + 8 AgU/0.5 mL + 32 AgU/0.5 mL] 1 napunjena šprica (PFS) suspenzije i 1 staklena bočica praška, u kutiji

PENTAXIM - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

ZU prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju [≥ 25 µg/0.5 mL + ≥ 40 i.j./0.5 mL + 29 D'AG'U/0.5 mL + 7 D'AG'U/0.5 mL + 26 D'AG'U/0.5 mL + 10 µg/0.5 mL] 1 bočica praška i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenoj šprici (0,5 ml) + 2 odvojene igle, u kutiji

J07CA09 vakcina protiv difterije, hemofilus influence B, pertusisa, poliomijelitisa, tetanusa, hepatitisa B

Doziranje: *Hexaxim*: primarna vakcinacija i dovakcinacija dojenčadi i male djece uzrasta od 6 sedmica protiv difterije, tetanusa, pertusisa, hepatitis B, poliomijelitisa i invazivnih bolesti koje uzrokuje Haemophilus influenzae tip B: i.m. primarna vakcinacija se provodi u 2 doze (u razmaku od najmanje 8 sedmica) ili sa 3 doze (u razmaku od najmanje 4 sedmice); dovakcinacija se provodi najmanje 6 mjeseci nakon zadnje doze iz primarne vakcinacije u skladu sa službenim preporukama

INFANRIX-Hexa : primarna i buster imunizacija novorođenčadi od navršanih 6 nedjelja i

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

male djece protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, poliomijelitisa, hepatitisa B i oboljenja izazvanog Hemophilus influenzae tip b: i.m. primarna imunizacija se provodi po šemi od 3 doze vakcine po 0,5 ml (prema šemi 2,3,4. mjesec; 3,4,5. mjesec; 2,4,6. mjesec ili dvije doze (po šemi 3,5. mjesec), putem duboke i.m. inj., uz preporuku da se svaka naredna doza vakcine primjenjuje na različitom injekcionom mjestu; između doza treba da postoji interval od najmanje mjesec dana; buster imunizacija se provodi prema protokolu, zavisno od toga koja je šema primjenjena, u skladu sa zvaničnim preporukama; sigurnost i efikasnost vakcine kod djece iznad 36 mjeseci starosti nije utvrđena;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HEXAXIM - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

ZU suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici [25 µg/0.5 mL+ ≥ 40 i.j./0.5 mL+ 29 D'AG'U/0.5 mL+ 7 D'AG'U/0.5 mL+ 26 D'AG'U/0.5 mL] 1 napunjena injekciona šprica sa 0,5 ml suspenzije za injekciju i 2 odvojene igle, u kutiji

INFANRIX HEXA - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

ZU prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju [25 µg/0.5 mL+ 8 µg/0.5 mL+ ≥ 40 i.j./0.5 mL+ 10 µg/0.5 mL+ 40 AgU/0.5 mL+ 8 AgU/0.5 mL+ 32 AgU/0.5 mL] 1 bočica sa praškom Hib komponente, jedna napunjena šprica sa 0,5 ml suspenzije DTP-HBV-IPV komponente i dvije igle, u kutiji

L **ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI**
L01 **ANTINEOPLASTICI**
L01A **Alkilirajući citostatici**
L01AA **Analozi azotnog plikavca**

L01AA01 **ciklofosamid**

Doziranje: parenteralno, leukemija, maligni limfomi, metastazirajući i maligni solidni tumori bez metastaza, progresivne autoimune bolesti, imunosupresija prilikom transplatacije organa: zavisno od indikacije kao dugotrajno liječenje, početno doziranje uobičajeno 3-6 mg/kg/dan (odgovara 120-240 mg/m²) u obliku i.v. inf; 10-15 mg/kg/dan (odgovara 400-600 mg/m²) u obliku i.v. inf. u intervalima 2-5 dana; liječenje sa velikim dozama 20-40 mg/kg (odgovara 800-1600 mg/m²) u obliku i.v. inf. u intervalima 10-20 dana i većim dozama (za kondicioniranje prije transplantacije kostne srži) u intervalima 21-28 dana; koristi se kao monoterapija ili u kombinovanim hemioterapijskim režimima prema protokolu; oralno, pomoćni tretman karcinoma dojke nakon resekcije tumora ili mastektomije, palijativni tretman metastaziranog karcinoma dojke: 100 mg/m² u prvih 14 dana tretmana, u kombinaciji sa metotreksatom i 5-fluorouracilom; ciklus tretmana se ponavlja svake 4 sedmice; dozu umanjiti za pacijente mlađe od 65 godina; po život opasne „autoimune bolesti“ (teški, progresivni oblici lupus nefritis-a, Wegener-ove granulomatoze): ako se uzimaju svakodnevno, 1-2 mg/kg (2 mg/kg za Wegener-ovu granulomatozu); kod intermitentne (prekidajuće) oralne terapije preporučuje se isto doziranje kao i za odgovarajuću i.v. terapiju (početna doza 500-1000 mg/m²).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ENDOXAN - BAXTER AG

- ZU obložena tableta [50 mg/1 tableta] 50 obloženih tableta (5 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
- ZU prašak za rastvor za injekciju [1000 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa 1069 mg praška za rastvor za injekciju, u kutiji
- ZU prašak za rastvor za injekciju [200 mg/1 boca] 1 staklena bočica sa 213,8 mg praška za rastvor za injekciju, u kutiji
- ZU prašak za rastvor za injekciju [500 mg/1 boca] 1 staklena bočica sa 534,5 mg praška za rastvor za injekciju, u kutiji

L01AA06 **ifosamid**

Doziranje: tumor testisa, rak grlića materice, rak dojke, nemikrocelularni karcinom bronhija, mikrocelularni karcinom bronhija, sarkom mekih tkiva (uključ. osteosarkom i rabdomiosarkom), Ewingov sarkom, non-Hodgkin limfom, Hodgkin-ova bolest: 1,2 - 2,4 g/m² (30-60 mg/kg) dnevno i.v. u podijeljenim dozama tokom 5 uzastopnih dana; kao dugotrajna 24-časovna inf. 5 g/m² (200 mg/kg).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HOLOXAN - BAXTER AG

- ZU prašak za rastvor za injekciju [2000 mg/1 viala] staklena bočica sa 2000 mg praška za rastvor za injekciju, u kutiji
- ZU prašak za rastvor za injekciju [1000 mg/1 viala] staklena bočica sa 1000 mg praška za rastvor za injekciju, u kutiji
- ZU prašak za rastvor za injekciju [500 mg/1 viala] staklena bočica sa 500 mg praška za rastvor za injekciju, u kutiji

L01AA09 bendamustin

Doziranje: prva linija liječenja hronične limfocitne leukemije (stadij B ili C prema Binetu) kod bolesnika kod kojih kombinovana terapija fludarabinom nije prikladna: 100 mg/m² 1. i 2. dana svake 4 sedmice, do 6 ciklusa; kao monoterapija kod bolesnika sa indolentnim ne-Hodgkinovim limfomom kod kojih je bolest napredovala tokom liječenja rituksimabom ili režimom koji sadrži rituksimab ili u roku od 6 mjeseci nakon tog liječenja: 120 mg/m² 1. i 2. dana svake 3 sedmice, najmanje 6 ciklusa; prva linija liječenja multiplog mijeloma (Durie-Salmon stadij II uz napredovanje bolesti ili stadij III) u kombinaciji sa prednizonom kod bolesnika starijih od 65 god. koji nisu pogodni za presađivanje autolognih matičnih ćelija i koji imaju kliničku neuropatiju u vrijeme dijagnoze, što onemogućava primjenu liječenja koje sadrži talidomid ili bortezomib: 120-150 mg/m² 1. i 2. dana, 60 mg/m² prednizona intravenski ili oralno 1. do 4. dana svake 4 sedmice, najmanje 3 ciklusa; i.v. inf. tokom 30-60 min.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

STINDAB - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

ZU	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [100 mg/1 bočica] 5 smeđih staklenih bočica od 50 ml, u kutiji
ZU	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [25 mg/1 bočica] 5 smeđih staklenih bočica od 25 ml, u kutiji

L01AB Alkil sulfonati

L01AB01 busulfan

Doziranje: *terapija kondicioniranja prije presađivanja hematopoetskih progenitorskih ćelija:* i.v. inf. za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BUSULFAN FRESENIUS KABI - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

ZU	Koncentrat za otopinu za infuziju [6 mg/1 mL] 8 bočica sa po 10 mL koncentrata za otopinu za infuziju u pojedinačnim kartonskim kutijama, u kutiji

L01AX Ostali alikilirajući citostatici

L01AX03 temozolomid

Doziranje: odrasli bolesnici s novodijagnostifikovanim glioblastomom multiforme; odrasli bolesnici i pedijatrijski bolesnici u dobi od 3 godine ili stariji sa recidivirajućim ili progresivnim malignim gliomom: oralno, za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BLASTOMAT - EIRGEN PHARMA LIMITED

ZU/Rp	kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] vrećica sa 5 kapsula tvrdih, u kutiji
ZU/Rp	kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula] vrećica sa 5 kapsula tvrdih, u kutiji

TEMOZOLOMID ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O.

ZU/Rp	kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 5 tvrdih kapsula u 5 vrećica (vrećica od PET/alu/PE) u kutiji
ZU/Rp	kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula] 5 tvrdih kapsula u 5 vrećica (vrećica od PET/alu/PE) u kutiji

TEMOZOLOMID ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O.

ZU/Rp	kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula] 5 tvrdih kapsula u 5 vrećica (vrećica od PET/alu/PE) u kutiji

L01B **Antimetaboliti**

L01BA **Analozi folne kiseline**

L01BA01 **metotreksat**

Doziranje: aktivni reumatski artritis kod odraslih pacijenata: s.c. i.m. ili i.v. 7,5 mg jednom sedmično, maks. sedmično 25 mg; *poliartritični oblici teškog, aktivnog juvenilnog idiopatskog artritisa*: s.c. i i.m. djeca i adolescenti mlađi od 16 god, 10-15 mg/m² sedmično, ne preporučuje se djeci mlađoj od 3 god; *teški oblici psorijaze i psorijatičnog artritisa*: s.c. i.m. i i.v. 7,5 mg metotreksata jednom sedmično, maks. sedmično 25 mg (napomena: kod djece i adolescenata lijek se daje samo s.c. i i.m.); *neoplastične bolesti*: konsultovati literaturu proizvođa

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EBETREXAT - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- ZU rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [20 mg/1 mL] 1 napunjena šprica sa 0,375 ml rastvora za injekciju, jednokratna igla za injekciju i dvije alkoholne maramice, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [20 mg/1 mL] 1 napunjena šprica sa 0,5 ml rastvora za injekciju, jednokratna igla za injekciju i dvije alkoholne maramice, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [20 mg/1 mL] 1 napunjena šprica sa 0,75 ml rastvora za injekciju, jednokratna igla za injekciju i dvije alkoholne maramice, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [20 mg/1 mL] 1 napunjena šprica sa 1 ml rastvora za injekciju, jednokratna igla za injekciju i dvije alkoholne maramice, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [20 mg/1 mL] 1 napunjena šprica sa 1,25 ml rastvora za injekciju, jednokratna igla za injekciju i dvije alkoholne maramice, u kutiji

METHOTREXATE PFIZER - PFIZER INC.

- ZU rastvor za injekciju [50 mg/2 mL] 5 bočica (polipropilenskih) po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

L01BA04 **pemetreksed**

Doziranje: maligni pleuralni mezoteliom; *nemikrocelularni karcinom pluća*: 500 mg/m² u vidu i.v. infuzije tokom 10 minuta, prvog dana svakog terapijskog ciklusa (21 dan); prilagođavanje doze se vrši u skladu sa hemioterapijskim nalazima i toksičnim efektima prethodnog ciklusa.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ARMISARTE - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [25 mg/1 mL] 1 bočica od 20ml, u kutiji

PELIMERA - SYNTHON B.V.

- ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [100 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za koncentrat za rastvor za infuziju, u kutiji
- ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [500 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za koncentrat za infuziju, u kutiji

L01BB Analizi purina

L01BB05 fludarabin

Doziranje: *hronična limfocitna leukemija:* i.v. 25 mg/m²/dan tokom 5 dana svakih 28 dana; *oralno,* 40 mg/m²/dan tokom 5 dana svakih 28 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FLUDARABIN PLIVA - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZU koncentrat za otopinu za injekciju/ infuziju [25 mg/1 mL] 1 staklena bočica (tip I) sa 2 ml koncentrata za otopinu za injekciju/infuziju sa bromobutil gumenim čepom i Al - prstenom i polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem

L01BC Analizi pirimidina

L01BC05 gemcitabin

Doziranje: *lokalno uznapredovali/metastatski adenokarcinom gušterače:* 1000 mg/m² sedmično tokom 7 sedmica potom slijedi 1 sedmica pauze, u sljedećim ciklusima se daje jedanput sedmično tokom perioda od 3 sedmice, nakon čega slijedi prekid od sedmicu dana; *lokalno uznapredovali/metastatski nesitnoćelijski karcinom pluća:* 1000 g/m² dani 1, 8. i 15. ponavljati ciklus svakih 28 dana, ili 1250 mg/m² dani 1. i 8. ponavljati ciklus svakih 21 dan; *neoperabilni, lokalno recidivirajući ili metastatski karcinom dojke (u kombinaciji sa paklitakselom):* 1250 mg/m² dani 1. i 8. ponavljati svaki 21 dan; *lokalno uznapredovali metastatski karcinom epitelnih ćelija jajnika (u kombinaciji sa karboplatinom):* 1000 mg/m² dani 1. i 8. ponavljati ciklus svaki 21 dan; *uznapredovali karcinom mokraćne bešike (u kombinaciji sa cisplatinom):* 1000 mg/m² jednom sedmično tokom 3 sedmice, ponavljati ciklus svake 4 sedmice.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GEMCITABIN SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [10 mg/1 mL] 1 staklena bočica koncentrata za rastvor za infuziju od 20 ml, u kutiji
ZU koncentrat za rastvor za infuziju [10 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 100 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji.

GEMCITABINE VENUS - VENUS PHARMA GMBH

ZU prašak za rastvor za infuziju [1000 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji
ZU prašak za rastvor za infuziju [200 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom za rastvor za infuziju, u kutiji

L01BC06 kapecitabin

Doziranje: *karcinom kolona, kolorektalne regije i dojke, kao monoterapija:* 1250 mg/m² primijenjeno 2 puta dnevno, tokom 14 dana, nakon čega slijedi period pauze od 7 dana; *preporučeno trajanje liječenja* 6 mjeseci; *karcinom kolona, kolorektalne regije i želuca, kod kombinovanog liječenja:* 800-1000 mg/m² primijenjeno 2 puta dnevno tokom 14 dana, nakon čega slijedi period od 7 dana pauze ili 625 mg/m² 2 puta dnevno kada se primjenjuje kontinuirano; *lokalno uznapredovali/metastatski karcinom dojke, u kombinaciji sa docetakselom:* 1250 mg/m² primijenjeno 2 puta dnevno, tokom 14 dana, nakon čega slijedi period pauze od 7 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CAPECITABINE ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O

ZU/Rp film tableta [150 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PVdC/Alu perforirana blistera djeljiva na pojedinačne doze sa 10 tableta) u kutiji

- ZU/Rp film tableta [300 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PVdC/Al perforirana blistera djeljiva na pojedinačne doze sa 10 tableta), u kutiji
- ZU/Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 120 film tableta (12 PVC/PVdC/Al perforirana blistera djeljiva na pojedinačne doze sa 10 tableta), u kutiji
- ZU/Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PVdC/Alu perforirana blistera djeljiva na pojedinačne doze sa 10 tableta), u kutiji

ECANSYA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- ZU/Rp filmom obložena tableta [150 mg/1 tableta] 60 filmom obložene tablete (6 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- ZU/Rp filmom obložena tableta [150 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- ZU/Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 120 filmom obloženih tableta (12 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- ZU/Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 120 filmom obloženih tableta (12 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

VEROBICINE - PHARMACARE PREMIUM LTD.

- ZU/Rp film tableta [150 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al-Al blistera po 10 film tableta), u kutiji
- ZU/Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 120 film tableta (12 Al-Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

L01BC07 azacitidin

Doziranje: terapija srednjeg-2 ili visokog rizik mijelodisplastičnog sindroma, hronične mijelomonocitne leukemije i akutne mijeloidne leukemije kod odraslih pacijenata kod kojih nije moguće transplantirati hematopoetske matične ćelije: s.c.75 mg/m²/dan, tokom 7 dana nakon čega slijedi pauza od 21 dan (28-dnevni ciklus liječenja); preporučuje se najmanje 6 ciklusa

REGISTROVANI LIJEKOVI:**AZACITIDIN MYLAN - MYLAN GERMANY GMBH**

- ZU prašak za suspenziju za injekciju [25 mg/1 mL] 1 staklena bočica tip I sa 100 mg azacitidina, u kutiji

AZACITIDIN STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG

- ZU prašak za suspenziju za injekciju [100 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za suspenziju za injekciju, u kutiji

AZACITIDINE ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O

- ZU prašak za suspenziju za injekciju [100 mg/1 bočica] 1 bočica, u kutiji
- ZU prašak za suspenziju za injekciju [150 mg/1 bočica] 1 bočica, u kutiji

ETRAGA - STADA ARZNEIMITTEL AG

- ZU prašak za suspenziju za injekciju [100 mg/1 bočica] 1 bočica sadrži 100 mg azacitidina za pripremu 4 ml suspenzije koncentracije 25 mg/ml, u kutiji
- ZU prašak za suspenziju za injekciju [150 mg/1 bočica] 1 bočica sadrži 150 mg azacitidina za pripremu 6 ml suspenzije koncentracije 25 mg/ml, u kutiji

ZASSIDA - AQVIDA GMBH

- ZU prašak za suspenziju za injekciju [100 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom za suspenziju za injekciju, u kutiji

L01BC59 **trifluridin, tipiracil**

Doziranje: metastatski kolorektalni karcinom kod pacijenata koji su prethodno liječeni ili se ne smatraju kandidatima za liječenje dostupnim terapijama, uključujući hemoterapije koje se zasnivaju na fluoropirimidinu, oksaliplatinu i irinotekanu, anti-VEGF lijekove i anti-EGFR lijekove; karcinom želuca: oralno, odrasli početna doza 35 mg/m²/dozi dva puta dnevno 1. do 5. dana i 8. do 12. dana svakog 28-dnevnog ciklusa sve dok se primjećuje korist ili dok se ne pojavi neprihvatljiva toksičnost; konsultovati literaturu proizvoda za više informacija o podešavanju doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LONSURF - LES LABORATOIRES SERVIER

- △ - ZU/Rp filmom obložena tableta [6,14 mg/1 tableta+ 15 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera sa laminarnim sredstvom za sušenje sa po 10 tableta), u kutiji
- △ - ZU/Rp filmom obložena tableta [8,19 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera sa laminarnim sredstvom za sušenje sa po 10 tableta), u kutiji

L01C **Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi**

L01CA **Vinka alkaloidi i analozi**

L01CA04 **vinorelbin**

Doziranje: *uznapredovali karcinom dojke, uznapredovali nesitnoćelijski karcinom pluća:* oralno, odrasli 60 mg/m² jednom nedjeljno tokom 3 nedjelje zatim povećati ukoliko se toleriše na 80 mg/m² jednom nedjeljno (maks. po dozi 160 mg jednom nedjeljno); i.v.inj.ili i.v.inf. odrasli, konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VINORELBIN LABORMED - LABORMED-PHARMA S.A.

- ZU kapsula, meka [20 mg/1 kapsula] 1 kapsula, meka (1 PVC/PVDC-Al/PET/papirni blister sa jednom kapsulom, mekom), u kutiji
- ZU kapsula, meka [30 mg/1 kapsula] 1 kapsula, meka (1 PVC/PVDC-Al/PET/papirni blister sa jednom kapsulom, mekom), u kutiji
- ZU kapsula, meka [80 mg/1 kapsula] 1 kapsula, meka (1 PVC/PVDC-Al/PET/papirni blister sa jednom kapsulom, mekom), u kutiji

L01CB **Derivati podofiltoksina**

L01CB01 **etopozid**

Doziranje: karcinom testisa, sitnoćelijski karcinom pluća, Hodgkinov limfom, Non-Hodgkinov limfom, akutna monocitna i mijelocitna leukemija: i.v.inf. odrasli, za doziranje konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ETOPOSID SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [100 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 5 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

L01CD **Taksani**

L01CD01 **paklitaksel**

Doziranje: karcinom jajnika, karcinom dojke, terapija Kaposijevog sarkoma u vezi sa AIDS-om, karcinom pluća ne malih ćelija, adenokarcinoma gušterače: i.v.inf. odrasli, za doziranje konsultovati literaturu proizvoda i protokole

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ATAXIL - DEVA HOLDING A.S.**

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [6 mg/1 mL] 1 staklena bočica od 25 ml sa 16,7 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [6 mg/1 mL] 1 staklena bočica od 50 ml sa 50 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [6 mg/1 mL] 1 staklena bočica od 8 ml sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

PACLITAXEL PLIVA 6 MG/ML - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [100 mg/16.7 mL] 1 staklena bočica sa 16,7 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

PACLITAXEL PLIVA 6 MG/ML - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [150 mg/25 mL] 1 staklena bočica sa 25 mL koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [30 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 5 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [300 mg/50 mL] 1 staklena bočica sa 50 mL koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

PACLITAXEL SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [6 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 16,7 mL koncentrata za rastvor za infuziju
- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [6 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 5 mL koncentrata za rastvor za infuziju
- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [6 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 50 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

L01CD02 docetaksel

Doziranje: operabilni karcinom dojke sa pozitivnim/negativnim limfnim čvorovima u adjuvantnom tretmanu (u kombinaciji sa doksorubicinom i ciklofosfamidom); inicijalna hemoterapija lokalno uznapredovalog/metastatskog karcinoma dojke (sa doksorubicinom); lokalno uznapredovali ili metastatski karcinom dojke nakon neuspjeha citotoksične terapije koja je uključivala antracikline ili alkilirajuće agense (monoterapija); lokalno uznapredovali ili metastatski karcinom dojke nakon neuspjeha citotoksične terapije koja je uključivala antracikline (sa kapecitabinom); inicijalna hemoterapija metastatskog karcinoma dojke sa pojačanom izražajnošću onkogena HER 2 (sa trastuzumabom); lokalno uznapredovali/metastatski nesitnoćelijski karcinom pluća nakon neuspjeha prethodne hemoterapije; inicijalna hemoterapija neoperabilnog, lokalno uznapredovalog ili metastatskog nesitnoćelijskog karcinom pluća (sa cisplatinom); hormon rezistentni metastatski karcinom prostate (u kombinaciji sa prednizonom ili prednizolonom); inicijalna terapija metastatskog gastrointestinalnog adenokarcinoma, uključujući adenokarcinom gastroezofagealnog spoja (sa cisplatinom i fluorouracilom); indukcijski tretman lokalno uznapredovalog karcinoma skvamoznih ćelija glave i vrata (sa cisplatinom i fluorouracilom); i.v. inf, odrasli, za doziranje konsultovati literaturu proizvoda ili lokalne protokole

REGISTROVANI LIJEKOVI:**DOCEKAR-80 - SAKAR HEALTHCARE LTD**

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [80 mg/4 mL] 1 bočica sa 4 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

DOCETAXEL ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O

- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [160 mg/8 mL] 1 bočica sa 8 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji.

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

ZU	Koncentrat za otopinu za infuziju [20 mg/1 mL] 1 bočica sa 1 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
ZU	Koncentrat za otopinu za infuziju [80 mg/4 mL] 1 bočica sa 4 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
DOCETAXEL SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.	
ZU	koncentrat za rastvor za infuziju [10 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 2 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ZU	koncentrat za rastvor za infuziju [10 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 8 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
DOCETAXEL VENUS - VENUS PHARMA GMBH	
ZU	koncentrat za rastvor za infuziju [160 mg/8 mL] 1 bočica sa 8 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ZU	koncentrat za rastvor za infuziju [20 mg/1 mL] 1 bočica sa 1 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ZU	koncentrat za rastvor za infuziju [80 mg/4 mL] 1 bočica sa 4 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

L01CD04 kabazitaksel

Doziranje: metastatski hormon refraktorni karcinom prostate u kombinaciji sa prednizonom ili prednizolonom kod pacijenata koji su prethodno bili na režimu liječenja docetakselom: 25 mg/m², primjenjena kao jednosatna intravenska infuzija na 3 sedmice i to u kombinaciji sa 10 mg prednizona ili prednizolona koji se uzimaju oralno svakodnevno tokom terapije

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CABAZITAXEL MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED

ZU	koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju [60 mg/1.5 mL] 1 bočica sa 1,5 mL koncentrata za rastvor za infuziju i 1 bočica sa 4,5 mL rastvarača, u kutiji

JEVTANA - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

ZU	koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju [60 mg/1.5 mL] 1 staklena bočica sa 1,5 ml koncentrata za rastvor za infuziju i 1 staklena bočica sa 4,5 ml rastvarača, u kutiji

KABAZITAKSEL EVER PHARMA - EVER VALINJECT GMBH

ZU	Koncentrat za otopinu za infuziju [10 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 4,5 mL koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
ZU	Koncentrat za otopinu za infuziju [10 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 5 mL koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
ZU	Koncentrat za otopinu za infuziju [10 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 6 mL koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

L01CE Inhibitori topoizomerase 1 (TOP1)

L01CE02 irinotekan

Doziranje: metastatski karcinom debelog crijeva ili rektuma u kombinaciji sa fluorouracilom i folnom kiselinom ili kao monoterapija kod pacijenata kod kojih nije postignut odgovor na terapiju koja sadrži fluorouracil; terapija metastatskog kolorektalnog karcinoma sa ekspresijom receptora za epidermani faktor rasta nakon neuspjeha hemoterapije koja je uključivala irinotekan (u kombinaciji sa cetuksimabom); prva linija terapije metastatskog karcinoma kolona ili rektuma (u kombinaciji sa fluorouracilom, folnom kiselinom i bevacizumabom); prva linija terapije metastatskog kolorektalnog karcinoma (u kombinaciji sa kapecitabinom sa ili bez bevacizumaba); odrasli, i.v. inf, konsultovati literaturu proizvoda i lokalne protokole

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IRINOTECAN ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [20 mg/1 mL] 1 bočica sa 2 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [20 mg/1 mL] 1 bočica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

IRINOTECAN KABI - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [100 mg/5 mL] 1 bočica od 5 mL koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [40 mg/2 mL] 1 staklena bočica sa 2 mL koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

IRINOTECAN QILU - QILU PHARMA SPAIN SL

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [100 mg/5 mL] 1 staklena bočica (staklo tamne boje tip I) od 5 ml rastvora za infuziju, u kutiji
- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [40 mg/2 mL] 1 staklena bočica (staklo tamne boje tip I) od 2 ml rastvora za infuziju, u kutiji

IRINOTESIN - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [100 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [40 mg/2 mL] 1 staklena bočica sa 2 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

L01D***Citotoksični antibiotici i srodne supstance*****L01DB*****Antraciklini i srodne supstance*****L01DB01****doksorubicin**

Doziranje: karcinom dojke, neoadjuvantna i adjuvantna terapija za osteosarkom, uznapredovali sarkom mekog tkiva kod odraslih, Ewingov sarkom, mikrocelularni karcinom pluća, Hodgkinov limfom, visokomaligni ne-Hodgkinov limfom, indukciona i terapija održavanja u slučaju akutne limfoblastne leukemije, akutna mijeloblastna leukemija, uznapredovali ili rekurentni papilarni/folikularni karcinom štitnjače, anaplastični karcinom štitnjače, sistemsko liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma mokraćne bešike, intravezikalna prevencija recidiva površinskog karcinoma mokraćne bešike nakon transuretralne resekcije kod pacijenata sa visokim rizikom od recidiva, rekurentni ovarijalni karcinom, Wilmsov tumor (II stadijum u visoko malignim varijantama, svi uznapredovali stadijumi: III-IV), uznapredovali neuroblastom: i.v. za doziranje konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:**DOXORUBICIN PLIVA 2 MG/ML - PLIVA HRVATSKA D.O.O.**

- ZU otopina za injekciju [2 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 25 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [2 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 5 ml otopine za injekciju, u kutiji

DOXORUBICIN SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [2 mg/1 mL] 1 bočica sa 25 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [2 mg/1 mL] 1 bočica sa 5 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

L01DB03**epirubicin**

Doziranje: karcinom dojke, karcinom jajnika, karcinom želuca, karcinom pluća, kolorektalni karcinom, maligni limfomi, leukemije, multipli mijelom: i.v. za doziranje

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

konsultovati literaturu proizvoda; *karcinom mokraćnog mjehura*: intravezikalno, za doziranje konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EPIRUBICIN SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

ZU	koncentrat za rastvor za injekciju/ infuziju [2 mg/1 mL] 1 bočica sa 25 mL koncentrata za rastvor za injekciju/ infuziju, u kutiji
ZU	koncentrat za rastvor za injekciju/ infuziju [2 mg/1 mL] 1 bočica sa 5 mL koncentrata za rastvor za injekciju/ infuziju, u kutiji

L01E INHIBITORI PROTEIN KINAZE **L01EA BCR-ABL inhibitori tirozin kinaze**

L01EA01 imatinib

Doziranje: *hronična faza hronične mijeloidne leukemije nakon neuspjeha sa interferonom alfa*, odrasli 400 mg jednom dnevno, povećati ukoliko je neophodno na maks. 800 mg dnevno (u 2 podijeljene doze); *za doziranje kod djece konsultovati literaturu proizvoda*; *ubrzana faza i blastna kriza hronične mijeloidne leukemije*: odrasli 600 mg jednom dnevno, po potrebi povećati na maks. 800 mg dnevno (u 2 podijeljene doze); *za doziranje kod djece konsultovati literaturu proizvoda*; *novodijagnostifikovana akutna limfoblastna leukemija*: odrasli 600 mg jednom dnevno; *za doziranje kod djece konsultovati literaturu proizvoda*; *c-kit (CD117)-pozitivan neresektabilni ili metastatski maligni gastro-inestinalni stromalni tumori (GIST)*; *dodatak terapiji nakon resekcije c-kit (CD117)-pozitivan GIST kod pacijenata sa značajnim rizikom od relapsa*; *mijelodisplastična/mijeloproliferativna bolest povezana sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta*: odrasli 400 mg jednom dnevno; *neresektabilni dermatofibrosarkom protuberans*; *rekurentni ili metastatski dermatofibrosarkom protuberans kod kojih nije moguća operacija*: odrasli 800 mg dnevno u 2 podijeljene doze; *uznapredovali hipereozinofilni sindrom i hronična eozinofilna leukemija*: odrasli 100-400 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IMATIS - DEVA HOLDING A.S.

ZU/Rp	filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 120 filmom obloženih tableta (12 PVC/Aclar//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
ZU/Rp	filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Aclar//Al blistera po 10 tableta) u kutiji

MEAXIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

ZU/Rp	filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 120 filmom obloženih tableta (12 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ZU/Rp	filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 120 filmom obloženih tableta (12 PVC/PE/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ZU/Rp	filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PE/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ZU/Rp	filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

PLIVATINIB - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZU/Rp	filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PE/PVdC/PE/ PVC - blistera po 10 tableta), u kutiji

L01EA02 dasatinib

Doziranje: *hronična faza hronične mijeloidne leukemije*: oralno, odrasli 100 mg jednom dnevno, zatim po potrebi povećati na 140 mg jednom dnevno, za podešavanje doze s obzirom na neželjena dejstva konsultovati literaturu proizvoda; *faza ubrzanja i blastna faza hronične mijeloidne leukemije (rezistentna ili intolerantna na prethodnu terapiju)*,

akutna limfoblastna leukemija (rezistentna ili intolerantna na prethodnu terapiju): oralno, odrasli, 140 mg jednom dnevno, zatim po potrebi povećati na 180 mg jednom dnevno, za podešavanje doze s obzirom na neželjena dejstva konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NODRIGA - ALKALOID AD SKOPJE

- ZU/Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 oPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- ZU/Rp film tableta [140 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 oPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- ZU/Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 oPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- ZU/Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 oPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
- ZU/Rp film tableta [70 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 oPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

L01EA03

nilotinib

Doziranje: novodijagnostifikovana Philadelphia hromozom-pozitivna hronična mijeloidna leukemija: oralno, odrasli 300 mg dva puta dnevno; hronična i ubrzana faza hronične mijeloidne leukemije s pozitivnim Philadelphia hromozomom kod odraslih pacijenata koji su otporni ili netolerantni na bar jednu prethodnu terapiju, uključujući imatinib: oralno, odrasli 400 mg dva puta dnevno; za podešavanje doze s obzirom na pojavu neželjenih efekata - konsultovati literaturu proizvoda; pedijatrijski pacijenti u hroničnoj fazi hronične mijeloidne leukemije sa pozitivnim Philadelphia hromozomom sa rezistencijom ili intolerancijom na prethodno liječenje uključujući imatinib: za doziranje konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NILOTINIB ZENTIVA - PHAROS MT LTD.

- ZU/Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 112 kapsula, tvrdih (4 kutije sa po 4 PVC/PE/PVdC/Alu blistera po 7 kapsula), u kutiji

NILOTINIB PHARMASCIENCE - PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED

- ZU/Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 112 kapsula, tvrdih (4 PVC/PE/PVdC/Alu blistera po 28 kapsula, tvrdih), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [200 mg/1 kapsula] 112 kapsula, tvrdih (4 PVC/PE/PVdC/Alu blistera po 28 kapsula, tvrdih), u kutiji

NILOTINIB STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG

- ZU/Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 112 kapsula, tvrdih (intermedijerno pakovanje sadrži 4 Al-OPA/Alu/PVC blistera po 7 kapsula, tvrdih (28 kapsula, tvrdih), spoljašnje, višestruko pakovanje sadrži 4 kutije intermedijernog pakovanja sa 28 kapsula, tvrdih (4x28))
- ZU/Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 112 kapsula, tvrdih (intermedijerno pakovanje sadrži 4 Al-PVC/PE/PVdC blistera po 7 kapsula, tvrdih (28 kapsula, tvrdih), spoljašnje, višestruko pakovanje sadrži 4 kutije intermedijernog pakovanja sa 28 kapsula, tvrdih (4x28))
- ZU/Rp kapsula, tvrda [200 mg/1 kapsula] 112 kapsula, tvrdih (intermedijerno pakovanje sadrži 4 Al-OPA/Alu/PVC blistera po 7 kapsula, tvrdih (28 kapsula, tvrdih), spoljašnje, višestruko pakovanje sadrži 4 kutije intermedijernog pakovanja sa 28 kapsula, tvrdih (4x28))

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

ZU/Rp	kapsula, tvrda [200 mg/1 kapsula] 112 kapsula, tvrdih (intermedijerno pakovanje sadrži 4 Al-PVC/PE/PVdC blistera po 7 kapsula, tvrdih (28 kapsula, tvrdih), spoljašnje, višestruko pakovanje sadrži 4 kutije intermedijernog pakovanja sa 28 kapsula, tvrdih (4x28))
ZU/Rp	kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 112 kapsula, tvrdih (intermedijerno pakovanje sadrži 4 Al-OPA/Alu/PVC blistera po 7 kapsula, tvrdih (28 kapsula, tvrdih), spoljašnje, višestruko pakovanje sadrži 4 kutije intermedijernog pakovanja sa 28 kapsula, tvrdih (4x28))
ZU/Rp	kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 112 kapsula, tvrdih (intermedijerno pakovanje sadrži 4 Al-PVC/PE/PVdC po 7 kapsula, tvrdih (28 kapsula, tvrdih), spoljašnje, višestruko pakovanje sadrži 4 kutije intermedijernog pakovanja sa 28 kapsula, tvrdih (4x28))
NILOTINIB TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.	
ZU/Rp	kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 112 kapsula, tvrdih (28 kapsula u 4 Al/PVC/PE/PVDC blistera po 7 kapsula u kutiji); 4 kutije po 28 kapsula upakovane u zbirnu kutiju.
ZU/Rp	kapsula, tvrda [200 mg/1 kapsula] 112 kapsula, tvrdih (28 kapsula u 4 Al/PVC/PE/PVDC blistera po 7 kapsula u kutiji); 4 kutije po 28 kapsula upakovane u zbirnu kutiju
NILOTINIB ZENTIVA - PHAROS MT LTD.	
ZU/Rp	kapsula, tvrda [200 mg/1 kapsula] 112 kapsula, tvrdih (4 kutije sa po 4 PVC/PE/PVdC/Alu blistera po 7 kapsula), u kutiji
NITINAB - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	
ZU/Rp	kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 112 kapsula, tvrdih (4 kutije sa po 4 PE-Al/Al blistera po 7 kapsula), u kutiji
ZU/Rp	kapsula, tvrda [200 mg/1 kapsula] 112 kapsula, tvrdih (4 kutije sa po 4 PE-Al/Al blistera po 7 kapsula), u kutiji
TASIGNA - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG	
ZU/Rp	kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 112 kapsula (4 kutije po 28 kapsula (7 PVC/PVDC/Al blistera po 4 kapsule)), u kutiji
ZU/Rp	kapsula, tvrda [200 mg/1 kapsula] 112 kapsula, tvrdih (28 kapsula u 2 PVC/PVdC//Al blistera po 14 kapsule, u kutiji); 4 kutije po 28 kapsula upakovane u zbirnu kutiju
ZU/Rp	kapsula, tvrda [200 mg/1 kapsula] 112 kapsula, tvrdih (28 kapsula u 7 PVC/PVdC//Al blistera po 4 kapsule, u kutiji); 4 kutije po 28 kapsula upakovane u zbirnu kutiju

L01EA04 bosutinib

Doziranje: *hronična mijeloidna leukemija:* oralno, odrasli, za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BOSULIF - PFIZER INC.

ZU/Rp	filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/poliklorotrifluoroeten/PVC blistera zatvorena folijom sa 14 filmom obloženih tableta), u kutiji
ZU/Rp	filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/poliklorotrifluoroeten/PVC blistera zatvorena folijom sa 14 filmom obloženih tableta), u kutiji
ZU/Rp	filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/poliklorotrifluoroeten/PVC blistera zatvorena folijom sa 14 filmom obloženih tableta), u kutiji

BOSUTINIB TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

- ZU/Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/Aclar-Al blistera sa 14 tableta) u kutiji
- ZU/Rp filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC /Aclar/Al blistera sa 14 tableta) u kutiji
- ZU/Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (PVC/Aclar/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

L01EA06 asciminib

Doziranje: *hronična mijeloidna leukemija:* oralno, odrasli 40 mg dva puta na dan u razmacima od 12 sati; za više informacija o doziranju, konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:**SCSEMBLIX - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG**

- ZU/Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 PCTFE/PVC/Alu blistera po 10 tableta) u kutiji
- ZU/Rp filmom obložena tableta [40 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 PCTFE/PVC/Alu blistera po 10 tableta) u kutiji

L01EB Inhibitori tirozin kinaze receptora epidermalnog faktora rasta (EGFR)**L01EB01 gefitinib**

Doziranje: terapija lokalno uznapredovalog ili metastatskog nemikrocelularnog karcinoma pluća sa aktiviranim mutacijama epidermalnog faktora rasta–EGFR kod odraslih: 250 mg jedanput dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**KATHESIN - LABORMED-PHARMA S.A.**

- ZU/Rp film tableta [250 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PE/PVDC-Al blistera sa zajedničkim zaštitnim omotom od slojevitih aluminijske folije PET/Al/PE sa po 10 tableta), u kutiji

SPIRTOS - STADA ARZNEIMITTEL AG

- ZU/Rp film tableta [250 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 oPA/Al/PVC aluminijumska blistera sa 10 tableta), u kutiji

L01EB02 erlotinib

Doziranje: prva linija liječenja lokalno uznapredovali/metastatski nesitnoćelijski karcinom pluća sa EGFR aktivirajućim mutacijama; lokalno uznapredovali/metastatski nesitnoćelijski karcinom pluća nakon neuspjeha prethodne hemoterapije; terapija održavanja (monoterapija) lokalno uznapredovalog ili metastatskog nesitnoćelijskog karcinoma pluća sa stabilnom bolešću nakon prve linije hemioterapije koja nije uključivala erlotinib: 150 mg jednom dnevno; metastatski karcinom gušterače: 100 mg jednom dnevno (u kombinaciji sa gemcitabinom).

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ERLOTINIB TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.**

- ZU/Rp film tableta [150 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ERTINO B - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

- ZU/Rp filmom obložena tableta [100 g/1 tableta] 30 film tableta (2 PCTFE-Vinyl Al/Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji
- ZU/Rp filmom obložena tableta [150 mg/1 tableta] 30 film tableta (2 PCTFE-Vinyl Al/Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji

FOKLEROS - ALKALOID AD SKOPJE

ZU/Rp	film tableta [100 mg/1 tableta] 30 film tableta (5 oPA/Al/PVC/Al blistera po 6 tableta), u kutiji
ZU/Rp	film tableta [150 mg/1 tableta] 30 film tableta (5 oPA/Al/PVC/Al blistera po 6 tableta), u kutiji

L01EB04 osimertinib

Doziranje: *rak pluća nemalih ćelija:* oralno, za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TAGRISSO - ASTRAZENECA AB

ZU/Rp	filmom obložena tableta [40 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/Al perforirana blistera s jediničnim dozama sa po 10 tableta), u kutiji
ZU/Rp	filmom obložena tableta [80 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/Al perforirana blistera s jediničnim dozama sa po 10 tableta), u kutiji

L01EC Inhibitori B-Raf serin-treonin kinaze (BRAF)

L01EC01 vemurafenib

Doziranje: *monoterapija u liječenju odraslih bolesnika s neoperabilnim ili metastatskim melanomom s pozitivnom mutacijom V600 gena BRAF:* odrasli preko 18 god. 960 mg dva puta dnevno, za prilagođavanje doze zbog neželjenih efekata, konsultovati literaturu proizvođa

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ZELBORAF - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

ZU/Rp	film tableta [240 mg/1 tableta] 56 film tableta (7 Al/Al blistera po 8 tableta) u kutiji

L01EC02 dabrafenib

Doziranje: monoterapija kod odraslih pacijenata sa inoperabilnim ili metastatskim melanomom s BRAF V600 mutacijom; adjuvantno liječenje melanoma (dabrafenib u kombinaciji s trametinibom je indikovano za adjuvantno liječenje odraslih pacijenata sa stadijumom III melanoma s BRAF V600 mutacijom, nakon kompletne resekcije), rak pluća nemalih ćelija: odrasli preko 18 god. 150 mg dva puta dnevno (na 12 sati)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TAFINLAR - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

ZU/Rp	kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (1 HDPE bočica), u kutiji
ZU/Rp	kapsula, tvrda [75 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (1 HDPE bočica), u kutiji

L01ED Inhibitori anaplastične limfom kinaze (ALK)

L01ED01 crizotinib

Doziranje: terapija nesitnoćelijskog karcinoma pluća pozitivnog na kinazu anaplastičnog limfoma (ALK); ROS1 pozitivni uznapredovali nesitnoćelijski karcinom pluća; anaplastični makorocelularni limfom kod pedijatrijskih pacijenata 6-18 god; inflamatorni miofibroblastni tumor kod pedijatrijskih pacijenata 6-18 god. 250 mg dva puta na dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

XALKORI - PFIZER INC.

- ZU/Rp kapsula, tvrda [200 mg/1 kapsula] 60 kapsula, tvrdih (6 PVC blistera po 10 kapsula), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 60 kapsula, tvrdih (6 PVC blistera po 10 kapsula), u kutiji

L01ED03 alektinib

Doziranje: *karcinom pluća nemalih ćelija*: 600 mg dva puta dnevno, za podešavanje doze s obzirom na neželjena dejstva konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ALECENSA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD**

- ZU/Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 224 kapsule, tvrde (4 kutije sa po 56 kapsula - jedna kutija sadrži 7 Aluminij/aluminij (PA/Alu/PVC/Alu) blistera sa po 8 kapsula), u kutiji

L01ED04 brigatinib

Doziranje: *uznapredovali nemikrocelularni karcinom pluća pozitivan na kinazu anaplastičnog limfoma (ALK)*: oralno, odrasli početna doza 90 mg jednom dnevno tokom 7 dana, zatim povećati na 180 mg jednom dnevno, za podešavanje doze s obzirom na neželjena dejstva konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ALUNBRIG - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG**

- ZU/Rp filmom obložena tableta [180 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 PCTFE blistera po 7 tableta od 180 mg), u kutiji
- ZU/Rp filmom obložena tableta [180 mg/1 tableta+ 90 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (1 PCTFE blister po 7 tableta od 90 mg i 3 PCTFE blistera po 7 tableta od 180 mg), u kutiji
- ZU/Rp filmom obložena tableta [30 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 PCTFE blistera sa po 7 tableta), u kutiji
- ZU/Rp filmom obložena tableta [90 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 PCTFE blistera sa po 7 tableta), u kutiji

L01ED05 lorlatinib

Doziranje: *anaplastični limfom kinaza pozitivni uznapredovali karcinom pluća ne-malih ćelija*: 100 mg dnevno, za podešavanje doze s obzirom na neželjena dejstva konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:**LORVIQUA - PFIZER INC.**

- ZU/Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
- ZU/Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 90 filmom obloženih tableta (9 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

L01EE Inhibitori aktivirane mitogen protein kinaze (MEK)**L01EE01 trametinib**

Doziranje: *Mekinist - neoperabilni ili metastatski melanom s BRAF V600 mutacijom* (kao monoterapija ili u kombinaciji s dabrafenibom), *adjuvantno liječenje melanoma* (u kombinaciji sa dabrafenibom je indikovano za adjuvantno liječenje odraslih bolesnika sa stadijumom III melanoma s BRAF V600 mutacijom, nakon kompletne resekcije, *rak pluća ne-malih ćelija s BRAF V600 mutacijom* (kao monoterapija ili u kombinaciji s dabrafenibom): oralno, 2 mg jednom dnevno;

Spexotras - *gliom*, oralno, pedijatrijska populacija u dobi od 1 god. i stariji, za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MEKINIST - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

ZU/Rp filmom obložena tableta [0,5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (1 HDPE bočica), u kutiji

ZU/Rp filmom obložena tableta [2 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (1 HDPE bočica), u kutiji

SPEXOTRAS - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

ZU/Rp prašak za oralni rastvor [0,05 mg/1 mL] 1 staklena bočica, 1 utisni nastavak za bočicu i 1 oralna šprica za doziranje za višekratnu primjenu, u kutiji

L01EE02 kobimetinib

Doziranje: neoperabilni ili metastatski melanom s mutacijom BRAF V600 (u kombinaciji sa vemurafenibom): 60 mg jednom dnevno tokom 21 uzastopnog dana, nakon čega slijedi 7-dnevna pauza (od 22.-28. dana ciklusa); za podešavanje doze s obzirom na neželjena dejstva konsultovati literaturu proizvođa

REGISTROVANI LIJEKOVI:

COTELLIC - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

ZU/Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 63 film tablete (3 PVC/PVDC blistera sa po 21 film tabletom), u kutiji

L01EE04 selumetinib

Doziranje: inoperabilni pleksiformni neurofibrom kod pedijatrijskih pacijenata s neurofibromatozom tipa 1 u dobi od 3 ili više godina: oralno, 25 mg/m² tjelesne površine, dva puta na dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KOSELUGO - ASTRAZENECA AB

ZU/Rp kapsula, tvrda [10 mg/1 kapsula] 1 plastična HDPE boca sa 60 kapsula, tvrdih, u kutiji

ZU/Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 1 plastična HDPE boca sa 60 kapsula, tvrdih, u kutiji

L01EF Inhibitori ciklin-zavisne kinaze (CDK)

L01EF01 palbociklib

Doziranje: lokalno uznapredovali ili metastatski rak dojke pozitivan na hormonski receptor (HR), negativan na receptor humanog epidermalnog faktora rasta 2 (HER2): u kombinaciji s inhibitorom aromataze, u kombinaciji s fulvestrantom kod žena koje su primile prethodnu endokrinu terapiju; kod žena u pre- i perimenopauzi endokrinu terapiju je potrebno kombinovati s agonistom hormona koji oslobađa luteinizirajući hormon (LHRH): 125 mg jednom dnevno tokom 21 uzastopnog dana nakon čega slijedi 7 dana pauze; promjena doze se vrši na osnovu pojedinačne podnošljivosti i sigurnosti

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IBRANCE - PFIZER INC.

ZU/Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 21 filmom obložena tableta (3 PVC/OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 7 tableta pojedinačno pakovani u kartonske omote u obliku novčanika), u kutiji

ZU/Rp filmom obložena tableta [125 mg/1 tableta] 21 filmom obložena tableta (3 PVC/OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 7 tableta pojedinačno pakovani u kartonske omote u obliku novčanika), u kutiji

ZU/Rp filmom obložena tableta [75 mg/1 tableta] 21 filmom obložena tableta (3 PVC/OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 7 tableta pojedinačno pakovani u kartonske omote u obliku novčanika), u kutiji

L01EF02 ribociklib

Doziranje: *karcinom dojke:* oralno, 600 mg dnevno tokom 21 uzastopnog dana, zatim 7 dana bez lijeka (28-dnevni ciklus), liječenje nastaviti dok ima koristi ili do nepodnošljive toksičnosti; za više informacija konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KISQALI - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

ZU/Rp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 21 filmom obložena tableta (1 PA/AL/PVC blister sa 21 tabletom), u kutiji

ZU/Rp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 63 filmom obložene tablete (3 PA/AL/PVC blistera sa po 21 tabletom), u kutiji

L01EF03 abemaciclib

Doziranje: *karcinom dojke:* oralno, za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VERZENIOS - ELI LILLY EXPORT S.A.

Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PCTFE/PE/PVC/Al blister sa po 14 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [150 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PCTFE/PE/PVC/Al blister sa po 14 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PCTFE/PE/PVC/Al blister sa po 14 tableta), u kutiji

L01EG Selektivni inhibitori mTOR (ciljni enzim za rapamicin kod sisara) kinaza

L01EG02 everolimus

Doziranje: neuroendokrini tumori pankreasnog porijekla, neuroendokrini tumori gastrointestinalnog ili plućnog porijekla, karcinom bubrežnih ćelija, hormon-receptor pozitivni HER2-negativni karcinom dojke: 10 mg jednom dnevno, za podešavanje doze s obzirom na neželjena dejstva konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EVEROLIMUS KRKA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

ZU/Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp tableta [2.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

EVEROLIMUS MYLAN - MYLAN GERMANY GMBH

ZU/Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (6 OPA/Al/PVC//Al blistera po 5 tableta), u kutiji

ZU/Rp tableta [2.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

SYRLENO - ALKALOID AD SKOPJE

ZU/Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (6 OPA/AL/PVC aluminijumska blistera po 5 tableta), u kutiji

ZU/Rp	tableta [2,5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/AL/PVC aluminijumska blistera po 10 tableta), u kutiji
ZU/Rp	tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/AL/PVC aluminijumska blistera po 10 tableta), u kutiji

L01EJ Inhibitori Janus kinaze (JAK)

L01EJ01 ruksolitinib

Doziranje: mijelofibroza, policitemija vera, bolest presatka protiv primatelja: oralno, za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

JAKAVI - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

ZU/Rp	tableta [10 mg/1 tableta] 56 tableta (4 PVC/PE/PVdC/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji
ZU/Rp	tableta [15 mg/1 tableta] 56 tableta (4 PVC/PE/PVdC/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji
ZU/Rp	tableta [20 mg/1 tableta] 56 tableta (4 PVC/PE/PVdC/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji
ZU/Rp	tableta [5 mg/1 tableta] 56 tableta (4 PVC/PE/PVdC/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji

L01EK Inhibitor tirozin kinaze receptora vaskularnog endotelnog faktora rasta (VEGFR)

L01EK01 aksitinib

Doziranje: karcinom bubrežnih ćelija: 5 mg dva puta dnevno, terapiju nastaviti dok postoji klinička korist ili do nepodnošljive toksičnosti; za više informacija o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AKSITINIB TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

ZU/Rp	filmom obložena tableta [1 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (8 OPA/Al/PVC/AL (Al/Al) blistera po 7 tableta), u kutiji
ZU/Rp	filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (8 OPA/AL/PVC/AL (Al/Al) blistera po 7 tableta), u kutiji

AXITINIB STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG

△ ZU/Rp	film tableta [1 mg/1 tableta] 56 film tableta (8 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
△ ZU/Rp	film tableta [3 mg/1 tableta] 56 film tableta (8 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
△ ZU/Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 56 film tableta (8 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
△ ZU/Rp	film tableta [7 mg/1 tableta] 56 film tableta (8 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji

INLYTA - PFIZER INC.

△ ZU/Rp	filmom obložena tableta [1 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 Al/Al blistera po 14 filmom obloženih tableta) u kutiji
△ ZU/Rp	filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 56 filmom obložena tableta (4 Al/Al blistera po 14 filmom obloženih tableta) u kutiji

L01EK04 frukvintinib

Doziranje: *kolorektalni karcinom*: oralno, 5 mg jednom dnevno u toku 21 uzastopnog dana, nakon čega slijedi 7 dana pauze; za prilagođavanje doze s obzirom na neželjena dejstva konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:**FRUZAQLA - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG**

- ZU/Rp kapsula, tvrda [1 mg/1 kapsula] 21 tvrda kapsula u 1 HDPE bočici, u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula] 21 tvrda kapsula u 1 HDPE bočici, u kutiji

L01EL Inhibitori Brutonove tirozin kinaze (BTK)**L01EL01 ibrutinib**

Doziranje: *limfom "mantle ćelija"*: oralno, odrasli 560 mg jednom dnevno, za podešavanje doze s obzirom na neželjena dejstva konsultovati literaturu proizvoda; *hronična limfocitna leukemija*; *Waldenströmova makroglobulinemija*: oralno, odrasli 420 mg jednom dnevno, za podešavanje doze s obzirom na neželjena dejstva konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:**IMBRUVICA - JANSSEN-CILAG KFT.**

- ZU/Rp kapsula, tvrda [140 mg/1 kapsula] 90 kapsula, tvrdih (1 plastična bočica), u kutiji

L01EL02 akalabrutinib

Doziranje: *hronična limfocitna leukemija*, *limfom plaštenih ćelija*: oralno, za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:**CALQUENCE - ASTRAZENECA AB**

- ZU/Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (7 Al/Al blistera sa po 8 tableta), u kutiji
- ZU/Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 Al/ Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

L01EM Inhibitori fosfatidilinozitol-3-kinaze (Pi3K)**L01EM03 alpelisib**

Doziranje: lokalno uznapredovali ili metastatski karcinom dojke (u kombinaciji sa fulvestrantom) za liječenje žena u post-menopauzi i muškaraca: oralno, odrasli, 300 mg jednom dnevno, za podešavanje doze, prekid liječenja ili prekid liječenja s obzirom na neželjena dejstva konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:**PIQRAY - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG**

- ZU/Rp filmom obložena tableta [150 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PCTFE/Alu blistera po 14 tableta), u kutiji
- ZU/Rp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PCTFE/Alu blistera po 14 tableta), u kutiji
- ZU/Rp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta: 28 tableta od 200 mg i 28 tableta od 50 mg (4 PVC/PCTFE/Alu blistera po 14 tableta: 1 blister sadrži 7 tableta od 200 mg i 7 tableta od 50 mg); u kutiji

L01EX Drugi inhibitori protein kinaze

L01EX01 sunitinib

Doziranje: uznapredovali/metastatski karcinom bubrežnih ćelija; neresektabilni/metastatski gastrointestinalni stromalni tumor poslije neuspjelog liječenja imatinibom: 50 mg jedanput dnevno tokom 4 sedmice (u ciklusu koji traje 6 sedmica); podešavati postepeno po 12,5 mg prema podnošljivosti, maks. dnevna doza 75 mg, a minimalna 25 mg; neresektabilni/metastatski pankreasni neuroendokrini tumor: 37,5 mg jednom dnevno, bez režima perioda odmora; dozu povećavati postepeno po 12,5 mg na osnovu individualne bezbjednosti i podnošljivosti; maks. doza 50 mg dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FASINDOR - ALKALOID AD SKOPJE

- ZU/Rp kapsula, tvrda [12,5 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 OPA/Al/PE/Al peel off blistera po 7 kapsula), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 OPA/Al/PE/Al peel off blistera po 7 tableta), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 OPA/Al/PE/Al peel off blistera po 7 tableta), u kutiji

MISVENOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- ZU/Rp kapsula, tvrda [12,5 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (2 PVC/PCTFE/Al blistera po 14 kapsula), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (2 PVC/PCTFE/Al blistera po 14 kapsula), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (2 PVC/PCTFE/Al blistera po 14 kapsula), u kutiji

SUNICOR - SYNTHON B.V.

- ZU/Rp kapsula, tvrda [12,5 mg/1 kapsula] 28 kapsula tvrdih (4 oPA/Al/PE/Al blister sa po 7 kapsula),u kutiji.
- ZU/Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 28 kapsula tvrdih (4 oPA/Al/PE/Al blister sa po 7 kapsula),u kutiji.
- ZU/Rp kapsula, tvrda [37,5 mg/1 kapsula] 28 kapsula tvrdih (4 oPA/Al/PE/Al blister sa po 7 kapsula),u kutiji.
- ZU/Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 28 kapsula tvrdih (4 oPA/Al/PE/Al blister sa po 7 kapsula),u kutiji.

SUNIGEN - GENEPHARM S.A.

- ZU/Rp kapsula, tvrda [12,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih u HDPE bočici, u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih u HDPE bočici, u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih u HDPE bočici, u kutiji

SUNITINIB MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED

- ZU/Rp kapsula, tvrda [12,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PCTFE-Alu blistera po 10 kapsula, tvrdih), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PCTFE-Alu blistera po 10 kapsula, tvrdih), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PCTFE-Alu blistera po 10 kapsula, tvrdih), u kutiji

SUNITINIB PHARMASCIENCE - PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED

- ZU/Rp kapsula, tvrda [12,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih u HDPE bočici, u kutiji

- ZU/Rp kapsula, tvrda [12,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih u jednom PVC-PVAC (PVC/PCTFE)/Al blisteru, u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih u HDPE bočici, u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih u 1 PVC-PVAC (PVC/PCTFE)/Al blisteru, u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih u HDPE bočici, u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih u jednom PVC-PVDC/Al blisteru, u kutiji

SUNITINIB PLIVA - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- ZU/Rp kapsula, tvrda [12,5 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 PVC/Aclar/PVC/Al blistera sa po 7 kapsula), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 PVC/Aclar/PVC/Al blistera sa po 7 kapsula), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 PVC/Aclar/PVC/Al blistera sa po 7 kapsula), u kutiji

SUNITINIB STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG

- ZU/Rp kapsula, tvrda [37,5 mg/1 kapsula] 28 kapsula (7 Al-OPA/Alu/PVC blistera sa 4 kapsule), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 28 kapsula (7 Al-OPA/Alu/PVC blistera sa 4 kapsule), u kutiji

SUNUBIS - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

- ZU/Rp kapsula, tvrda [12,5 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 14 kapsula, tvrdih), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 14 kapsula, tvrdih), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 14 kapsula, tvrdih (1 PVC/PE/PVDC-Al blister), u kutiji

SUTENT - PFIZER INC.

- ZU/Rp kapsula, tvrda [12,5 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 Al/PVC/Aclar - blistera po 7 kapsula), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 Al/PVC/Aclar - blistera po 7 kapsula), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4 Al/PVC/Aclar - blistera po 7 kapsula), u kutiji

L01EX02**sorafenib**

Doziranje: terapija uznapredovalog karcinoma bubrežnih ćelija kada terapija interferonom-alfa ili interleukinom-2 nije bila uspješna ili kada takva terapija nije primjerena; progresivni, lokalno uznapredovali, ili metastatski, diferencirani karcinom štitaste žlijezde, koji je refraktoran na radioaktivni jod; terapija hepatocelularnog karcinoma: oralno, odrasli, 400 mg dva puta dnevno, za podešavanje doze s obzirom na neželjena dejstva, konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:**SALTAPSA - GALENIKA A.D. BEOGRAD**

- ZU/Rp film tableta [200 mg/1 tableta] 112 film tableta (8 blistera sa po 14 tableta) u kutiji

SLAM - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

- ZU/Rp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 112 filmom obloženih tableta (8 OPA/Al/PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

SORAFENIB SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

ZU/Rp	filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 112 filmom obloženih tableta (4 ALU/OPA/ALU/PVC blistera po 28 tbl) u kartonskoj kutiji
ZU/Rp	filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 112 filmom obloženih tableta(4 ALU/PVC/PE/PVDC blistera po 28 tbl.) u kartonskoj kutiji
SORAFENIB STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG	
ZU/Rp	film tableta [200 mg/1 tableta] 112 film tableta (4 AL-PVC/PE/PVDC blistera sa po 28 tableta),u kutiji
ZU/Rp	film tableta [400 mg/1 tableta] 56 film tableta (8 AL-OPA/ALU/PVC blistera sa po 7 tableta), u kutiji
SORAFENIB TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.	
ZU/Rp	filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 112 filmom obloženih tableta (8 PVC/Aclar/PVC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
SORAGEN - GENEPHARM S.A.	
ZU/Rp	film tableta [200 mg/1 tableta] 112 film tableta (4 Al/Al blistera sa po 28 tableta), u kutiji

L01EX03 pazopanib

Doziranje: *karcinom bubrežnih ćelija; sarkom mekih tkiva:* odrasli preko 18 god, 800 mg jednom dnevno; dozu podešavati u postepenim koracima po 200 mg prema individualnoj podnošljivosti (maks. 800 mg dnevno).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FRONTIENT - PHARMACARE PREMIUM LTD.

ZU/Rp	filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta u HDPE bočici, u kutiji
ZU/Rp	filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta u HDPE bočici, u kutiji

LIBURADONE - PHARMACARE PREMIUM LTD.

ZU/Rp	film tableta [200 mg/1 tableta] 30 film tableta (HDPE bočica sa polipropilenskim bijelim sigurnosnim zatvaračem) u kutiji
ZU/Rp	film tableta [400 mg/1 tableta] 60 film tableta (HDPE bočica sa polipropilenskim bijelim sigurnosnim zatvaračem) u kutiji

PAZOPANIB PHARMASCIENCE - PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED

ZU/Rp	filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Aluminijum-PVC/PE/PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
ZU/Rp	filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta u HDPE bočici sa polipropilenskim zatvaračem, u kutiji
ZU/Rp	filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta u HDPE boci sa polipropilenskim zatvaračem, u kutiji
ZU/Rp	filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Aluminijum-PVC/PE/PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
ZU/Rp	filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 60 film tableta u HDPE boci sa polipropilenskim zatvaračem, u kutiji

PAZOPANIB STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG

ZU/Rp	film tableta [200 mg/1 tableta] 3 Aluminijum-PVC/PE/PVDC blistera sa po 10 film tableta, u kutiji.
ZU/Rp	film tableta [400 mg/1 tableta] 6 Aluminijum-PVC/PE/PVDC blistera sa po 10 film tableta, u kutiji.

PAZOPANIB TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

ZU/Rp	filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/PVC/PE/PVDC blister sa 10 tableta),u kutiji
ZU/Rp	filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/PVC/PE/PVDC blister sa 10 tableta),u kutiji

PAZOPANIB ZENTIVA - PHAROS MT LTD.

- ZU/Rp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta, u bijeloj HDPE bočici, u kutiji
- ZU/Rp filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta u bijeloj HDPE bočici, u kutiji

VOTRIENT - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

- ZU/Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (1 HDPE bočica), u kutiji

L01EX09 nintedanib

Doziranje: Nintedanib Pliva - *karcinom pluća ne-malih ćelija*: oralno, za doziranje konsultovati informacije o lijeku; *idiopatska plućna fibroza*; *hronične fibrozirajuće intersticijske bolesti pluća s progresivnim fenotipom kod odraslih osoba*; *intersticijska bolest pluća u sistemskoj sklerozi*: oralno, 150 mg 2 puta dnevno u slučaju nepodnošenja smanjiti na 100 mg 2 puta dnevno, za podešavanje doze s obzirom na neželjena dejstva konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:**NINTEDANIB ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O**

- ZU/Rp kapsula, meka [100 mg/1 kapsula] 60 kapsula, mekih (6 Alu/Alu blistera sa po 10 kapsula), u kutiji.

NINTEDANIB ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O.

- ZU/Rp kapsula, meka [100 mg/1 kapsula] 60 kapsula, mekih (6 Alu/Alu križno perforiranih blistera sa po 10 kapsula), u kutiji.
- ZU/Rp kapsula, meka [150 mg/1 kapsula] 60 kapsula, mekih (6 Alu/Alu blistera sa po 10 kapsula), u kutiji.
- ZU/Rp kapsula, meka [150 mg/1 kapsula] 60 kapsula, mekih (6 Alu/Alu križno perforiranih blistera sa po 10 kapsula), u kutiji.

NINTEDANIB PLIVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

- ZU/Rp kapsula, meka [100 mg/1 kapsula] 120 kapsula, mekih (12 OPA/AL/PVC/Al blistera po 10 kapsula, mekih), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, meka [150 mg/1 kapsula] 60 kapsula, mekih (6 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 kapsula, mekih), u kutiji

NINTEDANIB TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

- ZU/Rp kapsula, meka [100 mg/1 kapsula] 60 kapsula, mekih (6 OPA/AL/PVC/Al perforiranih blistera po 10 kapsula, mekih), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, meka [150 mg/1 kapsula] 60 kapsula, mekih (6 OPA/Al/PVC/Al perforiranih blistera po 10 kapsula, mekih), u kutiji

L01EX14 entrectinib

Doziranje: *solidni tumori, rak pluća nemalih ćelija*: oralno, za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ROZLYTREK - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD**

- ZU/Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih u bočici, u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [200 mg/1 kapsula] 90 kapsula, tvrdih u bočici, u kutiji

L01EX27 kapivasertib

Doziranje: *karcinom dojke*: oralno, za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:**TRUQAP - ASTRAZENECA AB**

ZU/Rp	filmom obložena tableta [160 mg/1 tableta] 64 filmom obloženih tableta (4 Aluminij/aluminijska blistera sa 16 tableta), u kutiji.
ZU/Rp	filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 64 filmom obloženih tableta (4 Aluminij/aluminijska blistera sa 16 tableta), u kutiji.

L01F *Monoklonska antitijela i antitijelo lijek konjugat* **L01FA** *CD20 (Clusters of Differentiation 20) inhibitori*

L01FA01 *rituksimab*

Doziranje: folikularni non-Hodgkins limfom, difuzni non-Hodgkins limfom, hronična limfocitna leukemija, granulomatoza s poliangitisom i mikroskopski poliangitis: i.v. inf. odrasli, pacijenti trebaju primiti premedikaciju prije svake doze (konsultovati literaturu proizvoda za detalje); non-Hodgkins limfom: s.c. inj. konsultovati literaturu proizvoda; teški oblik aktivnog reumatoidnog artritisa kod pacijenata koji nisu adekvatno odgovorili na druge antireumatske lijekove koji modifikuju tok bolesti, uključujući jedan ili više inhibitora faktora nekroze tumora, ili ih ne podnose (u kombinaciji sa metotreksatom): i.v.inf. 1 g dana 1. i 15. u kombinaciji sa metotreksatom (pacijent treba primiti premedikaciju prije svake infuzije); za doziranje i način davanja konsultovati literaturu proizvoda; obični pemfigus: i.v. inf. 1 g dana 1. i 15, doza održavanja 0,5 g u 12. i 18. mjesecu, a zatim svakih 6 mjeseci ako je potrebno, konsultovati literaturu proizvoda za terapiju relapsa

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MABTHERA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

ZU	koncentrat za rastvor za infuziju [100 mg/10 mL] 2 staklene bočice sa po 10 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ZU	koncentrat za rastvor za infuziju [500 mg/50 mL] 1 staklena bočica sa po 50 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ZU	rastvor za injekciju [1400 mg/11.7 mL] jedna staklena bočica sa 11,7 ml rastvora za injekciju (sa gumenim čepom, aluminijskim zaštitnim zatvaračem, plastičnim flip-off poklopcem); u kutiji

RITUXIMAB BIOCAD - ANABION SERVICES AND SOLUTIONS FZ-LLC

ZU	Koncentrat za otopinu za infuziju [10 mg/1 mL] 1 staklena bočica od 50 ml sa koncentratom za rastvor za infuziju, u kutiji
ZU	Koncentrat za otopinu za infuziju [10 mg/1 mL] 2 staklene bočice od 10 ml sa koncentratom za rastvor za infuziju, u kutiji

RIXATHON - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

ZU	koncentrat za rastvor za infuziju [100 mg/1 bočica] 2 staklene bočice od 10 ml sa po 100 mg rituksimaba, u kutiji
ZU	koncentrat za rastvor za infuziju [100 mg/1 bočica] 3 staklene bočice od 10 ml sa po 100 mg rituksimaba, u kutiji
ZU	koncentrat za rastvor za infuziju [500 mg/1 bočica] 1 staklena bočica od 50 ml sa 500 mg rituksimaba, u kutiji
ZU	koncentrat za rastvor za infuziju [500 mg/1 bočica] 2 staklene bočice od 50 ml sa po 500 mg rituksimaba, u kutiji

RUXIENCE - PFIZER INC.

ZU	koncentrat za rastvor za infuziju [100 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa 10 ml koncentrata, u kutiji
ZU	koncentrat za rastvor za infuziju [500 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa 50 ml koncentrata, u kutiji

TRUXIMA - CELLTRION INC.

ZU	Koncentrat za otopinu za infuziju [100 mg/10 mL] 2 bočice od 10 ml, u kutiji

ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [500 mg/50 mL] 1 bočica od 50 mL, u kutiji

L01FA03 obinutuzumab

Doziranje: liječenje odraslih bolesnika s prethodno neliječenom hroničnom limfocitnom leukemijom (CLL) i komorbiditetima, zbog kojih kod njih nije prikladna terapija temeljena na punoj dozi fludarabina; prethodno neliječeni uznapredovali folikularni limfom; u kombinaciji sa bendamustinom, nakon čega slijedi terapija održavanja lijekom Gazyva kod pacijenata sa folikularnim limfomom koji nisu odgovorili na terapiju ili koji su doživjeli regresiju u periodu do 6 mjeseci nakon terapije rituksimabom ili protokolom koji sadrži rituksimab: i.v.inf. za doziranje konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GAZYVA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [1000 mg/1 bočica] 1 bočica sa 40 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

L01FC CD38 (Klasteri diferencijacije 38) inhibitori

L01FC01 daratumumab

Doziranje: terapija relapsnog i refraktarnog multiplog mijeloma (kao monoterapija nakon neuspjeha terapije koja je uključivala inhibitor proteasoma i imunomodulator; u kombinaciji sa lenalidomidom i deksametazonom, ili bortezomibom i deksametazonom za terapiju odraslih pacijenata sa multiplim mijelomom, koji su prethodno primili najmanje jednu terapiju): 4-nedjeljni ciklus-16 mg/kg jednom nedjeljno od 1. do 8. nedjelje, zatim 16 mg/kg svake dvije nedjelje od 9. do 24. nedjelje, zatim 16 mg/kg svake četiri nedjelje nakon 25. nedjelje do regresije bolesti, za podešavanje doze zbog neželjenih dejstava i reakcije povezane sa infuzijom-konsultovati literaturu proizvođača; 3-nedjeljni ciklus- 16 mg/kg jednom nedjeljno od 1. do 9. nedjelje, zatim 16 mg/kg svake tri nedjelje od 10. do 24. nedjelje, zatim 16 mg/kg svake 4 nedjelje nakon 25. nedjelje do regresije bolesti, za podešavanje doze zbog neželjenih dejstava i reakcije povezane sa infuzijom-konsultovati literaturu proizvođača; u kombinaciji sa bortezomibom, melfalanom i prednizonom za terapiju odraslih pacijenata sa novodijagnostifikovanim multiplim mijelomom koji nisu podobni za presađivanje autolognih matičnih ćelija: 16 mg/kg jednom nedjeljno od 1. do 6. nedjelje, zatim 16 mg/kg svake tri nedjelje od 7. do 54. nedjelje, zatim 16 mg/kg svake četiri nedjelje nakon 55. nedjelje do regresije bolesti, za podešavanje doze zbog neželjenih dejstava i reakcije povezane sa infuzijom-konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DARZALEX - JANSSEN-CILAG KFT.

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [100 mg/5 mL] 1 staklena bočica od 5 mL, u kutiji

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [400 mg/20 mL] 1 staklena bočica od 20 mL, u kutiji

L01FD HER2 (Receptor humanog epidermalnog faktora rasta 2) inhibitori

L01FD01 trastuzumab

Doziranje: metastatski karcinom dojke: trosedmični raspored primjene-inicijalna doza je 8 mg/kg; doza održavanja 6 mg/kg u intervalima od 3 sedmice; sedmični raspored primjene-inicijalna doza je 4 mg/kg tokom 90 minuta; doza održavanja je 2 mg/kg tokom 90 minuta sedmično do regresije bolesti; rani karcinom dojke HER2 pozitivan:

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

trosedmični raspored primjene-inicijalna doza 8 mg/kg; doza održavanja 6 mg/kg u intervalima od 3 sedmice; sedmični raspored primjene-inicijalna doza je 4 mg/kg tokom 90 minuta; doza održavanja je 2 mg/kg tokom 90 minuta sedmično; *metastatski karcinom želuca*: inicijalna doza je 8 mg/kg, nakon 3 sedmice nastavlja se sa dozom održavanja 6 mg/kg svake 3 sedmice.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HERCEPTIN - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

- ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [150 mg/1 viala] 1 staklena bočica sa praškom za koncentrat za rastvor za infuziju od 150 mg, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju [600 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

HERZUMA - CELLTRION INC.

- ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [150 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom za koncentrat za rastvor za infuziju, u kutiji
- ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [420 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom za koncentrat za rastvor za infuziju, u kutiji

KANJINTI - AMGEN (EUROPE) GMBH

- ZU prašak za koncentrat za otopinu za infuziju [150 mg/1 bočica] 1 bočica sa 150 mg praška za koncentrat za otopinu za infuziju, u kutiji
- ZU prašak za koncentrat za otopinu za infuziju [420 mg/1 bočica] 1 bočica sa 420 mg praška za koncentrat za otopinu za infuziju, u kutiji

OGIVRI - BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED

- ZU prašak za koncentrat za otopinu za infuziju [150 mg/1 bočica] 1 staklena bočica od 15 ml, u kutiji

TRAZIMERA - PFIZER INC.

- ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [150 mg/1 bočica] 1 staklena bočica od 15 ml izrađena od bezbojnog stakla tip I sa butil gumenim zatvaračem, u kutiji
- ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [420 mg/1 bočica] 1 staklena bočica od 30 ml izrađena od bezbojnog stakla tip I sa butil gumenim zatvaračem, u kutiji

ZERCEPAC - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O

- ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [150 mg/1 bočica] 1 staklena bočica, u kutiji

L01FD02 pertuzumab

Doziranje: rani rak dojke-u kombinaciji s trastuzumabom i hemoterapijom (neoadjuvantno liječenje odraslih pacijenata s HER2 pozitivnim, lokalno uznapredovalim, upalnim rakom dojke ili rakom dojke u ranom stadijumu s velikim rizikom od recidiva; adjuvantno liječenje odraslih pacijenata s HER2 pozitivnim ranim rakom dojke s velikim rizikom od recidiva); *metastatski rak dojke*-u kombinaciji s trastuzumabom i docetakselom u odraslih pacijenata s HER2 pozitivnim metastatskim ili lokalno recidivirajućim neresektabilnim rakom dojke koji prethodno nisu primali anti-HER2 terapiju ni hemoterapiju za liječenje metastatske bolesti: i.v. inf. početna doza 840 mg, zatim svake 3 nedjelje doza održavanja 420 mg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PERJETA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [420 mg/14 mL] 1 staklena bočica sa 14 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kutiji

L01FD03 trastuzumab emtanzin

Doziranje: *HER2 pozitivni karcinom dojke, HER2 pozitivni rani karcinom dojke:* i.v. inf. odrasli, konsultovati literaturu proizvoda ili lokalne protokole

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KADCYLA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

- ZU prašak za koncentrat za otopinu za infuziju [100 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za koncentrat za otopinu za infuziju, u kutiji
- ZU prašak za koncentrat za otopinu za infuziju [160 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za koncentrat za otopinu za infuziju, u kutiji

L01FE EGFR (Receptor epidermalnog faktora rasta) inhibitori

L01FE01 cetuksimab

Doziranje: wilde-type RAS metastatskog kolorektalnog karcinoma koji ekspirira receptor za epidermalni faktor rasta, u kombinaciji sa irinotekan-baziranom hemoterapijom, u prvoj liniji u kombinaciji sa FOLFOX, kao monoterapija ukoliko terapija oksaliplatinom i irinotekanom bila neuspješna ili ukoliko se irinotekan ne toleriše; skvamozni karcinom čelija glave i vrata, u kombinaciji sa radijacionom terapijom lokalono uznapredovale bolesti, u kombinaciji sa platina-baziranom hemioterapijom za rekurentna i/ili metastatska oboljenja: jednom sedmično, početna doza 400 mg/m², a zatim 250 mg/m² sedmično

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ERBITUX - MERCK HEALTHCARE KGAA

- ZU rastvor za infuziju [5 mg/1 mL] 20 ml rastvora za infuziju (1 staklena bočica) u kutiji

L01FE02 panitumumab

Doziranje: metastatski kolorektalnim karcinomom (mCRC) sa divljim tipom RAS gena: kao prva linija terapije u kombinaciji sa FOLFOX ili FOLFIRI; kao druga linija terapije u kombinaciji sa FOLFIRI kod pacijenata koji su kao prvu liniju terapije primili hemoterapiju fluoropirimidinima (osim irinotekana); kao monoterapija, a nakon prethodne progresije bolesti na primjenjenu hemoterapiju fluoropirimidinima, oksaliplatinom i irinotekanom: 6 mg/kg tjelesne mase jednom u dvije sedmice (prema uputstvu datom u literaturi proizvoda i važećim protokolima)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VECTIBX - AMGEN (EUROPE) GMBH

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [20 mg/1 mL] staklena bočica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

L01FF PD-1/PDL-1 (Programirani protein ćelijske smrti 1) inhibitori

L01FF01 nivolumab

Doziranje: melanom, rak pluća nemalih stanica, maligni pleuralni mezotelijum, karcinom bubrežnih ćelija, uroteljelni karcinom, kolorektalni karcinom, planocelularni karcinom glave i vrata, planocelularni karcinom jednjaka, klasični Hodgkinov limfom, gastrointestinalni karcinom, hepatocelularni karcinom: i.v. inf. odrasli, za doziranje konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OPDIVO - BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [10 mg/1 mL] 1 bočica sa 10 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [10 mg/1 mL] 1 bočica sa 24 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [10 mg/1 mL] 1 bočica sa 4 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

L01FF02 pembrolizumab

Doziranje: melanom, karcinom pluća nemalih ćelija, maligni pleuralni mezoteliom, urotelijalni karcinom, klasični Hodgkin limfom, karcinom skvamoznih ćelija glave i vrata, uznapredovali karcinom bubrežnih ćelija, kolorektalni karcinom, karcinom jednjaka, trostruko negativni karcinom dojke, karcinom endometrijuma, karcinom grlića materice, adenokarcinom želuca ili gastroezofagusnog spoja, karcinom žučnog mjehura i vodova: i.v. infuzija, odrasli 200 mg svake 3 nedjelje, alternativno 400 mg svakih 6 nedjelja, za podešavanje doze prema neželjenim dejstvima ili prema rekcijama na infuziju - konsultovati literaturu proizvođa

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KEYTRUDA - MERCK SHARP & DOHME BV

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [25 mg/1 mL] 1 staklena bočica od 10 ml sa 4 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

L01FF03 durvalumab

Doziranje: karcinom pluća nemalih ćelija, karcinom pluća malih ćelija, karcinom bilijarnog trakta, hepatocelularni karcinom, karcinom endometrijuma: i.v. odrasli, za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IMFINZI - ASTRAZENECA AB

- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [50 mg/1 mL] 1 staklena bočica (staklo tip I) sa 10 mL koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [50 mg/1 mL] 1 staklena bočica (staklo tip I) sa 2,4 mL koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

L01FF04 avelumab

Doziranje: karcinom Merkelovih ćelija, karcinom bubrežnih ćelija, urotelijalni karcinom: i.v. inf. za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BAVENCIO - MERCK HEALTHCARE KGAA

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [20 mg/1 mL] Bočica od 10 ml (staklo tipa I) sa čepom od halobutil gume, u kutiji

L01FF05 atezolizumab

Doziranje: urotelijalni karcinom, rak pluća nemalih ćelija, rak pluća malih ćelija, rak dojke, hepatocelularni karcinom: i.v.inf. (koncentrat za rastvor za infuziju)/s.c. (rastvor za injekciju), odrasli, za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TECENTRIQ - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [60 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 14 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [60 mg/1 mL] jedna staklena bočica sa 20 ml koncentrata za otopinu za infuziju u kutiji

ZU otopina za injekciju [125 mg/1 mL] 1 staklena bočica od 15 mL, u kutiji

L01FF11 sugemalimab

Doziranje: *karcinom pluća nemalih ćelija:* i.v. za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CEJEMLY - MANUFACTURING PACKAGING FARMACA (MPF) B.V.

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [600 mg/1 bočica] 2

L01FG VEGF/VEGFR (Vaskularni endotelni faktor rasta) inhibitori

L01FG01 bevacizumab

Doziranje: *metastatski karcinom debelog crijeva ili rektuma:* 5 mg/kg ili 10 mg/kg svake 2 sedmice ili 7,5 mg/kg ili 15 mg/kg svake 3 sedmice; *metastatski karcinom dojke:* 10 mg/kg svake 2 sedmice ili 15 mg/kg svake 3 sedmice; *uznapredovali/metastatski ili rekurentni nesitnoćelijski karcinom pluća:* 7,5 mg/kg ili 15 mg/kg svake 3 sedmice; *uznapredovali/metastatski karcinom bubrežnih ćelija:* 10 mg/kg svake 2 sedmice; *epitelni karcinom jajnika, karcinom jajovoda i primarni karcinom peritoneuma:* 15 mg/kg svake 3 sedmice; *prvi recidiv epitelnog karcinoma jajnika, karcinoma jajovoda ili primarnog peritonealnog karcinoma:* 15 mg/kg svake 3 sedmice; *karcinom grlića materice:* 15 mg/kg svake 3 sedmice

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ABEVMY - BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED

ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [25 mg/1 mL] 1 bočica sa 16 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [25 mg/1 mL] 1 bočica sa 4 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

ALYMSYS - GH GENHELIX S.A.

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [25 mg/1 mL] 1 bočica sa 16 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [25 mg/1 mL] 1 bočica sa 4 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

AVASTIN - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

ZU koncentrat otopine za infuziju [100 mg/4 mL] 1 staklena bočica sa 4 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

ZU koncentrat otopine za infuziju [400 mg/16 mL] 1 staklena bočica sa 16 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

OYAVAS - STADA ARZNEIMITTEL AG

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [25 mg/1 mL] 1 bočica od 4 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [25 mg/1 mL] 1 bočica sa 16 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

VEGZELMA - CELLTRION INC.

ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [25 mg/1 mL] 1 bočica sa 16 mL koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [25 mg/1 mL] 1 bočica sa 4 mL koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

ZIRABEV - PFIZER INC.

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [25 mg/1 mL] 1 bočica sa 16 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU	koncentrat za rastvor za infuziju [25 mg/1 mL] 1 bočica sa 4 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

L01FX ***Ostala monoklonska antitijela i antitijelo lijek konjugati***

L01FX04 **ipilimumab**

Doziranje: melanom, karcinom bubrežnih ćelija, rak pluća nemalih ćelija, maligni pleuralni mezotelijum, kolorektalni karcinom s nedostatkom mehanizma popravka pogrešno sparenih baza ili visokom mikrosatelitskom stabilnošću, planocelularni karcinom jednjaka, hepatocelularni karcinom: i.v.inf. za doziranje konsultovati informacije o proizvodu

REGISTROVANI LIJEKOVI:

YERVOY - BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

ZU	Koncentrat za otopinu za infuziju [5 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 10 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

L01FX05 **brentuksimab vedotin**

Doziranje: CD30 pozitivan Hodgkinovog limfom; sistemski anaplastični limfom velikih ćelija; CD 30 pozitivan limfom kožnih T-ćelija: i.v. inf. za informacije o doziranju konsultovati literaturu proizvoda;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ADCETRIS - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG

ZU	prašak za koncentrat za otopinu za infuziju [50 mg/1 viala] 1 staklena bočica sa 50 mg praška za koncentrat za otopinu za infuziju, u kutiji

L01FX14 **polatuzumab vedotin**

Doziranje: difuzni limfom velikih B ćelija: i.v. inf. za doziranje konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:

POLIVY - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

ZU	prašak za koncentrat za otopinu za infuziju [140 mg/1 bočica] 1 staklena bočica (Tip I od borosilikatnog stakla) od 20 ml sa praškom, u kutiji
ZU	prašak za koncentrat za otopinu za infuziju [30 mg/1 bočica] 1 staklena bočica od 6ml sa 30 mg praška, u kutiji

L01FX25 **mosunetuzumab**

Doziranje: folikularni limfom: i.v.inf. za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LUNSUMIO - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

ZU	Koncentrat za otopinu za infuziju [1 mg/1 mL] 1 staklena bočica (staklo tip I) po 50 mL koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
ZU	Koncentrat za otopinu za infuziju [1 mg/1 mL] 1 staklena bočica (staklo tipa I) po 2 mL koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

L01FX28 **glofitamab**

Doziranje: difuzni B-velikoćelijski limfom: i.v.inf. za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

COLUMVI - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [10 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa 10 mL koncentrata za otopinu za infuziju u bočici od 15 mL, u kutiji
- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [2,5 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa 2,5 mL koncentrata za otopinu za infuziju u bočici od 6 mL, u kutiji

L01FX32 elranatamab

Doziranje: *multipli mijelom:* s.c. za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku
REGISTROVANI LIJEKOVI:

ELREXFIO - PFIZER INC.

- ZU rastvor za injekciju [40 mg/1 mL] 1 bočica, u kutiji

L01FY01 pertuzumab, trastuzumab

Doziranje: HER2-pozitivan karcinom dojke u ranom stadijumu (u kombinaciji sa hemoterapijom), HER2-pozitivan metastatski ili lokalno recidivirajući neresektibilan rak dojke (u kombinaciji sa docetkselom): odrasli, za doziranje konsultovati literaturu proizvoda ili lokalne protokole

REGISTROVANI LIJEKOVI:**PHESGO - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD**

- ZU/Rp otopina za injekciju [1200 mg/15 mL + 600 mg/15 mL] 1 staklena bočica sa 15 mL otopine za injekciju, u kutiji
- ZU/Rp otopina za injekciju [600 mg/10 mL + 600 mg/10 mL] 1 staklena bočica sa 10 mL otopine za injekciju, u kutiji

L01X Ostali antineoplastici
L01XA Jedinjenja platine

L01XA01 cisplatin

Doziranje: koristi se u liječenju različitih vrsta karcinoma (testisa, jajnika, pluća, mokraćne bešike, skvamoznih ćelija glave i vrata, cerviksa): i.v.inf. 50-120 mg/m²/dan svakih 3-4 nedjelje ili spora i.v. inf. 15-20 mg/m²/dan tokom 5 dana svake 3-4 nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:**CISPLATIN SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.**

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [0.5 mg/1 mL] 1 bočica sa 100 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [0.5 mg/1 mL] 1 bočica sa 20 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

CISPLATINUM ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O

- ZU/Rp koncentrat za rastvor za infuziju [1 mg/1 mL] Bočica staklena; 1 x 10 mL u kutiji
- ZU/Rp koncentrat za rastvor za infuziju [1 mg/1 mL] Bočica staklena; 1 x 50 mL, u kutiji 50mg cisplatina

L01XA02 karboplatin

Doziranje: *uznapredovali karcinom jajnika; mikrocelularni karcinom pluća; epidermoidni karcinom glave i vrata:* i.v. 400 mg/m²/dan svake 4 sedmice u zavisnosti od hemioterapijskog protokola i bubrežne funkcije.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**CARBONATIN - NANO FANAVARAN DAROUEI ALVAND (NANOALVAND)**

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [150 mg/15 mL] 1 tamna staklena bočica (tip I) od 20 mL, u kutiji

CARBOPLASIN - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [150 mg/15 mL] 1 staklena bočica od 15 ml u kutiji
- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [450 mg/45 mL] 1 staklena bočica od 45 ml u kutiji
- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [50 mg/5 mL] 1 staklena bočica od 5 ml u kutiji

CARBOPLATIN ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O

- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [10 mg/1 mL] 1 bočica jantarne boje od stakla tip I od 15ml, u kutiji
- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [10 mg/1 mL] 1 bočica jantarne boje od stakla tip I od 5ml, u kutiji
- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [10 mg/1 mL] 1 bočica jantarne boje stakla tip I od 50 ml, u kutiji
- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [10 mg/1 mL] 1 bočica jantarne boje od stakla tip I od 100 ml, u kutiji

CARBOPLATIN PFIZER - PFIZER INC.

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [150 mg/15 mL] 1 polipropilenska bočica sa 15 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

L01XA03 oksaliplatin

Doziranje: terapija metastatskog kolorektalnog karcinoma (u kombinaciji sa fluorouracilom i folnom kiselinom), terapija karcinoma kolona nakon resekcije primarnog tumora (adjuvantna terapija): i.v. 85 mg/m² svake 2 sedmice u 12 ciklusa (6 mjeseci)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OKSALIPLATIN QILU - QILU PHARMA SPAIN SL

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [5 mg/1 mL] 1 staklena bočica, u kutiji

OXALIPLATIN PLIVA 5 MG/ML - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [5 mg/1 mL] 1 staklena bočica (tip I) s 20 ml koncentrata za otopinu za infuziju, s gumenim (brombutilnim) čepom, aluminijskim prstenom i zaštitnim poklopcem, u kutiji
- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [5 mg/1 mL] 1 staklena bočica (Tip I) s 10 ml koncentrata za otopinu za infuziju, s gumenim (brombutilnim) čepom, aluminijskim prstenom i zaštitnim poklopcem, u kutiji

OXALIPLATINUM ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [5 mg/1 mL] 1 staklena bočica od 10 ml ,u kutiji
- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [5 mg/1 mL] 1staklena bočica od 20 ml ,u kutiji

L01XE Inhibitori protein kinaze

L01XE14 bosutinib

Doziranje: hronična mijeloidna leukemija: oralno, odrasli, za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BOSUTINIB MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED

- ZU/Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/Aclar-aluminij blistera po 14 tableta), u kutiji

- ZU/Rp filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/Aclar-aluminij blistera po 14 tableta), u kutiji
- ZU/Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/Aclar-aluminij blistera po 14 tableta), u kutiji

L01XG Inhibitori proteazoma

L01XG01 bortezomib

Doziranje: *progresivni multipli mijelom; mantle ćelijski limfom:* i.v, s.c. prema uputstvu proizvođača i prema kliničkim protokolima

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BORTEGAZ - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- ZU prašak za rastvor za injekciju [3,5 mg/1 bočica] 1 bočica, staklena

BORTEZOMIB ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O.

- ZU otopina za injekciju [2,5 mg/1 mL] 1 staklena boca sa 1,4 ml otopine za injekciju, sa gumenim čepom i aluminijumskim zatvaračem, u kutiji

- ZU otopina za injekciju [2,5 mg/1 mL] 4 staklene bočice bočice sa 1,4 ml otopine za injekciju, sa gumenim čepom i aluminijumskim zatvaračem, u kutiji

BORTEZOMIB PHARMAS - SYNTHON B.V.

- ZU prašak za otopinu za injekciju [3,5 mg/1 bočica] 1 bočica sa praškom za otopinu za injekciju, u kutiji

BORTEZOMIB PLIVA - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- ZU prašak za otopinu za injekciju [3,5 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za otopinu za injekciju, u kutiji

BORTEZOMIB STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG

- ZU rastvor za injekciju [2,5 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 1,4 ml rastvora za injekciju, u kutiji

- ZU rastvor za injekciju [2,5 mg/1 mL] Staklena bočica (bezbojna, tip I) sa 2,8 ml rastvora za injekciju zatvorena sa brombutil gumenim zatvaračem i aluminijumskim flip-off zatvaračem sa polipropilenskim diskom, u kutiji

BORTEZOMIB VENUS - VENUS PHARMA GMBH

- ZU prašak za rastvor za injekciju [3,5 mg/1 bočica] 1 bočica, u kutiji

GLOFTRINID - ALKALOID AD SKOPJE

- ZU prašak za rastvor za injekciju [3,5 mg/1 bočica] 1 staklena bočica (staklo tip I) od 10 ml sa gumenim čepom i poklopcem (flip-off) plave boje, u kutiji

VELCADE - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

- ZU prašak za rastvor za injekciju [3,5 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa praškom za otopinu za injekciju u providnom blister pakovanju, u kutiji

VORTEMIEL - SYNTHON B.V.

- ZU prašak za rastvor za injekciju [3,5 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa 3,5 mg praška za rastvor za injekciju, u kutiji

L01XG03 iksazomib

Doziranje: multipli mijelom kod pacijenata koji su primili najmanje jednu prethodnu terapiju, u kombinaciji sa lenalidomidom i deksametazonom: odrasli, oralno 4 mg jednom dnevno 1,8. i 15. dana 28-dnevnog ciklusa, za podešavane doze kod neželjenih dejstava, konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NINLARO - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG

- Rp kapsula, tvrda [2,3 mg/1 kapsula] 3 kapsule, tvrde ("PVC-Al/Al blister sa 1 kapsulom, u ovitku" - 3 ovitka sa po 1 blisterom), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [3 mg/1 kapsula] 3 kapsule, tvrde ("PVC-Al/Al blister sa 1 kapsulom, u ovitku" - 3 blistera), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [4 mg/1 kapsula] 3 kapsule, tvrde ("PVC-Al/Al blister sa 1 kapsulom, u ovitku" - 3 blistera), u kutiji

L01XX Inhibitori poli (ADP-riboze) polimeraze (PARP)

L01XX01 olaparib

Doziranje: karcinom dojke, adenokarcinom pankreasa, karcinom prostate, karcinom jajnika, karcinom endometrijuma: za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LYNPARZA - ASTRAZENECA AB

- ZU/Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (7 Al/Al neperforiranih blistera sa po 8 tableta), u kutiji.
- ZU/Rp filmom obložena tableta [150 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (7 Al/Al neperforiranih blistera sa po 8 tableta), u kutiji.

L01XX Ostali antineoplastici

L01XX05 hidroksikarbamid

Doziranje: liječenje maligne neoplastične bolesti uključujući hroničnu mijeloidnu leukemiju (faza prije liječenja i palijativna skrb), kao i za liječenje raka grlića materice i drugih solidnih tumora: oralno, za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HYDMOXIA - DEVA HOLDING A.S.

- Rp kapsula, tvrda [500 mg/1 kapsula] 100 kapsula, tvrdih (10 PA/AL/PVC blistera po 10 kapsula), u kutiji

L01XX35 anagrelid

Doziranje: esencijalna trombocitemija kod pacijenata sa visokim rizikom od trombo-hemoragijskih događaja koji nisu adekvatno odgovorili na druge lijekove ili koji ne podnose druge lijekove: 0,5 mg 2 puta dnevno, dozu podešavati u sedmičnim intervalima prema odgovoru, postepeno po 0,5 mg dnevno; uobičajena doza 1-3 mg dnevno u podijeljenim dozama (maks. pojedinačna doza 2,5 mg), maks. 10 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ATREMIA - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- Rp kapsula, tvrda [0,5 mg/1 kapsula] 100 kapsula, tvrdih u HDPE bočici, u kutiji

L01XX44 aflibercept

Doziranje: u kombinaciji sa irinotekan/5 fluorouracil/folna kiselina (FOLFIRI) hemoterapijom kod odraslih osoba sa metastatskim kolorektalnim karcinomom kod kojih je bolest rezistentna ili je napredovala nakon liječenja tretmanom koji sadrži oksaliplatin: i.v. inf. 4 mg/kg tjelesne mase tokom 1 sata, nakon koje se primjenjuje protokol FOLFIRI; ovaj ciklus se ponavlja na 2 nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ZALTRAP - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [25 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 4 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [25 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 8 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

L01XX52 venetoklaks

Doziranje: hronična limfocitna leukemija 17p delecije ili mutacije gena TP53 kod pacijenata koji nisu pogodni za liječenje signalnog puta B-ćelijskih receptora inhibitorom ili kod kojih ovo liječenje nije bilo uspješno; hronična limfocitna leukemija u odsustvu 17p delecije ili mutacije gena TP53 kod pacijenata kod kojih hemoimunoterapija i liječenje inhibitorom signalnog puta B-ćelijskog receptora nije bilo uspješno: oralno, odrasli, 20 mg jednom dnevno tokom 7 dana, zatim povećati na 50 mg jednom dnevno tokom 7 dana, zatim povećati na 100 mg jednom dnevno tokom 7 dana, zatim povećati na 200 mg jednom dnevno tokom 7 dana, zatim doza održavanja 400 mg jednom dnevno, dozu treba uzeti ujutro tokom faze titracije doze; dozu treba uzeti u isto vrijeme svaki dan, za podešavanje doze u odnosu na neželjena dejstva-konsultovati literaturu proizvoda; u kombinaciji s hipometilirajućim lijekom liječenje novodijagnostikovane akutne mijeloidne leukemije (AML) kod odraslih bolesnika koji nisu pogodni za intenzivnu hemoterapiju: oralno, odrasli 1. dan 100 mg, 2. dan 200 mg, 3. dan i dalje 400 mg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VENCLYXTO - ABBVIE INC.

ZU/Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta (7 PVC/PE/PCTFE blistera sa aluminijumskom folijom sa po 2 tablete), u kutiji

ZU/Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 112 filmom obloženih tableta ((7 PVC/PE/PCTFE blistera sa aluminijumskom folijom sa po 4 tablete), 4 kutije sa po 28 tableta), u višestrukum pakovanju

ZU/Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 7 filmom obloženih tableta (7 PVC/PE/PCTFE blistera sa aluminijumskom folijom sa po 1 tabletom), u kutiji

ZU/Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 7 tableta (7 PVC/PE/PCTFE blistera sa aluminijumskom folijom sa po 1 tabletom), u kutiji

L02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA

L02A Hormoni i srodni lijekovi

L02AB Progestageni

L02AB01 megestrol

Doziranje: anoreksija, gubitak težine koji je prouzrokovao malignim oboljenjima (kaheksija) ili gubitak težine kod pacijenata sa dijagnozom sindroma stečenog nedostatka imuniteta (AIDS): odrasli: 400-800 mg jednokratno u toku dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MEGOXI - POLFARMEX S.A.

ZU/Rp oralna suspenzija [40 mg/1 mL] 1 plastična boca sa 240 ml oralne suspenzije, u kutiji

L02AE Analizi hormona koji oslobađaju gonadotropin

L02AE02 leuprorelin

Doziranje: Eligard-hormonski zavistan uznapredovali karcinom prostate kao alternativa hirurškoj kastraciji; dodatna terapija radioterapiji ili radiološkoj prostatektomiji kod

pacijenata sa visoko rizičnim lokalizovanim ili lokalno uznapredovalim karcinomom prostate: s.c. 7,5 mg jednom mjesečno, 22,5 mg jednom u 3 mjeseca, 45 mg jednom u 6 mjeseci; Leuprostin-karcinom prostate: 3,6 mg jednom mjesečno, 5 mg jednom u 3 mjeseca; Lectrum 3,75 mg-lokalno uznapredovali karcinom prostate kao zamjena za hiruršku kastraciju; kao adjuvantno liječenje uz radioterapiju kod pacijenata sa visokorizičnim lokalizovanim ili lokalno uznapredovalim karcinomom prostate; metastatski karcinom prostate; kao adjuvantno liječenje uz radikalnu prostatektomiju kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim karcinomom prostate sa visokim rizikom od napredovanja bolesti; kao neadjuvantno liječenje koje prethodi radioterapiji kod pacijenata sa visokorizičnim lokalizovanim ili lokalno uznapredovalim karcinomom prostate: s.c. ili i.m. obično 3,75 mg kao jednomjesečna depo-inj; edometrioza: s.c. ili i.m. 3,75 mg svakog mjeseca tokom 6 mjeseci (liječenje započeti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa); endometrijalna priprema prije intrauterine operacije: s.c. ili i.m. 3,75 mg kao pojedinačna doza 5-6 nedjelja prije operacije (terapiju treba započeti tokom 3. do 5. dana menstrualnog ciklusa); preoperativno liječenje mioma materice: s.c. ili i.m. 3,75 mg kao pojedinačna doza svakog mjeseca tokom obično 3-4 mjeseca ili maksimalno 6 mjeseci; očuvanje funkcije jajnika kod žena u premenopauzi sa neoplastičnim oboljenjem koje su podvrgnute liječenju hemioterapijom, a koje može dovesti do prijevremenog smanjenja funkcije jajnika: s.c. ili i.m. 3,75 mg dvije nedjelje prije početka hemoterapije, a potom nastaviti sa mjesečnom primjenom za vrijeme hemioterapije; liječenje žena u premenopauzi i perimenopauzi sa karcinomom dojke u podmaklom stadijumu pogodnih za hormonalnu manipulaciju: s.c. 3,75 mg jednom mjesečno; kao adjuvantna terapija u kombinaciji sa tamoksifenom ili inhibitorom aromataze, kod žena u premenopauzi ili perimenopauzi koje boluju od karcinoma dojke u ranom stadijumu sa endokrinim odgovorom, a koje su u većem riziku od povratka bolesti (mladost, tumor visokog stepena, postojanje limfnih čvorova; kod žena koje su primile radioterapiju, premenopauzalni status mora biti potvrđen nakon završetka hemioterapije: s.c. 3,75 mg jednom mjesečno; Lectrum 7,5 mg-hormonski zavisna uznapredovali karcinom prostate, visokorizični lokalizovani i lokalno uznapredovali hormonski zavisna karcinom prostate u kombinaciji sa radioterapijom: s.c. jednom mjesečno; Lectrum 11,25 mg-lokalno uznapredovali karcinom prostate kao zamjena za hiruršku kastraciju; kao adjuvantno liječenje uz radioterapiju kod pacijenata sa visokorizičnim lokalizovanim ili lokalno uznapredovalim karcinomom prostate; metastatski karcinom prostate; kao adjuvantno liječenje uz radikalnu prostatektomiju kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim karcinomom prostate sa visokim rizikom od napredovanja bolesti; kao neadjuvantno liječenje koje prethodi radioterapiji kod pacijenata sa visokorizičnim lokalizovanim ili lokalno uznapredovalim karcinomom prostate: s.c. jednom u tri mjeseca; upravljanje endometriozaom, uključujući uklanjanje bola i smanjenje endometrijskih lezija: i.m. svaka 3 mjeseca tokom perioda od 6 mjeseci, započeti tokom prvih 5 dana menstrualnog ciklusa; liječenje žena u premenopauzi i perimenopauzi sa karcinomom dojke u podmaklom stadijumu pogodnih za hormonalnu manipulaciju: s.c. 11,25 mg na svaka 3 mjeseca; kao adjuvantna terapija u kombinaciji sa tamoksifenom ili inhibitorom aromataze, kod žena u premenopauzi ili perimenopauzi koje boluju od karcinoma dojke u ranom stadijumu sa endokrinim odgovorom, a koje su u većem riziku od povratka bolesti (mladost, tumor visokog stepena, postojanje limfnih čvorova), kod žena koje su primile radioterapiju, premenopauzalni status mora biti potvrđen nakon završetka hemioterapije: s.c. 11,25 mg na svaka 3 mjeseca

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ELIGARD - RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA & FARMACEUTICA S.P.A

ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [22.5 mg/1 šprica]
Termoformirana posuda i sterilna igla, u kartonskoj kutiji; posuda
sadrži kesicu sa sredstvom za sušenje i jedan spojeni sistem šprica
koji se sastoji od: šprice A napunjene rastvaračem, šprice B

- napunjene praškom i konektora sa dugmetom za zatvaranje za špricu A i B
- ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [45 mg/1 šprica]
Termoformirana posuda i sterilna igla, u kartonskoj kutiji; posuda sadrži kesicu sa sredstvom za sušenje i jedan spojeni sistem šprica koji se sastoji od: šprice A napunjene rastvaračem, šprice B napunjene praškom i konektora sa dugmetom za zatvaranje za špricu A i B
- ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [7.5 mg/1 šprica]
Termoformirana posuda i sterilna igla, u kartonskoj kutiji; posuda sadrži kesicu sa sredstvom za sušenje i jedan spojeni sistem šprica koji se sastoji od: šprice A napunjene rastvaračem, šprice B napunjene praškom i konektora sa dugmetom za zatvaranje za špricu A i B

LECTRUM - ERIOCHEM SA

- ZU prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem [11.25 mg/1 bočica] 1 bočica, 1 ampula, špric za jednokratnu upotrebu i 2 igle 22 G1 1/2
- ZU prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem [7.5 mg/1 bočica] 1 bočica, 1 ampula, špric za jednokratnu upotrebu i 2 igle 22 G1 1/2
- ZU prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju s produženim oslobađanjem [3.75 mg/1 bočica] 1 bočica, 1 ampula, špric za jednokratnu upotrebu i 2 igle 22 G1 1/2

LEUPROSTIN 3,6 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- ZU implantat u napunjenoj injekcionoj šprici [3.6 mg/1 implantat] 1 plastična šprica sa implantatom, u kutiji

LEUPROSTIN 5 MG - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- ZU implantat u napunjenoj injekcionoj šprici [5 mg/1 implantat] 1 plastična šprica sa implantatom, u kutiji

L02AE03 goserelin

Doziranje: metastatski karcinom prostate; lokalno uznapredovali karcinom prostate kao alternativa hirurškoj kastraciji; adjuvantna terapija radioterapiji ili radikalnoj prostatektomiji kod pacijenata sa visoko-rizičnim ili lokalno uznapredovalim karcinomom prostate; neoadjuvantna terapija prije započinjanja radioterapije kod pacijenata sa visoko-rizičnim ili lokalno uznapredovalim karcinomom prostate; metastatski karcinom prostate; uznapredovali karcinom dojke; estrogen-receptor-pozitivni rani karcinom dojke; endometriozna, istanjivanje endometrijuma, fibroidi uterusu, asistirana reprodukcija; karcinom prostate: 3,6 mg svake 4 sedmice, ili 10,8 mg svakih 12 sedmica potkožno u područje prednjeg trbušnog zida; ostale indikacije: 3,6 mg svake 4 sedmice potkožno u područje prednjeg trbušnog zida.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**RESELIGO - AMW GMBH**

- ZU implantat [10,8 mg/1 implantat] implantat u 1 napunjenom injekcionom špricu, u kutiji
- ZU implantat [3,6 mg/1 implantat] implantat u 1 napunjenom injekcionom špricu, u kutiji

L02AE04 triptorelin

Doziranje: Decapeptyl-smanjenje proizvodnje i prevencija preuranjenog skoka luteinizirajućeg hormona (LH) kod žena koje su podvrgnute kontrolisanoj hiperstimulaciji

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

jajnika u sklopu metoda potpomognute oplodnje: s.c. jednom dnevno; pacijentica treba da ostane pod medicinskim nadzorom tokom 30 min. nakon prvog davanja; Decapeptyl depo-muškarci, hormonski zavisani lokalno uznapredovali ili metastatski karcinom prostate: s.c. ili i.m. 3,75 mg svakih 4 nedjelje; žene, miomi maternice, endometrioza: 3,75 mg jednom u 4 nedjelje, liječenje započeti tokom prvih 5 dana ciklusa; djeca, dokazani centralni prerani pubertet (djevojčice mlađe od 9 god, dječaci mlađi od 10 god.): doziranje na osnovu tjelesne mase: djeca 30 kg 3,75 mg; daje se 0., 14. i 28. dana, nakon toga svake 3 sedmice

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DECAPEPTYL - FERRING PHARMACEUTICALS BV

ZU otopina za injekciju [0.1 mg/1 mL] 7 šprica sa po 1 mL otopine za injekciju, u kutiji

DECAPEPTYL DEPOT - FERRING PHARMACEUTICALS BV

ZU prašak i otapalo za suspenziju za injekciju [3.75 mg/1 mL] 1 špric sa 172 mg mikrokapsula praška i 1 špric sa 1 mL otapala za suspenziju za injekciju, u kutiji

L02B Hormonski antagonisti i srodni lijekovi

L02BA Anti-estrogeni

L02BA01 tamoksifen

Doziranje: karcinom dojke: 20 - 40 mg dnevno podijeljeno u 2 doze ili kao pojedinačna doza jednom dnevno u trajanju od najmanje 5 godina;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TAMOXIFEN REMEDICA - REMEDICA LIMITED

ZU/Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al stripa po 10 tableta), u kutiji

L02BA03 fulvestrant

Doziranje: karcinom dojke kod žena s pozitivnim estrogenskim receptorima: i.m. 500 mg u razmacima od jednog mjeseca, sa dodatnom dozom od 500 mg koja se daje 2 sedmice nakon početne doze.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FULVESTRANT PLIVA - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

ZU otopina za injekciju [250 mg/5 mL] 2 napunjene staklene štrcaljke sa po 5 ml otopine za injekciju i 2 sigurnosne igle za spajanje na trup štrcaljke, u kutiji

FULVESTRANT SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

ZU rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [250 mg/5 mL] 1 napunjena staklena šprica sa 5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

VASTALOMA - LABORATORIOS FARMALAN S.A.

ZU rastvor za injekciju [50 mg/1 mL] 6 napunjenih injekcionih šprica sa 5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

ZU rastvor za injekciju [50 mg/1 mL] 2 napunjena injekciona šprica sa 5ml rastvora za injekciju, u kutiji

ZU rastvor za injekciju [50 ml/1 mL] 1 napunjen injekcioni špric sa 5ml rastvora za injekciju, u kutiji

L02BB Anti-androgeni**L02BB03 bicalutamid**

Doziranje: lokalno uznapredovali karcinom prostate sa visokim rizikom od progresije bolesti, kao monoterapija ili adjuvantna terapija uz radikalnu prostatektomiju ili radioterapiju; oralno, odrasli 150 mg jednom dnevno; uznapredovali karcinom prostate, u kombinaciji sa LHRH analogom ili hirurškom kastracijom: 50 mg jednom dnevno (započeti istovremeno sa sprovođenjem hirurške kastracije ili najmanje 3 dana prije početka terapije LHRH analogom)

REGISTROVANI LIJEKOVI:**BICAPROST - SYNTHON B.V.**

Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 28 film tableta (4 PVC/PE/PVDC//Al blistera po 7 tableta), u kutiji

BIKALUTAMID PLIVA 50 MG - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/PVdC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji

BIKALUTAMID SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 PVC/Aclar/Alu blistera sa po 7 tableta), u kutiji

L02BB04 enzalutamid

Doziranje: karcinom prostate: oralno, odrasli, 160 mg jednom dnevno, za podešavanje doze s obzirom na neželjena dejstva konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ENZALUTAMID STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG**

ZU/Rp film tableta [40 mg/1 tableta] 112 film tableta (1 bočica od polietilena visoke gustine (HDPE)), u kutiji

ZU/Rp film tableta [40 mg/1 tableta] 112 film tableta, (8 Aluminium-OPA/Alu/PVC blistera po 14 film tableta), u kutiji

ZU/Rp film tableta [80 mg/1 tableta] 56 film tableta (1 bočica od polietilena visoke gustine (HDPE)), u kutiji

ZU/Rp film tableta [80 mg/1 tableta] 56 film tableta (8 Aluminium-OPA/Alu/PVC blistera po 7 film tableta), u kutiji

ENZULID - ADALVO LIMITED

ZU/Rp kapsula, meka [40 mg/1 kapsula] 112 mekih kapsula (4 PVC/ACLAR/Al blistera po 28 kapsula) u kutiji

XTANDI - ATELLAS PHARMA EUROPE B.V.

ZU/Rp kapsula, meka [40 mg/1 kapsula] 112 kapsula, mekih (4 blistera sa 28 kapsula), u kutiji

L02BB05 apalutamid

Doziranje: karcinom prostate: oralno, 240 mg jednom dnevno, za podešavanje doze s obzirom na neželjena dejstva, konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ERLEADA - JANSSEN-CILAG KFT.**

Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 120 film tableta (5 PVC-PCTFE blistera sa Al folijom sa 24 tablete), u kutiji

L02BB06 darolutamid

Doziranje: karcinom prostate: 600 mg dva puta dnevno, za podešavanje doze i prekid terapije s obzirom na neželjena dejstva konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NUBEQA - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

ZU/Rp filmom obložena tableta [300 mg/1 tableta] 112 filmom obloženih tableta (7 PVC/Al blistera sa po 16 tableta), u kutiji

L02BG

Inhibitori aromataze

L02BG03

anastrozol

Doziranje: dopunsko liječenje žena u postmenopauzi s ranim invazivnim karcinomom dojke koji ima pozitivne hormonske receptore; dopunsko liječenje žena u postmenopauzi sa hormon-pozitivnim receptorima kod ranog karcinoma dojke koje su već dobijale tamoksifen tokom 2-3 god; uznapredovali karcinom dojke kod postmenopauzalnih žena sa hormon pozitivnim receptorima: 1 mg dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ANASTRAZE - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Rp filmom obložena tableta [1 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 Al/PVC blistera po 7 tableta), u kutiji

AREMED - REMEDICA LIMITED

Rp film tableta [1 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/Al blistera po 14 tableta) u kutiji

L02BG04

letrozol

Doziranje: adjuvantna terapija ranog stadijuma hormon zavisnog karcinoma dojke (pozitivni hormonski receptori) kod žena u postmenopauzi; produžena adjuvantna terapija ranog stadijuma karcinoma dojke kod žena u postmenopauzi koje su prethodno primale standardnu adjuvantnu terapiju sa tamoksifenom tokom 5 godina; terapija prve linije kod postmenopauzalnih žena sa uznapredovalim, hormon-zavisnim karcinomom dojke; terapija uznapredovalog karcinoma dojke nakon relapsa ili progresije bolesti kod žena sa prirodnim ili vještački izazvanom postmenopauzalnim endokrinološkim statusom, koje su prethodno liječene antiestrogenima; neoadjuvantno liječenje žena u postmenopauzi s HER-2 negativnim rakom dojke pozitivnim na hormonske receptore, kod kojih hemoterapija nije primjerena i nema indikacije za hitan operativni zahvat: oralno, odrasli, 2,5 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AVOMIT - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Δ ZU/Rp filmom obložena tableta [2.5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

FEMARA - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Δ ZU/Rp film tableta [2.5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PE/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

LETRASAN - DEVA HOLDING A.S.

Δ ZU/Rp filmom obložena tableta [2.5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera po 15 tableta), u kutiji

LORTANDA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Δ ZU/Rp filmom obložena tableta [2.5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

SILETRIS - STADA ARZNEIMITTEL AG

Δ ZU/Rp film tableta [2.5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

L02BG06

eksemestan

Doziranje: adjuvantno liječenje ER pozitivnog ranog karcinoma dojke kod postmenopauzalnih žena nakon 2-3 godine terapije tamoksifenom; uznapredovali

karcinom dojke kod postmenopauzalnih žena čija je bolest progredirala nakon antiestrogenske terapije: oralno, odrasli 25 mg/dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AROMASIN - PFIZER INC.

Rp obložena tableta [25 mg/1 tableta] 30 obloženih tableta (2 Al-PVDC/PVC-PVDC blistera po 15 tableta), u kutiji

EXEDRAL - REMEDICA LIMITED

Rp film tableta [25 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

L02BX

Ostali hormonski antagonisti i srodni lijekovi

L02BX03

abirateron

Doziranje: sa prednizonom ili prednizonom za terapiju novodijagnostifikovanog hormonski osjetljivog metastatskog karcinoma prostate visokog rizika kod odraslih muškaraca u kombinaciji sa androgen deprivacionom terapijom; za terapiju metastatskog karcinoma prostate koji je rezistentan na kastraciju, kod odraslih muškaraca koji nemaju simptome bolesti ili su simptomi bolesti blagi nakon neuspjeha sa androgen deprivacionom terapijom, i kod kojih hemoterapija još nije klinički indikovana; terapija metastatskog karcinoma prostate kod odraslih muškaraca kod kojih je bolest progredirala tokom ili poslije hemioterapijskog režima zasnovanog na docetakselu: 1 g jednom dnevno, za doziranje prednizona ili prednizolona konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ABESINE - HETERO EUROPE S.L.

ZU/Rp film tableta [250 mg/1 tableta] 120 film tableta (12 Alu/Alu blistera sa 10 tableta), u kutiji

ABIRATERON SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

ZU/Rp filmom obložena tableta [250 mg/1 tableta] 120 filmom obloženih tableta (12 ALU /OPA /ALU /PVC blistera sa 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp filmom obložena tableta [250 mg/1 tableta] 120 filmom obloženih tableta (12 ALU /PVC /PE /PVDC blistera sa 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 ALU/OPA /ALU/PVC blistera sa 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 ALU/PVC/PE/PVDC blistera sa 10 tableta), u kutiji

ABIRATERON STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG

ZU/Rp film tableta [250 mg/1 tableta] 120 film tableta (12 Al-PVC/PE/PVDC blistera sa 10 film tableta), u kutiji

ZU/Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al-PVC/PE/PVDC blistera sa 10 film tableta), u kutiji

ABIRATERONE ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O.

ZU/Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 transparentna PVC/PVDC/AL blistera po 14 film tableta) u kutiji

ZU/Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 transparentnih PVC/PVDC/AL blistera po 10 film tableta) u kutiji

ZU/Rp tableta [250 mg/1 tableta] 120 tableta (1 HDPE bočica zatvorena PP čepom), u kutiji

ABIRATERONE PHARMASCIENCE - PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED

ZU/Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVdC/PE/PVC/Al blisterom sa 14 tableta), u kutiji

ZU/Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (5 PVdC/PE/PVC/Al blisterom sa 12 tableta), u kutiji

ABIREX - LABORATORIOS LICONSA S.A.

ZU/Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (4 blistera sa po 15 tableta), u kutiji

ENAGAL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

ZU/Rp film tableta [250 mg/1 tableta] 120 film tableta (12 Aluminijum-PVC/PE/PVDC blistera sa 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Aluminijum-PVC/PE/PVDC blistera sa 10 tableta), u kutiji

NERIDE - SYNTHON B.V.

ZU/Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC/PVDC blistera sa po 10 film tableta), u kutiji

ZU/Rp tableta [250 mg/1 tableta] 120 tableta u polietilenskoj (HDPE) bočici, u kutiji

REMAIRAT - REMEDICA LIMITED

ZU/Rp film tableta [250 mg/1 tableta] 120 film tableta (12 Aluminijum-PVC/PE/PVDC blistera po 10 film tableta), u kutiji

ZU/Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Aluminijum-PVC/PE/PVDC blistera po 10 film tableta), u kutiji

L03 IMUNOSTIMULANSI

L03A Imunostimulansi

L03AA Faktori stimulacije kolonija

L03AA02 filgrastim

Doziranje: skraćivanje trajanja neutropenije i incidence febrilne neutropenije kod pacijenata koji se liječe sa potvrđenom citotoksičnom hemoterapijom za maligne bolesti (sa izuzetkom hronične mijeloidne leukemije i mijelodisplastičnog sindroma): s.c. ili i.v. inf. odrasli, 5 mcg/kg na dan do broja neutrofila koji je u normalnom opsegu, obično se očekuje da će biti dovoljno do 14 dana (do 38 dana kod akutne mijeloidne leukemije); prva doza se daje najranije nakon 24 sata poslije citotoksične hemioterapije; skraćivanje trajanja neutropenije kod pacijenata koji se liječe sa mijeloablativnom terapijom, poslije koje će uslijediti transplantacija koštane srži: 10 mcg/kg, početi najmanje 24 sata nakon citotoksične hemoterapije i tokom 24 sata od infuzije koštane srži, zatim podešavati prema broju neutrofila-konsultovati literaturu proizvođa; mobilizacija perifernih matičnih ćelija: s.c. ili kao infuzija 10 mcg/kg/dan tokom 5 - 7 dana; nakon mijelosupresivne hemioterapije: s.c. 5 mcg/kg/dan; teška kongenitalna neutropenija sa istorijom teških rekurentnih infekcija: s.c. početna doza 12 mcg/kg na dan, podesiti prema odgovoru, dato u pojedinačnoj dozi ili u podijeljenim dozama, konsultovati literaturu proizvođa; teška ciklična neutropenija ili idiopatska neutropenija sa istorijom teških ili rekurentnih infekcija: s.c. injekcija, 5 mcg/kg/dan u jednoj ili više podijeljenih doza, podesiti prema odgovoru, konsultovati literaturu proizvođa; mobilizacija matičnih ćelija periferne krvi u zdravih davaoca prije alogene transplantacije matičnih ćelija periferne krvi: s.c. odrasli 10 mcg/kg/dan tokom 4-5 dana; neutropenija u HIV inficiranih pacijenata: s.c. inj. početna doza 1 mcg/kg/dan, podešavati prema odgovoru do maks. 4 mcg/kg/dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ACCOFIL - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O

ZU rastvor za injekciju/ infuziju [300 µg/0.5 mL] 5 napunjenih šprica sa sigurnosnom zaštitom za iglu u blisteru, u kutiji

ZU rastvor za injekciju/ infuziju [480 µg/0.5 mL] 5 napunjenih šprica sa sigurnosnom zaštitom za iglu u blisteru, u kutiji.

FRAVEN - ARVEN ILAC SAN. VE TIC.A.S.

- ZU rastvor za injekciju /infuziju u napunjenoj šprici [300 µg/0.5 mL] 1
napunjena šprica sa 0,5 ml rastvora za injekciju/ infuziju, u kutiji
- ZARZIO - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.**
- ZU rastvor za injekciju /infuziju u napunjenoj šprici [300 µg/0.5 mL] 1
napunjena šprica bez sigurnosne zaštite za iglu, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju /infuziju u napunjenoj šprici [300 µg/0.5 mL] 1
napunjena šprica sa sigurnosnom zaštitom za iglu, u kutiji

L03AA13 pegfilgrastim

Doziranje: skraćeno trajanje neutropenije i smanjenje učestalosti febrilne neutropenije kod bolesnika s malignom bolesti koja se liječi citotoksičnom hemoterapijom (izuzev hronične mijeloidne leukemije i mijelodisplastičnih sindroma: s.c. inj. odrasli preko 18 god. 6 mg uz svaki hemoterapijski ciklus, početi 24 sata nakon hemoterapije)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FULPHILA - BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED

- ZU/Rp otopina za injekciju [6 mg/0.6 mL] 1 napunjena šprica sa iglom i
štitnikom za iglu, u kutiji

NYVEPRIA - PFIZER INC.

- ZU/Rp otopina za injekciju [6 mg/0.6 mL] 1 napunjena šprica sa 0,6 mL
otopine za injekciju, u kutiji

PELGRAZ - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O

- ZU/Rp otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki [6 mg/0.6 mL] 1
napunjena štrcaljka sa sigurnosnom zaštitom za iglu, u blisteru, sa
jastučićem natopljenim alkoholom, u kutiji
- ZU/Rp Otopina za injekciju u napunjenom injektoru [6 mg/0.6 mL] 1
napunjeni injektor s jastučićem natopljenim alkoholom, u blister
pakiranju, u kutiji

L03AB Interferoni

L03AB07 interferon beta-1a

Doziranje: Avonex-pacijenati sa dijagnozom relapsne multiple skleroze (MS) sa dvije ili više akutnih egzacerbacija (relapsa) u prethodne tri godine bez dokaza o kontinuiranoj progresiji između relapsa; pacijenati sa pojedinačnim demijelinizacijskim događajem sa akutnim inflamatornim procesom, ukoliko je dovoljno ozbiljan da opravda terapiju intravenskim kortikosteroidima, i ako je određeno da postoji visoki rizik da se razvije klinički evidentna multipla skleroza: 30 mcg (0,5 ml rastvora) jednom sedmično u vidu i.m. injekcije; Rebif-relapsna multipla skleroza; pacijenati sa pojedinačnim demijelinizacijskim događajem sa akutnim inflamatornim procesom (ako su pod velikim rizikom za razvoj multiple skleroze): s.c. 22 ili 44 mcg tri puta sedmično

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AVONEX - BIOGEN INTERNATIONAL GMBH

- ZU rastvor za injekciju [30 µg/0.5 mL] kutija sa 4 napunjene šprice sa
po 0,5 ml rastvora za injekciju i 4 injekcione igle, svaka šprica je
upakovana u zapečaćeni plastični kontejner

REBIF - MERCK HEALTHCARE KGAA

- ZU rastvor za injekciju u napunjenom špricu [22 µg/0.5 mL] 12
napunjenih injekcionih šprica po 0,5 ml rastvora za injekciju, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju u napunjenom špricu [44 µg/0.5 mL] 12
napunjenih injekcionih šprica po 0,5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

L03AB08 interferon beta-1b, rekombinantni

Doziranje: relapsno, remitentna multipla skleroza; sekundarna progresivna multipla skleroza sa aktivnom bolešću; pojedinačni demijelinizirajući događaji sa aktivnim upalnim procesom (ukoliko je on dovoljno težak da bi se opravdalo liječenje sa intravenskim kortikosteroidima i pacijenti imaju visok rizik za razvoj multiple skleroze): 250 mcg (8 M.i.j.) s.c. svaki drugi dan (preporučuje se početna doza 62,5 mcg svaki drugi dan i postepeno povećavati dozu do 250 mcg (1 ml) svaki drugi dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BETAFERON - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT

ZU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju [0.25 mg/1 mL] 15 bočica
praška + 15 napunjenih injekcionih šprica od 2,25 ml sa 1,2 ml
rastvarača), kutija sa 15 pojedinačnih pakovanja

L03AX Ostali imunostimulansi

L03AX metenkefalin, tridekaktid

Doziranje: relapsno remitentni oblici multiple skleroze (RRMS): s.c. u kožu nadlaktice, odrasli, 12 mg 3 puta sedmično tokom 6 mjeseci, nakon toga 6 mg 3 puta sedmično; *tretman relapsa-akutne egzacerbacije:* dvostruka doza lijeka 12 mg otopljena u istom volumenu otapala kao i jednostruka doza u trajanju od 3 dana uzastopno; nakon toga nastavlja se šema prvobitnog doziranja (mjeseci se računaju po lunarnom kalendaru (1 mjesec = 4 sedmice); liofilizat se otapa sa priloženim otapalom, neposredno prije primjene)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ENKORTEN - BOSNALIJEK D.D.

ZU liofilizat za otopinu za injekciju [5 mg/1 viala+ 1 mg/1 viala] 6 bočica
liofilizata i 6 ampula po 2 ml 0,9 % NaCl kao otopine za
rastvaranje, u kutiji

L03AX03 BCG vakcina

Doziranje: tumor mokraćne bešike: intravezikalno (instilacija u bešiku), za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ONKO BCG 100 - SYNTHAVERSE S.A.

ZU prašak i rastvarač za intravezikalnu suspenziju [100 mg/1 bočica] 1
bočica sa 100 mg praška i 1 ampula sa 1 ml rastvarača, u kutiji

L03AX13 glatiramer acetat

Doziranje: multipla skleroza (relapsno-remitentna): s.c. odrasli 20 mg jednom dnevno ili 40 mg 3 puta nedjeljno u razmaku od najmanje 48 sati

REGISTROVANI LIJEKOVI:

COPAXONE - TEVA PHARMACEUTICAL PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

ZU/Rp otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki [20 mg/1 mL] 28
napunjenih štrcaljki sa iglom, sa po 1 ml otopine za injekciju (4
blistera po 7 napunjenih štrcaljki), u kutiji
ZU/Rp otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki [40 mg/1 mL] 12
napunjenih štrcaljki sa po 1 ml otopine za injekciju u PVC blisteru, u
kutiji

REMUREL - SYNTHON B.V.

ZU/Rp rastvor za injekciju [20 mg/1 mL] 28 napunjenih injekcionih šprica
sa po 1ml rastvora za injekciju, u kutiji

ZU/Rp rastvor za injekciju [40 mg/1 mL] 12 napunjenih injekcionih šprica
sa po 1 ml rastvora za injekciju, u kutiji

L04 IMUNOSUPRESIVI

L04A Imunosupresivi

L04AA Selektivni imunosupresivi

L04AA06 mikofenolna kiselina

Doziranje: profilaksa akutnog odbacivanja transplantiranih organa (u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima)-transplantacija bubrega: odrasli-oralni mikofenolat mofetil 1 g 2 puta dnevno uključiti u okviru 72 sata od transplantacije; djeca i adolescenti (uzrast 2-18 god.) 600 mg/m² 2 puta dnevno, a pacijenti koji imaju površinu tijela veću od 1,5 m² 1 g 2 puta dnevno; transplantacija srca: odrasli-oralni mikofenolat mofetil 1,5 g 2 puta dnevno uključiti u okviru 5 dana od transplantacije; transplantacija jetre: uz i.v. mikofenolat koji treba uključiti u roku od 4 dana nakon transplantacije, oralni mikofenolat mofetil treba uključiti što prije zbog bolje tolerancije, 1,5 g 2 puta dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MYFORTIC - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

ZU/Rp gastorezistentna tableta [180 mg/1 tableta] 120 gastorezistentnih
tableta (12 PA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
ZU/Rp gastorezistentna tableta [360 mg/1 tableta] 120 gastorezistentnih
tableta (12 PA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

TRIXIN - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Rp kapsula, tvrda [250 mg/1 kapsula] 100 kapsula, tvrdih (10
PVC/PVdC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

L04AA13 leflunomid

Doziranje: *aktivni reumatoidni artritis:* odrasli preko 18 god, početna doza 100 mg jednom dnevno tokom 3 dana, doza održavanja je 10-20 mg jednom dnevno; *aktivni psorijatični artritis:* odrasli preko 18 god, početna doza 100 mg jednom dnevno tokom 3 dana, zatim 20 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BAGEDA - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Š.

△ Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih
tableta (3 Alu-OPA/Alu-PVC blistera sa 10 tableta), u kutiji

L04AA27 fingolimod

Doziranje: *multipla skleroza:* odrasli preko 18 god, 0,5 mg jednom dnevno; djeca 10 god. i više tjelesne mase manje od 40 kg 0,25 mg jednom dnevno, djeca 10 god. i više tjelesne mase veće od 40 kg 0,5 mg jednom dnevno, terapiju započinje i prati ljekar specijalista

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ESTRELA - BLUEPHARMA-INDUSTRIA FARMACEUTICA, S.A.

ZU/Rp kapsula, tvrda [0,56 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4
OPA/Al/PVC/aluminijum blistera sa po 7 kapsula), u kutiji

FINGOLIMOD MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED

ZU/Rp kapsula, tvrda [0,5 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (2
PCTFE/PVC/Al blistera po 14 kapsula), u kutiji

FINGOLIMOD TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

ZU/Rp kapsula, tvrda [0,5 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (4
OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 7 kapsula), u kutiji

L04AA29 tofacitinib

Doziranje: umjereni do teški oblik aktivnog reumatoidnog artritisa kod odraslih pacijenata koji su na liječenju jednim ili više antireumatskih lijekova koji modifikuju tok bolesti, imali neadekvatan odgovor ili ih nisu podnosili (sam ili u kombinaciji sa metotreksatom), psorijatični artritis: oralno, filmom obložene tablete, 5 mg dva puta dnevno; oralno, tablete sa produženim oslobađanjem, odrasli 11 mg jednom dnevno, za izostavljanje doze ili prekid terapije s obzirom na neželjena dejstva, konsultovati informacije o lijeku; umjereni do teški ulcerozni kolitis: oralno, filmom obložene tablete, 10 mg dva puta dnevno tokom 8 nedjelja, 5 mg dva puta dnevno za održavanje, ukoliko se ne postigne adekvatan terapijski odgovor tokom 8 nedjelja, početna doza se može davati još 8 nedjelja, prekinuti terapiju ukoliko nema odgovora nakon 16 nedjelja, za podešavanje doze s obzirom na neželjena dejstva, smanjen odgovor tokom terapije održavanja ili nakon prekida terapije, konsultovati literaturu proizvoda; ankilozirajući spondilitis: oralno, filmom obložene tablete, 5 mg dva puta dnevno, razmotriti prekid terapije ukoliko nema odgovora nakon 16 nedjelja od inicijalne doze, za izostavljanje doze ili prekid terapije s obzirom na neželjena dejstva konsultovati literaturu proizvoda; poliarтикуlarni juvenilni idiopatski artritis i juvenilni psorijatični artritis: oralno, oralni rastvor, djeca 12-17 god. (tjelesne težine 10-19 kg), 3,2 mg dva puta dnevno, razmotriti prekid terapije ukoliko nema odgovora nakon 18 nedjelja od inicijalne doze, za izostavljanje doze ili prekid terapije s obzirom na neželjena dejstva konsultovati literaturu proizvoda; djeca 12-17 god. (tjelesne težine 20-39 kg), 4 mg dva puta dnevno, razmotriti prekid terapije ukoliko nema odgovora nakon 18 nedjelja od inicijalne doze, za izostavljanje doze ili prekid terapije s obzirom na neželjena dejstva konsultovati literaturu proizvoda; oralno, film tablete, djeca 12-17 god. (tjelesne težine 40 kg i više) 5 mg dva puta dnevno, razmotriti prekid terapije ukoliko nema odgovora nakon 18 nedjelja od inicijalne doze, za izostavljanje doze ili prekid terapije s obzirom na neželjena dejstva konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:

XELJANZ - PFIZER INC.

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 Al blistera s Al/PVC podlogom sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 Al blistera s Al/PVC podlogom sa po 14 tableta), u kutiji

L04AA31 teriflunomid

Doziranje: relapsno-remitirajuća multipla skleroza kod odraslih i djeca preko 10 god: odrasli, 14 mg jedanom dnevno, djeca preko 10 god. tjelesne mase manje od 40 kg 7 mg jednom dnevno, djeca preko 10 god. tjelesne mase preko 40 kg 14 mg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TEREBO - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp filmom obložena tableta [14 mg/1 tableta] 28 tableta (2 OPA/Alu/PVC-Alu blistera po 14 tableta) u kutiji

TERIFLUNOMID PHARMAS 14 MG FILMOM OBLOŽENE TABLETE - ADALVO LIMITED

- Rp filmom obložena tableta [14 mg/1 tableta] 84 tablete (6 Alu/PVC/Alu/OPA blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [14 mg/1 tableta] 28 tableta (2 Alu/PVC/Alu/OPA blistera sa po 14 tableta), u kutiji

TERIFLUNOMIDE PHARMASCIENCE - PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED

- Rp filmom obložena tableta [14 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 blistera po 14 tableta), u kutiji

TERIMIDANE - PHARMACARE PREMIUM LTD.

Rp filmom obložena tableta [14 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC-Al blistara po 14 filmom obloženih tableta), u kutiji

L04AA40 kladribin

Doziranje: liječenje odraslih pacijenata sa visoko aktivnom relapsnom multiplom sklerozom: oralno, odrasli, 10 mg ili 20 mg u obliku jedne dnevne doze u toku jednog ciklusa liječenja koji se sastoji od 2 sedmice liječenja, jedene na početku prvog mjeseca i jedne na početku drugog mjeseca dotične godine liječenja; preporučena kumulativna doza je 3,5 mg/kg tjelesne mase tokom 2 god, primjenjene u obliku 1 ciklusa liječenja od 1,75 mg/kg godišnje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MAVENCLAD - MERCK HEALTHCARE KGAA

ZU/Rp tableta [10 mg/1 tableta] 1 tableta (1 OPA/Al/PVC-Al blister sa 1 tabletom), u kutiji
 ZU/Rp tableta [10 mg/1 tableta] 4 tablete (1 OPA/Al/PVC-Al blister sa 4 tablete), u kutiji
 ZU/Rp tableta [10 mg/1 tableta] 6 tableta (1 OPA/Al/PVC-Al blister sa 6 tableta), u kutiji

L04AA50 ponesimod

Doziranje: multipla skleroza: oralno, početi sa 2 mg jednom dnevno prvi i drugi dan, zatim povećati na 3 mg jednom dnevno treći i četvrti dan, zatim povećati na 4 mg jednom dnevno peti i šesti dan zatim povećavati u koracima od 1 mg jednom dnevno u periodu od sedmog do jedanaestog dana, zatim povećati na 10 mg jednom dnevno na dane 12-14, doza održavanja 20 mg jednom dnevno od petnaestog dana pa na dalje; za ponovno započinjanje terapije nakon prekida titracije doze ili tokom perioda održavanja konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PONVORY - JANSSEN-CILAG KFT.

ZU/Rp film tableta [2 mg/1 tableta+ 3 mg/1 tableta+ 4 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 6 mg/1 tableta+ 7 mg/1 tableta+ 8 mg/1 tableta+ 9 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 14 film tableta (Alu/Alu blister, 1 x 6 tableta, 1 x 3 tablete, 1 x 5 tableta), u kutiji;
 ZU/Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Alu/Alu blistera sa 14 tableta), u kutiji

L04AB Tumor nekroza faktor (TNF-alfa) inhibitori

L04AB01 etanercept

Doziranje: reumatoidni artritis, psorijatični artritis, ankilozirajući spondilitis, aksijalni spondiloartritis bez radiografskih dokaza: s.c.inj. odrasli 25 mg dva puta sedmično ili 50 mg jednom sedmično, razmotriti obustavu terapije ukoliko nema odgovora nakon 4 mjeseca od početne doze; plak psorijaza: s.c.inj. odrasli 25 mg dva puta sedmično ili 50 mg jednom sedmično, alternativno se može primjeniti 50 mg dva puta sedmično do 12 sedmica, da bi se liječenje nastavilo po potrebi sa 25 mg dva puta sedmično ili 50 mg jednom sedmično do 24 sedmice, može postojati potreba kod nekih pacijenata da se terapija nastavi i poslije 24 sedmice, ukoliko nema odgovora poslije 12 sedmica prekinuti terapiju; djeca 6-17 god. 800 mcg/kg jednom nedjeljno (maks. po dozi 50 mg) do 24 nedjelje, prekinuti terapiju ukoliko nema odgovora nakon 12 sedmica; poliartritis, oligoartritis: s.c. inj. djeca 2-17 godina, 400 mcg/kg (maks. po dozi 25 mg) dva puta nedjeljno, sa intervalom 3-4 dana između doza ili 800 mcg/kg (maks. po dozi 50 mg)

jednom nedjeljno, razmotriti obustavu terapije ukoliko nema odgovora nakon 4 mjeseca od početne doze; *psorijatični artritis, entezitis povezan sa artritismom*: s.c. inj. djeca 12-17 godina, 400 mcg/kg (maks. po dozi 25 mg) dva puta nedjeljno, sa intervalom 3-4 dana između doza ili 800 mcg/kg (maks. po dozi 50 mg) jednom nedjeljno, razmotriti obustavu terapije ukoliko nema odgovora nakon 4 mjeseca od početne doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ENBREL - PFIZER INC.

ZU/Rp	prašak i otapalo za otopinu za injekciju [10 mg/1 bočica] 4 bočice sa praškom, 4 napunjene šprice sa otapalom, 4 igle, 4 adaptera za bočice i 8 alkoholnih jastučića, u kutiji
ZU/Rp	prašak i otapalo za otopinu za injekciju [25 mg/1 bočica] 4 bočice sa praškom, 4 napunjene šprice sa otapalom, 4 igle, 4 adaptera za bočice i 8 alkoholnih jastučića, u kutiji
ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [50 mg/1 mL] 4 šprice od prozirnog stakla napunjene rastvorom, 4 igle od nerđajućeg čelika i 4 jastučića, natopljenih alkoholom, u kutiji

L04AB02 infliksimab

Doziranje: *reumatoidni artritis* (u kombinaciji sa metotreksatom): i.v. inf. odrasli početna doza 3 mg/kg, zatim 3 mg/kg 2. i 6. sedmice nakon prve, te nadalje svakih 8 sedmica; ukoliko je odgovor neadekvatan nakon 12 sedmica, doza se povećava postepeno po 1,5 mg/kg svakih 8 sedmica, do maks. 7,5 mg/kg svakih 8 sedmica; alternativno, 3 mg/kg se može dati svake 4 sedmice; prekinuti liječenje ukoliko nema odgovora 12 sedmica od početne infuzije ili nakon podešavanja doze; početak sa i.v.inf. odrasli početna doza 3 mg/kg, zatim (i.v.inf.) 3 mg/kg nakon 2 nedjelje; održavanje s.c.inj. 120 mg svake 2 nedjelje, održavanje s.c.inj započeti 4 nedjelje nakon druge inicijalne i.v.inf; razmotriti prekid terapije ukoliko nema odgovora 12 nedjelja nakon početne infuzije; *ankilozirajući spondilitis*: i.v. inf. odrasli, početna doza 5 mg/kg, zatim 5 mg/kg ponoviti 2. i 6. sedmice nakon prve, a zatim 5 mg/kg svakih 6 - 8 sedmica; prekinuti liječenje ukoliko nema odgovora 6 sedmica od početne infuzije; početak sa i.v.inf. početna doza 5 mg/kg koju slijedi (i.v.inf.) 5 mg/kg nakon 2 nedjelje; održavanje s.c.inj. 120 mg svake 2 nedjelje, održavanje s.c.inj. počinje 4 nedjelje nakon druge inicijalne i.v.inf; prekinuti terapiju ukoliko nema odgovora u toku 6 nedjelja od početne doze (nakon 2 doze); *psorijatični artritis*: i.v.inf. odrasli početna doza 5 mg/kg, ponavljati 2. i 6. sedmice nakon prve, a zatim svakih 8 sedmica; početak sa i.v.inf. 5 mg/kg, koje se nastavlja (i.v.inf.) sa 5 mg/kg nakon 2 nedjelje, održavanje s.c. inj. 120 mg svake 2 nedjelje, održavanje s.c.inj. počinje 4 nedjelje nakon druge inicijalne i.v.inf; *težak aktivni oblik Kronove bolesti*: i.v.inf. početna doza 5 mg/kg, zatim 5 mg/kg 2 sedmice poslije početne doze, zatim ukoliko je došlo do odgovora doza održavanja 5 mg/kg 6 sedmica poslije inicijalne doze, zatim 5 mg/kg svakih 8 sedmica; terapija održavanja može biti ponovo primjenjena ako se znaci i simptomi pojave u periodu od 16 nedjelja od posljednje infuzije; djeca 6-18 god. početna doza 5 mg/kg, zatim 5 mg/kg 2. i 6. sedmica poslije početne doze, zatim 5 mg/kg svakih 8 sedmica; interval između doza održavanja podešavati prema odgovoru; prekinuti terapiju ukoliko nema odgovora u toku 10 sedmica od početne doze; početak sa i.v.inf. 5 mg/kg, zatim (i.v.inf.) 5 mg/kg nakon 2 nedjelje, održavanje s.c.inj. 120 mg svake 2 nedjelje, održavanje s.c.inj. započinje 4 nedjelje nakon druge inicijalne i.v.inf; *fistulozna Kronova bolest*: i.v.inf. odrasli, početna doza 5 mg/kg, zatim 5 mg/kg 2. sedmice i 6. sedmica nakon početne doze, ukoliko pacijent ne reaguje na terapiju nakon 3 početne doze, prekinuti sa liječenjem; kod pacijenata koji su odgovorili na terapiju terapija održavanja 5 mg/kg na 8 nedjelja; ponovna primjena inf. 5 mg/kg na 8 nedjelja ako se jave znaci i simptomi nakon 16 nedjelja od posljednje infuzije; početak sa i.v.inf. odrasli 5 mg/kg, zatim (i.v.inf.) 5 mg/kg nakon 2 nedjelje; održavanje s.c.inj. 120 mg svake 2 nedjelje, održavanje s.c. inj. počinje 4 nedjelje nakon druge inicijalne i.v.inf. prekinuti

terapiju ukoliko nema odgovora nakon 6 doza ukupno, ponovna primjena nakon 16 nedjelja od posljednje doze; *jaki aktivni ulcerozni kolitis*: i.v.inf. odrasli, početna doza 5 mg/kg, zatim 5 mg/kg 2. sedmice i 6. sedmica poslije inicijalne doze, zatim 5 mg/kg svakih 8 sedmica; prekinuti sa terapijom ukoliko nema odgovora 14 sedmica poslije početne doze; djeca 6-17 god. početna doza 5 mg/kg, zatim 5 mg/kg 2. sedmice i 6. sedmica poslije inicijalne doze, zatim 5 mg/kg svakih 8 sedmica; prekinuti sa terapijom ukoliko nema odgovora 8 sedmica poslije početne doze; početak sa i.v.inf. početna doza 5 mg/kg, zatim (i.v.inf.) 5 mg/kg nakon 2 nedjelje, održavanje s.c.inj. 120 mg svake 2 nedjelje, održavanje s.c.inj. počinje 4 nedjelje nakon druge inicijalne i.v.inf. razmotriti prekid terapije ukoliko nema odgovora nakon 14 nedjelja (nakon 6 doza ukupno); *plak psorijaza*: i.v. inf. početna doza 5 mg/kg, zatim 5 mg/kg 2. i 6. sedmice nakon prve infuzije, a zatim na svakih 8 sedmica; prekinuti terapiju ukoliko nema odgovora nakon 14 nedjelja od početne doze (nakon 4 doze); početak sa i.v.inf. početna doza 5 mg/kg, zatim (i.v.inf.) 5 mg/kg nakon 2 nedjelje, održavanje s.c.inj. 120 mg svake 2 nedjelje, održavanje s.c.inj. počinje 4 nedjelje nakon druge inicijalne i.v.inf. razmotriti prekid terapije ukoliko nema odgovora nakon 14 nedjelja (nakon 7 doza ukupno)

REGISTROVANI LIJEKOVI:**REMICADE - JANSSEN-CILAG KFT.**

ZU prašak za koncentrat za rastvor za infuziju [100 mg/1 viala] 1 staklena bočica sa 100 mg praška za koncentrat za rastvor za infuziju u kutiji

REMSIMA - CELLTRION INC.

ZU prašak za koncentrat za otopinu za infuziju [100 mg/1 bočica] 1 staklena bočica sa 100 mg praška za koncentrat za otopinu za infuziju, u kutiji

ZU/Rp rastvor za injekciju [120 mg/1 mL] 2 napunjena pena sa po 1 ml rastvora za injekciju i 2 alkoholna jastučića, u kutiji

L04AB04**adalimumab**

Doziranje: *plak psorijaza*: s.c. početna doza 80 mg, zatim 40 mg svake 2 sedmice, počevši 1 sedmicu nakon inicijalne doze, razmotriti opravdanost terapije ukoliko nema odgovora tokom 16 nedjelja -konsultovati literaturu proizvođa; *reumatoidni artritis*: s.c. odrasli preko 18 god, 40 mg svake 2 sedmice; ukoliko je neophodno povećati na 40 mg sedmično ili 80 mg svake 2 sedmice kod pacijenata koji primaju samo adalimumab; razmotriti opravdanost terapije ukoliko nema odgovora tokom 12 sedmica; *psorijatični artritis*, *ankilozirajući spondilitis*, *aksijalni spondiloartritis*: s.c. odrasli preko 18 god. 40 mg svake 2 sedmice, razmotriti opravdanost terapije ukoliko nema odgovora tokom 12 sedmica; *Crohnova bolest*: s.c. početna doza 80 mg, zatim 40 mg nakon 2 sedmice i zatim 40 mg svake 2 sedmice; po potrebi može se dati 160 mg (4 inj. u jednom danu ili 2 inj. dnevno tokom 2 uzastopna dana), zatim 80 mg nakon 2 sedmice i potom 40 mg svake 2 sedmice, povećati ukoliko je neophodno na 40 mg svake sedmice ili 80 mg svake druge sedmice; *ulcerozni kolitis*: s.c.160 mg u sedmici 0 (4 inj u jednom danu ili 2 inj dnevno tokom 2 uzastopna dana), zatim 80 mg nakon 2 sedmice i potom 40 mg svake 2 sedmice, povećati ukoliko je neophodno na 40 mg svake sedmice ili 80 mg svake druge sedmice, razmotriti opravdanost terapije ukoliko nema odgovora tokom 8 sedmica; *gnojni hidradenitis*: s.c. početna doza 160 mg (primjenjena u obliku 2 injekcije od 80 mg u jednom danu ili jedne injekcije od 80 mg na dan tokom 2 uzastopna dana), nakon koje slijedi doza od 80 mg 2 sedmice kasnije u danu 15; dvije sedmice kasnije (dan 29) liječenje se nastavlja dozom od 40 mg svake sedmice, povećati ukoliko je neophodno na 40 mg svake sedmice ili 80 mg svake druge sedmice, razmotriti opravdanost terapije ukoliko nema odgovora tokom 12 sedmica; *uveitis (neinfektivni intermedijarni, posteriorni i panuveitis)*: s.c. početna doza 80 mg, zatim 40 mg svake druge sedmice, počevši 7 dana

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

nakon početne doze, doza održavanja 40 mg svake 2 sedmice; za doziranje u pedijatrijskoj populaciji konsultovati literaturu proizvođača;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AMGEVITA - AMGEN (EUROPE) GMBH

ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [40 mg/0.8 mL] 2 napunjena pena sa po 0,8 ml otopine za injekciju, u kutiji

HUKYNDRA - STADA ARZNEIMITTEL AG

ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [40 mg/0.4 mL] 2 napunjena injekciona pena sa po 0,4 mL rastvora za injekciju u blisteru sa 2 alkoholna tupfera, u kutiji

ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom špricu [40 mg/0.4 mL] 2 napunjena injekciona šprica sa po 0,4 mL rastvora za injekciju u blisteru sa 2 alkoholna tupfera, u kutiji

ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom špricu [80 mg/0.8 mL] 1 špric (staklo tip I) sa 0,8 mL rastvora za injekciju u blisteru sa alkoholnim tupferom, u kutiji

HULIO, OTOPINA ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOJ SPRICI, 40MG / 0,8ML -

BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED

ZU/Rp otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki [40 mg/0.8 mL] 2 napunjene šprice sa 2 jastučića natopljena alkoholom, u kutiji

HULIO, OTOPINA ZA INJEKCIJU U NAPUNJENOM PENU, 40MG / 0,8MG -

BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED

ZU/Rp otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici [40 mg/0.8 mL] 2 napunjena pena sa 2 jastučića natopljena alkoholom, u kutiji

HUMIRA - ABBVIE INC.

ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [20 mg/0.2 mL] 2 napunjene šprice sa po 0,2 ml rastvora za injekciju i 2 alkoholom napunjena tufera, u kutiji

ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [40 mg/0.4 mL] 2 napunjene šprice po 0,4 ml rastvora za injekciju i 2 alkoholom natopljena tufera, u kutiji

ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [80 mg/0.8 mL] 1 napunjeni injekcioni pen (0,8 ml sterilnog rastvora), sa 2 jastučića natopljena alkoholom, u kutiji

HYRIMOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [40 mg/0.8 mL] 2 napunjene jednokratne šprice od stakla tipa I sa gumenim čepom i iglom od nehrđajućeg čelika sa automatskom zaštitnom za iglu, sa hvatištem za prste, gumenim zatvaračem za iglu i plastičnim klipom, u kutiji

ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [40 mg/0.8 mL] 1 napunjeni injekcioni pen, u kutiji

ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [40 mg/0.8 mL] 2 napunjena injekciona pena, u kutiji

ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom špricu [40 mg/0.8 mL] 1 napunjena jednokratna šprica od stakla tipa I sa gumenim čepom i igla od nehrđajućeg čelika sa automatskom zaštitom za iglu, sa hvatištem za prste, gumenim zatvaračem za iglu i plastičnim klipom, u kutiji

IDACIO - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

ZU/Rp otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki [40 mg/0.8 mL] 2 napunjene štrcaljke sa po 0,8 ml otopine za injekciju, u kutiji

ZU/Rp otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici [40 mg/0.8 mL] 2 napunjene brizgalice sa po 0,8 ml otopine za injekciju, u kutiji

YUFLYMA - CELLTRION INC.

ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [40 mg/0.4 mL] 2
napunjena pena po 0,4 mL rastvora za injekciju i 2 alkoholna
jastučića, u kutiji

L04AB06 golimumab

Doziranje: u kombinaciji s metotreksatom (MTX) za liječenje umjerenog do teškog oblika reumatoidnog artritisa u odraslih bolesnika čiji je odgovor na antireumatske lijekove koji modifikuju tok bolesti (terapija DMARD), uključujući metotreksat, neadekvatan; liječenje teškog, aktivnog i progresivnog reumatoidnog artritisa kod odraslih koji prethodno nisu bili liječeni MTX; kao monoterapija ili u kombinaciji s metotreksatom, za liječenje aktivnog i progresivnog psorijatičnog artritisa u odraslih bolesnika u kojih je odgovor na prethodno liječenje antireumatskim lijekovima koji modifikuju tok bolesti bio neadekvatan; teški oblik aktivnog ankilozirajućeg spondilitisa kod pacijenata koji nisu adekvatno reagovali na konvencionalnu terapiju: s.c. odrasli preko 18 god. 50 mg jednom mjesečno, istog dana u mjesecu; razmotriti opravdanost dalje terapije ukoliko se nakon 3-4 doze ne postigne adekvatan klinički odgovor; pacijenti tjelesne mase preko 100 kg, ukoliko se ne postigne adekvatan klinički odgovor nakon 3-4 doze od 50 mg jednom mjesečno, doza se može povećati na 100 mg jednom mjesečno, razmotriti opravdanost dalje terapije ukoliko se ne postigne adekvatan klinički odgovor nakon 3-4 ove više doze; ulcerozni kolitis: s.c. odrasli (tjelesne težine do 80 kg), početna doza 200 mg, zatim 100 mg nakon 2 nedjelje, doza održavanja 50 mg svake 4 nedjelje, alternativno doza održavanja 100 mg svake 4 nedjelje, razmotriti opravdanost terapije ukoliko nema odgovora nakon 4 doze; odrasli (tjelesne težine 80 kg i više), početna doza 200 mg, zatim 100 mg nakon 2 nedjelje, doza održavanja 100 mg svake 4 nedjelje, razmotriti opravdanost terapije ukoliko nema odgovora nakon 4 doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:**SIMPONI - JANSSEN-CILAG KFT.**

ZU rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [50 mg/0.5 mL] 1 napunjena
šprica sa 0,5 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU rastvor za injekciju u napunjenom penu [50 mg/0.5 mL] 1 napunjeni
pen sa 0,5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

L04AC Inhibitori interleukina**L04AC05 ustekinumab**

Doziranje: *psorijaza tipa plaka:* s.c.inj. odrasli, tjelesne mase do 101 kg, početi sa 45 mg, zatim 45 mg poslije 4 nedjelje, zatim 45 mg svakih 12 nedjelja, razmotriti prekid terapije ukoliko nema odgovora tokom 28 nedjelja; odrasli, tjelesne mase 101 kg i preko, početi sa 90 mg, zatim 90 mg svake 4 nedjelje, zatim 90 mg svakih 12 nedjelja, razmotriti prekid terapije ukoliko nema odgovora tokom 28 nedjelja; *psorijatični artritis:* s.c. odrasli, početi sa 45 mg, zatim 45 mg poslije 4 nedjelje, zatim 45 mg svakih 12 nedjelja, više doze od 90 mg mogu biti upotrijebljene kod pacijenata tjelesne mase preko 100 kg; razmotriti prekid terapije ukoliko nema odgovora tokom 28 nedjelja; *Kronova bolest:* odrasli, početi sa i.v. primjenom (260 mg, za i.v. primjenu se koristi drugi oblik lijeka u vidu koncentrata za rastvor za infuziju), zatim s.c. inj. 90 mg nakon 8 nedjelja, zatim s.c. inj. 90 mg svakih 12 nedjelja, ukoliko odgovor nije adekvatan nakon 8 nedjelja od prve s.c. inj. ili je odgovor izostao, učestalost primjene lijeka može biti povećana - konsultovati informacije o lijeku; ukoliko nema odgovora u toku 16 nedjelja od početne doze ili 16 nedjelja nakon povećanja učestalosti doziranja, treba razmotriti prekid liječenja; *psorijaza tipa plaka kod pedijatrijskih pacijenata* (6 godina i stariji, tjelesne mase 60-100 kg): s.c. početi sa 45 mg,

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

zatim 45 mg nakon 4 nedjelje, zatim 45 mg svakih 12 nedjelja; razmotriti prekid terapije ukoliko nema odgovora u toku 28 nedjelja

REGISTROVANI LIJEKOVI:

UZPRUVO - STADA ARZNEIMITTEL AG

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [130 mg/1 bočica] 1 staklena bočica (staklo tip I) zapremine 30 mL sa 26 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom špricu [45 mg/0.5 mL] 1 napunjeni injekcioni (stakleni) špric po 0,5 mL rastvora za injekciju, u kutiji
- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom špricu [90 mg/1 mL] 1 napunjeni injekcioni (stakleni) špric po 1 mL rastvora za injekciju, u kutiji

YESINTEK - BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED

- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [130 mg/26 mL] 1 staklena bočica od 30 mL sa 26 mL koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [45 mg/0.5 mL] 0,5 mL rastvora za injekciju u staklenoj šprici od 1 mL, u kutiji
- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom špricu [90 mg/1 mL] 1 mL rastvora za injekciju u staklenoj šprici od 1 mL, u kutiji

L04AC07 **tocilizumab**

Doziranje: u kombinaciji s metotreksatom (MTX) za liječenje teškog, aktivnog i progresivnog reumatoidnog artritisa (RA) u odraslih bolesnika koji nisu ranije liječeni sa MTX; umjerenog do teškog aktivnog reumatoidnog artritisa (RA) odraslih koji nisu pokazali primjeren odgovor ili nisu podnosili prethodnu terapiju s jednim ili s više antireumatskih lijekova koji mijenjaju tok bolesti (disease-modifying anti-rheumatic drug-DMARD) ili antagonistima tumor nekrotizirajućeg faktora (TNF), kao monoterapija ili u kombinaciji sa metotreksatom: i.v. inf. preporučena doza je 8 mg/kg tjelesne težine (maks. 800 mg), jednom u četiri nedjelje; hospitalizovani COVID 19 odrasli pacijenti koji primaju sistemske kortikosteroide i kojima je potrebna nadomjesna terapija kiseonikom ili mehanička ventilacija: i.v. inf. 8 mg/kg (maks. 800 mg po dozi) u jednoj dozi; aktivni sistemski juvenilni idiopatski artritis (u kombinaciji sa metotreksatom ili sam ukoliko je metotreksat neodgovarajući) kod djece koja imaju neadekvatan odgovor na nesteroidne antiinflamatorne lijekove i sistemske kortikosteroide: i.v. inf. djeca 2-18 god. tjelesne mase manje od 30 kg 12 mg/kg jednom svake 2 nedjelje; razmotriti opravdanost dalje primjene terapije ukoliko nema poboljšanja nakon 6 nedjelja terapije; djeca tjelesne mase preko 30 kg 8 mg/kg jednom svake 2 nedjelje; razmotriti opravdanost dalje primjene terapije ukoliko nema poboljšanja nakon 6 nedjelja terapije; poliarikularni juvenilni idiopatski artritis (u kombinaciji sa metotreksatom ili sam ukoliko je metotreksat neodgovarajući) kod djece koja su imala neadekvatan odgovor na metotreksat: i.v. inf. djeca 2-18 god. tjelesne mase manje od 30 kg 10 mg/kg jednom svake 4 nedjelje; razmotriti opravdanost dalje primjene terapije ukoliko nema poboljšanja nakon 12 nedjelja terapije; djeca tjelesne mase preko 30 kg 8 mg/kg jednom svake 4 nedjelje; razmotriti opravdanost dalje primjene terapije ukoliko nema poboljšanja nakon 12 nedjelja terapije; sindrom otpuštanja citokina: kod odraslih i djece preko 2 god. i.v. 8 mg/kg kod pacijenata tjelesne mase 30 kg i više, odnosno 12 mg/kg kod pacijenata tjelesne mase manje od 30 kg; maks. 800 mg po infuziji

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ACTEMRA - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [200 mg/10 mL] 1 staklena bočica sa 10 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [400 mg/20 mL] 1 staklena bočica sa 20 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [80 mg/4 mL] 1 staklena bočica sa 4 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

L04AC10 sekukinumab

Doziranje: *ankilozirajući spondilitis:* s.c. odrasli 150 mg sedmično počevši od inicijalne (0.) sedmice, zatim u 1. 2. i 3. i 4. sedmici, nakon čega slijedi mjesečna doza održavanja od 150 mg; doza može biti povećana na 300 mg prema kliničkom odgovoru; *neradiografski aksijalni spondiloartritis:* s.c. odrasli 150 mg sedmično počevši od inicijalne (0.) sedmice, zatim u 1. 2. i 3. i 4. sedmici, nakon čega slijedi mjesečna doza održavanja od 150 mg; *psorijatični artritis:* s.c. odrasli 150 mg sedmično počevši od inicijalne (0.) sedmice, zatim u 1. 2. i 3. i 4. sedmici, nakon čega slijedi mjesečna doza održavanja od 150 mg; doza može biti povećana na 300 mg prema kliničkom odgovoru; *psorijatični artritis sa istovremenom umjerenom do teškom plak psorijazom ili za bolesnike koji imaju neodgovarajući odgovor na anti-TNFa:* s.c. odrasli 300 mg sedmično počevši od inicijalne (0.) sedmice, zatim u 1. 2. i 3. i 4. sedmici, nakon čega slijedi mjesečna doza održavanja od 300 mg; *plak psorijaza:* s.c. odrasli 300 mg sedmično počevši od inicijalne (0.) sedmice, zatim u 1. 2. i 3. i 4. sedmici, nakon čega slijedi mjesečna doza održavanja od 300 mg; ukoliko se klinički odgovor ne postigne unutar 16 sedmica liječenja, razmotriti prekid liječenja; djeca starija od 6 godina i adolescenti, tjelesne mase preko 50 kg, s.c. 150 mg sedmično počevši od inicijalne (0.) sedmice, zatim u 1. 2. i 3. i 4. sedmici, nakon čega slijedi mjesečna doza održavanja od 150 mg; *juvenilni idiopatski artritis; artritis povezan sa entezitisom i juvenilni psorijatični artritis:* s.c. odrasli, 150 mg u 0,1,2,3 i 4 sedmici, a zatim mjesečna doza održavanja; svaka doza od 300 mg se daje u obliku dvije subkutane injekcije od 150 mg; djeca tjelesne mase preko 50 kg, 150 mg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

COSENTYX - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [75 mg/0.5 mL] 1 napunjena šprica sa 0,5 ml rastvora za injekciju, u kutiji
 ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [150 mg/1 mL] 1 napunjen pen sa 1 ml rastvora za injekciju, u kutiji
 ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [150 mg/1 mL] 2 napunjena pena sa po 1 ml rastvora za injekciju, u kutiji

L04AC16 guselkumab

Doziranje: *umjereni do teški psorijaza tipa plaka:* s.c.inj. odrasli, početna doza 100 mg, zatim 100 mg nakon 4 nedjelje, doza održavanja 100 mg svakih 8 nedjelja, razmotriti prekid terapije ukoliko nema odgovora nakon 16 nedjelja; *psorijatični artritis:* s.c.inj. odrasli, početna doza 100 mg, zatim 100 mg nakon 4 nedjelje, doza održavanja 100 mg svakih 8 nedjelja, doza održavanja od 100 mg svake 4 nedjelje može se razmotriti kod pacijenata koji su u visokom riziku od oštećenja zglobova, razmotriti prekid terapije ukoliko nema odgovora nakon 24 nedjelje; *ulcerozni kolitis:* početi sa i.v.inf. 200 mg u nultoj, 4. i 8. nedjelji; doza održavanja s.c.inj. 100 mg počevši od 16. nedjelje na svakih 8 nedjelja; alternativno, za pacijente koji ne dostignu adekvatnu kliničku korist od indukciono terapije, može se razmotriti primjena terapije održavanja od 200 mg s.c. inj. počevši od 12. nedjelje, a zatim na svake 4 nedjelje; *Kronova bolest:* i.v.inf. u nultoj, 4. i 8. nedjelji ili s.c. 400 mg u nultoj, 4. i 8. nedjelji

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TREMFYA - JANSSEN-CILAG KFT.

ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom špricu [100 mg/1 mL] 1 napunjeni injekcioni špric sa 1 ml rastvora za injekciju, u kutiji

L04AC19 satralizumab

Doziranje: *optički neuromijelitis:* odrasli i djeca preko 12 god. s.c. inj. 120 mg svake 2 nedjelje tokom prve 3 primjene (prva doza u 0. nedjelji, druga doza u drugoj nedjelji i treća doza u 4. nedjelji); doza održavanja 120 mg svake 4 nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ENSPRYNG - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

ZU/Rp otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki [120 mg/1 mL] Jedna napunjena šprica od 1 ml, u kutiji

L04AC24 mirikizumab

Doziranje: *ulcerozni kolitis:* i.v.inf. početi sa 300 mg svake 4 nedjelje za 3 doze, ukoliko adekvatan odgovor nije postignut nakon 12 nedjelja, indukcijski režim može biti proširen na dodatnih 12 nedjelja, prekinuti terapiju ukoliko nema odgovora nakon 24 nedjelje; zatim s.c. doza održavanja 200 mg svake 4 nedjelje; ukoliko se odgovor izgubi, za re-indukciju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OMVOH - ELI LILLY EXPORT S.A.

ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [300 mg/15 mL] 1 staklena bočica sa 15 mL koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
ZU/Rp otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici [100 mg/1 mL] 2 napunjene brizgalice, u kutiji

L04AD Inhibitori kalcineurina

L04AD01 ciklosporin

Doziranje: *transplantacija organa:* 12 sati prije hirurškog zahvata 10-15 mg/kg; uspostavljena doza nastavlja se tokom 1-2 sedmice postoperativno, a zatim se postepeno smanjuje do doze održavanja 2-6 mg/kg; kada se daje u kombinaciji sa drugim imunosupresivima doza se smanjuje (npr. na 3-6 mg/kg inicijalno); *transplantacija koštane srži:* početna doza se daje dan prije hirurškog zahvata, 3-5 mg/kg dnevno; uspostavljena doza se nastavlja do 2 sedmice postoperativno, a zatim se prelazi na oralni tretman ciklosporinom sa dozom od oko 12,5 mg/kg/dan; *endogeni uveitis:* 5 mg/kg/dan, po postizanju učinka doza se može smanjiti na 0,5-1 mg/kg/dan do konačne doze 2,5 mg/kg/dan (u refraktornim slučajevima vremenski ograničeno može se doza povisiti na 7 mg/kg/dan); *nefrotički sindrom:* ako je bubrežna funkcija normalna 5 mg/kg/dan, postepeno smanjivati na učinkovitu dozu; kod pacijenata sa poremećenom bubrežnom funkcijom 2,5 mg/kg/dan uz pažljivo nadgledanje; *reumatoidni artritis:* 3 mg/kg/dan, doza se može postepeno povećavati, ali ne smije da pređe 5 mg/kg/dan; *psorijaza:* 2,5 mg/kg/dan, ukoliko poboljšanje ne nastupi za mjesec dana dozu postepeno povećavati, ali ne smije premašiti 5 mg/kg/dan; *atopijski dermatitis:* 2,5-5 mg/kg/dan primjenjeno u dvije doze; dnevna doza ciklosporina treba uvijek da bude podijeljena na dvije doze.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SANDIMMUN NEORAL - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp kapsula, meka [100 mg/1 kapsula] 50 kapsula, mekih (10 PA/Al/PVC//Al blistera sa 5 kapsula), u kutiji
Rp kapsula, meka [25 mg/1 kapsula] 50 kapsula, mekih (10 PA/Al/PVC//Al blistera sa 5 kapsula), u kutiji
Rp kapsula, meka [50 mg/1 kapsula] 50 kapsula, mekih (10 PA/Al/PVC//Al blistera sa 5 kapsula), u kutiji
Rp oralni rastvor [100 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 50 ml oralnog rastvora u kutiji

L04AD02 takrolimus

Doziranje: profilaksa odbacivanja transplantata jetre, početi 12-18 sati nakon završetka transplantacije: oralno, odrasli početi sa 0,1-0,2 mg/kg jednom dnevno, ujutro; profilaksa odbacivanja transplantata bubrega, početi 24 sata nakon završetka transplantacije: oralno, odrasli početi sa 0,2-0,3 mg/kg jednom dnevno, ujutro; odbacivanje alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primjenu drugih imunosupresivnih lijekova: konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ADVAGRAF 0,5 MG - ASTELLAS IRELAND CO. LTD**

Rp kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda [0,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrdih (3 PVC/PVDC blistera sa 10 kapsula), u kutiji

ADVAGRAF 1 MG - ASTELLAS IRELAND CO. LTD

Rp kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda [1 mg/1 kapsula] 30 kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrdih (3 PVC/PVDC blistera sa 10 kapsula), u kutiji

ADVAGRAF 3 MG - ASTELLAS IRELAND CO. LTD

Rp kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda [3 mg/1 kapsula] 30 kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrdih (3 PVC/PVDC blistera sa 10 kapsula), u kutiji

ADVAGRAF 5 MG - ASTELLAS IRELAND CO. LTD

Rp kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda [5 mg/1 kapsula] 30 kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrdih (3 PVC/PVDC blistera sa 10 kapsula), u kutiji

PROGRAF - ASTELLAS IRELAND CO. LTD

Rp kapsula, tvrda [0,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVDC/Al - blistera po 10 kapsula), u kutiji

Rp kapsula, tvrda [1 mg/1 kapsula] 60 kapsula, tvrdih (6 PVC/PVDC/Al - blistera po 10 kapsula), u kutiji

Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVDC/Al - blistera po 10 kapsula), u kutiji

TACFORIUS - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

Rp kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda [0,5 mg/1 kapsula] 30 kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrdih (3 prozorna PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 kapsula) u aluminjskoj vrećici, u kutiji

Rp kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda [1 mg/1 kapsula] 30 kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrdih (3 prozorna PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 kapsula) u aluminjskoj vrećici, u kutiji

Rp kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda [3 mg/1 kapsula] 30 kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrdih (3 prozorna PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 kapsula) u aluminjskoj vrećici, u kutiji

Rp kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda [5 mg/1 kapsula] 30 kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrdih (3 prozorna PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 kapsula) u aluminjskoj vrećici, u kutiji

L04AE Modulatori sfingozin-1-fosfat (S1P) receptora

L04AE01 fingolimod

Doziranje: *multipla skleroza:* odrasli preko 18 god, 0,5 mg jednom dnevno; djeca 10 god. i više tjelesne mase manje od 40 kg 0,25 mg jednom dnevno, djeca 10 god. i više tjelesne mase veće od 40 kg 0,5 mg jednom dnevno, terapiju započinje i prati ljekar specijalista

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FINGOLIMOD ZENTIVA - ZENTIVA S.A.

ZU/Rp kapsula, tvrda [0,5 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (2
PVC/PVDC/Al blistera sa 14 kapsula), u kutiji

L04AE03 siponimod

Doziranje: *multipla skleroza (sekundarno progresivna, sa aktivnom bolešću):* oralno, početi sa 0,25 mg jednom dnevno na dan 1 i 2, nastaviti sa 0,5 mg jednom dnevno na dan 3, nastaviti sa 0,75 mg jednom dnevno na dan 4, nastaviti sa 1,25 mg jednom dnevno na dan 5, doze u prvih 5 dana trebaju biti uzete ujutro; doza održavanja 2 mg jednom dnevno od dana 6 pa nadalje, kod pacijenata sa genotipom CYP2C9*1*3 ili CYP2C9*2*3 smanjiti dozu održavanja na 1 mg jednom dnevno; za podešavanje doze s obzirom na broj limfocita konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MAYZENT - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

ZU/Rp filmom obložena tableta [0,25 mg/1 tableta] 12 filmom obloženih
tableta (1 PA/Al/PVC/Al blister sa 12 tableta), u kutiji
ZU/Rp filmom obložena tableta [0,25 mg/1 tableta] 120 filmom obloženih
tableta (10 PA/Al/PVC/Al blistera sa po 12 tableta), u kutiji
ZU/Rp filmom obložena tableta [1 mg/1 tableta] 28 tableta (2
PA/Alu/PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
ZU/Rp filmom obložena tableta [2 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih
tableta (2 PA/Al/PVC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

L04AF03 upadacitinib

Doziranje: *reumatoidni artritis, psorijatični artritis:* oralno, odrasli 15 mg dnevno; za prekid terapije kod pojave neželjenih dejstava konsultovati informacije o lijeku, razmotriti prekid terapije ukoliko nema odgovora nakon 12 nedjelja; *ankilozirajući spondilitis, neradiografski aksijalni spondiloartritis:* oralno, odrasli 15 mg dnevno; za prekid terapije kod pojave neželjenih dejstava konsultovati informacije o lijeku, razmotriti prekid terapije ukoliko nema odgovora nakon 16 nedjelja; *gigantocelularni arteritis:* oralno, 15 mg jedanput dnevno, u kombinaciji sa postepenim smanjenjem doze kortikosteroida, za liječenje nakon 52 sedmice treba se voditi aktivnošću bolesti, procjenom ljekara i odlukom bolesnika; *atopijski dermatitis:* oralno, 15 mg jednom dnevno, više doze od 30 mg mogu biti odgovarajuće za pojedine pacijente - konsultovati informacije o lijeku, razmotriti prekid terapije ukoliko nema odgovora nakon 12 nedjelja, za prekid terapije kod pojave neželjenih dejstava konsultovati informacije o lijeku; *ulcerozni kolitis:* oralno, početi sa 45 mg jednom dnevno tokom 8 nedjelja, ukoliko se tokom 8 nedjelja ne postigne adekvatan terapijski odgovor, početnu dozu treba nastaviti davati i narednih 8 nedjelja, prekinuti terapiju ukoliko nema odgovora nakon 16 nedjelja, za prekid terapije kod pojave neželjenih dejstava konsultovati informacije o lijeku, doza održavanja 15 mg jednom dnevno, više doze održavanja od 30 mg jednom dnevno mogu biti odgovarajuće za pojedine pacijente - konsultovati informacije o lijeku, za prekid terapije kod pojave neželjenih dejstava konsultovati informacije o lijeku; *Crohnova bolest:* oralno, početi sa 45 mg jednom dnevno tokom 12 nedjelja, ukoliko se tokom 12 nedjelja ne postigne adekvatan terapijski odgovor, početnu dozu treba smanjiti na 30 mg jednom dnevno i

nastaviti davati narednih 12 nedjelja, prekinuti terapiju ukoliko nema odgovora nakon 24 nedjelje, za prekid terapije kod pojave neželjenih dejstava konsultovati informacije o lijeku, doza održavanja 15 mg jednom dnevno, više doze održavanja 30 mg jednom dnevno mogu biti odgovarajuće za pojedine pacijente - konsultovati informacije o lijeku, za prekid terapije kod pojave neželjenih dejstava konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

RINVOQ - ABBVIE INC.

ZU/Rp tableta s produženim oslobađanjem [15 mg/1 tableta] 28 tableta sa produženim oslobađanjem (4 PVC/PE/PCTFE/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji

RINVOQ, TABLETE SA PRODUŽENIM OSLOBAĐANJEM, 30 MG - ABBVIE INC.

ZU/Rp tableta s produženim oslobađanjem [30 mg/1 tableta] 28 tableta u blisterima (4 PVC/PE/PCTFE/alu blistera sa po 7 tableta), u kutiji. Jedan kalendarski blister sadrži 7 tableta.

RINVOQ, TABLETE SA PRODUŽENIM OSLOBAĐANJEM, 45 MG - ABBVIE INC.

ZU/Rp tableta s produženim oslobađanjem [45 mg/1 tableta] 28 tableta u blisterima (4 PVC/PE/PCTFE/alu blistera sa po 7 tableta), u kutiji. Jedan kalendarski blister sadrži 7 tableta.

L04AG

Monoklonska antitijela

L04AG03

natalizumab

Doziranje: visoko aktivna relapsno-remitentna multipla skleroza uprkos liječenju bar jednom terapijom koja mijenja tok bolesti ili kod pacijenata sa teškom brzo napredujućom relapsno-remitentnom multiplom sklerozom: odrasli 18-65 god, i.v. 300 mg jedanput svake 4 sedmice; razmotriti prekid terapije ukoliko nema vidljive koristi terapije nakon 6 mjeseci

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TYRUKO - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

ZU otopina za infuziju [20 mg/1 mL] 15 ml otopine u staklenoj bočici, u kutiji

TYSABRI - BIOGEN INTERNATIONAL GMBH

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [300 mg/15 mL] 15 ml koncentrata za rastvor za infuziju u staklenoj bočici, u kutiji

L04AG05

vedolizumab

Doziranje: umjeren do izrazito aktivan *ulcerozni kolitis*: odrasli i.v. inf. tokom 30 min. inicijalno 300 mg, ponoviti nakon 2 nedjelje i nakon 6 nedjelja nakon inicijalne doze, a nakon toga na svakih 8 nedjelja (ukoliko je terapija prekinuta ili je došlo do smanjenja odgovora, učestalost doziranja se može povećati na 300 mg na 4 nedjelje); razmotriti opravdanost dalje primjene terapije ukoliko se do 10. nedjelje ne utvrdi korist terapije; s.c. kao terapija održavanja, koja slijedi bar nakon 2 i.v. inf, 108 mg jedanput svake dvije nedjelje; prvu s.c.inj. treba primijeniti umjesto sljedeće zakazane i.v. doze, te svake dvije nedjelje nakon toga; umjerena do izrazito aktivna *Crohnova bolest*: odrasli i.v. inf. tokom 30 min. inicijalno 300 mg, ponoviti nakon 2 nedjelje i nakon 6 nedjelja nakon inicijalne doze, a nakon toga na svakih 8 nedjelja-ukoliko odgovor nije postignut, dodatna doza od 300 mg može biti data 10 nedjelja nakon inicijalne doze; ukoliko je terapija prekinuta ili je došlo do smanjenja odgovora, učestalost doziranja se može povećati na 300 mg na 4 nedjelje); razmotriti opravdanost dalje primjene terapije ukoliko se do 14. nedjelje ne utvrdi korist terapije; s.c. kao terapija održavanja, koja slijedi bar nakon 2 i.v. inf, 108 mg jedanput svake dvije nedjelje; prvu s.c.inj. treba primijeniti umjesto sljedeće zakazane i.v. doze, te svake dvije nedjelje nakon toga

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ENTYVIO - TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG

- Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [108 mg/1 šprica] 2
napunjene šprice sa po 0,68 ml rastvora za injekciju (vanjska kutija
sadrži 2 unutrašnje kutije sa po 1 napunjenom špricom sa iglom)
- Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [108 mg/1 Pen] 2
napunjena pena sa po 0,68 ml rastvora za injekciju, u kutiji
- ZU prašak za koncentrat za otopinu za infuziju [300 mg/1 bočica] 1
bočica sa 300 mg praška za koncentrat za otopinu za infuziju, u
kutiji

L04AG06 alemtuzumab

Doziranje: visoko aktivna relapsno-remitentna multipla skleroza kod odraslih sa definisanim kliničkim ili slikovnim karakteristikama: i.v.inf. odrasli, za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LEMTADA - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

- ZU koncentrat za rastvor za infuziju [12 mg/1 bočica] 1 bočica sa 1,2 ml
koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

L04AG08 okrelizumab

Doziranje: multipla skleroza: i.v.inf. odrasli, za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OCREVUS - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [300 mg/10 mL] 1 staklena bočica
sa 10 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

OCREVUS 920 MG/23 ML - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

- ZU otopina za injekciju [920 mg/23 mL] 1 staklena bočica sa 23 ml
otopine za injekciju, u kutiji

L04AG12 ofatumumab

Doziranje: multipla skleroza: s.c. početna doza 20 mg jednom nedjeljno 3 doze (nedjelja 0, 1. i 2.) zatim doza održavanja 20 mg jednom mjesečno počevši od 4. nedjelje (2 nedjelje nakon 3. doze)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KESIMPTA - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

- ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenom penu [20 mg/0.4 mL] 1 pen sa 0,4
ml rastvora za injekciju, u kutiji

L04AJ Inhibitori komplementa

L04AJ02 ravulizumab

Doziranje: paroksizmalna noćna hemoglobinurija, atipični hemolitičko-uremijski sindrom, generalizovana mijastenija gravis, poremećaj iz spektra optičkog neuromijelitisa: i.v.inf. odrasli, za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ULTOMIRIS - ALEXION EUROPE SAS

- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [1100 mg/11 mL] 1 bočica sa 11
ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji
- ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [300 mg/3 mL] 1 bočica sa 3 ml
koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

L04AK Inhibitor enzima dihidroorotat dehidrogenaze**L04AK01 leflunomid**

Doziranje: *aktivni reumatoidni artritis:* odrasli preko 18 god, početna doza 100 mg jednom dnevno tokom 3 dana, doza održavanja je 10-20 mg jednom dnevno; *aktivni psorijatični artritis:* odrasli preko 18 god, početna doza 100 mg jednom dnevno tokom 3 dana, zatim 20 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ARAVA - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE**

Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (1HDPE bočica sa 30 film obloženih tableta), u kutiji

LARTEXA - LABORATORIOS NORMON S.A.

Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/Al-poliamid-PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

L04AK02 teriflunomid

Doziranje: *relapsno-remitentna multipla skleroza* kod odraslih i djeca preko 10 god: odrasli, 14 mg jedanom dnevno, djeca preko 10 god tjelesne mase manje od 40 kg 7 mg jednom dnevno, djeca preko 10 god tjelesne mase preko 40 kg 14 mg

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ARTEFLUMID - GALENIKA A.D. BEOGRAD**

Rp film tableta [14 mg/1 tableta] 28 film tableta, 2 blistera sa po 14 tableta, u kutiji

AUBAGIO - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

Rp film tableta [14 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 film tableta) u kartonskom ovitku sa integrisanim blisterima i u zaštitnom kartonskom omotu, u kutiji

TERIFLUNOMID STADA - STADA ARZNEIMITTEL AG

Rp film tableta [14 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Alu/PVC/Alu/OPA blistera sa 14 film tableta), u kutiji

L04AX Ostali imunosupresivi**L04AX01 azatioprin**

Doziranje: transplantacija: početna doza do 5 mg/kg/dan, doza održavanja 1-4 mg/kg/dan; teški reumatoidni artritis, upalne crijevne bolesti (Kronova bolest ili ulcerozni kolitis), sistemski eritemski lupus, dermatomiozitis i polimiozitis, auto-imuni hronični aktivni hepatitis, nodozni poliarteritis, pemphigus vulgaris, autoimuna hemolitička anemija, hronična refraktorna idiopatska trombocitopenična purpura: početna doza rijetko više od 3 mg/kg/dan, snižavanje prema odgovoru, doza održavanja 1-3 mg/kg/dan; ako nema poboljšanja za 3 mjeseca treba prekinuti primjenu.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**IMUPRIN - REMEDICA LIMITED**

Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 100 film tableta (10 Alu/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 Alu/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

IMURAN - ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 100 film tableta (4 bijela neprozirna PVC/Al - blistera po 25 tableta), u kutiji

L04AX02 talidomid

Doziranje: *multipli mijelom:* oralno, odrasli, 200 mg dnevno, trajanje ciklusa 42 dana, maksimalno 12 ciklusa

REGISTROVANI LIJEKOVI:

THALIDINE - SHILPA MEDICARE LIMITED

ZU/Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 28 tvrdih kapsula (4 PVC/Aclar-Aluminijum blistera po 7 kapsula) u kutiji

L04AX03 metotreksat

Doziranje: *umjeren do jak aktivni reumatoidni artritis:* oralno, odrasli preko 18 god, početna doza 7,5 mg jednom nedjeljno (jednokratno), dozu podešavati prema odgovoru; maks. 20 mg nedjeljno; *psorijaza:* 7,5 mg jednom sedmično; maks. 30 mg nedjeljno; *terapija održavanja za akutnu limfoblastnu leukemiju:* oralno, odrasli, 20 do 40 mg/m² jednom nedjeljno, pedijatrijski pacijenti 20 mg/m² jednom nedjeljno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

METHOTREXAT SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Δ ZU/Rp tableta [2.5 mg/1 tableta] 50 tableta u Al/PVC/PVDC blisterima (5 blistera sa po 10 tableta), u kutiji

METOTREKSAT REMEDICA - REMEDICA LIMITED

Δ ZU/Rp film tableta [2,5 mg/1 tableta] 100 film tableta (10 Alu/PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

L04AX04 lenalidomid

Doziranje: *multipli mijelom (novodijagnostifikovani) kod kojih je provedena transplantacija autolognih matičnih ćelija:* 10 mg jednom dnevno u toku 28 uzastopnih dana u toku ponavljanih 28-dnevnih ciklusa, do napredovanja bolesti ili do nepodnošenja terapije; nakon 3 ciklusa doza se može povećati na 15 mg jednom dnevno; *multipli mijelom (novodijagnostifikovani) kod pacijenata koji nisu podobni za transplantaciju u kombinaciji sa deksametazonom;* *multipli mijelom kod pacijenata koji su primili najmanje jednu prethodnu terapiju (u kombinaciji sa deksametazonom):* odrasli, 25 mg jednom dnevno u toku 21 uzastopnog dana u toku ponavljanih 28-dnevnih ciklusa, za dozu deksametazona i za podešavanje doze s obzirom na neželjena dejstva-konsultovati literaturu proizvoda; *multipli mijelom (novodijagnostifikovani) kod pacijenata koji nisu podobni za transplantaciju u kombinaciji sa melfalanom i prednizonom,* 10 mg jednom dnevno u toku 21 uzastopnog dana u toku ponavljanih 28-dnevnih ciklusa, do 9 ciklusa; pacijenti koji su primili 9 ciklusa ili koji ne podnose kombinovanu terapiju, trebaju nastaviti terapiju lenalidomidom kao monoterapijom, za doze melfalana i prednizona i podešavanje doze s obzirom na neželjene efekte, konsultovati literaturu proizvoda; *novodijagnostifikovani multipli mijelom kod pacijenata koji nisu podobni za transplantaciju u kombinaciji sa bortezomibom i deksametazonom:* odrasli, oralno 25 mg jednom dnevno u toku 14 uzastopnih dana u toku ponavljanih 21-dnevnih ciklusa tokom 8 ciklusa, praćeno sa 25 mg jednom dnevno tokom 21 uzastopnog dana ponavljanih 28-dnevnih ciklusa (u kombinaciji sa samim deksametazonom); za doze bortezomiba i deksametazona i podešavanje doze s obzirom na neželjene efekte konsultovati literaturu proizvoda; *mijelodisplastični sindrom:* odrasli, 10 mg jednom dnevno u toku 21 uzastopnog dana u toku ponavljanih 28-dnevnih ciklusa; za podešavanje doze s obzirom na neželjene efekte konsultovati literaturu proizvoda; *folikularni limfom (u kombinaciji sa rituksimabom):* odrasli, oralno 20 mg jednom dnevno u toku 21 uzastopnog dana u toku ponavljanih 28-dnevnih ciklusa do 12 ciklusa; za doziranje rituksimaba i za podešavanje doze s obzirom na neželjena dejstva konsultovati literaturu proizvoda; *limfom plaštenih stanica:* oralno, 25 mg jednom dnevno od 1. do 21. dana u ponavljajućim 28-dnevnim ciklusima

REGISTROVANI LIJEKOVI:**LENALIDOMID ACCORD - ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z.O.O**

- ZU/Rp kapsula, tvrda [10 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda (1 OPA/AL/PVC-Alu-Alu blister sa 21 kapsulom), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [15 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda (1 OPA/AL/PVC-Alu-Alu blister sa 21 kapsulom), u kutiji.
- ZU/Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda (1 OPA/AL/PVC-Alu-Alu blister sa 21 kapsulom), u kutiji.

LENALIDOMID ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

- ZU/Rp kapsula, tvrda [10 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 kapsula); u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [15 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 kapsula); u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [2,5 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 kapsula); u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 kapsula); u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 kapsula); u kutiji

LENALIDOMID TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

- ZU/Rp kapsula, tvrda [10 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa 7 kapsula), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [15 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa 7 kapsula), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [2,5 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa 7 kapsula), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa 7 kapsula), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [5 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa 7 kapsula), u kutiji

LENALIDOMIDE GRINDEKS - AS GRINDEKS, KRUSTPILS IELA 53, RIGA, LV-1057, LETONIJA

- ZU/Rp kapsula, tvrda [10 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda, (3 PVC/Aclar/PVC-aluminijum blistera po 7 kapsula), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [15 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda, (3 PVC/Aclar/PVC-aluminijum blistera po 7 kapsula), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda, (3 PVC/Aclar/PVC-aluminijum blistera po 7 kapsula), u kutiji

L04AX05 *pirfenidon*

Doziranje: *idiopatska plućna fibroza*: oralno, odrasli, početi sa 267 mg 3 puta dnevno tokom 7 dana, zatim povećati na 534 mg 3 puta dnevno tokom 7 dana, zatim povećati na 801 mg 3 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**PIRFENIDON MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED**

- ZU/Rp film tableta [267 mg/1 tableta] 252 film tablete (12 PVC/PCTFE-Alu blistera sa 21 tabletom) u kutiji
- ZU/Rp film tableta [801 mg/1 tableta] 84 film tablete (4 PVC/PCTFE/Alu blistera sa 21 tabletom), u kutiji

L04AX06 *pomalidomid*

Doziranje: *multopli mijelom*: oralno, za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

POMERGOLID - SYNTHON B.V.

- ZU/Rp kapsula, tvrda [1 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda (3 oPA/Al/PVC/Al blistera po 7 kapsula, tvrdih), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [2 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda (3 oPA/Al/PVC/Al blistera po 7 kapsula, tvrdih), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [3 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda (3 oPA/Al/PVC/Al blistera po 7 kapsula, tvrdih), u kutiji
- ZU/Rp kapsula, tvrda [4 mg/1 kapsula] 21 kapsula, tvrda (3 oPA/Al/PVC/Al blistera po 7 kapsula, tvrdih), u kutiji

L04AX07 dimetil fumarat

Doziranje: *relapsno-remitentna multipla skleroza:* odrasli preko 18 god. i djeca 13-17 god. 120 mg dva puta dnevno; nakon 7 dana povećati na 240 mg 2 puta dnevno; za podešavanje doze zbog neželjenih efekata konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DIMETEX - ADALVO LIMITED

- Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [120 mg/1 kapsula] 14
gastorezistentnih kapsula, tvrdih (2 OPA/Alu/PVC/Alu blistera sa po 7 kapsula), u kutiji.

DIMETEX - ADALVO LIMITED

- Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [240 mg/1 kapsula] 56
gastorezistentnih kapsula, tvrdih (8 OPA/Alu/PVC/Alu blistera sa po 7 kapsula), u kutiji

DIMETILFUMARAT MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED

- Rp želučanootporna kapsula, tvrda [240 mg/1 kapsula] 56
želučanootpornih kapsula, tvrdih (4 PVC/PE/PVdC-Alu blistera po 14 kapsula), u kutiji.
- Rp želučanootporna kapsula, tvrda [240 mg/1 kapsula] 56
želučanootpornih kapsula, tvrdih (4 PVC/PE/PVdC-Alu perforirana blistera s jediničnom dozom po 14 kapsula), u kutiji

DIMETILFUMARAT TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

- Rp želučanootporna kapsula, tvrda [120 mg/1 kapsula] 14
želučanootpornih kapsula, tvrdih (2 OPA/Alu/PVC//Alu blistera po 7 kapsula), u kutiji

DIMETILFUMARAT TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

- Rp želučanootporna kapsula, tvrda [240 mg/1 kapsula] 56
želučanootpornih kapsula, tvrdih (8 OPA/Alu/PVC//Alu blistera po 7 kapsula), u kutiji

DIMTRUZIC - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [120 mg/1 kapsula] 14
gastorezistentnih kapsula, tvrdih (1 AL/PVC/PVDC blister sa 14 kapsula), u kutiji
- Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [240 mg/1 kapsula] 56
gastorezistentnih kapsula, tvrdih (4 AL/PVC/PVDC blister sa 14 kapsula), u kutiji

TECFIDERA - BIOGEN INTERNATIONAL GMBH

- Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [120 mg/1 kapsula] 14
gastorezistentnih kapsula, tvrdih (1 PVC/PE/PVDC-PVC/Al blister), u kutiji
- Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [240 mg/1 kapsula] 56
gastorezistentnih kapsula, tvrdih (4 PVC/PE/PVDC-PVC/Al blistera po 14 kapsula), u kutiji

M **MIŠIĆNO - KOŠTANI SISTEM**
M01 **ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI**
M01A **Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski**
lijekovi
M01AB **Derivati sircetne kiseline i srodne supstance**

M01AB01 **indometacin**

Doziranje: upalne reumatske bolesti (reumatoidni artritis, seronegativni spondiloartritis); degenerativne bolesti zglobova (osteoartritis): početna doza tokom prve nedjelje 50-75 mg na dan, doza se svakih nedjelju dana povećava za 25-50 mg dok se ne postigne zadovoljavajući učinak ili maksimalna dnevna doza od 150-200 mg indometacina; artropatija zbog odlaganja kristala (akutni urički artritis, pseudogicht): početna doza je 50 mg tri puta na dan, nakon poboljšanja potrebno je brzo smanjivati dozu do potpunog prekida terapije; izvanzglobni reumatizam (burzitis, kapsulitis, tendinitis, tendosinovitis, sinovitis, humeroskapularni periartritis): početna doza je 75-150 mg na dan podijeljeno u 3-4 pojedinačne doze; bolna stanja (lumbalgije, stanja nakon hirurških i zubarskih zahvata, dismenoreja): do 75 mg na dan podijeljeno u 2-3 pojedinačne doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:

INDOMETACIN FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

△ Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 15 kapsula), u kutiji

M01AB05 **diklofenak**

Doziranje: diklofenak natrijum-bol i inflamacija kod reumatskih oboljenja (uključujući juvenilni idiopatski artritis) i druge mišićno-skeletne poremećaje; akutni giht; postoperativni bol; bolna i/ili inflamatorna stanja u ginekologiji (npr. primarna dismenoreja ili adneksitis i menoregija); simptomatsko kratkotrajno liječenje boli vezano uz upalne infekcije uha, grla ili nosa (npr. faringotonzilitis, otitis): oralno, tablete sa trenutnim oslobađanjem 75-150 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze; tablete sa produženim oslobađanjem 1 tableta dnevno; rektalno-supozitorije, 75-150 mg dnevno u podijeljenim dozama; juvenilni idiopatski artritis: rektalno, djeca 6 mjeseci-18 god. i oralno, djeca 14-18 god. 1,5-2,5 mg/kg (maks. 75 mg) 2 puta dnevno, alternativno, ukupna dnevna doza može biti data u 3 podijeljene doze; postoperativni bol: oralno, tablete sa trenutnim oslobađanjem odrasli 75-150 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze; tablete sa produženim oslobađanjem 1 tableta dnevno; rektalno, djeca 6 mjeseci-18 god. tjelesne mase 8-12 kg 12,5 mg 2 puta dnevno tokom maks. 4 dana; tjelesne mase preko 12 kg 1 mg/kg (maks. 50 mg) 3 puta dnevno tokom maks. 4 dana; i.v. inf ili i.m. inj. u glutealni mišić, djeca 2-18 god. 0,3-1 mg/kg jednom ili 2 puta dnevno tokom maks. 2 dana (maks. 150 mg dnevno), odrasli 75 - 150 mg dnevno; diklofenak kalijum-bol i inflamacija kod reumatskih oboljenja i drugih mišićno-skeletnih poremećaja; akutni giht; simptomatsko kratkotrajno liječenje boli vezano uz upalne infekcije uha, grla ili nosa (npr. faringotonzilitis, otitis): 75-150 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze; djeca preko 14 god. 75-100 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze; postoperativni bol: 75-150 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze; djeca 9-14 god. (tjelesne mase 35 kg i više), do 2 mg/kg (maks. 100 mg) dnevno u 3 podijeljene doze; djeca preko 14 god. 75-100 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze; migrena: prvo 50 mg, ponoviti nakon 2 sata ukoliko je neophodno, zatim nakon 4-6 sati; maks. 200 mg u toku 24 sata; ne preporučuje se djeci; groznica kod infekcije uha, nosa ili grla: djeca preko 9 god. (tjelesne mase 35 kg i više), do 2 mg/kg (maks. 100 mg) dnevno u 3 podijeljene doze; akutna bol kod renalnih kolika, pogoršanje osteoartritisa i reumatoidnog artritisa, akutnog bola u leđima, akutnog gihta, akutne traume i frakture: i.m. 75-150 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DICLOFENAC PHARMASWISS - PHARMASWISS D.O.O.

- Rp kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda [75 mg/1 kapsula] 30 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

DICLORAPID - PHARMASWISS D.O.O.

- Rp gastrozistentna kapsula, tvrda [75 mg/1 kapsula] 20 gastrozistentnih kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC/Al - blistera po 10 kapsula), u kutiji

DIFEN - BOSNALIJEK D.D.

- Rp tableta s produženim oslobađanjem [100 mg/1 tableta] 20 tableta s produženim oslobađanjem (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

- Rp želučanootporna tableta [50 mg/1 tableta] 20 želučanootpornih tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

DIKLOFEN - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- Rp gastrozistentna tableta [50 mg/1 tableta] 20 gastrozistentnih tableta (2 PVC/PVdC/Alu/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

- Rp supozitorija [50 mg/1 supozitorija] 10 supozitorija (2 stripa po 5 supozitorija), u kutiji

- Rp tableta sa produženim oslobađanjem [100 mg/1 tableta] 20 tableta sa produženim oslobađanjem (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

- ZU rastvor za injekciju [75 mg/3 mL] 5 staklenih ampula sa 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

DIKLOFENAK HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- ZU rastvor za injekciju [75 mg/3 mL] 5 staklenih ampula sa 3 mL rastvora za injekciju (1 PVC/Al - blister sa 5 ampula), u kutiji

DIKLORON - DEVA HOLDING A.S.

- Rp gastrozistentna tableta [50 mg/1 tableta] 20 gastrozistentnih tableta (2 PVC/PVDC/Al blisteru po 10 tableta) u kutiji

- ZU rastvor za injekciju [75 mg/3 mL] 4 ampule sa po 3 mL rastvora za injekciju, u kutiji

NAKLOFEN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- ZU otopina za injekciju [75 mg/3 mL] 5 staklenih ampula po 3 mL otopine za injekciju, u kutiji

NAKLOFEN DUO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp kapsula, tvrda [75 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (2 OPA/Al/PVC folija/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

- Rp kapsula, tvrda [75 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/PE/PVDC/PE/PVC/Al blister po 10 kapsula), u kutiji

RAPTEN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

RAPTEN - K - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp obložena tableta [50 mg/1 tableta] 10 obloženih tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji

RAPTEN DUO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- Rp tableta sa modifikovanim oslobađanjem [75 mg/1 tableta] 10 tableta sa modifikovanim oslobađanjem (1 PVC/PVDC/Al blister), u kutiji

Rp tableta sa modifikovanim oslobađanjem [75 mg/1 tableta] 30 tableta sa modifikovanim oslobađanjem (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

RAPTEN FORTE - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp tableta sa modifikovanim oslobađanjem [100 mg/1 tableta] 20 tableta sa modifikovanim oslobađanjem (2 PVC/PVdC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

VOLTAREN - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp čepić [12,5 mg/1 čepić] 10 čepića (2 PVC/LD-PE-blistera po 5 čepića) u kutiji

Rp čepić [25 mg/1 čepić] 10 čepića (2 PVC/LD-PE blistera po 5 čepića) u kutiji

Rp čepić [50 mg/1 čepić] 10 čepića (2 PVC/LD-PE blistera sa 5 čepića) u kutiji

VOLTAREN FORTE - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp želučanootporna tableta [50 mg/1 tableta] 20 želučanootpornih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji

VOLTAREN RAPID - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp obložena tableta [50 mg/1 tableta] 10 obloženih tableta (1 PVC/PE/PVDC/Alu blister sa 10 tableta) u kutiji

VOLTAREN RETARD - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp tableta sa produženim oslobađanjem [100 mg/1 tableta] 20 tableta sa produženim oslobađanjem (2 PVC/PE/PVDC- Alu blistera po 10 tableta), u kutiji

M01AB08 etodolak

Doziranje: bol i zapaljenje kod reumatskog artritisa i osteoartritisa: odrasli i djeca preko 18 god, 300-600 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze; tbl. sa produženim oslobađanjem 600 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BARCA SR - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp tableta s produženim oslobađanjem [600 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta sa produženim oslobađanjem [600 mg/1 tableta] 10 tableta sa produženim oslobađanjem (1 Al/PVC/PVDC blister sa 10 tableta) u kutiji

ETOL FORT - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 14 film tableta (1 PVC/Al - blister sa 14 tableta) u kutiji

ETOL SR - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

Rp tableta s produženim oslobađanjem [600 mg/1 tableta] 10 tableta sa produženim oslobađanjem (1 PVC/PE/PVDC//Al blister), u kutiji

TILAC - BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 14 film tableta (1 PVC/ Al blister),u kutiji

M01AB11 acemetacin

Doziranje: bol i zapaljenje kod akutnog i hroničnog artritisa, ankilizirajućeg spondilitisa, drugih reumatskih oboljenja i mišićno-koštanih poremećaja: 60 mg 1-3 puta dnevno, sa dovoljno tečnosti, tokom obroka.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

RANTUDIL FORTE - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

△ Rp kapsula, tvrda [60 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al - blistera po 10 kapsula) u kutiji

M01AB16 aceklofenak

Doziranje: bol i zapaljenje (stomatološka stanja, reumatoidni artritis, osteoartritis, ankilozirajući spondilitis): 100 mg dva puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ACEDOL - QUALIX PHARMA S.L.

Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PA/Aluminijum/PVC–Aluminijum/PVC/PVDC blistera sa 10 film tableta), u kutiji

M01AB55 diklofenak, orfenadrin

Doziranje: *akutni radikularni bol, bol i upalna stanja kičmenog stuba, akutni bol povezan sa reumatskim oboljenjima, postoperativna bol:* uobičajena dnevna doza je 250 ml rastvora za infuziju; u posebnim slučajevima mogu se dati dvije infuzije po 250 ml na dan, uz pauzu od najmanje 8 sati između završetka prve i početka druge infuzije; infuzija mora trajati 1,5-2 sata.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NEODOLPASSE - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

△ ZU rastvor za infuziju [75 mg/250 mL+ 30 mg/250 mL] 10 staklenih boca sa po 250 ml rastvora za infuziju, u kutiji

M01AC Oksikami

M01AC06 meloksikam

Doziranje: *egzacerbacija osteoartritisa* (kratkotrajna terapija), oralno, odrasli i djeca preko 16 god. 7,5 mg jednom dnevno, povećati ukoliko je neophodno na maks. 15 mg jednom dnevno; *bol i inflamacija kod reumatskih oboljenja, ankilozirajući spondilitis:* odrasli i djeca preko 16 god. 7,5 -15 mg jednom dnevno (pacijenti sa renalnom insuficijencijom i stariji pacijenti maksimalno 7,5 mg dnevno); parenteralno (samo za odrasle): 7,5 – 15 mg jednom dnevno kao duboka intramuskularna injekcija, primjena ograničena na 2-3 dana, uz nastavak oralne primjene ako je neophodno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEVOXICAM - DEVA HOLDING A.S.

Rp tableta [15 mg/1 tableta] 10 tableta (1 Al/PVC/PVDC blister sa 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [7.5 mg/1 tableta] 10 tableta (1 Al/PVC/PVDC blister sa 10 tableta), u kutiji

MELCAM - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

Rp tableta [15 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [7.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

MELOX - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

Rp tableta [7.5 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/PE/PVDC//Al - blister), u kutiji

Rp tableta [7.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PE/PVDC//Al - blistera), u kutiji

ZU otopina za injekciju [15 mg/1.5 mL] 3 staklene ampule sa 1,5 ml otopine za injekciju, u kutiji

MELOX FORT - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

- Rp tableta [15 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/PE/PVDC//AI - blister), u kutiji
- Rp tableta [15 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PE/PVDC//AI - blistera po 10 tableta), u kutiji

M01AE *Derivati propionske kiseline*

M01AE01 *ibuprofen*

Doziranje: bol i zapaljenje kod reumatskih oboljenja i drugih mišićno skeletnih poremećaja; umjeren do jak bol uključujući dismenoreju; postoperativna analgezija; zubobolja; oralno uzimajući preparate sa trenutnim oslobađanjem, odrasli, početi sa 300-400 mg 3-4 puta dnevno; povećati ukoliko je neophodno na maks. 2,4 g dnevno; uobičajena doza održavanja 0,6-1,2 g dnevno podijeljeno u 3 doze; oralno uzimajući preparate sa modifikovanim oslobađanjem, odrasli 1,6 g jednom dnevno, dozu treba uzeti jednom uveče, po potrebi povećati na 2,4 g dnevno u 2 podijeljene doze, dozu povećati samo u slučaju jakih bolova; akutna migrena, oralno uzimajući preparate sa trenutnim oslobađanjem: odrasli 400-600 mg u jednoj dozi, uzeti čim se simptomi migrene krenu razvijati; umjeren do jak bol, bol i zapaljenje usljed povrede mekog tkiva, groznica sa neugodnošću, oralno uzimajući preparate sa trenutnim oslobađanjem: djeca 3-5 mjeseci 50 mg 3 puta dnevno; maks. dnevna doza treba biti data u 3-4 podijeljene doze; maks. 30 mg/kg po danu; djeca 6-11 mjeseci 50 mg 3-4 puta dnevno (maks. 30 mg/kg dnevno u 3-4 podijeljene doze); djeca 1-3 god. 100 mg 3 puta dnevno (maks. 30 mg/kg dnevno u 3-4 podijeljene doze); djeca 4-6 god. 150 mg 3 puta dnevno (maks. 30 mg/kg dnevno u 3-4 podijeljene doze); djeca 7-9 god. 200 mg 3 puta dnevno (do 30 mg/kg dnevno (maks. 2,4 g u 3-4 podijeljene doze); djeca 10-11 god. 300 mg 3 puta dnevno (do 30 mg/kg dnevno (maks. 2,4 g) u 3-4 podijeljene doze); djeca 12-17 god. početna doza 300-400 mg 3-4 puta dnevno, po potrebi povećati do 600 mg 4 puta dnevno, doza održavanja 200-400 mg 3 puta dnevno; bol i zapaljenje uzimajući preparate sa modifikovanim oslobađanjem: djeca 12-17 god. 1,6 g jednom dnevno, doza se pretežno uzima u ranim večernjim časovima, i može se u slučaju jake boli povećati na 2,4 g dnevno u 2 podijeljene doze; bol i zapaljenje kod reumatskih oboljenja uključujući juvenilni idiopatski artritis, oralno upotrebljavajući preparate sa trenutnim oslobađanjem, djeca 3 mjeseca-17 god. 30-40 mg/kg dnevno u 3-4 podijeljene doze, maks. 2,4 g dnevno; bol i inflamacija kod sistemskog juvenilnog idiopatskog artritisa: oralno, upotrebljavajući preparate sa trenutnim oslobađanjem, djeca 3 mjeseca-17 god. do 60 mg/kg dnevno u 4-6 podijeljenih doza (maks. 2,4 g dnevno); postimunizacijska pireksija kod odojčadi (samo nakon savjeta ljekara), oralno uzimajući preparate sa trenutnim oslobađanjem, djeca 2-3 mjeseca 50 mg u jednoj dozi, ponovo nakon 6 sati dati 50 mg ako je potrebno; parenteralno - kratkotrajna simptomatska terapija akutnog blagog bola, kratkotrajna simptomatska terapija povišene temperature: 400 mg svakih 6 do 8 sati, maks. 1200 mg dnevno; rektalno - snižavanje povišene tjelesne temperature, uključujući onu kod prehlade i gripa i kod vakcinacije; ublažavanje blagih do umjerenih bolova, poput bola kod nicanja zuba, zubobolje, grlobolje, uholbolje: djeca 6-8 kg (3-9 mjeseci) 60 mg 3 puta na dan u razmaku od 6-8 sati, djeca 8-12 kg (9 mjeseci do 2 god.) 60 mg 4 puta na dan u razmaku od 6 sati; djeca 12,5-17 kg (2-4 god.) 125 mg 3 puta na dan u razmaku 6-8 sati; 17-20,5 kg (4-6 god.) 125 mg 4 puta na dan u razmaku od 6 sati

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BLOKMAX - ALKALOID AD SKOPJE

- BRp film tableta [200 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/AI blister sa po 10 tableta), u kutiji
- BRp film tableta [200 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/AI blistera sa po 10 tableta), u kutiji

BLOKMAX FORTE - ALKALOID AD SKOPJE

- BRp film tableta [400 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/Al blister sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

BLOKMAX FORTE ZA DJECU - ALKALOID AD SKOPJE

- Rp oralna suspenzija [200 mg/5 mL] 100 ml oralne suspenzije u staklenoj boci i špric za doziranje, u kutiji

BLOKMAX RAPID - ALKALOID AD SKOPJE

- BRp film tableta [400 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PVdC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

BLOKMAX ZA DJECU - ALKALOID AD SKOPJE

- Rp oralna suspenzija [100 mg/5 mL] 100 ml oralne suspenzije u staklenoj bočici od neutralnog stakla zatvorena bijelim navojnim plastičnim zatvaračem, u kutiji

BRUFEN - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [600 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp šumeće granule [600 mg/1 vrećica] 30 vrećica sa šumećim granulama, u kutiji

BRUFEN EFFECT - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- BRp filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
- BRp šumeće granule [400 mg/1 vrećica] 12 vrećica sa šumećim granulama, u kutiji

BRUFEN EFFECT RAPID - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- BRp filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 12 filmom obloženih tableta (1 PVC/PE/PVDC-Al blister), u kutiji

BRUFEN SR - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- Rp tableta s produženim oslobađanjem [800 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

CAFFETIN MENSTRUAL - ALKALOID AD SKOPJE

- BRp film tableta [200 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/Al - blister sa 10 tableta), u kutiji

DAFEN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- BRp film tableta [200 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/ALU blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [600 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

DALSY - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- BRp sirup [100 mg/5 mL] 1 smeđa polietilenska bočica sa 100 mL sirupa i plastična kašika za doziranje, u kutiji.

IBUDIRECT - PHARMAMED D.O.O. TRAVNIK

- BRp kapsula, meka [200 mg/1 kapsula] 10 kapsula, mekih (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji

- BRp kapsula, meka [400 mg/1 kapsula] 10 kapsula, mekih (1 PVC/PVDC-Al blister), u kutiji
- IBUMAX 2% - HEMOFARM A.D. VRŠAC**
- BRp oralna suspenzija [100 mg/5 mL] 1 PET boca sa 100 ml oralne suspenzije, sa sigurnosnim zatvaračem za djecu sa navojem (CRC), adapterom za oralni špric i oralnim špricom u kartonskoj kutiji
- IBUMAX 4 % - HEMOFARM A.D. VRŠAC**
- Rp oralna suspenzija [40 mg/1 mL] boca od 100 ml, u kutiji
- IBUMAX DIRECT - STADA ARZNEIMITTEL AG**
- BRp oralni prašak [200 mg/1 kesica] 12 kesica sa oralnim praškom, u kutiji
- BRp oralni prašak [400 mg/1 kesica] 12 kesica sa oralnim praškom, u kutiji
- IBUPROFEN ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE**
- BRp film tableta [200 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 Al/PVC blister), u kutiji
- BRp film tableta [200 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
- BRp film tableta [400 mg/1 tableta] 10 film tableta (1Al/PVC blister), u kutiji
- BRp oralna suspenzija [100 mg/5 mL] 100 ml oralne suspenzije (staklena bočica sa oralnom suspenzijom, 1 plastični špric, u kutiji)
- Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
- IBUPROFEN B. BRAUN 4 MG/ML - B.BRAUN MELSUNGEN AG**
- ZU otopina za infuziju [4 mg/1 mL] 10 polietilenskih boca niske gustoće (LDPE) po 100 mL otopine za infuziju, u kutiji
- ZU otopina za infuziju [4 mg/1 mL] 10 polietilenskih boca niske gustoće (LDPE) po 50 mL otopine za infuziju, u kutiji
- IBUPROFEN B. BRAUN 6 MG/ML - B.BRAUN MELSUNGEN AG**
- ZU otopina za infuziju [6 mg/1 mL] 10 polietilenskih boca niske gustoće (LDPE) po 100 mL otopine za infuziju, u kutiji
- IBUPROFEN FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO**
- Rp filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [600 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- IBUPROFEN HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA**
- Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- IBUPROFEN KABI 400 MG OTOPINA ZA INFUZIJU - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH**
- ZU otopina za infuziju [4 mg/1 mL] 10 LDPE boca sa po 100 ml otopine za infuziju, u kutiji
- IBUPROFEN REMEDICA - REMEDICA LIMITED**
- BRp obložene tablete [200 mg/1 tableta] 30 obloženih tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

Rp	film tableta [600 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	obložene tablete [400 mg/1 tableta] 20 obloženih tableta (2 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
IBUPROFEN REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE	
BRp	film tableta [200 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	film tableta [400 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
Rp	sirup [100 mg/5 mL] 1 staklena boca sa 100 ml sirupa i dozirnom kašikom, u kutiji
NEOFEN - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.	
BRp	čepić [125 mg/1 supozitorija] 10 čepića (2 PVC/PE stripa po 5 čepića), u kutiji
BRp	čepić [60 mg/1 čepić] 10 čepića (2 PVC/PE blistera sa 5 čepića), u kutiji
BRp	sirup [100 mg/5 mL] 1 smeđa staklena bočica sa 100 ml sirupa, polietilenskim (HDPE) sigurnosnim zatvaračem i štrcaljkom za usta, graduiranom u kutiji
BRp	filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
NEOFEN FORTE - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO	
BRp	filmom obložena tableta [400 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al blister) u kutiji
NEOFEN RAPID - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO	
BRp	filmom obložena tableta [342 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
BRp	filmom obložena tableta [684 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
NUROFEN ZA DJECU JAGODA - RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED	
Rp	oralna suspenzija [100 mg/5 mL] 100 ml oralne suspenzije u plastičnoj bočici i 1 dozirni špric, u kutiji
Rp	oralna suspenzija [100 mg/5 mL] 200 ml oralne suspenzije u plastičnoj bočici i jedan dozirni špric, u kutiji
RAPIDOL S - PHARMASWISS D.O.O.	
BRp	kapsula, meka [200 mg/1 kapsula] 20 kapsula, mekih (2 PVC/PE/PVdC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji
ROZYFEN - GALENIKA A.D. BEOGRAD	
BRp	film tableta [400 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 blister od Alu/PVC trake i tvrde PVC trake po 10 film tableta), u kutiji
Rp	film tableta [400 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 blistera od Alu/PVC trake i tvrde PVC trake po 10 film tableta), u kutiji

M01AE02 naproksen

Doziranje: *bol i inflamacija kod reumatskih oboljenja:* 0,5-1 g dnevno u 1-2 podijeljene doze; *bol i inflamacija kod mišićnoskeletnih oboljenja i dismenoreja:* početna doza 500 mg, zatim po potrebi 250 mg svakih 6-8 sati; maks. doza poslije prvog dana 1,25 g dnevno; *akutni giht:* početna doza 750 mg, zatim 250 mg dok bol postoji; *akutna migrena:* oralno, odrasli 500 mg u jednoj dozi, uzeti u kombinaciji sa sumatriptanom čim se simptomi migrene razvijaju

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BOLEX - BOSNALIJEK D.D.

BRp film tableta [275 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

BOLEX FORTE - BOSNALIJEK D.D.

Rp film tableta [550 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

Rp film tableta [550 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

NALGESIN FORTE - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp filmom obložena tableta [550 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al blister sa 10 filmom obloženih tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [550 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/Al blistera po 10 filmom obloženih tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [550 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera po 10 filmom obloženih tableta), u kutiji

NALGESIN S - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp filmom obložena tableta [275 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al folija blister), u kutiji

BRp filmom obložena tableta [275 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/Al folija blistera po 10 tableta), u kutiji

BRp filmom obložena tableta [275 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

NAPROKSEN GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

BRp film tableta [275 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC Al-blister sa 10 tableta) u kutiji

Rp film tableta [550 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

M01AE03 ketoprofen

Doziranje: bol i slaba inflamacija kod reumatskih oboljenja i drugih mišićnoskeletnih poremećaja i nakon hirurških zahvata u ortopediji; akutni giht; dismenoreja; oralno, reumatska oboljenja, 100-200 mg u 2-4 podijeljene doze; bol i dismenoreja: 50 mg do 3 puta dnevno; akutna jaka bol (u slučaju akutne upale zglobova), hronični bolovi u zglobovima (posebno kod reumatskog artritisa(hronični poliartritis), ankilozni spondilitis (Bechterewljeva bolest) i ostalih upalno-reumatskih bolesti kičme, nadražajnih stanja pri degenerativnim bolestima zglobova i kičme (artroze i spondiloartroze), izvanzglobni reumatizam, bolne otekline ili upale nakon ozljeda: i.m. 100 mg, po potrebi još 100 mg, maks. 200 mg dnevno; i.v. 100-200 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DOLPIRINN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp prašak za oralni rastvor [50 mg/1 kesica] 30 (papir/aluminijum/polietilen) kesica po 1,5 g praška za oralni rastvor, u kutiji

KE-RELIEF - EAST AFRICAN INDIA OVERSEAS

ZU rastvor za injekciju/ infuziju [100 mg/2 mL] 10 ampula po 2 ml od jantarnog stakla, u kutiji

KETOBOS - BOSNALIJEK D.D.

Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 10 kapsula, tvrdih), u kutiji

KETONAL - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 25 kapsula, tvrdih (staklena bočica), u kutiji

ZU	rastvor za injekciju [100 mg/2 mL] 10 ampula po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji
KETONAL DUO - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.	
Rp	kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda [150 mg/1 kapsula] 20 kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrdih (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 kapsula), u kutiji
KETONAL FORTE - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.	
Rp	filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/Alu blistera sa 10 tableta), u kutiji
KETONAL SPRINT - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.	
BRp	granule za oralni rastvor [25 mg/1 vrećica] 12 vrećica (papir/Al/PE vrećica) sa po 1 g granula za oralni rastvor, u kutiji

M01AE17 deksketoprofen

Doziranje: oralna primjena: *simptomatska terapija akutnih bolova blagog do umjerenog intenziteta (mišićno-koštani bol, bolna menstruacija, zubobolja):* 12,5 mg na svakih 4-6 sati ili 25 mg na svakih 8 sati, maksimalno 75 mg dnevno; parenteralna primjena: *simptomatsko liječenje akutnog bola umjerenog do jakog intenziteta kada oralna primjena nije primjerena, kod postoperativnog bola, renalnih kolika i bola u donjem dijelu leđa:* 50 mg svakih 8-12 sati; ako je potrebno doza se može ponoviti nakon 6 sati; maksimalno 150 mg dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEKENOR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

ZU otopina za injekciju/ infuziju [50 mg/2 mL] 5 ampula po 2 ml otopine za injekciju/infuziju, u kutiji

DEKSALGIN - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

BRp film tableta [25 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PE/PVDC/Al blister neprozirni sa 10 film tableta), u kutiji

ZU otopina za injekciju [50 mg/2 mL] 6 staklenih ampula po 2 ml otopine za injekciju, u kutiji

DEXIREN - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp film tableta [25 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

DEKETOPIROFEN KALCEKS - AS KALCEKS

ZU rastvor za injekciju/ infuziju [50 mg/2 mL] 10 ampula (tamno staklo tip I) sa 2 mL rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

DEXOMEN 25 - BERLIN-CHEMIE AG

BRp film tableta [25 mg/1 tableta] 10 tableta, u kutiji

BRp granule za oralnu otopinu [25 mg/1 kesica] 10 kesica sa granulama za oralnu otopinu, u kutiji

DEXOMEN INJECT - BERLIN-CHEMIE AG

ZU rastvor za injekciju/ infuziju [50 mg/2 mL] 5 staklenih ampula po 2 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

DOLOREX - BOSNALIJEK D.D.

BRp film tableta [25 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PVdC-Al blister sa 10 tableta), u kutiji

SERTOPIROFEN - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ş.

BRp filmom obložena tableta [36,91 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 Alu-PVC/ PVDC blister), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [36,91 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 Alu-PVC/ PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

ZU rastvor za injekciju [73,8 mg/1 ampula] 5 staklenih ampula od po 2 ml sa rastvorom za injekciju, u kutiji

M01AE51 ibuprofen, paracetamol

Doziranje: simptomatsko liječenje blage do umjerene akutne boli (glavobolja, zubobolja, bol nakon vađenja zuba, dismenoreja, simptomatsko liječenje blagih do umjerenih reumatskih i mišićnih bolova, bolovi uzrokovani blagim oblicima artritisa, stanja povišene tjelesne temperature: odrasli iznad 18 god, jedna tableta do tri puta dnevno, sa vodom, uz minimalan razmak između doza od šest sati; maksimalno po dvije tablete do tri puta na dan (maks 6 tableta tokom 24 sata)

REGISTROVANI LIJEKOVI:**NEOFEN COMBO - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.**

- BRp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta] 10
filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC//Al blister), u kutiji

PARAFEN - REPEK AD SKOPJE

- BRp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta] 10
filmom obloženih tableta (1 PVDC/TE/PVC//Al blister sa 10 tableta),
u kutiji
- BRp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta] 20
filmom obloženih tableta (2 PVDC/TE/PVC//Al blistera po 10
tableta), u kutiji

M01AE51 fenilefrin, ibuprofen

Doziranje: *otklanjanje simptoma prehlade i gripa sa udruženom kongestijom:* odrasli, starije osobe i djeca uzrasta od 12 god. 2 tablete 200 mg/5 mg ili 1 tabletu 400 mg/10 mg na 8 sati; period između doza ne smije biti manji od 4 sata, maks. dnevna doza 1200 mg/30 mg

REGISTROVANI LIJEKOVI:**IBUMAX DUO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA****D.O.O. BANJA LUKA**

- BRp film tableta [10 mg/1 tableta+ 400 mg/1 tableta] 10 film tableta (1
PVC/PE/PVdC//Al blister sa 10 tableta), u kutiji

M01AH Koksibi**M01AH01 celekoksib**

Doziranje: *simptomatski tretman osteoartritisa:* 200 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze, ukoliko je neophodno povećati na maks. 200 mg dva puta dnevno; *simptomatski tretman reumatoidnog artritisa:* 100 mg dva puta dnevno, ukoliko je neophodno povećati na 200 mg dva puta dnevno; *ankilozirajući spondilitis:* 200 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze, ukoliko je neophodno povećati na maks. 400 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze; kako se rizik od kardiovaskularnog uticaja može povećati s povećanjem doze i dužinom primjene, celekoksib treba koristiti što je moguće kraće i u najnižim efikasnim dnevnim dozama.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ACLEXA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO**

- Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 10 kapsula, tvrdih (1 PVC/Al blister), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/Al blistera), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [200 mg/1 kapsula] 10 kapsula, tvrdih (1 PVC/Al blister), u kutiji
- Rp kapsula, tvrda [200 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/Al blistera), u kutiji

M01AH05 etorikoksib

Doziranje: *osteoartritis*: 30 mg jednom dnevno, ukoliko je neophodno dozu povećati na 60 mg jednom dnevno; *reumatoidni artritis i ankilozirajući spondilitis*: 90 mg jednom dnevno; *akutni urični artritis (giht)*: 120 mg jednom dnevno u toku maks. 8 dana; kontraindikovano kod djece i adolescenata mlađih od 16 godina; *kratkotrajno liječenje umjereno jakog bola povezanog sa stomatološkim hirurškim zahvatom*: 90 mg jednom dnevno, najduže 3 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ARCOXIA - N.V. ORGANON

- Rp filmom obložena tableta [120 mg/1 tableta] 7 filmom obloženih tableta (1 Al/Al blister sa 7 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [30 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 Al/Al blistera po 7 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [60 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta (1 Al/Al blister sa 14 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [90 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera po 7 tableta), u kutiji

DOLOXIB - ZENTIVA, K.S.

- Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 14 film-tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa 7 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [90 mg/1 tableta] 14 film-tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa 7 tableta), u kutiji

ETOXIB - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp filmom obložena tableta [120 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [120 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [30 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [30 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [60 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [60 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [90 mg/1 tableta] 14 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [90 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji

M01AX Ostali nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lijekovi

M01AX05 glukozamin

Doziranje: *ublažavanje simptoma blagog do umjerenog ostoartritisa*: 1 tbl. 2 puta na dan ili 1 kesica praška za oralni rastvor jednom dnevno; ukoliko ne dođe do ublažavanja simptoma nakon 2-3 mjeseca, terapiju glukozaminom treba razmotriti

REGISTROVANI LIJEKOVI:

METASPON - LABORATORIO REIG JOF RE S.A.

- BRp prašak za oralni rastvor [1500 mg/1 kesica] 30 kesica praška za oralni rastvor, u kutiji

M01AX07 benzidamin

Doziranje: ublažavanje bolova u traumatskim stanjima kao što su tonzilektomija ili primjena nazogastrične sonde, stomatološke operacije: odrasli, adolescenti i starije osobe, 4-8 potisaka spreja svakih 1,5-3 sata; djeca 6-12 god. 4 potiska svaka 1,5-3 sata; djeca ispod 6 god, 1 potisak na svaka 4 kg tjelesne težine do maks. 4 potiska na svaka 1,5-3 sata

REGISTROVANI LIJEKOVI:**TANFLEX 0,15% - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.**

BRp sprej za usnu sluznicu [1.5 mg/1 mL] 30 ml spreja za usnu sluznicu (1 staklena boca i poklopac sa sprej pumpicom), u kutiji

M01AX17 nimesulid

Doziranje: akutni bolovi različite etiologije, simptomatska terapija osteoartritisa, primarna dismenoreja: 100 mg dva puta dnevno poslije jela; maks. dužina terapije je 15 dana; kontraindikovano kod djece mlađe od 12 godina.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**NIMULID - PANACEA BIOTEC PHARMA LIMITED**

Rp tableta [100 mg/1 tableta] 20 tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

NIMULID MD - PANACEA BIOTEC PHARMA LIMITED

Rp oralna disperzibilna tableta [100 mg/1 tableta] 10 oralnih disperzibilnih tableta (1 AL/PVC blister sa 10 tableta) u kutiji

VENTOR - REPLEK AD SKOPJE

Rp tableta [100 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

M02 LIJEKOVI ZA LOKALNU PRIMJENU PROTIV BOLOVA U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA**M02A Lijekovi za lokalnu primjenu protiv bolova u mišićima i zglobovima****M02AA Nestteroidni antiinflamatorni lijekovi za lokalnu primjenu****M02AA06 etofenamat**

Doziranje: simptomatsko liječenje bola (iščašjenja, uganuća, modrice ekstremiteta nakon tupih trauma kao što su sportske ozljede; mekog tkiva u slučajevima gonartroze): 3 puta dnevno utrljati gel (oko 10 cm) na bolnu površinu kože, terapija traje do 7 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:**JUVE - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.**

BRp gel [50 mg/1 g] 40 g gela u Al tubi, u kutiji

RHEUMON - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

BRp gel [5 g/100 g] Al - tuba sa 40 g gela, u kutiji

M02AA10 ketoprofen

Doziranje: lokalno liječenje bolnih poremećaja osteoartikularnog i muskularnog sistema reumatskog i traumatskog porijekla (kontuzije, distorzije, istegnuća mišića, ukočen vrat, lumbago): 1-3 puta dnevno blago utrljati u oboljelo mjesto, tokom najduže 7 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:**FASTUM - BERLIN-CHEMIE AG**

Rp gel [2.5 g/100 g] Al - tuba sa 100 g gela, u kutiji

Rp	gel [2.5 g/100 g] Al - tuba sa 20 g gela, u kutiji
Rp	gel [2.5 g/100 g] Al - tuba sa 30 g gela, u kutiji
Rp	gel [2.5 g/100 g] Al - tuba sa 50 g gela, u kutiji

M02AA13 ibuprofen

Doziranje: lokalni simptomatski tretman reumatskih bolova, bolova u mišićima, bolova u leđima, bolova i otoka izazvanih uganućima, istegnućima i sportskim povredama i bolova udruženim sa blagim do umjerenim artričkim stanjima: gel/krem, 4-10 cm gela/kreme lagano utrljati 3 do 4 puta dnevno u predio oboljelog mjesta;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BLOKMAX - ALKALOID AD SKOPJE

BRp gel [50 mg/1 g] aluminijska tuba sa 50g gela, u kutiji

DOLGIT GEL - DOLORGIET GMBH & CO. KG

BRp gel [5 g/100 g] 1 Alu tuba sa 50 g gela, u kutiji

DOLGIT GEL - DOLORGIET GMBH & CO. KG

BRp gel [50 mg/1 g] 1 Alu tuba sa 100 g gela, u kutiji

BRp gel [50 mg/1 g] 1 Alu tuba sa 150 g gela, u kutiji

DOLGIT KREMA - DOLORGIET GMBH & CO. KG

BRp krema [5 g/100 g] 1 Alu tuba sa 50 g kreme, u kutiji

IBUPROFEN REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE

BRp krema [100 mg/1 g] 1 Al-tuba sa 50 g kreme, u kutiji

NEOFEN PLUS - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

BRp gel [50 mg/1 g] 50 g gela u aluminijskoj tubi, u kutiji

M02AA15 diklofenak

Doziranje: lokalno i simptomatsko olakšanje boli i upale kod ozljede tetiva, ligamenata, mišića i zglobova; lokalizovani oblici reumatizma mekih tkiva; osteoartritis površinskih zglobova: 2-4 puta dnevno utrljati po 2-4 g gela

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DICLAC 5% - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

BRp gel [5 g/100 g] Aluminijska tuba sa 50 g gela, u kutiji

DIFEN - BOSNALIJEK D.D.

BRp gel [10 mg/1 g] 1 Al tuba sa 40 g gela

DIKLOFEN - GALENIKA A.D. BEOGRAD

BRp gel [10 mg/1 g] 1 aluminijumska tuba sa 50 g gela, u kutiji

BRp gel [20 mg/1 g] 50 g gela u tubi, u kutiji

DIKLORON - DEVA HOLDING A.S.

BRp gel [10 mg/1 g] 1 aluminijska tuba sa 50 g gela, u kutiji

LOKOSOL, GEL, 10 MG / G - LABORATORIOS BASI-INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.

BRp gel [10 mg/1 g] 100 g gela u aluminijskoj tubi, u kutiji

MAZENID - ALKALOID AD SKOPJE

BRp gel [11,6 mg/1 g] 1 aluminijska tuba sa 100 g gela, u kutiji

BRp gel [11,6 mg/1 g] 1 aluminijska tuba sa 50 g gela, u kutiji

BRp gel [11,6 mg/1 g] 1 aluminijska tuba sa 60 g gela, u kutiji

MAZENID FORTE - ALKALOID AD SKOPJE

BRp gel [23,2 mg/1 g] 1 aluminijska tuba sa 100 g gela, u kutiji

BRp gel [23,2 mg/1 g] 1 aluminijska tuba sa 50 g gela, u kutiji

BRp gel [23,2 mg/1 g] 1 aluminijska tuba sa 60 g gela, u kutiji

OLFEN - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

BRp gel [20 mg/1 g] 1 tuba sa 100 g gela, u kutiji

BRp gel [20 mg/1 g] 1 tuba sa 50 g gela, u kutiji

RAPTEN - HEMOFARM A.D. VRŠAC

- BRp gel [10 mg/1 g] 40 g gela u Al-tubi, u kutiji
RAPTEN FORTE 2% GEL - STADA ARZNEIMITTEL AG
 BRp gel [20 mg/1 g] 1 aluminijumska laminirana tuba od 60 g, u kutiji
VOLTAREN EMULGEL 1% - HALEON HUNGARY KFT
 BRp gel [10 mg/1 g] Al laminatna tuba sa 50 g gela, u kutiji
VOLTAREN FORTE 2% - HALEON HUNGARY KFT
 BRp gel [20 mg/1 g] 1 aluminij laminatna tuba sa 100 g gela, sa
 zatvaračem na preklapanje (flip-top zatvarač), u kutiji
 BRp gel [20 mg/1 g] 1 aluminijiska višeslojna tuba sa 50 g gela, u kutiji

M02AA26 nimesulid

Doziranje: simptomatska terapija bola kod iščašenja zglobova i akutnih povreda tetiva: 2-3 puta dnevno nanijeti 4-5 cm gela na oboljelo mjesto i lagano utrljati; liječenje traje tokom 7-15 dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NIMULID TRANSGEL - PANACEA BIOTEC PHARMA LIMITED

BRp gel [10 mg/1 g] 1 tuba sa 30 g gela u kutiji

M02AA27 deksketoprofen

Doziranje: bolna i inflamatorna stanja prouzrokovana traumom ili degenerativnim promjenama zglobova, tetiva, ligamenata i mišića: gel se nanosi 2-3 puta dnevno, ukupna dnevna doza gela ne bi trebala biti viša od 7,5 g (približno 14 cm gela)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEKSALGIN - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Rp gel [12.5 mg/1 g] 1 Al tuba sa 60 g gela, u kutiji

DOLOREX - BOSNALIJEK D.D.

BRp gel [12,5 mg/1 g] 1 Al tuba sa 40 g gela, u kutiji

M02AC Preparati sa derivatima salicilne kiseline

M02AC mentol, metil-salicilat, terpentinsko ulje, ulje eukaliptusa

Doziranje: simptomatsko ublažavanje bolova i ukočenosti u mišićima i zglobovima, uključujući akutnu i subakutnu bol u donjem dijelu leđa, bol povezanu s osteoartritisom te drugu fazu liječenja manjih sportskih povreda uključujući uganuća i istegnuća: lagano utrljati kremu na bolno područje 2-3 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEEP HEAT RUB - THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED

BRp krema [5.91 %/100 g+ 12.8 %/100 g+ 1.47 %/100 g+ 1.97 %/100 g]
 67 g kreme u aluminijskoj tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji

M02AC benzil-nikotinat, kamfor, mentol, metil-salicilat

Doziranje: hronična degenerativna reumatska oboljenja, lumbago, išijas, bolne fibromijalgije, neuritis, neuralgije, bolovi usljed priraslica plućne maramice, lakše sportske povrede koje nisu praćene oštećenjem kože: 3-4 puta na dan blago utrljati na bolno mjesto

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KAMFART - BOSNALIJEK D.D.

BRp krem [10 mg/1 g+ 20 mg/1 g+ 10 mg/1 g+ 10 mg/1 g] Al - tuba sa
 40 g kreme, u kutiji

M02AX Ostali lijekovi za lokalnu primjenu protiv bolova u mišićima i zglobovima

M02AX ibuprofen, levomentol

Doziranje: simptomatsko liječenje reumatskih i mišićnih bolova i upala usljed uganuća, naprezanja i sportskih povreda: odrasli i djeca starija od 12 god. 1-4 cm gela na zahvaćeno područje 2-3 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IBUMENTHOL - ANTIBIOTIC-RAZGRAD AD,

BRp gel [50 mg/1 g+ 30 mg/1 g] 1 aluminijska tuba sa 40 g gela, u kutiji

M02AX eterično ulje ružmarina

Doziranje: za olakšavanje blagog bola u mišićima i zglobovima i lakših perifernih poremećaja cirkulacije: odrasli i stariji, nanijeti približno 3-6 cm kreme 2-3 puta dnevno na zahvaćeno područje i lagano umasirati

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ROSACTA - MEDIS D.O.O. LJUBLJANA

BRp krema [100 mg/1 g] 50 g kreme u aluminijskoj tubi, u kutiji

BRp krema [100 mg/1 g] 90 g kreme u aluminijskoj tubi, u kutiji

M02AX ibuprofen, mentol

Doziranje: ublažavanje reumatskog bola, mišićnih bolova, bolova i oticanja kao što su istegnuća, uganuća i sportske povrede; ublažavanje bolova kod blažeg oblika artritisa: odrasli i djeca starija od 12 god. nanijeti 1-4 cm gela na zahvaćeno područje, po potrebi do 3 puta dnevno u razmaku od najmanje 4 sata i nježno utrljati; ako nema poboljšanja nakon 2 nedjelje potražiti savjet ljekara

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEEP RELIEF - THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED

BRp gel [50 mg/1 g+ 30 mg/1 g] 100 g gela u aluminijskoj tubi, u kutiji

BRp gel [50 mg/1 g+ 30 mg/1 g] 15 g gela u aluminijskoj tubi, u kutiji

BRp gel [50 mg/1 g+ 30 mg/1 g] 50 g gela u aluminijskoj tubi, u kutiji

M03 MIORELAKSANSI (MIŠIĆNI RELAKSANSI)
M03A Miorelaksansi sa perifernim djelovanjem
M03AB Derivati holina

M03AB01 suksametonijum

Doziranje: neuromuskularna blokada (kratkotrajna) tokom operacije i intubacije: i.v. 1-1,5 mg/kg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SUXAMETHONIUM CHLORID VUAB 100 MG - VUAB PHARMA A.S.

ZU prašak za rastvor za injekciju/infuziju [100 mg/1 bočica] 1 bočica sa 100 g praška za rastvor za injekciju i infuziju, u kutiji

M03AC Ostala kvaterna amonijum jedinjenja

M03AC01 pankuronijum

Doziranje: relaksacija skeletne muskulature tokom različitih hirurških intervencija, kod pacijenata koji su na dugotrajnoj mehaničkoj ventilaciji u intenzivnoj njezi i u različitim patološkim stanjima (status asthmaticus, tetanus); kod određivanja doze uzeti u obzir metodu anestezije, očekivano trajanje hirurškog zahvata, moguće interakcije sa drugim

lijekovima koje pacijent prima ili koji treba da budu upotrijebljeni za vrijeme anestezije i zdravstveno stanje pacijenta: početna doza 50-80 mcg/kg (intubacija se postiže u toku 120-150 sekundi) ili 80-100 mcg (90-120 sekundi), doza održavanja 10-20 mcg/kg; pedijatrijski bolesnici: 60-100 mcg/kg, doza održavanja 10-20 mcg/kg; novorođenčad od 1 mjeseca: doze se moraju pažljivo individualno odrediti, početna doza 30-40 mcg/kg, doza održavanja u rasponu 10-20 mcg/kg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PANCURONIUM PANPHARMA - PANPHARMA S.A.

- ▲ ZU rastvor za injekciju [4 mg/2 mL] 10 ampula po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

M03AC04 atrakurijum besilat

Doziranje: *neuromuskularna blokada (kratkog do umjerenog djelovanja) za vrijeme operacije ili tokom intenzivne njege;* intubacija i hirurgija, odrasli, i.v. inj. inicijalno 0,3 - 0,6 mg/kg, po potrebi još 0,1-0,2 mg/kg ili inicijalno i.v. inj. 0,3-0,6 mg/kg praćena i.v.inf. 0,3-0,6 mg/kg/sat; intenzivna njega, odrasli, i.v. inj. inicijalno 0,3-0,6 mg/kg (opciono), zatim i.v. inf. 0,27-1,77 mg/kg/sat (uobičajena doza 0,65-0,78 mg/kg/sat)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ACURMIL - LISAPHARMA SPA

- ZU rastvor za injekciju [50 mg/5 mL] 5 ampula po 5 mL rastvora za injekciju, u kutiji

ATRACURIUM KALCEKS - AS KALCEKS

- ZU rastvor za injekciju/ infuziju [50 mg/5 mL] 5 staklenih ampula od 5 ml, u kutiji

ATRASYL - PHARMADA ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

- ZU/Rp rastvor za injekciju/ infuziju [25 mg/2.5 mL] 10 ampula po 3 ml rastvora, u kutiji
ZU/Rp rastvor za injekciju/ infuziju [50 mg/5 mL] 10 ampula po 5 ml rastvora, u kutiji

M03AC09 rokuronijum bromid

Doziranje: kao dodatak opštoj anesteziji za olakšavanje endotrahealne intubacije tokom rutinskog uvođenja u anesteziju i da bi se izazvala relaksacija poprečno prugaste muskulature tokom operacijskog zahvata kod odraslih i pedijatrijskih bolesnika (od novorođenčadi rođene u terminu do adolescenata [0 do <18 godina]); kao dodatak za olakšavanje intubacije tokom uvođenja u anesteziju u brzom slijedu i kao dodatak za olakšavanje intubacije i mehaničke ventilacije u jedinicama intenzivnog liječenja kod odraslih: za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ROCURIUM BROMIDE KALCEKS - AS KALCEKS

- ZU rastvor za injekciju/ infuziju [10 mg/1 mL] 10 bočica po 5 ml (2 blistera sa po 5 bočica), u kutiji
ZU rastvor za injekciju/ infuziju [10 mg/1 mL] 50 bočica od 5 ml (10 blistera sa po 5 bočica), u kutiji

M03AX *Drugi mišićni relaksansi, perifernog djelovanja*

M03AX01 botulinski toksin

Doziranje: privremeno poboljšanje u izgledu srednje do jače izraženih vertikalnih bora između obrva vidljivih kod najjačeg mrštenja (glaberalnih bora) i/ili, srednje do jače izraženih lateralnih kantarnih bora (bora poput noge vrane) koje se vide pri najjačem smijehu i/ili srednje do jače izraženih čeonih bora vidljivih pri najjačem podizanju obrva,

kada izraženost na licu ima značajan psihološki uticaj kod odraslih pacijenata: za doziranje konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BOCOUTURE - MERZ PHARMACEUTICALS GMBH

- △ ZU prašak za rastvor za injekciju [100 jedinica/1 bočica] 1 bočica (staklo tip I) s čepom (bromobutilna guma) i sa sigurnosnim zatvaračem (aluminijum), u kutiji
- △ ZU prašak za rastvor za injekciju [50 jedinica/1 bočica] 1 bočica (staklo tip I) s čepom (bromobutilna guma) i sa sigurnosnim zatvaračem (aluminijum), u kutiji

VISTABEL - ABBVIE INC.

- △ ZU prašak za rastvor za injekciju [4 jedinica/0.1 mL] 1 staklena bočica s praškom za rastvor za injekciju sa 100 Allergan jedinica, u kutiji

M03B

Miorelaksansi sa centralnim djelovanjem

M03BX

Ostali miorelaksansi sa centralnim djelovanjem

M03BX01

baklofen

Doziranje: spastičnost skeletne muskulature uzrokovana oboljenjima kao što su multipla skleroza, cerebralna paraliza, degenerativne, traumatske, neoplastične lezije ili lezije uzrokovane infekcijama u CNS-u: oralno, odrasli, početi sa 15 mg na dan, po mogućnosti podijeljeno u 2-4 doze, povećavati po 15 mg/dan u trodnevni intervalima, uobičajeno dnevna doza 30-75 mg; pedijatrijska populacija, početi sa 0,3 mg/kg dnevno, podijeljeno u 2-4 doze, dozu treba postepeno povećavati u intervalima od oko 1 sedmicu do postizanja optimalne doze, uobičajeno 0,75 do 2 mg/kg tjelesne težine, ukupna dnevna doza ne smije prelaziti maks. od 40 mg/dan u djece mlađe od 8 god, god djece preko 8 god. maks. 60 mg; tablete nisu prikladne za djecu tjelesne težine manje od 33 kg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FEZEA - MAKPHARM D.O.O.

- △ Rp tableta [10 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/PVDC//AI blistera sa 10 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [25 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC//AI blistera sa 10 tableta), u kutiji

M03BX05

tiokolhikozid

Doziranje: *adjuvantno liječenje bolnih mišićnih grčeva kod akutne spinalne patologije:* oralno, 8 mg svakih 12 sati (dnevna doza 16 mg), trajanje tretmana je ograničeno na 5-7 uzastopnih dana; ne preporučuje se primjena kod djece mlađe od 16 godina; parenteralno, 4 mg svakih 12 sati (dnevna doza 8 mg) do 5 dana;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MUSCOFLEX - BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

- Rp kapsula, tvrda [8 mg/1 kapsula] 10 kapsula, tvrdih (1 AI/PVC blister), u kutiji
- △ ZU otopina za injekciju [4 mg/2 mL] 6 ampula po 2 ml otopine za injekciju, u kutiji

TIYOZID - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

- Rp tableta [4 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PE/PVdC-AI blistera po 10 tableta), u kutiji

TIYOZID, TABLETA, 8 MG - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

- Rp tableta [8 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/PE/PVdC-AI blister sa 10 tableta), u kutiji

TYOFLEX - ABDI İBRAHİM İLAC SANAYİ VE TİCARET A.S.

Rp kapsula, tvrda [8 mg/1 kapsula] 14 kapsula, tvrdih (1 PVC/PVDC/Al blister sa 14 kapsula), u kutiji

M04 **LIJEKOVI ZA LIJEČENJE GIHTA**
M04A **Lijekovi za liječenje gihta**
M04AA **Inhibitori sinteze mokraćne kiseline**

M04AA01 **alopurinol**

Doziranje: profilaksa gihta i bubrežnih kamenaca mokraćne kiseline i kalcijum oksalata; profilaksa hiperurikemije povezane sa hemoterapijom kancera: oralno, odrasli, početna doza 100 mg dnevno, poslije jela, zatim podešavati prema koncentraciji mokraćne kiseline u plazmi ili urinu; uobičajena doza održavanja u blažim stanjima 100-200 mg dnevno; u umjereno teškim stanjima 300-600 mg dnevno; u teškim stanjima 700-900 mg dnevno; doze preko 300 mg dnevno treba davati u podijeljenim dozama; djeca ispod 15 god. (maligna oboljenja, enzimski poremećaji) 10-20 mg/kg dnevno (maks. 400 mg dnevno) podijeljeno u 3 doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALOPURINOL BOSNALIJEK - BOSNALIJEK D.D.

Rp tableta [100 mg/1 tableta] 100 tableta (10 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

ALOPURINOL FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp tableta [100 mg/1 tableta] 100 tableta (1 PVC bočica), u kutiji

M04AA03 **febuksostat**

Doziranje: *terapija hronične hiperurikemije kod gihta:* oralno, odrasli 80 mg jednom dnevno, ukoliko je nakon 2-4 sedmice nivo mokraćne kiseline u serumu > 6 mg/100 ml (357 µmol/l), povećati na 120 mg jednom dnevno; *profilaksa i terapija akutne hiperurikemije kod pacijenata podvrgnutih hemoterapiji radi hematoloških maligniteta:* odrasli, 120 mg jednom dnevno, početi 2 dana prije citotoksične terapije i nastaviti tokom 7-9 dana, prema dužini trajanja hemoterapije

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ABUXAR - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp filmom obložena tableta [120 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp filmom obložena tableta [80 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

ADENURIC 120 - BERLIN-CHEMIE AG

Rp film tableta [120 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Aclar/PVC/Al blistera po 14 film tableta), u kutiji

ADENURIC 80 - BERLIN-CHEMIE AG

Rp film tableta [80 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Aclar/PVC/Al blistera po 14 film tableta), u kutiji

FITAXYL - RONTIS HELLAS S.A.

Rp film tableta [120 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Al-PVC/PE/PVdC blistera sa po 14 film tableta), u kutiji

Rp film tableta [80 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Al-PVC/PE/PVdC blistera sa po 14 film tableta), u kutiji

M05 **LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU**
M05B **Lijekovi koji djeluju na strukturu i mineralizaciju kostiju**
M05BA **Bifosfonati**

M05BA04 **alendronska kiselina**

Doziranje: osteoporoza kod žena u postmenopauzi, smanjuje rizik od preloma kičme i kuka: 70 mg jednom sedmično.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FOSAMAX T - N.V. ORGANON

Rp tableta [70 mg/1 tableta] 4 tablete (1 Al/Al blister sa 4 tablete) u kutiji

POROXIFEN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

Rp tableta [70 mg/1 tableta] 1 PVC/PE/PVDC//Al blister sa 4 tablete, u kutiji

PROMASS - BOSNALIJEK D.D.

Rp tableta [70 mg/1 tableta] 4 tablete (1 PVC/PVdC//Al blister sa 4 tablete), u kutiji

M05BA06 **ibandronska kiselina**

Doziranje: *redukcija oštećenja kosti kod metastaza na kostima kod karcinoma dojke:* oralno, 50 mg dnevno ili i.v. inf. 6 mg svake 3-4 nedjelje; *hiperkalcemija izazvana malignitetom:* prema koncentraciji kalcijuma u serumu, 2-4 mg u pojedinačnoj infuziji; *liječenje osteoporoze kod žena u postmenopauzi:* oralno 150 mg jedanput mjesečno ili i.v. injekcija tokom 15-30 sekundi, 3 mg jednom u tri mjeseca; napomena: tablete treba progutati cijele sa punom čašom vode, u stojećem položaju ili u uspravnom sjedećem položaju; tablete treba uzeti na prazan stomak, najmanje 30 min. (tablete od 50 mg) ili 1 sat (tablete od 150 mg) prije prvog jela ili pića (koje nije voda), ili drugog lijeka koji se uzima oralnim putem; pacijent bi trebao stajati ili sjediti uspravno tokom najmanje 1 sat nakon uzimanja tablete

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALVODRONIC - PHARMATHEN S.A.

Rp film tableta [150 mg/1 tableta] 1 film tableta (1 PA/ALL/PVC aluminijum blister) u kutiji

BONDRONAT - ATNAHS PHARMA DENMARK APS

Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 28 film tableta (4 OPA/Al/PVC//Al blistera po 7 tableta), u kutiji

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [6 mg/6 mL] 1 bočica (staklo tipa I sa zatvaračem od bromo-butilne gume) sa 6 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

BONVIVA - ATNAHS PHARMA DENMARK APS

Rp film tableta [150 mg/1 tableta] 1 film tableta u PVC/PVDC-Al blisteru, u kutiji

ZU rastvor za injekciju [3 mg/3 mL] 1 napunjena staklena šprica sa 3 ml rastvora za injekciju i 1 igla za injekciju, u kutiji

IDIKA - STADA ARZNEIMITTEL AG

Rp film tableta [150 mg/1 tableta] 1 film tableta (1 PVC/PVdC/Al blister), u kutiji

M05BA08 zoledronska kiselina

Doziranje: prevencija događaja povezanih sa skeletom (patološki prelomi, spinalna kompresija, zračenje ili operacija kosti ili tumorom izazvana hiperkalcijemija) kod odraslih pacijenata sa uznapredovalim malignim bolestima koje zahvataju kosti: i.v. 4 mg tokom najmanje 15 min. svake 3-4 nedjelje; uzimati 500 mg kalcijuma i 400 I.J vitamina D dnevno; tumorom izazvana hiperkalcijemija: i.v. inf. 4 mg kao pojedinačna doza tokom najmanje 15 min.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**RONIX - CENTURION ILAC SANAYI VE TIC. A.S.**

ZU koncentrat za rastvor za infuziju [4 mg/5 mL] 1 bočica sa koncentratom za rastvor za infuziju ,u kutiji

ZOLEDRONSKA KISELINA FRESENIUS KABI - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

△ ZU koncentrat za rastvor za infuziju [0,8 mg/1 mL] 1 bočica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

△ ZU koncentrat za rastvor za infuziju [0,8 mg/1 mL] 10 bočica sa po 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

△ ZU koncentrat za rastvor za infuziju [0,8 mg/1 mL] 4 bočice sa po 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

ZOLEDRONSKA KISELINA TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [4 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 5 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

M05BB Bifosfonati, kombinacije**M05BB03 alendronska kiselina, holkalciferol**

Doziranje: *postmenopauzna osteoporoza kod žena sa nedovoljnim unosom vitamina D:* 1 tbl. jednom sedmično

REGISTROVANI LIJEKOVI:**REBONE - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.**

Rp tableta [70 mg/1 tableta] 4 tablete (1 Al/Al blister sa 4 tablete), u kutiji

M05BX Ostali lijekovi koji djeluju na strukturu i mineralizaciju kosti**M05BX04 denosumab**

Doziranje: terapija osteoporoze kod žena u postmenopauzi i kod muškaraca sa karcinomom prostate i povećanim rizikom od pojave fraktura; terapija gubitka kosti povezana sa hormonskom ablacijom kod muškaraca sa karcinomom prostate i povećanim rizikom od fraktura; liječenje gubitka koštane mase povezano sa dugotrajnom sistemskom terapijom glukokortikoidima kod odraslih pacijenata koji imaju povećani rizik od fraktura: s.c. inj. 60 mg svakih 6 mjeseci

REGISTROVANI LIJEKOVI:**PROLIA - AMGEN (EUROPE) GMBH**

ZU/Rp rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [60 mg/1 mL] 1 napunjena staklena injekciona šprica sa 1 ml rastvora za injekciju, sa automatskom zaštitom za iglu u blisteru, u kutiji

M05BX05 burosumab

Doziranje: *x-vezane hipofosfatemije:* s.c.odrasli, 1 mg/kg svakih 4 nedjelje (maks. po dozi 90 mg), svaka doza treba biti zaokružena na najbližih 10 mg; djeca i adolescenti u

dobi 1-17 god. 0,8 mg/kg svake 2 nedjelje (maks. po dozi 90 mg), svaka doza treba biti zaokružena na najbližih 10 mg;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CRYSVITA - KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V

ZU/Rp	otopina za injekciju [10 mg/1 bočica]	1 bočica, u kutiji
ZU/Rp	otopina za injekciju [20 mg/1 bočica]	1 bočica, u kutiji
ZU/Rp	otopina za injekciju [30 mg/1 bočica]	1 bočica, u kutiji

M09 OSTALI LIJEKOVI ZA POREMAĆAJE MIŠIĆNO-KOŠTANOG SISTEMA

M09A OSTALI LIJEKOVI ZA POREMAĆAJE MIŠIĆNO-KOŠTANOG SISTEMA

M09AX Ostali lijekovi za poremećaje mišićno-koštanog sistema

M09AX07 nusinersen

Doziranje: *spinalna mišićna atrofija* prouzrokovana mutacijom na hromosomu 5q: intratekalnom injekcijom, početi sa 12 mg u 4 doze, na dan 0, 14, 28 i 63, zatim 12 mg svakih 4 mjeseca, za savjet za propuštenu dozu konsultovati literaturu proizvođa

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SPINRAZA - BIOGEN INTERNATIONAL GMBH

ZU	rastvor za injekciju [2,4 mg/1 mL]	5 mL rastvora za injekciju u staklenoj bočici, u kutiji

M09AX10 risdiplam

Doziranje: 5 q *spinalna mišićna atrofija*: odrasli, 5 mg jednom dnevno, nakon obroka, svakog dana u isto vrijeme; djeca 2-23 mjeseca 0,2 mg/kg jednom dnevno, nakon obroka, svakog dana u isto vrijeme; djeca 2-17 god, tjelesne mase do 19 kg, 0,25 mg/kg jednom dnevno, nakon obroka, svakog dana u isto vrijeme; djeca 2-17 god, tjelesne mase preko 20 kg, 5 mg jednom dnevno, nakon obroka, svakog dana u isto vrijeme

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EVRYSDI - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

ZU/Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 28 film tableta (4 Al/Al perforirana blistera s jediničnom dozom, svaki sa 7 tableta), u kutiji.	
ZU/Rp	prašak za oralnu otopinu [0,75 mg/1 mL]	1 bočica sa praškom za oralnu otopinu, 1 utisni nastavak za bocu, 2 štrcaljke za usta za višekratnu upotrebu od 6 ml i 2 štrcaljke za usta za višekratnu upotrebu od 12 ml; u kutiji

N **NERVNI SISTEM**
N01 **ANESTETICI**
N01A **Anestetici, opšti**
N01AB **Halogenovani ugljovodonici**

N01AB08 **sevofluran**

Doziranje: *indukcija anestezije:* individualno, koncentraciju lijeka postepeno povećavati u zavisnosti od postignutog odgovora, odrasli i djeca starija od 1 mjesec, početna doza 0,5-1%, zatim povećavati postepeno do maks. 8%; *održavanje anestezije:* koncentracija lijeka se kreće 0,5-3% (odrasli i djeca starija od 1 mjeseca); lijek se primjenjuje u kiseoniku ili smjesi azotnog oksida i kiseonika, pomoću isparivača specijalno kalibrisanog za sevofluran.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SEVOFLURAN BAXTER - BAXTER AG

- ▲ ZU para za inhalaciju, tečnost [100 %/250 mL] 6 aluminijumskih boca od 250 ml, u kutiji

SEVORANE - ABBVIE INC.

- ▲ ZU para za inhalaciju, tečnost [100 %/1 boca] 250 ml tečnosti u smeđoj bočici od polietilenaftalata sa sigurnosnim zatvaračem, u kutiji

N01AF **Barbiturati, monokomponentni**

N01AF03 **tiopental**

Doziranje: *kratkotrajne anestezije bez intubacije* (kratkotrajna anestezija kod hirurških procedura koje ne zahtijevaju vještačku respiraciju), *uvođenje u opštu anesteziju sa ili bez intubacije* (primjena anestetika sa dužim trajanjem dejstva kod hirurških intervencija sa ili bez vještačke respiracije): doza zavisi od specifične osjetljivosti pacijenta i željenog nivoa anestezije; sljedeće informacije su date samo kao smjernice; najsigurniji način postizanja optimalne efikasnosti je primjenom sporo ponovljenih injekcija sa malim dozama: pri uvođenju u opštu anesteziju, prosječna doza i.v. inj. kod adolescenata i odraslih je 5 mg/kg tjelesne mase, dejstvo traje približno 6 do 8 min; opšte pravilo je da se 100-200 mg injektuje sporo tokom 20 sekundi; primjena dodatnih doza zavisi od individualne osjetljivosti pacijenta i željene dubine anestezije; kod kratkotrajne anestezije, ukupna primjenjena doza ne treba da pređe dva puta dozu od 100-200 mg za indukciju, ukupna potrebna doza za hiruršku intervenciju može biti u opsegu 400-1000 mg; pojedinačna doza i.v. inj. (oko 3-4 mg/kg tjelesne mase) dovodi do nesvjesnog stanja u roku od 10 sekundi i traje 3–5 min. Napomena: kao i kod svih barbiturata, prilikom uvođenja u anesteziju, potrebna je primjena analgetika.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

THIOPENTAL PANPHARMA - PANPHARMA S.A.

- ▲ ZU prašak za rastvor za injekciju [1 g/1 bočica] 10 staklenih bočica sa po 1 g praška u bočici, u kutiji

N01AH **Opioidni anestetici**

N01AH01 **fentanyl**

Doziranje: analgezija u toku kraćih hirurških procedura i premedikacija u anesteziji (niže doze), analgezija /respiratorna depresija uz asistiranu ventilaciju (više doze), neuroleptanalgezija u kombinaciji sa neuroleptikom, jak bol; spora i.v. inj. (bolus), spontana respiracija, odrasli i djeca preko 12 god. početna doza 50-100 mcg (maks. 200 mcg), zatim 25-50 mcg ako je potrebno; djeca 2-11 god. 1-3 mcg/kg, a zatim 1 mcg/kg

ako je potrebno; asistirana ventilacija, odrasli i djeca preko 12 god, početna doza 0,3-3,5 mg, zatim 100-200 mcg ako je potrebno; djeca 2-11 god. 1-3 mcg/kg, a zatim 1 mcg/kg ako je potrebno; i.v. inf. spontana respiracija, 0,05-0,08 mcg/kg/min, veće brzine od 3 mcg/kg/min. se koriste za operacije srca; asistirana ventilacija, odrasli, početna doza 1 mcg/kg/min, a nakon toga brzinom od 0,1 mcg/kg/min. podešavati prema postignutom odgovoru; i.m. za premedikaciju, 1-2 ml (50-100 mcg) 45 min. prije indukcije anestezije

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FENTANIL CITRAT KALCEKS - AS KALCEKS

- ▲,§ ZU rastvor za injekciju [0,05 mg/1 mL] 10 staklenih ampula od 10ml (2 PVC blistera sa po 5 ampula), u kutiji
- ▲,§ ZU rastvor za injekciju [0,05 mg/1 mL] 50 staklenih ampula od 10ml (10 PVC blistera sa po 5 ampula), u kutiji

FENTANYL PANPHARMA - PANPHARMA S.A.

- ▲,§ ZU rastvor za injekciju [0.5 mg/10 mL] 10 (2 x 5) ampula po 10 mL rastvora za injekciju, u kutiji

N01AX

Ostali opšti anestetici

N01AX10

propofol

Doziranje: *uvođenje u opštu anesteziju:* sporom i.v. inj. ili i.v. inf. odrasli 18-55 god. 1,5-2,5 mg/kg tjelesne mase postepeno po 20-40 mg svakih 10 sekundi; stariji od 55 god. i iscrpljeni 1-1,5 mg/kg tjelesne mase postepeno po 20 mg svakih 10 sekundi do postizanja odgovora; djeca 1 mjesec-3 godine, 2,5-4 mg/kg tjelesne mase; preko 8 god. 2,5 mg/kg tjelesne mase; *održavanje opšte anestezije:* intravenskom infuzijom 4-12 mg/kg/h (3-6 mg/kg/h kod starijih ili iscrpljenih) ili sporom i.v. inj., 25-50 mg ponavljati prema odgovoru; djeca, uobičajeno 9-15 mg/kg/h, kod djece uzrasta 1 mjesec -3 godine mogu biti potrebne veće doze; *sedaciju za vrijeme dijagnostičkih i operativnih procedura:* i.v. inf. početna doza 1,5-4,5 mg/kg/h (infuzija se može dopuniti primjenom bolus injekcije 10-20 mg ako je potrebno brzo povećanje dubine sedacije); kod pacijenata starijih od 55 god. i kod iscrpljenih mogu biti potrebne niže doze; djeca, 1,5-9 mg/kg/h (infuzija se može dopuniti primjenom bolus injekcije do 1 mg/kg ako je potrebno brzo povećanje dubine sedacije); *sedaciju pacijenata na umjetnom disanju starijih od 16 godina u jedinicama intenzivne njege:* i.v.inf. 0,3-4 mg/kg/h; spora i.v.inj. odrasli početna doza 0,5-1 mg/kg, dati u toku 1-5 min, dozu i brzinu davanja podesiti prema željenom nivou sedacije i prema odgovoru

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PROPOFOL 1% MCT FRESENIUS - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

- ▲ ZU emulzija za injekciju/ infuziju [10 mg/1 mL] 10 staklenih bočica sa po 100 mL emulzije za injekciju/infuziju, u kutiji
- ▲ ZU emulzija za injekciju/ infuziju [10 mg/1 mL] 10 staklenih bočica sa po 50 mL emulzije za injekciju/infuziju, u kutiji
- ▲ ZU emulzija za injekciju/ infuziju [10 mg/1 mL] 5 staklenih ampula sa po 20 mL emulzije za injekciju/infuziju, u kutiji

PROPOFOL TROIKAA - TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED

- ▲ ZU emulzija za injekciju/ infuziju [10 mg/1 mL] 1 bezbojna staklena bočica od 20 mL, u kutiji
- ▲ ZU emulzija za injekciju/ infuziju [10 mg/1 mL] 1 bezbojna staklena bočica od 50 mL, u kutiji

N01AX13

azot suboksida

Doziranje: inhalaciona anestezija u kombinaciji sa drugim opštim anestetima (inhalacionim ili intravenskim) i mišićnim relaksansima; analgezija bez gubitka svijesti, što se postiže subanestetičkim dozama (u kombinaciji sa kiseonikom) kod zahvata u

stomatologiji, porodiljstvu, pri promjeni zavoja, kod postoperativnih fizioterapija i drugih bolova: za doziranje konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AZOT SUBOKSID MESSER - MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD

- ▲ ZU medicinski gas, djelimicno tečni [100 % v/v/1 inhalacija] boca za gas: 1 x 30 kg
- ▲ ZU medicinski gas, djelimicno tečni [100 % v/v/1 inhalacija] boca za gas: 1 x 37,5 kg
- ▲ ZU medicinski gas, djelimicno tečni [100 % v/v/1 inhalacija] boca za gas: 1 x 7,5 kg

N01AX14 esketamin

Doziranje: *uvođenje i održavanje opšte anestezije:* spora i.v.inj. odrasli 0,5-1 mg/kg, zatim održavanje 0,25-0,5 mg/kg svakih 10-150 min, podešavati prema odgovoru; i.m. 2-4 mg/kg, zatim održavanje 1-2 mg/kg svakih 10-15 min, podešavati prema odgovoru; kontinuirana i.v.inf. odrasli 0,5-3 mg/kg/sat, podešavati prema odgovoru; *ublažavanje bolova kod regionalne i lokalne anestezije:* kontinuirana i.v.inf. odrasli 0,125-0,25 mg/kg/sat, podešavati prema odgovoru; *analgezija u hitnoj medicini:* i.m. odrasli 0,25-0,5 mg/kg, podešavati prema odgovoru, spora i.v.inj. 0,125-0,25 mg/kg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ESKETAMIN KALCEKS - AS KALCEKS

- ▲ ZU rastvor za injekciju/ infuziju [25 mg/1 mL] 10 ampula od bezbojnog stakla zapremine 10 mL sa one point cut upakovane u PVC blister, u kutiji
- ▲ ZU rastvor za injekciju/ infuziju [25 mg/1 mL] 10 ampula od bezbojnog stakla zapremine 2mL sa one point cut upakovane u PVC blister, u kutiji
- ▲ ZU rastvor za injekciju/ infuziju [5 mg/1 mL] 10 ampula od bezbojnog stakla zapremine 5 ml sa one point cut upakovane u PVC blister, u kutiji

N01B Anestetički, lokalni

N01BB Amidi

N01BB02 lidokain

Doziranje: *lokalna anestezija:* 10-40 mg ili više, maks. doza kao jednokratna ili kao podijeljene doze u roku od 120 min. 300 mg (primjenjuje se i.v., i.m., s.c. ili epiduralnom injekcijom); *ventrikularne aritmije,* inicijalna terapija 50-100 mg (0,7-0,14 mg/kg) u vidu i.v. bolus inj. brzinom 25-50 mg/min. (0,35-0,7 mg/kg/min), ukoliko se ne postigne željeni odgovor, sledeća doza se može ponoviti nakon 5 min. u roku od jednog sata ne smije se primjeniti više od 200-300 mg lidokaina; kontinuirana i.v.inf. nakon primjene bolus injekcije: doza održavanja 20-50 mcg/kg/min (1-4 mg/min. kod osobe prosječne tjelesne mase 70 kg); lokalna primjena (gel) 5% - površinska lokalna anestezija u usnoj duplji, 0,1-0,5 g gela jednokratno aplikovati na sluzokožu usne duplje pomoću kuglice vate; lokalna primjena (gel) 2% muškarci, *uretralna anestezija:* 100-200 mg lidokainhidrohlorida (5-10 ml gela); žene, *uretralna anestezija:* 60-100 mg lidokainhidrohlorida (3-5 ml gela); endoskopija 200-400 mg (10-20 ml gela); sprej - *prevencija boli u stomatologiji:* 1-5 aplikacija na sluznicu; *prevencija boli u otorinolaringologiji:* 3 aplikacije za punkciju maksilarnog sinusa; *prevencija boli u opstetriciji:* do 20 aplikacija pri porodu; *pri uvođenju instrumenata i katetera u disajni i probavni sistem:* do 20 aplikacija kod zahvata na farinksu, larinksu i traheji

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DOLOKAIN GEL - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

Rp gel [20 mg/1 g] 1 Al- tuba sa 25 g gela i aplikator u zaštitnoj vrećici, u kutiji

LIDOCAINA CLORIDRATO BIOINDUSTRIA L.I.M. - BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.

ZU rastvor za injekciju [20 mg/1 mL] 25 bočica sa 50 ml rastvora za injekciju, u kutiji

LIDOCAINE 2% S.A.L.F. - S.A.L.F.-S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO

ZU rastvor za injekciju [20 mg/1 mL] 4 bočice po 50 ml rastvora za injekciju, u kutiji

LIDOCAINE KABI 20 MG/ML - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

ZU rastvor za injekciju [20 mg/1 mL] 50 ampula (polietilenske ampule) po 20 ml rastvora za injekciju, u kutiji

LIDOKAIN - HLORID GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp gel [50 mg/1 g] 30 g gela u aluminijskoj tubi, u kutiji

LIDOKAIN BELUPO SPREJ - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

Rp Otopina za kožu/usnu sluznicu [100 mg/1 mL] 50 mL otopine u smeđoj bočici od lijevanog stakla III hidrolitičke grupe s pumpicom i raspršivačem, u kutiji

LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 1% - GALENIKA A.D. BEOGRAD

ZU rastvor za injekciju [35 mg/3.5 mL] 10 staklenih ampula po 3,5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 2% - GALENIKA A.D. BEOGRAD

ZU rastvor za injekciju [40 mg/2 mL] 50 staklenih ampula po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

N01BB10 levobupivakain

Doziranje: hirurška anestezija: *lumbalna epiduralna*, odrasli 50–150 mg upotrebom rastvora 5 mg/ml (0.5%) ili 7.5 mg/ml, datih tokom 5 minuta; *carski rez*, 75–150 mg upotrebom rastvora 5 mg/ml (0.5%), datog tokom 15–20 minuta; *intratekalna injekcija*, odrasli 15 mg upotrebom rastvora 5 mg/ml (0.5%); *blokada perifernih živaca*, odrasli 2.5–150 mg upotrebom rastvora 2.5 mg/ml (0.25%) ili 5 mg/ml (0.5%); *peribulbarni blok*, odrasli 37.5–112.5 mg upotrebom rastvora 7.5 mg/ml (0.75%); *lokalna infiltracijska anestezija*, odrasli, 2.5–150 mg upotrebom rastvora 2.5 mg/ml (0.25%). Akutna bol: *lumbalna epiduralna*, odrasli, *porođajni bol*, intermitentnim injekcijama, 15–25 mg upotrebom rastvora 2.5 mg/ml (0.25%), ponavljati ako je potrebno u intervalima od 15 min. ili kontinuiranom epiduralnom infuzijom, 5–12.5 mg/sat upotrebom rastvora 1.25 mg/ml (0.125%); *postoperativni bol*, kontinuiranom epiduralnom infuzijom, 12.5–18.75 mg/sat upotrebom rastvora 1.25 mg/ml (0.125%) ili rastvora 2.5 mg/ml (0.25%); maks. 400 mg u toku 24 sata

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LEVOBUPIVAKAIN KABI 5 MG/ML OTOPINA ZA INJEKCIJU/INFUZIJU - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

▲ ZU otopina za injekciju/ infuziju [5 mg/1 mL] 5 ampula sa po 10 mL otopine za infuziju/injekciju, u kutiji

N01BB52 cetilpiridin, lidokain

Doziranje: *ublažavanje bola i nelagode koji se javlja pri nicanju zuba i smirivanju desni dojenčeta*: djeca starija od 5 mjeseci, količinu gela veličine zrna graška istisnuti na jododicu čistog prsta i nježno utrljati na bolno mjesto desni, po potrebi ponoviti nakon 3 sata, najviše 6 puta na dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CALGEL - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

BRp gel za desni [1 mg/1 g+ 3.3 mg/1 g] 1 alu-tuba sa 10 g gela za desni, u kutiji

N01BB52 adrenalin (epinefrin), lidokain

Doziranje: *lokalna anestezija u stomatologiji (infiltracija, blokada nerva):* koristi se najmanja doza lijeka koja će dovesti do efikasne anestezije; odrasli, doza se određuje individualno u zavisnosti od metode koja se koristi i karakteristika pacijenta, kod oralne infiltracije i/ili mandibularnog bloka, obično je dovoljna početna doza 1-4 ml; pedijatrijska populacija, prosječna preporučena doza 20-30 mg lidokaina po intervenciji; maks. preporučene doze: kod zdravih odraslih osoba maks. pojed.doza (kada se primjenjuje sa adrenalinom) je 7 mg/kg tjelesne mase; djeca, maks. 5 mg lidokain-hidrohlorida po kg tjelesne mase, odnosno doza od 0,25 ml lijeka po kilogramu tjelesne mase; **Lidofast** se koristi za stvaranje regionalne i lokalne anestezije tehnikama infiltracije, za stvaranje intravenske regionalne anestezije tehnikama blokade perifernih nerava (kao što je brahijalni plexus, interkostalnim i centralnim neuralnim tehnikama (kao što je lumbalni i srčani epiduralni blok): infiltracija injekcijom, za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LIDOFAST - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

ZU rastvor za injekciju [0.025 mg/2 mL+ 40 mg/2 mL] 20 ampula, u kutiji

LIDOKAIN 2% - ADRENALIN GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

ZU rastvor za injekciju [0.025 mg/2 mL+ 40 mg/2 mL] 50 staklenih ampula (u 10 PVC blistera) sa po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

N01BB58 adrenalin (epinefrin), artikain

Doziranje: *infiltracija i blokada živaca kod složenih stomatoloških zahvata:* uobičajeno 1,7 ml rastvora; za doziranje kod pedijatrijske populacije pogledati literaturu proizvođa; ne preporučuje se djeci ispod 4 god. starosti

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DENTASTAZIN - LABORATORIOS NORMON S.A.

ZU rastvor za injekciju [0,01 mg/1 mL+ 40 mg/1 mL] 100 cilindričnih staklenih ampula sa 1,7 mL rastvora za injekciju, u kutiji

ORABLOC - PIERREL S.P.A.

ZU rastvor za injekciju [0,01 mg/1 mL+ 40 mg/1 mL] 50 patrona (10 patrona od bezbojnog stakla (Tip I) zatvorena na jednom kraju s brombutilnim gumenim zatvaračem, a na drugom kraju s aluminijskim poklopcem i gumenim zatvaračem, zapakovanih u PVC blisteru) 5 blistera po 10 patrona, u kutiji

N02 ANALGETICI

N02A Opioidi

N02AA Prirodni alkaloidi opijuma

N02AA01 morfin

Doziranje: parenteralno, *jaki akutni i hronični bolovi:* i.m. ili s.c. 10 mg/70 kg (5-20 mg) svakih 4 do 6 h po potrebi; za brže postizanje efekta daje se i.v. 2,5-15 mg razrijeđeno u 4 do 5 ml vode za injekcije sporo tokom 4-5 min. na svakih 4-6 h, prema potrebi (i.v. primjena povećava incidencu neželjenih djelovanja!); kod s.c. ili i.v.inf. početi od 0,8 do 10 mg/sat i dozu titrirati prema odgovoru pacijenta; *infarkt miokarda* 1-3 mg sporom i.v.

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

inj. s vremenskim intervalima i do 5 min.; *akutni pulmonarni edem kao rezultat lijevo-komorne slabosti*: 0,1-0,15 mg sporom i.v.inj. tokom 4-5 min.; *preanestetička medikacija*: i.m. ili s.c. 10 mg na 45 do 60 min. prije anestezije; *uporni kašalj*: i.m. ili s.c 5 mg svakih 4-6 sati prema potrebi; kapsule sa produženim oslobađanjem, *ublažavanje jakog do vrlo jakog bola*: 40 mg jednom dnevno (svaka 24 sata) ili 20 mg 2 puta dnevno (svakih 12 sati); *jak hroničan bol ili/ bol otporan na terapiju drugim analgeticima, a pogotovo kancerski bol*: oralni rastvor, odrasli: početna doza 10 do 20 mg (1 do 2 pakovanja sa pojedinačnim dozama od 10 ml), doza se može povećati na 30 mg/5 ml ili na 100 mg/5 ml; djeca uzrasta 6 do 12 god: maks. 5 do 10 mg (1/2 do 1 cijele doze u pakovanju od 10 mg) na svaka 4 sata; neposredno prije upotrebe, rastvor se može razblažiti u vodi ili nekom bezalkoholnom piću; oralne kapi, odrasli: doze od 10 do 20 mg svaka 4 h (što odgovara 0.5-1 ml ili 8-16 kapi); djeca 6 do 12 god: maks. doza 5 do 10 mg svaka 4 h (što odgovara 0.25-0.5 ml ili 4-8 kapi); djeca 1 do 5 god: maks. doza 5 mg svaka 4 h (što odgovara 0.25-0.5 ml ili 4 kapi); sirup: odrasli: 10 do 20 mg (5-10 ml) na svaka 4 h; djeca 6 do 12 god: maks. doza 5 do 10 mg (2.5-5 ml) svaka 4 h; djeca 1 do 5 god: maks. 5 mg (2.5 ml) svaka 4 h

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MORPHINI HYDROCHLORIDUM ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

- ▲,§ ZU otopina za injekciju [20 mg/1 mL] 10 ampula po 1 ml rastvora za injekciju, u kutiji

ORAMORPH - L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SOCIETA DI ESERCIZIO- S.P.A.

- ▲,§ Rp oralne kapi, rastvor [20 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 20 ml oralnih kapi, rastvora, u kutiji.
- ▲,§ Rp sirup [10 mg/5 mL] 1 staklena boca sa 100 ml sirupa, u kutiji

N02AA03

hidromorfon

Doziranje: *jaki bol*: i.v. inj. ili i.v. inf. ili. s.c. odrasli i adolescenti stariji od 12 god, za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HIDROMORFON KALCEKS - AS KALCEKS

- ▲,§ ZU rastvor za injekciju/ infuziju [10 mg/1 mL] 5 staklenih ampula sa 1 mL rastvora za injekciju/infuziju (1 blister po 5 ampula), u kutiji
- ▲,§ ZU rastvor za injekciju/ infuziju [10 mg/1 mL] 5 staklenih ampula sa 10 mL rastvora za injekciju/infuziju (1 blister po 5 ampula), u kutiji
- ▲,§ ZU rastvor za injekciju/ infuziju [2 mg/1 mL] 10 staklenih ampula sa 1 mL rastvora za injekciju/infuziju (2 blistera po 5 ampula), u kutiji
- ▲,§ ZU rastvor za injekciju/ infuziju [20 mg/1 mL] 10 staklenih ampula sa 1 mL rastvora za injekciju/infuziju (2 blistera po 5 ampula), u kutiji
- ▲,§ ZU rastvor za injekciju/ infuziju [50 mg/1 mL] 5 staklenih ampula sa 1 mL rastvora za injekciju/infuziju (1 blister po 5 ampula), u kutiji

N02AA55

nalokson, oksikodon

Doziranje: *jaki bolovi koji se mogu adekvatno liječiti samo opioidnim analgeticima*: oralno, odrasli početna doza 10 mg/5 mg svakih 12 sati, maks. pojedinačna doza 40/20 mg svakih 12 sati, doze se mogu povećavati prema odgovoru, maks. dnevna doza 160/80 mg; pacijenti koji su već uzimali opioidnu analgeziju mogu početi sa većim dozama; *druga linija terapije teškog do vrlo teškog idiopatskog sindroma nemirnih nogu nakon neuspješne dopaminergičke terapije*: oralno, odrasli početna doza 5/2,5 mg svakih 12 sati, dozu podešavati sedmično prema odgovoru, uobičajena doza 10/5 mg svakih 12 sati, maksimalna dnevna doza 60/30 mg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DOLNADA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- ▲,§ Rp tableta s produženim oslobađanjem [10 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- ▲,§ Rp tableta s produženim oslobađanjem [20 mg/1 tableta+ 40 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- ▲,§ Rp tableta s produženim oslobađanjem [5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

TARGINACT - BARD PHARMACEUTICALS LIMITED

- ▲,§ Rp tableta s produženim oslobađanjem [10 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 30 tableta s produženim oslobađanjem (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- ▲,§ Rp tableta s produženim oslobađanjem [2,5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 30 tableta s produženim oslobađanjem (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- ▲,§ Rp tableta s produženim oslobađanjem [20 mg/1 tableta+ 40 mg/1 tableta] 30 tableta s produženim oslobađanjem (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- ▲,§ Rp tableta s produženim oslobađanjem [5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 30 tableta s produženim oslobađanjem (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

N02AB

Derivati fenilpiperidina

N02AB03

fentanyl

Doziranje: transdermalni flaster, *jak hronični bol:* kod pacijenata koji prethodno nisu primali opioidne analgetike, terapija se započinje najnižom dozom (25 mcg/h transdermalnog-TD flastera); kada se prelazi sa oralno/parenteralno korišćenih opijata, prvo se izračuna 24-časovna potreba za opijatom koji je do tada dat (pomoću tablete koju daje proizvođač se odredi TD-flaster koji ima istu efikasnost kao 24-časovna doza morfina data oralno ili parenteralno); potrebnu dozu treba prilagoditi bolesniku i preispitivati u redovnim intervalima; način primjene: neposredno po otvaranju pakovanja i skidanja zaštitnog sloja, flaster se nanosi na neoštećenu kožu, opranu čistom vodom i dobro osušenu, na kojoj nema malja, na površini na gornjem dijelu tijela (grudi, leđa, nadlaktica); na mjesto na koje se flaster lijepi ne smiju se nanositi kreme, ulja, losioni i puderi; flaster treba mijenjati na svakih 72 h, za svaku upotrebu mora se odabrati novo mjesto na koži, a ista površina kože se može koristiti nakon 7 dana od uklanjanja prethodnog flastera; flaster se ne smije oštetiti, dijeliti ili rezati;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DUROGESIC - JANSSEN-CILAG KFT.

- ▲,§ Rp transdermalni flaster [100 µg/1 Hr] kutija sa 5 transdermalnih flastera
- ▲,§ Rp transdermalni flaster [25 µg/1 Hr] kutija sa 5 transdermalnih flastera
- ▲,§ Rp transdermalni flaster [50 µg/1 Hr] kutija sa 5 transdermalnih flastera

N02AE

Derivati oripavina

N02AE01

buprenorfin

Doziranje: umjeren do jak hronični bol kod karcinoma kod pacijenata koji su ranije primali jaku opioidnu analgeziju; jak bol koji ne reaguje na ne-opioidnu analgeziju kod pacijenata koji su ranije primali jaku opioidnu analgeziju: početna doza treba da se odredi na osnovu 24-satne opioidne terapije, konsultovati literaturu proizvoda; podešavanje doze-kada se počinje sa primjenom, analgetski efekat ne bi trebao biti evaluiran prije nego što prođe 24 sata (kako bi se dozvolilo postepeno povećanje koncentracije buprenorfina u plazmi)-ukoliko je neophodno, dozu bi trebalo podešavati u intervalima ne dužim od 96 sati

upotrebljavajući flaster naredne jačine ili upotrebljavajući 2 flastera iste jačine (aplikovati u isto vrijeme radi izbjegavanja konfuzije); maks. 2 flastera se mogu aplikovati istovremeno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TRANSTEC 35 MG/H - GRUNENTHAL GMBH

- ▲,§ Rp transdermalni flaster [20 mg/1 strip] 4 transdermalna flastera (4 vrećice sa po 1 transdermalnim flasterom), u kutiji

TRANSTEC 52,5 MG/H - GRUNENTHAL GMBH

- ▲,§ Rp transdermalni flaster [30 mg/1 strip] 4 transdermalna flastera (4 vrećice sa po 1 transdermalnim flasterom), u kutiji

TRANSTEC 70 MG/H - GRUNENTHAL GMBH

- ▲,§ Rp transdermalni flaster [40 mg/1 strip] 4 transdermalna flastera (4 vrećice sa po 1 transdermalnim flasterom), u kutiji

N02AJ Opioidi u kombinaciji sa neopioidnim analgeticima

N02AJ13 paracetamol, tramadol

Doziranje: *simptomatsko liječenje umjerene do jake boli:* oralno, odrasli i adolescenti (djeca 12 god. i više) 75 mg/650 mg, po potrebi dozu ponoviti u intervalima ne kraćim od 6 sati; maks. dnevna doza 300 mg tramadola i 2600 mg paracetamola

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DORETA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- ▲ Rp filmom obložena tableta [325 mg/1 tableta+ 37.5 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 neprozirni, bijeli PVC/PVDC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp filmom obložena tableta [325 mg/1 tableta+ 37.5 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 neprozirna, bijela PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp filmom obložena tableta [325 mg/1 tableta+ 37.5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 neprozirna, bijela PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp filmom obložena tableta [650 mg/1 tableta+ 75 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 bijela PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp filmom obložena tableta [650 mg/1 tableta+ 75 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 bijela PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp filmom obložena tableta [650 mg/1 tableta+ 75 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 bijelih PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

DOTRAX - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO

- ▲ Rp filmom obložena tableta [325 mg/1 tableta+ 37,5 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp filmom obložena tableta [325 mg/1 tableta+ 37,5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

ZALDIAR 37,5 MG/325 MG - GRUNENTHAL GMBH

- ▲ Rp film tableta [325 mg/1 tableta+ 37.5 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 papir/ PET/ Al/ PVC - blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp film tableta [325 mg/1 tableta+ 37.5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 papir/ PET/ Al/ PVC - blistera po 10 tableta), u kutiji

ZARACET - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- ▲ Rp filmom obložena tableta [325 mg/1 tableta+ 37.5 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji
- ▲ Rp filmom obložena tableta [325 mg/1 tableta+ 37.5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp filmom obložena tableta [650 mg/1 tableta+ 75 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

N02AJ14 deksketoprofen, tramadol

Doziranje: *simptomatsko kratkotrajno liječenje akutne boli u odraslih pacijenata:* 1 tbl. dnevno s najmanjim intervalom između doza od 8 h, maks. 3 tablete dnevno, maks. tokom 5 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SKUDEX - BERLIN-CHEMIE AG

- ▲ Rp film tableta [25 mg/1 tableta+ 75 mg/1 tableta] 15 film tableta (1 PVC/PVdC//Al blister sa 15 tableta), u kutiji

N02AX Ostali opiodi

N02AX02 tramadol

Doziranje: *umjerena do jaka bol:* odrasli i djeca preko 12 god, oralno, upotrebljavajući tablete sa trenutnim oslobađanjem, akutna bol, uobičajena početna doza 100 mg, zatim 50-100 mg svakih 4-6 sati; *hronična bol,* upotrebljavajući tablete sa trenutnim oslobađanjem, početna doza 50 mg zatim podešavati prema odgovoru; obično nije potrebno više od ukupno 400 mg dnevno; tablete sa modifikovanim oslobađanjem: odrasli i djeca preko 12 god. početna doza 50-100 mg 2 puta dnevno, po potrebi doza se može povećati na 150 mg ili 200 mg 2 puta dnevno, maks. 400 mg dnevno; oralne kapi, rastvor: odrasli i djeca preko 12 god. 20-40 kapi (50-100 mg) sa malo tečnosti ili na kocki šećera, ukoliko je potrebno doza se može ponoviti nakon 30-60 min; rastvor/otopina za injekciju: odrasli i djeca preko 12 god. i.m. ili i.v inj. (tokom 2-3 min) ili i.v. inf. 50-100 mg svakih 4-6 h (maks. 400 mg/dan)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TRAMADOL ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

- ▲ Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (2 Al/PVC/PVdC blistera po 10 kapsula, tvrdih), u kutiji

TRAMADOL BOSNALIJEK 50 MG KAPSULA, TVRDA - BOSNALIJEK D.D.

- ▲ Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 20 kapsula (2 PVC/Al blister sa po 10 kapsula), u kutiji

TRAMADOL HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- ▲ Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp oralne kapi, rastvor [100 mg/1 mL] 10 mL rastvora u bočici sa kapaljkom od polietilena, u kutiji

TRAMADOL KRKA - KRKA, TOVARNA ZDRAVLJ, D.D., NOVO MESTO

- ▲ Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al blistera sa 10 kapsula) u kutiji
- ▲ ZU otopina za injekciju [100 mg/2 mL] 5 staklenih ampula po 2 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ▲ ZU otopina za injekciju [50 mg/1 mL] 5 staklenih ampula po 1 ml otopine za injekciju, u kutiji

N02AX06 tapentadol

Doziranje: *terapija umjerenog do teškog hroničnog bola koji se može odgovarajuće ublažiti samo sa opioidnim analgeticima:* oralno upotrebljavajući tablete sa trenutnim oslobađanjem, početna doza 50 mg svaka 4 sata, podešavati prema odgovoru, prvog dana terapije dodatna doza od 50 mg može biti uzeta jedan sat poslije početne doze; maks. 700 mg u prva 24 sata; maks. 600 mg dnevno; oralno upotrebljavajući tablete sa produženim oslobađanjem, početna doza 50 mg svakih 12 sati, podesiti prema odgovoru, maks. 500 mg dnevno; oralno, rastvor *umjerena do teška akutna bol kod djece 2-17 god. i tjelesne mase preko 16 kg koja se može odgovarajuće ublažiti samo sa opioidnim analgeticima:* 1,25 mg/kg svakih 4 sata (maks. po dozi 100 mg) do 3 dana, doze za djecu sa visokim BMI ne smije preći izračunatu maksimalnu dozu za tjelesnu težinu pri 97,5-oj percentili za datu dob

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PALEXIA - GRUNENTHAL GMBH

- ▲ Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

PALEXIA SR - GRUNENTHAL GMBH

- ▲ Rp tableta s produženim oslobađanjem [100 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/PVDC-aluminijum/PET/papir blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [150 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/PVDC-aluminijum/PET/papir blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [50 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/PVDC-aluminijum/PET/papir blistera sa po 10 tableta), u kutiji

N02B Ostali analgetici i antipiretici

N02BA Salicilna kiselina i derivati

N02BA01 acetilsalicilna kiselina

Doziranje: *slab do umjeren bol, pireksija:* oralno, 300-900 mg svakih 4-6 h kada je potrebno; *profilaksa cerebrovaskularnih ili kardiovaskularnih oboljenja i prijetećih tromboza:* 50-300 mg/dan; uzimati sa hranom; ne preporučuje se djeci ispod 16 god.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ANDOL - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- BRp tableta [300 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVDC/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ASPIRIN - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT

- BRp tableta [500 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PP/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

N02BA51 acetilsalicilna kiselina, kofein, paracetamol

Doziranje: *blaga do umjerena glavobolja tokom napada migrene sa ili bez aure, glavobolja usljed napetosti:* odrasli i djeca starija od 12 god. 1-2 tbl. po potrebi i do tri puta dnevno (obično u razmaku od 4 do 8 sati); maks. dnevna doza za odrasle i djecu stariju od 12 god. tri puta na dan (odgovara 1500 mg aspirina, 1500 mg paracetamola i 300 mg kofeina)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TOPIRIN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- BRp tableta [250 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/PVDC-Al blister), u kutiji

N02BA51 acetilsalicilna kiselina, askorbinska kiselina

Doziranje: *blagi i umjereni bolovi, febrilna stanja:* odrasli 1-3 puta na dan 1-2 šumeće tablete rastvorene u čaši vode; maks. acetilsalicilne kiseline 4g/dan; ne preporučuje se djeci ispod 16 god

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ANDOL C - PLIVA HRVATSKA D.O.O.**

BRp šumeća tableta [500 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta] 10 šumećih tableta (1 PVC tuba sa 10 tableta)

ASPIRIN PLUS C - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

BRp šumeća tableta [400 mg/1 tableta+ 240 mg/1 tableta] 10 šumećih tableta (5 stripova po 2 šumeće tablete), u kutiji

ASPIRIN PLUS C FORTE - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

BRp šumeća tableta [800 mg/1 tableta+ 480 mg/1 tableta] Strip od 4 sloja (papir/PE/aluminij/ionomer) u kartonskoj kutiji koji sadrži 10 šumećih tableta (5 strip pakovanja po 2 šumeće tablete)

ASPIRIN PLUS C SA OKUSOM NARANČE - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

BRp šumeća tableta [400 mg/1 tableta+ 240 mg/1 tableta] 10 šumećih tableta u strip pakiranju (5 stripova po 2 šumeće tablete), u kutiji

N02BB Pirazoloni**N02BB02 metamizol natrijum**

Doziranje: akutni jaki bolovi nakon povreda ili operacija, kolike, kancerski bolovi, ostali akutni ili hronični jaki bolovi ukoliko nisu indikovane druge terapijske mjere, visoka temperatura koja ne reaguje na druge lijekove: odrasli, oralno, 1-2 puta po 500 mg; parenteralno, 0,5-1 g kao i.m. ili spora i.v. inj, maks. 4 g dnevno; kod djece i adolescenata do 14 god. može se primjeniti pojedinačna doza 8-16 mg/kg tjelesne težine, za febrilna stanja doziranje kod djece je 10 mg/kg tjelesne težine

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ANALGIN - ALKALOID AD SKOPJE**

BRp tableta [500 mg/1 tableta] 6 tableta (1 PVC/Al blister sa 6 tableta) u kutiji

Rp tableta [500 mg/1 tableta] 10 tableta (1 Al/PVC blister po 10 tableta), u kutiji

ZU rastvor za injekciju [1 g/2 mL] 50 staklenih ampula sa 2 ml rastvora za injekciju (10 PVC uložaka po 5 ampula), u kutiji

ZU rastvor za injekciju [2,5 g/5 mL] 50 staklenih ampula sa 5 ml rastvora za injekciju (10 PVC uložaka po 5 ampula), u kutiji

NOVALGETOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

ZU rastvor za injekciju [2.5 g/5 mL] 50 ampula (10 PVC nosača po 5 ampula), u kutiji

REFALGIN - REPLEK AD SKOPJE

Rp tableta [500 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/Al blister) u kutiji

N02BE Anilidi**N02BE01 paracetamol**

Doziranje: *slabi do umjereno jaki bolovi, pireksija:* oralno, odrasli 0,5-1 g svakih 4-6 sati, maks. 4 g dnevno; djeca, uzrasta 2-3 mjeseca, 60 mg u jednoj dozi, zatim po potrebi 60 mg nakon 4-6 sati, uzrasta 3-5 mjeseci 60 mg svakih 4-6 sati kod post-imunizacijske pireksije; djeca uzrasta 6 mjeseci-2 god. 120 mg; 2-3 god. 180 mg, 4-5 god. 240 mg, 6-7

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

god. 240-250 mg, 8-9 god. 360-375 mg, 10-11 god. 480-500 mg, 12-15 god. 480-750 mg, 16-17 god. 0,5-1 g; ove doze se mogu ponoviti svakih 4-6 sati ukoliko je potrebno (maks. 4 doze u toku 24 h); rektalno, odrasli 0,5-1 g svakih 4-6 sati, maks. 4 g dnevno, djeca 3 mjeseca-11 mjeseci 60-125 mg, 1-4 god. 125-250 mg, 5-11 god. 250-500 mg, 12-17 god. 500 mg; doze se mogu ponoviti svakih 4-6 h ukoliko je neophodno (maks. 4 doze u toku 24 h); i.v. inf. tokom 15 min, odrasli i djeca preko 50 kg, 1 g svakih 4-6 sati, maks. 4 g dnevno; odrasli i djeca 10-50 kg, 15 mg/kg svakih 4-6 sati, maks. 60 mg/kg dnevno; djeca ispod 10 kg, 10 mg/kg do 4 puta dnevno, maks. 30 mg/kg/dnevno; *akutna migrena*: oralno, odrasli, 1 g u jednoj dozi čim se počnu razvijati simptomi

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DALERON - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- BRp oralna suspenzija [120 mg/5 mL] 1 staklena boca sa 100 ml oralne suspenzije i jedna brizgalica, u kutiji
BRp tableta [500 mg/1 tableta] 12 tableta (2 PVC/Al - blistera po 6 tableta), u kutiji
ZU tableta [500 mg/1 tableta] 500 tableta (50 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

FEBRICET - HEMOFARM A.D. VRŠAC

- BRp sirup [120 mg/5 mL] 100 mL sirupa u staklenoj boci i plastična kašičica u kutiji
BRp supozitorija [200 mg/1 supozitorija] 5 supozitorija (1 PVC/PE - blister) u kutiji
BRp tableta [500 mg/1 tableta] 12 tableta (2 Al/PE - strip folije po 6 tableta) u kutiji
BRp supozitorija [250 mg/1 supozitorija] 10 supozitorija (2 PVC/PE - folije po 5 supozitorija) u kutiji

GRIPPOSTAD TOPLI NAPITAK - STADA ARZNEIMITTEL AG

- BRp prašak za oralni rastvor [600 mg/1 kesica] 5 kesica (5 Al - kesica sa po 5 g praška za oralni rastvor), u kutiji

LEKADOL - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- BRp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 18 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera po 6 tableta), u kutiji

LUPOCET - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

- BRp čepić [120 mg/1 čepić] 10 (2x5) čepića u strip (PVC/PE) pakiranju, u kutiji
BRp sirup [120 mg/5 mL] 100 ml sirupa u smeđoj staklenoj bočici s polietilenskim (HDPE) sigurnosnim zatvaračem i graduirana štrcaljka za primjenu lijeka, u kutiji

PANADOL - GLAXOSMITHKLINE-CONSUMER MAGYARORSZAG KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG

- BRp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 12 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji

PANADOL BABY - HALEON HUNGARY KFT

- BRp oralna suspenzija [120 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 100 ml oralne suspenzije i plastična šprica za doziranje od 10 mL u kartonskoj kutiji

PANADOL OPTIZORB - HALEON HUNGARY KFT

- BRp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 12 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al/PET neprozirni blister sa 12 tableta), u kutiji

PARACEROL - POLIFARMA ILAC SAN VE TIC.A.S.

- ZU rastvor za infuziju [10 mg/1 mL] 48 bočica u kartonskoj kutiji (12 bočica pakovano u zaštitnu foliju, 4 folije od po 12 bočica u kutiji)

PARACETAMOL ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

- BRp oralna suspenzija [120 mg/5 mL] 100 ml oralne suspenzije u tamnoj staklenoj boci sa navojnim zatvaračem i plastičnom čašicom za doziranje, u kutiji
- BRp tableta [500 mg/1 tableta] 12 tableta (2 Al/PE strip sa 6 tableta), u kutiji

PARACETAMOL AMSAL - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO

- BRp oralni rastvor [120 mg/5 mL] 200 ml oralnog rastvora u staklenoj boci, u kutiji
- BRp tableta [500 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
- BRp tableta [500 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

PARACETAMOL BOSNALIJEK - BOSNALIJEK D.D.

- BRp sirup [120 mg/5 mL] 100 ml sirupa u staklenoj bočici i kašičica za doziranje, u kutiji
- BRp tableta [500 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
- BRp tableta [500 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

PARACETAMOL GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- BRp sirup [120 mg/5 mL] boca od 125 ml sa 100 ml sirupa i kašikom za doziranje, kutiji
- BRp tableta [500 mg/1 tableta] 20 tableta (2 Al/PVC/PVC/PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

PARACETAMOL REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE

- BRp sirup [120 mg/5 mL] staklena boca sa 100 ml sirupa, u kutiji
- BRp tableta [500 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

PARACETAMOL S.A.L.F. - S.A.L.F.-S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO

- ZU rastvor za infuziju [10 mg/1 mL] 30 PP bočica po 100 ml, u kutiji

PARACETAMOL ZADA - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- BRp tableta [500 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/PVDC-Al blister), u kutiji
- BRp tableta [500 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVDC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji

PLICET RAPID - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- BRp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC/aluminijska blistera po 10 tableta), u kutiji

N02BE51 fenilefrin, gvaifenezin, paracetamol

Doziranje: *olakšavanje simptoma prehlade, groznice i gripa:* odrasli i adolescenti stariji od 16 god. 1 vrećicu svakih 4-6 sati, maksimalno 3 vrećice dnevno, minimalni interval doziranja 4 sata

REGISTROVANI LIJEKOVI:**LUPOCET TRIO - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.**

- BRp prašak za oralnu otopinu [12,2 mg/1 vrećica+ 200 mg/1 vrećica+ 1000 mg/1 vrećica] 10 pojedinačnih vrećica (trostruka PET/Al/PE folija) praška za oralnu otopinu, u kutiji

N02BE51 ibuprofen, paracetamol

Doziranje: *kratkotrajna terapija blagog do umjerenog bola* (migrena, glavobolja, bol u leđima, menstrualni bol, zubobolja, reumatski i mišićni bol, bol kod blažeg oblika artritisa,

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

simptomi prehlade i gripa, bol u grlu ili povišena tjelesna temp.): odrasli preko 18 god, oralno 1 tbl. do 3 puta dnevno, maks. 6 tbl. u toku dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BLOKMAX DUO - ALKALOID AD SKOPJE

- BRp film tableta [200 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PVDC/Aluminijski blister sa 10 film tableta), u kutiji
- BRp film tableta [200 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/PVDC/Aluminijska blistera sa po 10 film tableta), u kutiji

BRUFEN EFFECT DUO - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- BRp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 Aluminij-PVC/PVDC blister sa po 10 tableta) u kutiji

COMBOGESIC - AFT PHARMACEUTICALS LIMITED

- BRp filmom obložena tableta [150 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta, u kutiji

N02BE51 hlorfenamin, natrijum-askorbat, paracetamol

Doziranje: *simptomatsko liječenje prehlade i gripe:* odrasli i djeca starija od 12 god, 1-2 šumeće tabl. svakih 4-6 sati (maks. 12 šum. tabl. unutar 24 h); djeca od 6 do 12 god: 1 šum. tabl. na 4-6 sati (maks. 3 šum. tabl. unutar 24 h); ne smije se primjenjivati kod djece mlađe od 6 godina

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LUOCET FLU FORTE - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

- BRp šumeća tableta [1.41 mg/1 tableta+ 280 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta] 10 šumećih tableta u polipropilenskoj tubi s polietilenskim zatvaračem, u kutiji

N02BE51 kodein, kofein, paracetamol

Doziranje: akutni bolovi blagog do umjerenog intenziteta (glavobolja, migrena, zubobolja, dismenoreja, neuralgija i reumatski bol (uključujući mialgije i bol u leđima): odrasli preko 18 god. po 2 tbl. najviše do 4 puta dnevno, vremenski interval između doza najmanje 4 sata, maks. dnevno 8 tbl; djeca uzrasta 16-18 god. do 2 tbl. na svakih 6 sati, maks. 8 tbl. dnevno; djeca uzrasta 12-15 god. 1 tbl. na svakih 6 sati, najviše do 4 tbl. dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CAFFEBOL - HEMOFARM A.D. VRŠAC

- BRp tableta [10 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta+ 460 mg/1 tableta] 12 tableta (2 Al/PE stripa po 6 tableta) u kutiji

N02BE51 askorbinska kiselina, paracetamol

Doziranje: *analgoantipiretik:* šumeće tablete, odrasli i djeca preko 12 god. 1 šumeću tabletu rastvoriti u čaši vode i popiti; po potrebi ponoviti za 4 sata; maks. 4 doze dnevno; granule za oralni rastvor, odrasli i djeca starija od 12 god. 4-6 puta dnevno po 1 kesicu, maks. 6 kesica; interval između pojedinih doza je najmanje 4 h; rastvor se pripremi neposredno prije upotrebe tako što se sadržaj kesice rastvori u 2 dl tople vode ili čaja

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LEKADOL PLUS C - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- BRp granule za oralni rastvor [300 mg/5 g+ 500 mg/5 g] 10 PET/Al/ PE - vrećica sa po 5 g granula za oralni rastvor, u kutiji

PARACET FLU - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO

- BRp prašak za oralni rastvor [250 mg/1 vrećica+ 500 mg/1 vrećica] 10 vrećica sa praškom za oralni rastvor (1 papirna vrećica obložena Al sadrži oko 3 g praška), u kutiji

N02BE51 kofein, paracetamol

Doziranje: *slabi do umjereno jaki bolovi, pireksija:* tablete: odrasli, 1-2 tabl. svaka 4 sata, ne primjenjivati u razmaku kraćem od 4 sata i ne prelaziti dozu od 8 tableta u 24 sata (4 doze); djeca starija od 12 god.: pola do 1 tabl. svakih 6 sati, ako je potrebno; prašak za oralni rastvor: 1-3 puta po 1-2 praška dnevno, po potrebi

REGISTROVANI LIJEKOVI:**PANADOL EXTRA - GLAXOSMITHKLINE-CONSUMER MAGYARORSZAG****KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG**

BRp filmom obložena tableta [65 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta] 12
filmom obloženih tablete (1 PVC/Al blister), u kutiji

PANADOL FORTE OPTIZORB - HALEON HUNGARY KFT

BRp filmom obložena tableta [65 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta] 12
filmom obloženih tableta (1 PVC/Al/PET neprozirni blister sa 12
tableta), u kutiji

N02BE51 kofein, paracetamol, propifenazon

Doziranje: bolovi blagog do umjerenog intenziteta različite etiologije (glavobolja, zubobolja, neuralgija, artralgijska, mijalgija, posttraumatski i postoperativni bolovi, dismenoreja), povišena tjelesna temperatura: odrasli: 1-2 tablete do 3 puta dnevno; djeca 12-16 godina: 1 tabl. do 3 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**KOFAN INSTANT - BOSNALIJEK D.D.**

BRp tableta [50 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta] 20
tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

N02BE51 askorbinska kiselina, hlufenamin, paracetamol

Doziranje: *simptomatsko liječenje prehlade i gripe:* odrasli i djeca starija od 12 god, 1-2 šumeće tabl. svakih 4-6 sati (maks. 12 šum.tabl. unutar 24h); djeca od 6 do 12 god: 1 šum. tabl. na 4-6 sati (maks. 3 šum. tabl.unutar 24h); ne smije se primjenjivati kod djece mlađe od 6 god.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**LUPOCET FLU - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.**

BRp šumeća tableta [250 mg/1 tableta+ 1,41 mg/1 tableta+ 300 mg/1
tableta] 10 šumećih tableta u polipropilenskoj tubi, u kutiji

N02BE51 hlufenamin, paracetamol, pseudoefedrin

Doziranje: *ublažavanje simptoma prehlade, gripe ili alergijskog rinitisa:* tablete, odrasli i djeca starija od 12 godina, 1 tableta na 6 h, preporučena dnevna doza je do 4 tablete; sirup, djeca od 6-12 godina, 1 odmjerna kašika (5 ml) svakih 6 sati; djeca starija od 12 godina, 3 odmerne kašike (15 ml) svakih 6 sati.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**RHINOSTOP - BOSNALIJEK D.D.**

Δ BRp sirup [1,01 mg/5 mL+ 101 mg/5 mL+ 20.2 mg/5 mL] 1 staklena
bočica sa 100 ml sirupa, u kutiji
Δ BRp tableta [2.54 mg/1 tableta+ 251 mg/1 tableta+ 61.2 mg/1 tableta] 10
tableta (1 PVC/Al - blister), u kutiji
Δ BRp tableta [2.54 mg/1 tableta+ 251 mg/1 tableta+ 61.2 mg/1 tableta] 20
tableta (2 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

N02BE51 fenilefrin, hlufenamin, paracetamol

Doziranje: kratkotrajno ublažavanje simptoma prehlade, gripe, alergijskog rinitisa ili drugih alergijskih bolesti gornjeg dijela respiratornog trakta; kratkotrajno ublažavanje

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

ostalih simptoma alergijskog rinitisa; pomaže u prohodnosti nosnih puteva; pomaže u dekongestiji sinusnih otvora i puteva: odrasli i djeca preko 12 god: 2 tbl. po potrebi svaka 4 sata, maks. 12 tbl. dnevno ili 4 dozirne kašike (20 ml) sirupa po potrebi svaka 4 sata; djeca 6-11 god. (tjelesna težina 22-43 kg): 1 tbl. po potrebi svaka 4 sata, maks. 5 tbl. dnevno ili 2 dozirne kašike (10 ml) sirupa po potrebi svaka 4 sata, maks. 5 puta u toku 24 sata.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

RHINOBOS - BOSNALIJEK D.D.

- △ BRp sirup [2.5 mg/5 mL+ 1 mg/5 mL+ 160 mg/5 mL] 1 smeđa staklena boca sa 100 ml sirupa, sigurnosnim zatvaračem za djecu (CRC/TE) i kašičica graduirana na 2,5 ml i 5 ml, u kutiji
- △ BRp tableta [5 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta] 1 PVC/PVDC/Al blister sa 10 tableta, u kutiji
- △ BRp tableta [5 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

N02BE51

kodein, kofein, paracetamol, propifenazon

Doziranje: *kratkotrajna terapija akutne, umjerene boli:* oralno, odrasli preko 18 god. 1 tbl. 3-4 puta dnevno, mogu se uzeti odjednom 2 tbl; maks. 6 tbl. dnevno; djeca 12-18 god. 1/2-1 tbl. do 3 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CAFFETIN - ALKALOID AD SKOPJE

- BRp tableta [10 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta+ 210 mg/1 tableta] 12 tableta (2 Al/PE-strip pakovanja po 6 tableta), u kutiji
- BRp tableta [10 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta+ 210 mg/1 tableta] 6 tableta (1 Al/PE- strip pakovanje), u kutiji

PLIVADON - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- BRp tableta [10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 210 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta] 1 PVC/PVdC/Al blister sa 10 tableta, u kutiji

N02BF

Gabapentinoidi

N02BF02

pregabalin

Doziranje: *periferni i centralni neuropatski bol:* oralno, odrasli početna doza 150 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze, povećati ukoliko je neophodno nakon 3-7 dana do 300 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze, povećati dalje ukoliko je neophodno nakon narednih 7 dana do maks. 600 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze; *dopunska terapija parcijalnih napada epilepsije sa ili bez sekundarne generalizacije:* oralno, odrasli početna doza 25 mg 2 puta dnevno, povećavati u intervalima od 7 dana po 50 mg dnevno do 300 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze, povećati dalje ukoliko je potrebno nakon 7 dana do maks. 600 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze; *generalizovani anksiozni poremećaj:* oralno, odrasli početna doza 150 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze, povećavati postepeno u intervalima od 7 dana po 150 mg dnevno; maks. 600 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GABINA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- △ Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 56 kapsula (4 PVC/Al blistera sa po 14 kapsula), u kutiji
- △ Rp kapsula, tvrda [300 mg/1 kapsula] 56 kapsula (8 PVC/Al blistera sa po 7 kapsula), u kutiji
- △ Rp kapsula, tvrda [75 mg/1 kapsula] 56 kapsula (4 PVC/Al blistera sa po 14 kapsula), u kutiji

LYRICA - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- △ Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrda (4 PVC/Al blistera po 14 kapsula)
- △ Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrdih (4 PVC/Al blistera po 14 kapsula)
- △ Rp kapsula, tvrda [300 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrdih (4 PVC/Al blistera po 14 kapsula)
- △ Rp kapsula, tvrda [75 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrdih (4 PVC/Al blistera po 14 kapsula)

PAGAMAX - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

- △ Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrdih (4 prozirna PVC/PE/PVDC aluminijska blistera po 14 kapsula), u kutiji
- △ Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrdih (4 prozirna PVC/PE/PVDC aluminijska blistera po 14 kapsula), u kutiji
- △ Rp kapsula, tvrda [75 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrdih (4 prozirna PVC/PE/PVDC aluminijska blistera po 14 kapsula), u kutiji

PREGABALIN REMEDICA - REMEDICA LIMITED

- △ Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrdih (8 PVC/Al blistera po 7 kapsula, tvrdih), u kutiji.
- △ Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrdih (8 PVC/Al blistera po 7 kapsula, tvrdih), u kutiji
- △ Rp kapsula, tvrda [75 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrdih (8 PVC/Al blistera po 7 kapsula, tvrdih), u kutiji.

PREGABIO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- △ Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrdih (4 PVC/PVDC//Al blistera sa po 14 kapsula), u kutiji
- △ Rp kapsula, tvrda [25 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrdih (4 PVC/PVDC//Al blistera sa po 14 kapsula), u kutiji
- △ Rp kapsula, tvrda [300 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrdih (4 PVC/PVDC//Al blistera sa po 14 kapsula), u kutiji
- △ Rp kapsula, tvrda [75 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrdih (4 PVC/PVDC//Al blistera sa po 14 kapsula), u kutiji

N02C**Antimigrenici****N02CA****Ergot alkaloidi****N02CA52 ergotamin, kamilofin, kofein, mekloksamin, propifenazon**

Doziranje: migrena, vaskularna glavobolja, cluster glavobolja: najbolje lijek uzeti u ranom, prodromalnom stadijumu glavobolje, 1-2 film-tablete, doziranje se nastavlja, ukoliko je potrebno, sa 1 film-tabletom svakih pola sata do najviše 4 film-tablete po napadu; ukupna sedmična doza ne smije prijeći 10 film-tableta; ne preporučuje se više od dva terapijska tretmana mjesečno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**NOMIGREN - BOSNALIJEK D.D.**

- △ Rp film tableta [0,75 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 Alu/Alu blister sa 10 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [0,75 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta] 2 film tablete (1 Alu/Alu blister sa 2 tablete), u kutiji

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

△ Rp	film tableta [0,75 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji
△ Rp	film tableta [0,75 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta] 4 film tablete (1 Alu/Alu blister sa 4 tablete), u kutiji
△ Rp	film tableta [0.75 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta] 1 fiola sa 10 film tableta, u kutiji
△ Rp	film tableta [0.75 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta] 1 fiola sa 20 film tableta, u kutiji

N02CC **Selektivni agonisti serotonina (5-HT1 receptora)**

N02CC01 **sumatriptan**

Doziranje: *akutno liječenje napada migrene:* početna doza 50 mg (nekim pacijentima može biti potrebno 100 mg); doza se može ponoviti nakon najmanje 2 sata; maks. 300 mg u toku 24 sata; napomena: pacijent koji nije odgovorio na početnu dozu ne bi trebao uzeti drugu dozu za isti napad.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IMIGRAN - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

△ Rp	filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 2 filmom obložene tablete (1 blister) u kutiji

SUMATRIPTAN SLAVIAMED - SLAVIAMED D.O.O. BEOGRAD

△ Rp	tableta [50 mg/1 tableta] 2 tablete (1 Al/poliamid/PVC blister), u kutiji

N02CC03 **zolmitriptan**

Doziranje: *akutni napadi migrene:* 2,5 mg, doza se može ponoviti nakon najmanje 2 sata, maksimalno 10 mg tokom 24 sata; ako efekat doze od 2,5 mg ne zadovolji, sljedeći napadi mogu se liječiti dozom od 5 mg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TRECAR - HEMOFARM A.D. VRŠAC

△ Rp	oralna disperzibilna tableta [2.5 mg/1 tableta] 3 oralne disperzibilne tablete (1 OPA/Al/PVC//Al blister sa 3 tablete), u kutiji

N02CD03 **fremanezumab**

Doziranje: *profilaksa migrene kod odraslih koji imaju migrenu najmanje 4 dana mjesečno:* 225 mg jednom mjesečno ili 675 mg jednom u 3 mjeseca, za više informacija o doziranju, konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AJOVY - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

ZU/Rp	otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici [225 mg/1 Brizgalica] 1 napunjena brizgalica sa 1,5 ml otopine za injekciju, u kutiji

N02CD06 **rimegepant**

Doziranje: akutna migrena: oralno, odrasli, 75 mg jednom dnevno po potrebi; preventivno liječenje epizodične migrene kod odraslih koji imaju najmanje 4 napada migrene mjesečno: 75 mg svaki drugi dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VYDURA - PFIZER INC.

Rp	oralni liofilizat [75 mg/1 Liofilizat] 2 oralna liofilizata (1 PVC/OPA/Al blister sa 2 liofilizata), u kutiji

N02CD07 atogepant

Doziranje: profilaksa epizoda hronične migrene (kod osoba koje imaju migrenu najmanje četiri dana u mjesecu): oralno, odrasli, 60 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AQUIPTA - ABBVIE INC.

- ZU/Rp tableta [10 mg/1 tableta] 28 tableta (4 PVC/PE/PCTFE/alu blistera sa po 7 tableta) , u kutiji. Jedan kalendarski blister sadrži 7 tableta.
 ZU/Rp tableta [10 mg/1 tableta] 98 tableta u blisterima, 2 unutrašnje kutije sa po 49 tableta, a svaka kutija sadrži 7 tableta x 7 blistera
 ZU/Rp tableta [60 mg/1 tableta] 98 tableta u blisterima, 2 unutrašnje kutije sa po 49 tableta, a svaka kutija sadrži 7 tableta x 7 blistera
 ZU/Rp tableta [60 mg/1 tableta] 28 tableta (4 PVC/PE/PCTFE/alu blistera sa po 7 tableta) , u kutiji. Jedan kalendarski blister sadrži 7 tableta.

N03 ANTIEPILEPTICI
N03A Antiepileptici
N03AA Barbiturati i derivati

N03AA02 fenobarbiton

Doziranje: svi oblici epilepsije osim apsans napada: odrasli, 1-5 mg/kg dnevno što uobičajeno iznosi 100 mg 1-3 puta dnevno; antikonvulzivna doza za djecu uzrasta 1 mjesec-12 god. iznosi 1-1,5 mg/kg 2 puta dnevno i povećava se po potrebi za po 2 mg/kg dnevno; uobičajena doza održavanja iznosi 2,5-4 mg/kg jednom ili 2 puta dnevno; prevencija febrilnih konvulzija kod djece: 3-4 mg/kg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

**PHENOBARBITON HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH
 PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA**

- ▲,§ Rp tableta [100 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

N03AE Derivati benzodiazepina**N03AE01 klonazepam**

Doziranje: sve forme epilepsije: oralno, djeca 1-11 mjeseci: početna doza 0,25 mg dnevno, doza održavanja 0,5-1 mg dnevno; djeca 1-4 god. početna doza 0,25 mg dnevno, doza održavanja 1-3 mg dnevno; djeca 5-11 god. početna doza 0,5 mg dnevno, doza održavanja 3-6 mg dnevno; djeca 12-17 god. početna doza 1 mg jednom dnevno, doza održavanja 4-8 mg dnevno; sve forme epilepsije, mioklonus: odrasli, početna doza 1 mg uveče, povećavati dozu tokom 2-4 nedjelje; doza održavanja 4-8 mg obično uveče (može se dati u 3-4 podijeljene doze);

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KLONAZEPAM REMEDICA - REMEDICA LIMITED

- ▲ Rp tableta [2 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

RIVOTRIL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- ▲ Rp tableta [2 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/PVC-PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

N03AF Derivati karboksamida

N03AF01 karbamazepin

Doziranje: *epilepsija (fokalni i sekundarno generalizovani toničko-klonički napadi, primarno generalizovani toničko-klonički napadi):* početna doza 100-200 mg 1-2 puta dnevno povećavati postepeno do uobičajene doze 0,8-1,2 g dnevno u podijeljenim dozama; u nekim slučajevima može biti potrebno 1,6-2 g dnevno u podijeljenim dozama; kod starijih smanjiti početnu dozu; djeca u podijeljenim dozama, do 1 god. 100-200 mg, 1-5 god. 200-400 mg, 5-10 god. 400-600 mg, 10-15 god. 0,6-1 g; *trigeminalna neuralgija:* početna doza 100 mg 1-2 puta dnevno (nekim pacijentima mogu biti potrebne više početne doze), povećavati postepeno prema postignutom odgovoru; uobičajena doza 200 mg 3-4 puta dnevno, do 1,6 g dnevno kod nekih pacijenata; *profilaksa bipolarnih poremećaja koji ne reaguju na litijum:* početna doza 400 mg dnevno u podijeljenim dozama, povećavati do kontrole simptoma; uobičajeno 400-600 mg dnevno; maks. 1,6 g dnevno; *simptomi apstinencije od alkohola:* oralno, odrasli, početi sa 800 mg dnevno u podijeljenim dozama, zatim smanjiti na 200 mg dnevno za uobičajeno trajanje terapije 7-10 dana, doza se postepeno smanjuje tokom 5 dana; formulacije sa produženim oslobađanjem: doze kod epilepsije za odrasle i djecu preko 5 god, kao što je naprijed navedeno; trigeminalna neuralgija, kao što je naprijed navedeno; bipolarni poremećaji, kao što je naprijed navedeno; ukupna dnevna doza se daje u 2 podijeljene doze; simptomi apstinencije od alkohola: 600-800 mg, u delirijum tremensu može biti potrebno 1200 - 1600 mg dnevno sa naknadnim redukcijama. Različiti preparati mogu imati različitu biološku raspoloživost; da bi se izbjegao izostanak dejstva ili suvišna neželjena dejstva, treba izbjegavati promjenu formulacije.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CARBAMAZEPINE REMEDICA RETARD - REMEDICA LIMITED

- ▲ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [400 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

KARBAPIN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- ▲ Rp tableta [200 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

TEGRETOL - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

- ▲ Rp tableta [200 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/PE/PVdC/Al blister po 10 tableta) u kutiji

TEGRETOL CR - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

- ▲ Rp tableta sa modifikovanim oslobađanjem [400 mg/1 tableta] 30 tableta sa modifikovanim oslobađanjem (3 PVC/PE/PVDC/Al blister po 10 tableta) u kutiji

N03AF02 okskarbazepin

Doziranje: *epilepsija (parcijalni napadi sa ili bez sekundarne generalizacije toničko-kloničkim napadima):* kao monoterapija ili dodatak terapiji, početna doza 300 mg 2 puta dnevno, povećavati prema postignutom odgovoru za maksimalnih 600 mg dnevno, postepeno u sedmičnim intervalima; uobičajena doza 0,6-2,4 g u podijeljenim dozama; djeca 6-17 god, 8-10 mg/kg dnevno u 2 podijeljene doze, povećavati prema odgovoru postepeno u sedmičnim intervalima maksimalno po 10 mg/kg dnevno; doza održavanja oko 30 mg/kg dnevno; maks. dnevna doza 46 mg/kg u podijeljenim dozama

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EXMAL - BOSNALIJEK D.D.

- ▲ Rp tableta [300 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta [600 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

TRILEPTAL - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

- ▲ Rp film tableta [300 mg/1 tableta] 50 film tableta (5 PVC/PE/PVDC// Al - blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp film tableta [600 mg/1 tableta] 50 film tableta (5 PVC/PE/PVDC// Al - blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp oralna suspenzija [60 mg/1 mL] staklena bočica sa 250 mL suspenzije i špric od 10 mL, u kutiji

N03AG Derivati masnih kiselina**N03AG01 valproinska kiselina**

Doziranje: generalizovani napadi (toničko-klonički (grand mal), apsans (petit mal), mioklonički napadi, atonički napadi), parcijalni napadi: odrasli, početi sa 500 mg dnevno, odnosno sa dozom 10-15 mg/kg dnevno; dozu je potrebno titrirati do optimalne i podijeliti u 1-2 doze; uobičajena doza je 20-30 mg/kg/dan; za djecu uobičajena doza iznosi 30 mg/kg/dan; manične epizode u bipolarnom poremećaju: oralno, početi sa 750 mg dnevno, uobičajena dnevna doza 1000-2000 mg

REGISTROVANI LIJEKOVI:**NAVARIN XR - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.**

- ▲ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [500 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (5 Al/Al blistera po 6 tableta) u kutiji

N03AG01 natrijum-valproat

Doziranje: liječenje generalizovane epilepsije: klonički, tonički, tonički-klonički, apsans, mioklonični i atonični epi napadi; Lennox-Gastautov sindrom; liječenje parcijalne epilepsije: parcijalni epi napadi sa ili bez sekundarne generalizacije - odrasli i djeca, ili kao monoterapija ili u kombinaciji sa nekim drugim antiepileptikom; prevencija povrata epi napada nakon jedne ili više febrilnih konvulzija koje ispunjavaju kriterije za komplikovane febrilne konvulzije, kada intermitentna profilaksa benzodiazepinima nije dala rezultat - djeca; dojenčad i djeca, 30 mg/kg dnevno (po mogućnosti koristiti sirup, oralni rastvor i granule sa produženim oslobađanjem) u 2-3 podijeljene doze; adolescenti i odrasli 20-30 mg/kg dnevno (po mogućnosti koristiti tablete sa produženim oslobađanjem), u 3 podijeljene doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:**DEPAKINE - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE**

- △ Rp sirup [57.64 mg/1 mL] staklena boca sa 150 ml sirupa i dozna šprica sa adapterom, u kutiji

N03AG01 natrijum-valproat, valproinska kiselina

Doziranje: epilepsija (terapija generalizovanih, parcijalnih i drugih epileptičkih napada): odrasli, početna dnevna doza 10-15 mg/kg (što odgovara količini od 2 do 5 tbl. od 300 mg ili 1 do 3 tbl. od 500 mg), jednom dnevno, doza se može povećati do optimalne dnevne doze od 20-30 mg/kg (što odgovara količini od 4 do 10 tbl. od 300 mg ili 2 do 6 tbl. od 500 mg); djeca, uobičajena dnevna doza je 20-30 mg/kg; ovaj lijek je namijenjen za odrasle i djecu tjelesne težine veće od 17 kg; manične epizode u bipolarnom poremećaju, kada je liječenje litijumom kontraindikovano ili ga bolesnici ne podnose: početna dnevna doza 750 mg, prosječna dnevna doza 1000 mg-2000 mg, ne preporučuje se djeci mlađoj od 18 god.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEPAKINE CHRONO 300 - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

- ▲ Rp tableta s prilagođenim oslobađanjem [199.8 mg/1 tableta+ 87 mg/1 tableta] 100 tableta sa prilagođenim oslobađanjem (2 polipropilenska spremnika (bočice) sa 50 tableta), u kutiji

DEPAKINE CHRONO 500 - SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

- ▲ Rp tableta s prilagođenim oslobađanjem [333 mg/1 tableta+ 145 mg/1 tableta] 30 tableta sa prilagođenim oslobađanjem u sa polipropilenskom spremniku (bočica) polietilenskim zatvaračem, u kutiji

N03AX

Ostali antiepileptici

N03AX09

lamotrigin

Doziranje: monoterapija parcijalnih napada, monoterapija primarnih i sekundarno generalizovanih toničko-kloničkih napada, monoterapija napada povezanih sa Lennox-Gastaut sindromom: odrasli i djeca preko 12 god, 25 mg dnevno prvih 14 dana, povećati na 50 mg dnevno narednih 14 dana, postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 100-200 mg u 1-2 podijeljene doze (može biti potrebno do 500 mg dnevno); titraciju doze treba ponoviti ako se ponovo počne nakon perioda dužeg od 5 dana; kombinovana terapija parcijalnih napada sa valproatom, kombinovana terapija primarnih i sekundarno generalizovanih toničko-kloničkih napada sa valproatom, kombinovana terapija napada povezanih sa Lennox-Gastaut sindromom sa valproatom: odrasli i djeca preko 12 god, 25 mg na drugi dan prvih 14 dana, 25 mg dnevno narednih 14 dana, postepeno povećavati za 25-50 mg nedjeljno, do optimalne doze održavanja 100-200 mg dnevno u jednoj ili u 2 doze; djeca 2-12 god. inicijalno 150 mikrograma/kg jednom dnevno tokom 14 dana (djeci ispod 13 kg može da se daje 2 mg svaki drugi dan tokom prvih 14 dana), zatim 300 mikrograma/kg jednom dnevno, tokom narednih 14 dana, nakon toga povećati za maks. 300 mikrograma/kg svakih 7-14 dana; uobičajena doza održavanja 1-5 mg/kg dnevno u 1-2 podeljene doze; maks. 200 mg dnevno; kombinovana terapija parcijalnih napada s induktorima enzima bez valproata; kombinovana terapija primarnih i sekundarno generalizovanih toničko-kloničkih napada s induktorima enzima bez valproata; kombinovana terapija napada povezanih sa Lennox-Gastaut sindromom s induktorima enzima bez valproata: odrasli i djeca preko 12 god, 50 mg dnevno prvih 14 dana, zatim 50 mg 2 puta dnevno narednih 14 dana, povećavati za 100 mg nedjeljno do optimalne doze održavanja 200-400 mg dnevno u 2 doze (može biti potrebno do 700 mg dnevno); titraciju doze treba ponoviti ako se ponovo počne nakon perioda dužeg od 5 dana; djeca 2-12 god. inicijalno 600 mikrograma/kg dnevno u 2 podijeljene doze, tokom 14 dana, zatim 1,2 mg/kg dnevno u 2 podijeljene doze tokom narednih 14 dana, nakon toga povećavati za maks. 1.2 mg/kg svakih 7-14 dana; uobičajena doza održavanja 5-15 mg/kg dnevno u 1-2 podijeljene doze; maks. 400 mg dnevno; titraciju doze treba ponoviti ako se ponovo počne nakon perioda dužeg od 5 dana; kombinovana terapija parcijalnih napada bez induktora enzima i bez valproata; kombinovana terapija primarnih i sekundarno generalizovanih toničko-kloničkih napada bez induktora enzima i bez valproata; kombinovana terapija napada povezanih sa Lennox-Gastaut sindromom bez induktora enzima i bez valproata: odrasli i djeca preko 12 god, inicijalno 25 mg jednom dnevno tokom 14 dana, povećati na 50 mg jednom dnevno tokom narednih 14 dana, zatim povećati za maks. 100 mg svakih 7-14 dana, uobičajena doza održavanja 100-200 mg dnevno u jednoj ili u 2 doze; titraciju doze treba ponoviti ako se ponovo počne nakon perioda dužeg od 5 dana; djeca 2-12 god, inicijalno 300 mikrograma/kg dnevno u 1-2 podijeljene doze tokom 14 dana, zatim 600 mikrograma/kg dnevno u 1-2 podijeljene doze, tokom narednih 14 dana, zatim povećati za maks. 600 mikrograma/kg svakih 7-14 dana; uobičajena doza održavanja 1-10 mg/kg dnevno u 1-2 podijeljene doze; titraciju doze

treba ponoviti ako se ponovo počne nakon perioda dužeg od 5 dana; maks. 200 mg dnevno; monoterapija ili dodatak terapiji bipolarnih poremećaja (bez lijekova koji indukuju enzime) bez valproata: odrasli preko 18 god, početna doza 25 mg jednom dnevno tokom 14 dana, zatim 50 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze tokom narednih 14 dana, zatim 100 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze tokom narednih 7 dana; uobičajena doza održavanja 200 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze; titraciju doze treba ponoviti ako se ponovo počne nakon perioda dužeg od 5 dana; maks. 400 mg dnevno; dodatak terapiji bipolarnih poremećaja sa valproatima: odrasli preko 18 god, početna terapija 25 mg na naizmjenične dane tokom 14 dana, zatim 50 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze tokom narednih 7 dana; uobičajena doza održavanja 100 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze; titraciju doze treba ponoviti ako se ponovo počne nakon perioda dužeg od 5 dana; maks. 200 mg dnevno; dodatak terapiji bipolarnih poremećaja (sa lijekovima koji indukuju enzime) bez valproata: odrasli preko 18 god, početna doza 50 mg jednom dnevno tokom 14 dana, zatim 50 mg 2 puta dnevno tokom narednih 14 dana, zatim 100 mg 2 puta dnevno tokom narednih 7 dana, zatim 150 mg 2 puta dnevno tokom narednih 7 dana; uobičajena doza održavanja 200 mg 2 puta dnevno; titraciju doze treba ponoviti ako se ponovo počne nakon perioda dužeg od 5 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ARVIND - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- ▲ Rp tableta [100 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/AI blistera po 15 tableta) u kutiji
- ▲ Rp tableta [25 mg/1 tableta] 30 tableta (1 PVC/AI blister), u kutiji
- ▲ Rp tableta [50 mg/1 tableta] 30 tableta (1 PVC/AI blister), u kutiji

LAMAL - ALKALOID AD SKOPJE

- ▲ Rp tableta [100 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/AI blistera po 15 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta [200 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/AI blistera po 15 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta [25 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/AI blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta [50 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/AI blistera po 10 tableta), u kutiji

LAMICTAL - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

- ▲ Rp tableta [100 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/AI - blistera po 15 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta [25 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/AI - blistera po 15 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta [50 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/AI - blistera po 15 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta za žvakanje [5 mg/1 tableta] 1 HDPE bočica sa sigurnosnim zatvaračem za djecu sa 30 tableta za žvakanje, u kutiji

LATRIGIL - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- ▲ Rp tableta za oralnu suspenziju [100 mg/1 tableta] 30 tableta za oralnu suspenziju (3 blistera od Aclar/ PVC/AI folije po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta za oralnu suspenziju [25 mg/1 tableta] 30 tableta za oralnu suspenziju (3 blistera od Aclar/ PVC/AI folije po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tablete za oralnu suspenziju [50 mg/1 tableta] 30 tableta za oralnu suspenziju (3 blistera od Aclar/ PVC/AI folije po 10 tableta), u kutiji

MOTRIX - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

- ▲ Rp tableta [100 mg/1 tableta] 30 tableta (2 AI/PVC blistera sa po 15 tableta), u kutiji

- ▲ Rp tableta [25 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta [50 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

N03AX11 topiramat

Doziranje: *epilepsija (generalizovani toničko-klonički napadi ili parcijalni napadi sa ili bez sekundarne generalizacije): monoterapija*, početna terapija 25 mg uveče tokom 1 nedjelje, zatim povećavati postepeno po 25-50 mg uzeto u 2 podijeljene doze u intervalima 1-2 nedjelje; uobičajena doza 100-200 mg dnevno u 2 podijeljene doze, podešavati prema odgovoru; maks. 500 mg dnevno; djeca 6-18 god, početna doza 0,5-1 mg/kg (maks. 25 mg) uveče tokom 1 nedjelje, zatim povećavati postepeno po 0,5-1 mg/kg (maks. 50 mg) uzeto u 2 podijeljene doze u intervalima od 1-2 nedjelje; početna ciljna doza 100 mg dnevno u 2 podijeljene doze; maks. 15 mg/kg (maks. 500 mg) dnevno; *dodatak terapiji epilepsije*: početna doza 25-50 mg uveče tokom jedne nedjelje, zatim povećavati postepeno po 25-50 mg uzeto u 2 podijeljene doze u intervalima od 1-2 nedjelje; uobičajena doza 200-400 mg dnevno u 2 podijeljene doze: maks. 400 mg dnevno; djeca 2-18 god, početna doza 1-3 mg/kg (maks. 25 mg) uveče tokom 1 nedjelje zatim povećavati postepeno po 1-3 mg/kg (maks. 50 mg) uzeto u 2 podijeljene doze u intervalima 1-2 nedjelje; uobičajena doza 5-9 mg/kg dnevno u 2 podijeljene doze; maks. 15 mg/kg (maks. 400 mg) dnevno; *profilaksa migrene*: odrasli preko 18 god., početna doza 25 mg dnevno uveče tokom jedne nedjelje zatim povećavati postepeno po 25 mg u intervalima od 1 nedjelju; uobičajena doza 50-100 mg dnevno u 2 podijeljene doze; maks. 200 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TIRAMAT - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- ▲ Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (3 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 20 tableta), u kutiji
- ▲ Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 30 tableta), u kutiji
- ▲ Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC/Al blistera po 30 tableta), u kutiji

N03AX12 gabapentin

Doziranje: *epilepsija* (monoterapija i dodatak terapiji parcijalnih napada sa ili bez sekundarne generalizacije): 300 mg dnevno prvi dan, zatim 300 mg 2 puta dnevno drugi dan, zatim 300 mg 3 puta dnevno trećeg dana ili početna doza 300 mg 3 puta dnevno prvi dan; zatim postepeno povećavati prema postignutom odgovoru po 300 mg (u 3 podijeljene doze) svaka 2-3 dana; uobičajena doza 0,9-3,6 g dnevno u 3 podijeljene doze (maks. 4,8 g u 3 podijeljene doze; djeca 6-12 god. (samo dodatak terapiji) početna doza 10 mg/kg (maks. 300 mg) jednom dnevno prvog dana, zatim 10 mg/kg (maks. 300 mg) 2 puta dnevno drugog dana, zatim 10 mg/kg (maks. 300 mg) 3 puta dnevno trećeg dana; uobičajena doza 25-35 mg/kg dnevno u 3 podijeljene doze; maks. 70 mg/kg dnevno u 3 podijeljene doze; *neuropatski bol*: odrasli preko 18 god, 300 mg jednom dnevno prvog dana, zatim 300 mg 2 puta dnevno drugog dana, zatim 300 mg 3 puta dnevno trećeg dana ili početna doza 300 mg 3 puta dnevno prvog dana, zatim povećavati postepeno prema postignutom odgovoru po 300 mg (u 3 podijeljene doze) svaka 2-3 dana do maks. 3,6 g dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NIRVAX - BOSNALIJEK D.D.

- △ Rp kapsula, tvrda [300 mg/1 kapsula] 50 kapsula, tvrdih (5 PVC/PVDC/AL blistera po 10 kapsula), u kutiji

△ Rp kapsula, tvrda [400 mg/1 kapsula] 50 kapsula, tvrdih (5 PVC/PVDC/AL blistera po 10 kapsula), u kutiji

N03AX14 levetiracetam

Doziranje: *monoterapija parcijalnih napada sa ili bez sekundarne generalizacije:* oralno ili i.v. inf, odrasli i djeca preko 16 god, inicijalno 250 mg jednom dnevno tokom nedelju dana, zatim povećati na 250 mg 2 puta dnevno, zatim povećavati prema odgovoru po 250 mg dva puta dnevno (maks. 1,5 g dva puta dnevno) podešavati prema odgovoru, doze se povećavaju svake 2 sedmice; *dopunska terapija parcijalnih napada sa ili bez sekundarne generalizacije:* oralno, odrasli, inicijalno 250 mg dva puta dnevno, podešavati za po 500 mg dva puta dnevno svake 2-4 nedjelje; maks. 1,5 g dva puta dnevno; djeca 12-17 god. s više od 50 kg tjelesne težine, inicijalno 250 mg dva puta dnevno, podešavati za po 500 mg dva puta dnevno svake 2-4 nedjelje; maks. 1,5 g dva puta dnevno; djeca preko 6 mjeseci-17 god, tjelesne mase ispod 50 kg, početna doza 10 mg/kg jednom dnevno; povećati za maks. 10 mg/kg 2 puta dnevno svake 2 nedjelje; maks. 30 mg/kg 2 puta dnevno; djeca 1-6 mjeseci, inicijalno 7 mg/kg jednom dnevno, povećati za maks. 7 mg/kg 2 puta dnevno svake 2 nedjelje; maks. 21 mg/kg 2 puta dnevno; i.v.inf. djeca 4-17 god. (tjelesne mase do 50 kg) početi sa 10 mg/kg jednom dnevno, zatim doze povećavati postepeno u koracima od 10 mg/kg dva puta dnevno svake 2 nedjelje do maksimalno 30 mg/kg dva puta dnevno; djeca 12-17 god. (tjelesne mase 50 kg i više): početi sa 250 mg dva puta dnevno, dozu zatim povećavati postepeno u koracima po 500 mg dva puta dnevno svake 2 nedjelje do maksimalno 1,5 g dva puta dnevno; odrasli, početi sa 250 mg dva puta dnevno, dozu zatim postepeno povećavati u koracima od po 500 mg dva puta dnevno svakih 2-4 nedjelje do maks. 1,5 g dva puta dnevno; *dopunska terapija miokloničkih napada i primarno generalizovanih toničko-kloničkih napada:* oralno ili i.v. inf, odrasli, inicijalno 250 mg dva puta dnevno, podešavati za po 500 mg dva puta dnevno svake 2-4 nedjelje; maks. 1,5 g dva puta dnevno; djeca 12-17 god. s tjelesnom masom preko 50 kg inicijalno 250 mg dva puta dnevno, podešavati za po 500 mg dva puta dnevno svake 2-4 nedjelje; maks. 1,5 g dva puta dnevno; djeca 12-17 god. s manje od 50 kg tjelesne težine: inicijalno 10 mg/kg jednom dnevno; doza se može povećati do 30 mg/kg dva puta dnevno, s tim da se doza podešava za 10 mg/kg dva puta dnevno svake dvije sedmice

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EPILEM - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

△ ZU koncentrat za rastvor za infuziju [500 mg/5 mL] 10 staklenih bočica (tip I) koncentrata za rastvor za infuziju po 5 ml, u kutiji

EPIXX - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

△ Rp filmom obložena tableta [1000 mg/1 tableta] 50 filmom obloženih tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

EPIXX - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

△ Rp filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 50 filmom obloženih tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

KEPPRA - UCB PHARMA S.A.

△ Rp film tableta [1000 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

△ Rp film tableta [250 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

△ Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

△ Rp oralni rastvor [100 mg/1 mL] 1 staklena bočica od 150 ml oralnog rastvora i šprica od 1 ml, u kutiji

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

△ Rp	oralni rastvor [100 mg/1 mL] 1 staklena bočica od 150 ml oralnog rastvora i šprica od 5 ml, u kutiji
△ Rp	oralni rastvor [100 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 300 ml oralnog rastvora i šprica od 10 ml, u kutiji
LEPTICA - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	
△ Rp	film tableta [500 mg/1 tableta] 50 film tableta (5 PVC/PVDC-AL blistera sa po 10 tableta), u kutiji
LEVETIRACETAM FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO	
△ Rp	filmom obložena tableta [1000 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (10 Al/PVC blistera po 6 tableta), u kutiji
△ Rp	filmom obložena tableta [250 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (4 Al/PVC blistera po 15 tableta) u kutiji
△ Rp	filmom obložena tableta [500 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
LEVETIRACETAM HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA	
△ Rp	film tableta [1000 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC-PE-PVDC/AL blistera po 10 tableta) u kutiji
△ Rp	film tableta [250 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC-PE-PVDC/AL blistera po 10 tableta) u kutiji
△ Rp	film tableta [500 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC-PE-PVDC/AL blistera po 10 tableta) u kutiji
LEVEX - BOSNALIJEK D.D.	
Rp	film tableta [1000 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC /PVdC /Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji.
Rp	film tableta [250 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC /PVdC /Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji.
Rp	film tableta [500 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 PVC /PVdC /Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji.
LYVAM - ALKALOID AD SKOPJE	
△ Rp	film tableta [1000 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
△ Rp	film tableta [250 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
△ Rp	film tableta [500 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
△ Rp	film tableta [750 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

N03AX16 pregabalin

Doziranje: *periferni i centralni neuropatski bol:* oralno, odrasli početna doza 150 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze, povećati ukoliko je neophodno nakon 3-7 dana do 300 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze, povećati dalje ukoliko je neophodno nakon narednih 7 dana do maks. 600 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze; *dopunska terapija parcijalnih napada epilepsije sa ili bez sekundarne generalizacije:* oralno, odrasli početna doza 25 mg 2 puta dnevno, povećavati u intervalima od 7 dana po 50 mg dnevno do 300 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze, povećati dalje ukoliko je potrebno nakon 7 dana do maks. 600 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze; *generalizovani anksiozni poremećaj:* oralno, odrasli početna doza 150 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze, povećavati postepeno u intervalima od 7 dana po 150 mg dnevno; maks. 600 mg dnevno u 2-3 podijeljene doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EPIRON - BOSNALIJEK D.D.

- △ Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrdih (8 PVC/Al blistera po 7 kapsula) u kutiji
- △ Rp kapsula, tvrda [75 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrdih (8 PVC/Al blistera po 7 kapsula) u kutiji

GABAPREG - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- △ Rp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrdih (4 PVC/Al blistera sa po 14 kapsula), u kutiji
- △ Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 90 kapsula, tvrdih (9 PVC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji
- △ Rp kapsula, tvrda [75 mg/1 kapsula] 56 kapsula, tvrdih (4 PVC/Al blistera sa po 14 kapsula), u kutiji

N03AX18**lakoamid**

Doziranje: *monoterapija lokalnih napada sa ili bez sekundarne generalizacije:* oralno, djeca tjelesne mase 50 kg i više): početna doza 50 mg dva puta dnevno, zatim povećati na 100 mg dva puta dnevno, nakon jedne nedjelje, alternativno inicijalno 100 mg dva puta dnevno, povećati u koracima po 50 mg dva puta dnevno (maks. doza 300 mg dva puta dnevno), ukoliko je neophodno i ukoliko se podnosi, dozu treba povećati na nedjeljnom intervalu; djeca 4-17 god. (tjelesne mase do 50 kg), konsultovati literaturu proizvođača; odrasli, početna doza 50 mg dva puta dnevno, zatim povećati na 100 mg dva puta dnevno, nakon jedne nedjelje, alternativno inicijalno 100 mg dva puta dnevno, povećati u koracima po 50 mg dva puta dnevno (maks. doza 300 mg dva puta dnevno), ukoliko je neophodno i ukoliko se podnosi, dozu treba povećati na nedjeljnom intervalu; *monoterapija lokalnih napada sa ili bez sekundarne generalizacije:* započinjanje terapije udarnim dozama za brzo postizanje koncentracije lijeka u plazmi (pod strogim ljekarskim nadzorom), udarna doza od 200 mg, nakon čega slijedi nakon 12 sati doza od 100 mg dva puta dnevno; povećati u koracima po 50 mg dva puta dnevno (maks. doza 300 mg dva puta dnevno), ukoliko je neophodno i ukoliko se podnosi, dozu treba povećati na nedjeljnom intervalu; *dodatak terapiji lokalnih napada sa ili bez sekundarne generalizacije:* početna doza 50 mg dva puta dnevno, zatim povećati na 100 mg dva puta dnevno, nakon jedne nedjelje, alternativno inicijalno 100 mg dva puta dnevno, povećati u koracima po 50 mg dva puta dnevno (maks. doza 200 mg dva puta dnevno), ukoliko je neophodno i ukoliko se podnosi, dozu treba povećati na nedjeljnom intervalu; *dodatak terapiji lokalnih napada sa ili bez sekundarne generalizacije,* započinjanje terapije udarnim dozama za brzo postizanje koncentracije lijeka u plazmi (pod strogim ljekarskim nadzorom), udarna doza od 200 mg, nakon čega slijedi nakon 12 sati doza od 100 mg dva puta dnevno; povećati u koracima po 50 mg dva puta dnevno (maks. doza 200 mg dva puta dnevno), ukoliko je neophodno i ukoliko se podnosi, dozu treba povećati na nedjeljnom intervalu;

REGISTROVANI LIJEKOVI:**BELEPTIC - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO**

- △ Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [150 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

LACOMDA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- △ Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PVDC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

- △ Rp film tableta [150 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PVDC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [200 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PVDC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PVDC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

LOSMORID - ALKALOID AD SKOPJE

- △ Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [150 mg/1 tableta] 56 film tablete (4 PVC/PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [200 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 PVC/PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

N03AX23 brivaracetam

Doziranje: *dodatak terapiji parcijalnih napada sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje:* odrasli, početi sa 25-50 mg dva puta dnevno, podešavati prema odgovoru, uobičajena doza održavanja 25-100 mg dva puta dnevno (maks. po dozi 100 mg dva puta dnevno); djeca 2-17 god. (tjelesne mase 10-19 kg) početi sa 0,5-1,25 mg/kg dva puta dnevno, podešavati prema odgovoru, uobičajena doza održavanja 1,25 mg/kg dva puta dnevno (maks. po dozi 2,5 mg/kg dva puta dnevno); djeca 2-17 god. (tjelesne mase 20-49 kg) početi sa 0,5-1 mg/kg dva puta dnevno, podešavati prema odgovoru, uobičajena doza održavanja 1 mg/kg dva puta dnevno (maks. po dozi 2 mg/kg dva puta dnevno); djeca 2-17 god. (tjelesne mase 50 kg i više) početi sa 25-50 mg dva puta dnevno, podešavati prema odgovoru, uobičajena doza održavanja 50 mg dva puta dnevno (maks. po dozi 100 mg dva puta dnevno);

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BRIVAX - STADA ARZNEIMITTEL AG

- △ Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 56 film tableta (8 Aluminium-OPA/Alu/PVC blistera sa 7 film tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [25 mg/1 tableta] 56 film tableta (8 Aluminium-OPA/Alu/PVC blistera sa 7 film tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 56 film tableta (8 Aluminium-OPA/Alu/PVC blistera sa 7 film tableta), u kutiji

N04 ANTIPARKINSONICI

N04A Antiholinergici

N04AA Tercijarni amini

N04AA02 biperiden

Doziranje: *Parkinsonova bolest:* oralno, inicijalno dva puta dnevno po 1 mg; doza se može povećavati za 2 mg dnevno; doza održavanja 1-4 mg 3-4 puta dnevno; maks. dnevna doza 16 mg; i.m. ili i.v. 2-4 ml (10-20 mg biperidena) podijeljeno u toku dana; *ekstrapiramidalni poremećaji prouzrokovani lijekovima:* oralno, odrasli 2-3 puta dnevno 1-4 mg; oralno, djeca 3-15 god. 1-3 puta na dan 1-2 mg; i.m. ili i.v. odrasli 0,5-1 ml (2,5-5 mg biperidena), ako je potrebno ista doza se može ubrizgati ponovo nakon 30 min; maks. dnevna doza 2-4 ml (10-20 mg biperidena); djeca do 1 god. 1 mg biperidena (0,2 ml), djeca do 6 god. 2 mg biperidena (0,4 ml), djeca do 10 god. 3 mg biperidena (0,6 ml); ako je potrebno ista doza se može ubrizgati ponovo nakon 30 min; *trovanje nikotinom:*

i.m. 1-2 ml (5-10 mg biperidena); u izuzetno teškim slučajevima i.v. ubrizgati 1 ml (5 mg biperidena); nastavak liječenja oralno; *trovanje organskim jedinjenjima fosfora*: individualno, 5 mg i.v. višekratno do nestanka simptoma trovanja.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AKINETON - LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T.

△ Rp tableta [2 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta),
u kutiji

MENDILEX - ALKALOID AD SKOPJE

△ Rp tableta [2 mg/1 tableta] 50 tableta (5 AL/PVC blistera po 10 tableta),
u kutiji

N04B **Dopaminergički lijekovi** **N04BA** **Dopa i derivati dope**

N04BA02 **benzerazid, levodopa**

Doziranje: *Parkinson-ova bolest*: u ranim stadijima bolesti liječenje treba započeti s 1/2 tablete 3 do 4 puta na dan, postepeno povećavati u zavisnosti od odgovora na terapiju, optimalni terapijski efekat se obično postiže primjenom 300-800 mg levodopa i 75-200 mg benzerazida dnevno podijeljeno u 3 ili više doza; doza održavanja je obično 1 tbl. 3-6 puta dnevno; potrebno je 4 do 6 sedmica da se postigne optimalno djelovanje; *sindrom nemirnih nogu*: idiopatski sindrom nemirnih nogu, bolesnici koji imaju poteškoće sa snom, 1 sat prije odlaska u krevet, početna doza 62,5-125 mg, doza se može povećati na 250 mg; bolesnici koji imaju poteškoće sa snom, poremećaj noćnog sna i dodatne smetnje tokom dana: preporučuje se da se ovi bolesnici liječe dodatnom dozom od 125 mg, pri čemu ukupna doza tokom 24 sata ne smije biti veća od 500 mg; *sindrom nemirnih nogu zbog zatajenja bubrega koji zahtijeva dijalizu*: 125 mg prije dijalize

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MADOPAR - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

△ Rp tableta [25 mg/1 tableta+ 100 mg/1 tableta] 1 staklena bočica sa
100 tableta sa sredstvom za sušenje, u kutiji

N04BA02 **karbidopa, levodopa**

Doziranje: *tretman Parkinsonove bolesti i Parkinsonovog sindroma*: oralno-tablete, početna doza 12,5/125 mg jedanput dnevno ili dva puta dnevno, zatim postepeno povećavati u koracima po 12,5/125 mg svaki ili svaki drugi dan; kod prebacivanja pacijenata sa levodope, davanje levodope se mora prekinuti najmanje 12 h nakon početka primjene preparata sa karbidopom (ili 24 h za preparate levodope sa produženim djelovanjem; odabrati dozu preparata sa karbidopom koja će obezbijediti 20% prethodne doze levodope; preporučena početna doza za većinu pacijenata koji uzimaju više od 1500 mg levodope je jedna tableta 3 ili 4 puta dnevno; liječenje treba biti individualizirano i prilagođeno u skladu sa željenim terapijskim odgovorom; maksimalno 8 tableta dnevno; tablete sa produženim oslobađanjem-pacijenti koji se liječe samo levodopom: potrebno je ukinuti primjenu levodope najmanje 8 sati prije terapije tbl. sa produženim djelovanjem 50/200 mg; početna doza 1 tbl. sa produž. oslob. 50/200 mg 2 puta dnevno, početna doza ne smije prekoračiti 600 mg levodope dnevno, niti se smije dati u intervalima manjim od 6 sati; za više informacija o titraciji i dozi održavanja konsultovati literaturu proizvođa;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DAMAR - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

△ Rp tableta [25 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta] 100 tableta (10
PVC/PVDC/ALU blistera sa po 10 tableta), u kutiji

NAKOM - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

△ Rp	tableta [25 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta] 100 tableta (10 PVC/Al blistera sa po 10 tableta) u kutiji

N04BB **Derivati adamantana**

N04BB01 **amantadin**

Doziranje: *Parkinsonova bolest:* oralno, odrasli 100 mg dnevno, povećati nakon jedne nedjelje na 100 mg 2 puta dnevno, obično u kombinaciji sa drugom terapijom; nekim pacijentima mogu biti potrebne više doze; maks. 400 mg dnevno; stariji od 65 god. 100 mg dnevno podešavati prema odgovoru; *liječenje gripe:* oralno, sa terapijom započeti što prije, po mogućnosti 24-48 sati nakon pojave simptoma, odrasli i djeca iznad 10 god. 100 mg 1-2 puta na dan tokom 5 dana; *profilaksa gripe:* oralno, odrasli i djeca iznad 10 god. 100 mg dnevno do 6 sedmica; *postherpetična neuralgija:* oralno, odrasli 100 mg dva puta dnevno tokom 14 dana, nastaviti tokom narednih 14 dana ukoliko je neophodno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NEOMIDANTAN - JSC OLPHA

Rp	kapsula, tvrda [100 mg/1 kapsula] 50 kapsula, tvrdih (5 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

N04BC **Agonisti dopamina**

N04BC01 **bromokriptin**

Doziranje: *parkinsonizam:* 1,25 mg pred spavanje tokom 1. nedjelje, druge nedjelje 2,5 mg pred spavanje, treće nedjelje 2,5 mg dva puta dnevno; četvrta nedjelja 2,5 mg tri puta dnevno; dalje 3 puta dnevno sa povećanjem 2,5 mg svakih 3-14 dana u zavisnosti od terapijskog odgovora, uobičajeno optimalno 10-30 mg dnevno; *prevencija laktacije:* 2,5 mg prvog dana od porođaja a zatim 2,5 mg 2 puta dnevno tokom 14 dana; *supresija laktacije:* 2,5 mg u toku 2-3 dana, zatim povećavati na 2 puta po 2,5 mg tokom 14 dana; *hipogonadizam, galaktoreja, infertilitet:* u početku 1-1,25 mg uveče pred spavanje, povećati postepeno; uobičajena doza 7,5 mg dnevno u podijeljenim dozama, po potrebi povećati na maks. 30 mg dnevno, uobičajena doza kod infertiliteta bez hiperprolaktinemije, 2,5 mg dva puta dnevno; *akromegalija:* početna doza 1-1,25 mg uveče pred spavanje, povećati postepeno na 5 mg svakih 6 sati; *prolaktinemija:* u početku 1-1,25 mg uveče pred spavanje; povećati postepeno na 5 mg svakih 6 sati (uobičajeno je potrebno do 30 mg dnevno);

prolaktinomi: djeca 7-17 god. 1,25 mg dva puta dnevno, postepeno povećavati, maksimalno 5 mg kod djece 7-12 god, maksimalno 20 mg kod djece 13-17 god; *gigantizam (akromegalija):* početnu dozu odrediti u skladu sa nivoom hormona rasta u krvi, maksimalno 10 mg kod djece 7-12 god, maksimalno 20 mg kod djece 13-17 god.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BROMOKRIPTIN ZDRAVLJE - ZDRAVLJE AD LESKOVAC

△ Rp	tableta [2,5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

N04BC04 **ropinirol**

Doziranje: *Parkinson-ova bolest,* ili kao monoterapija ili kao dodatak terapiji: oralno, tablete sa trenutnim oslobađanjem, monoterapija, 3 puta po 0,25 mg dnevno, tokom 1. nedjelje (najbolje uz obrok), tokom 2. nedjelje 3 puta po 0,5 mg dnevno, tokom 3. nedjelje 3 puta po 0,75 mg dnevno, tokom 4. nedjelje 3 puta po 1 mg dnevno; dalje povećavati prema odgovoru po 1,5-3 mg dnevno u intervalima od nedjelju dana; uobičajena doza 9-16 mg dnevno; maks. 24 mg dnevno u 3 podijeljene doze; u kombinaciji sa levodopom, doza levodope se može postepeno smanjiti za približno 20%; oralno, tablete sa produženim oslobađanjem, 2 mg jednom dnevno tokom prve nedjelje, zatim 4 mg jednom

dnevno počev od druge nedjelje, povećavati postepeno po 2 mg u intervalima od najmanje nedjelju dana, povećati na 8 mg jednom dnevno, doze se mogu i dalje povećavati ukoliko nema odgovora; po potrebi povećavati po 2-4 mg u intervalima od najmanje 2 nedjelje, razmotriti sporiju titraciju kod osoba starijih od 75 god. kada se primjenjuje kao dodatak terapiji uz levodopu moguće je postepeno smanjivati dozu levodope na približno 30% početne doze; maks. 24 mg dnevno; *Parkinsonova bolest kod pacijenata koji prelaze sa ropinirol tableta sa trenutnim oslobađanjem*: oralno tablete sa produženim oslobađanjem, odrasli uzimaju početnu dozu tableta sa produženim oslobađanjem istovjetnu ukupnoj dnevnoj dozi tableta sa trenutnim oslobađanjem, koliko kontrola nije postignuta nakon zamjene, titrirati dozu;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

REQUIP - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

- ▲ Rp filmom obložena tableta [0.25 mg/1 tableta] 21 filmom obložena tableta (1 PVC/PE/PVdC-Alu/ papir blister siguran za djecu), u kutiji
- ▲ Rp filmom obložena tableta [1 mg/1 tableta] 21 filmom obložena tableta (1 PVC/PE/PVdC-Alu/ papir blister siguran za djecu), u kutiji
- ▲ Rp filmom obložena tableta [2 mg/1 tableta] 21 filmom obložena tableta (1 PVC/PE/PVdC-Alu/ papir blister siguran za djecu), u kutiji

REQUIP MODUTAB - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

- ▲ Rp tableta s produženim oslobađanjem [2 mg/1 tableta] 28 tableta sa produženim oslobađanjem (2 PVC/PE/PVdC- Aluminij/papir blistera sigurna za djecu po 14 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [4 mg/1 tableta] 28 tableta sa produženim oslobađanjem (2 PVC/PE/PVdC- Aluminij/papir blistera sigurna za djecu po 14 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [8 mg/1 tableta] 28 tableta sa produženim oslobađanjem (2 PVC/PE/PVdC- Aluminij/papir blistera sigurna za djecu po 14 tableta), u kutiji

ROLPRYNA SR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- ▲ Rp tableta s produženim oslobađanjem [2 mg/1 tableta] 28 tableta s produženim oslobađanjem (4 OPA/Al/PVC//Al blistera po 7 tableta),
- ▲ Rp tableta s produženim oslobađanjem [4 mg/1 tableta] 28 tableta s produženim oslobađanjem (4 OPA/Al/PVC//Al blistera po 7 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta s produženim oslobađanjem [8 mg/1 tableta] 28 tableta s produženim oslobađanjem (4 OPA/Al/PVC//Al blistera po 7 tableta), u kutiji

N04BC05 pramipeksol

Doziranje: *Parkinsonova bolest*: oralno, tablete sa trenutnim oslobađanjem, početna doza 88 mcg 3 puta dnevno, doze se udvostručavaju svakih 5-7 dana ako je podnošljivost dobra do 350 mcg 3 puta dnevno; dalje ukoliko je potrebno dozu povećavati za 180 mcg 3 puta dnevno u nedjeljnim intervalima; maks. 3,3 mg dnevno u 3 podijeljene doze (napomena: 88 mcg baze pramipeksol odgovara 125 mcg soli (pramipeksol dihidrohlorid monohidrat); 180 mcg baze odgovara 250 mcg soli; 350 mcg baze odgovara 500 mcg soli; 700 mcg baze odgovara 1 mg soli); tablete s produženim oslobađanjem, početna doza 260 mcg jednom dnevno, doze se udvostručavaju svakih 5-7 dana do 1,05 mg jednom dnevno; dalje povećanje ukoliko je neophodno je 520 mcg dnevno u intervalu od nedjelju dana; maks. 3,15 mg jednom dnevno; napomena: 260 mcg baze pramipeksol odgovara 375 mcg soli (pramipeksol dihidrohlorid monohidrat); 520 mcg baze odgovara 750 mcg soli; 1,05 mg baze odgovara 1,5 mg soli; 1,57 mg baze odgovara 2,25 mg soli;

2,1 mg baze odgovara 3 mg soli; 2,62 mg baze odgovara 3,75 mg soli; 3,15 mg baze odgovara 4,5 mg soli);

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OPRYMEA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- ▲ Rp tableta [0.088 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta [0.18 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al-blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta [0.7 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al-blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [0.26 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/desikant/PE-Al folija blistera sa po 10 tableta) u kutiji
- ▲ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [0.52 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/desikant/PE-Al folija blistera sa po 10 tableta) u kutiji
- ▲ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [1.05 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/desikant/PE-Al folija blistera sa po 10 tableta) u kutiji
- ▲ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [1.57 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/desikant/PE-Al folija blistera sa po 10 tableta) u kutiji
- ▲ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [2.1 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/desikant/PE-Al folija blistera sa po 10 tableta) u kutiji

N04BD

Inhibitori monoamino oksidaze B

N04BD02 rasagilin

Doziranje: Parkinsonova bolest (kao monoterapija ili kao dodatna terapija s levodopom): 1 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AGILLAS - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp tableta [1 mg/1 tableta] 28 tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

PARLIN - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

- Rp tableta [1 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

RASAGILINE REMEDICA - REMEDICA LIMITED

- Rp tableta [1 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/OPA/Al/PVC blistera sa 10 tableta), u kutiji

N04BD03 safinamid

Doziranje: Parkinsonova bolest, kao dodatak terapiji levodope koja se primjenjuje sama ili u kombinaciji sa drugim antiparkinsonicima, kod pacijenata u srednjem do kasnom stadijumu sa fluktuacijama: oralno, odrasli, 50 mg jednom dnevno, povećati po potrebi na 100 mg jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FIRSSAMO - MSN LABS EUROPE LIMITED

- Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC-Alu blistera po 10 film tableta), u kutiji
- Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC-Alu blistera po 10 film tableta), u kutiji

N04BX Drugi dopaminergički lijekovi**N04BX04 opikapon**

Doziranje: dodatna terapija uz terapiju kombinacijom levodope/inhibitora DOPA dekarboksilaze (DDCI) kod odraslih pacijenata s Parkinsonovom bolešću i motoričkim fluktuacijama pri kraju doze: odrasli, oralno 50 mg jednom dnevno prije spavanja i najmanje jedan sat prije ili jedan sat poslije uzimanja kombinacije koja sadrži levodopu

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ONGENTYS - BIAL - PORTELA & CA,S.A.

Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

N05 PSIHOLEPTICI**N05A Antipsihotici****N05AA Fenotazini sa alifatičnim bočnim nizom****N05AA01 hlompromazin**

Doziranje: šizofrenija i druge psihoze (naročito paranoidne), manija i hipomanija; anksioznost, psihomotorna agitacija, pretjerana uzbuđenost, nasilno ili opasno impulsivno ponašanje: početna doza 25 mg 3 puta dnevno (ili 75 mg uveče), podešavati prema odgovoru do uobičajene doze održavanja od 75-300 mg dnevno (ali do 1 g dnevno može biti potrebno kod psihoza); stariji pacijenti ili ometeni u razvoju, trećina do polovina doze za odrasle; djeca (dječija šizofrenija i autizam) 1-6 god. 500 mikrograma/kg svakih 4-6 sati (maks. 40 mg dnevno); 6-12 god. 10 mg 3 puta dnevno (maks. 75 mg dnevno); kratkoročni tretman uporne šćucavice: 25-50 mg 3 puta dnevno; mućnina i povraćanje kod terminalnih stanja (kada drugi preparati nemaju učinka ili nisu dostupni: odrasli, 10-25 mg na svakih 4-6 sati; djeca 1-6 god, 0,5mg/kg tjelesne mase na svakih 4-6 sati, maks. 40 mg dnevno; djeca 6-12 god. 0,5 mg/kg tjelesne mase na svakih 4-6 sati, maks. 75 mg dnevno; stariji pacijenti ili ometeni u razvoju, terapiju započeti sa 1/3 do 1/2 uobićajene doze za odrasle, dozu prilagoditi na osnovu iskustva i klinićke slike do postizanja kontrole

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CHLORPROMAZINE REMEDICA - REMEDICA LIMITED

- ▲ Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 50 film tableta (5 Al/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji
- ▲ Rp film tableta [25 mg/1 tableta] 50 film tableta (5 Al/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji

N05AA02 levomepromazin

Doziranje: akutna psihotićna oboljenja, hronićna psihotićna oboljenja (šizofrenija, hronićna ne-šizofrena manija: paranoidna manija, hronićna halucinatorsna psihoza), u kombinaciji sa antidepressivima, kratkotrajni tretman odrećene ozbiljne forme velike depresije (kombinacija sa ovim lijekom se može primjeniti samo u početnom periodu tretmana (npr. 4-6 sedmica): oralno, početna doza 25-200 mg dnevno, dozu povećati do maksimalno 400 mg dnevno, dnevnu dozu uzeti naveće pred spavanje ili u tri podijeljene doze uz obrok

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NOZINAN - NEURAXPHARM PHARMACEUTICALS S.L.

- ▲ Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/ Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

- ▲ Rp film tableta [25 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/ Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

N05AA03 promazin

Doziranje: kratkotrajni dodatak terapiji psihomotorne ekscitiranosti: 100-200 mg 4 puta dnevno; ekscitiranost i uznemirenost kod starijih: 25-50 mg 4 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PRAZINE - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- ▲ Rp obložena tableta [100 mg/1 tableta] 50 obloženih tableta (5 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp obložena tableta [25 mg/1 tableta] 50 obloženih tableta (5 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

PROMAZIN FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- ▲ Rp obložena tableta [100 mg/1 tableta] Polipropilenska bočica sa 50 obloženih tableta, u kutiji
- ▲ Rp obložena tableta [25 mg/1 tableta] Polipropilenska bočica sa 50 obloženih tableta, u kutiji

N05AB Fenotiazini sa piperazinskom strukturom

N05AB02 flufenazin

Doziranje: tablete, *akutni i hronični psihotični poremećaji (shizofrenija, paranoidne psihoze, manija i hipomanija):* odrasli, 2,5-10 mg dnevno podijeljeno u 2-3 doze, maks. 20 mg dnevno, doza održavanja jednom dnevno po 1-5 mg; *anksioznost i drugi nepsihotični poremećaji:* 1-2 mg dnevno, po potrebi povećati na 4 mg, trajanje liječenja do 3 mjeseca; *agitacija i emocionalni poremećaj starije dobi:* 1-2,5 mg dnevno; otopina za injekciju, *terapija održavanja i sprečavanje ponavljanja shizofrenije i drugih psihoza:* i.m. uobičajena početna doza 12,5-25 mg, naredne doze i vremenski razmak između njih određuje se za svakog pacijenta posebno; uobičajeno interval doziranja je 15-35 dana; ako su potrebne doze veće od 50 mg, postepeno povećati po 12,5 mg; maks. doza 100 mg; pacijenti koji nisu dobijali fenotiazine moraju započeti liječenje injekcijama s kratkotrajnim djelovanjem ili tabletama flufenazina

REGISTROVANI LIJEKOVI:

METOTEN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O.

BANJA LUKA

- ▲ Rp obložena tableta [1 mg/1 tableta] HDPE bočica sa 25 obloženih tableta, sa bijelim LDPE zatvaračem, u kutiji

MODITEN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- ▲ Rp obložena tableta [1 mg/1 tableta] 25 obloženih tableta u staklenoj bočici u kutiji
- ▲ Rp obložena tableta [2.5 mg/1 tableta] 100 obloženih tableta u staklenoj bočici u kutiji
- ▲ Rp obložena tableta [5 mg/1 tableta] 100 obloženih tableta u staklenoj bočici u kutiji

MODITEN DEPO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- ▲ ZU otopina za injekciju [25 mg/1 mL] 5 ampula po 1 ml otopine za injekciju, u kutiji

N05AD Derivati butirofenona

N05AD01 haloperidol

Doziranje: *šizofrenija i šizoafektivni poremećaj:* oralno, odrasli, 2-10 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze, uobičajena doza 2-4 mg dnevno u prvoj epizodi šizofrenije, do 10 mg

dnevno kod višestrukih epizoda šizofrenije; dozu podešavati prema odgovoru u intervalima 1-7 dana; kada se razmatraju doze više od 10 mg, procijeniti omjer koristi i rizika za pojedinačnog pacijenta; stariji, početna doza je pola doze za odrasle, zatim postepeno podešavati prema odgovoru do maks. 5 mg dnevno, doze više od 5 mg dnevno razmatrati samo kod pacijenata koji tolerišu više doze i nakon ponovne procjene odnosa korist-rizik; *akutni delirijum (kada su nefarmakološka liječenja neuspješna)*: oralno, odrasli, 1-10 mg dnevno u 1-3 podijeljene doze, terapiju treba započeti sa najnižom mogućom dozom i zatim je postepeno povećavati u intervalima 2-4 sata po potrebi, maks. 10 mg dnevno; i.m. 1-10 mg dnevno, terapiju treba započeti sa najnižom mogućom dozom i zatim je postepeno povećavati u intervalima 2-4 sata po potrebi, maks. 10 mg dnevno; stariji, početi sa 0,5 mg, dozu podešavati postepeno prema odgovoru do maks. 5 mg dnevno, doze preko 5 mg razmatrati samo kod pacijenata koji tolerišu više doze i nakon ocjene koristi i rizika; *umjerene do teške manične epizode povezane sa bipolarnim poremećajem tipa I*: oralno, odrasli, 2-10 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze, dozu podešavati prema odgovoru u intervalima 1-3 dana; kada se razmatraju doze više od 10 mg, procijeniti omjer koristi i rizika za pojedinačnog pacijenta; nastavak primjene potrebno je procijeniti u ranoj fazi liječenja; maks. 15 mg dnevno; stariji, početna doza je pola najniže doze za odrasle, zatim postepeno podešavati prema odgovoru do maks. 5 mg dnevno, doze više od 5 mg dnevno razmatrati samo kod pacijenata koji tolerišu više doze i nakon ponovne procjene odnosa korist-rizik; nastavak primjene potrebno je procijeniti u ranoj fazi liječenja; *akutna psihomotorna agitacija povezana sa psihotičnim poremećajem ili maničnim epizodama bipolarnog poremećaja tipa I*: oralno, odrasli početna doza 5-10 mg, po potrebi ponoviti nakon 12 sati, nastavak primjene potrebno je procijeniti u ranoj fazi liječenja; maks. 20 mg dnevno; stariji, početna doza 2,5 mg dnevno, po potrebi dozu ponoviti nakon 12 sati, maks. do 5 mg dnevno; doze više od 5 mg dnevno razmatrati samo kod pacijenata koji tolerišu više doze i nakon ponovne procjene odnosa korist-rizik; nastavak primjene potrebno je procijeniti u ranoj fazi liječenja; *brza kontrola teške akutne psihomotorne agitacije povezane sa psihotičnim poremećajem ili maničnim epizodama bipolarnog poremećaja tipa I kada peroralna terapija nije prikladna*: i.m. odrasli 5 mg, primjena se može ponavljati svakih sat vremena po potrebi, kod većine pacijenata dovoljne su doze do 15 mg dnevno; nastavak primjene potrebno je procijeniti u ranoj fazi liječenja; maks. 20 mg dnevno; stariji, 2,5 mg, primjena se može ponavljati svakih sat vremena po potrebi, do maks. 5 mg dnevno; doze više od 5 mg dnevno razmatrati samo kod pacijenata koji tolerišu više doze i nakon ponovne procjene odnosa korist-rizik; nastavak primjene potrebno je procijeniti u ranoj fazi liječenja; *liječenje dugotrajne agresije i psihotičnih simptoma kod pacijenata sa umjerenom do teškom Alzheimerovom demencijom i vaskularnom demencijom kada su nefarmakološka liječenja neuspješna i kada postoji rizik od samoozljeđivanja ili ozljeđivanja drugih osoba*: oralno, odrasli 0,5-5 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze, doze podešavati prema odgovoru u intervalima 1-3 dana; potrebu za nastavkom liječenja procijeniti nakon najviše 6 nedjelja; stariji, 0,5 mg dnevno, potrebu za nastavkom liječenja procijeniti nakon najviše 6 nedjelja; *liječenje poremećaja sa tikovima, uključujući Touretteov sindrom, kod pacijenata sa teškim oštećenjem nakon neuspjeha edukacijskih, psiholoških i drugih farmakoloških terapija*: oralno, odrasli 0,5-5 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze, doze podešavati prema odgovoru u intervalima 1-7 dana; potrebu za nastavkom liječenja procijeniti svakih 6-12 mjeseci; stariji, početi sa polovinom najniže doze za odrasle, zatim postepeno podešavati prema odgovoru do maks. 5 mg dnevno; potrebu za nastavkom liječenja procijeniti svakih 6-12 mjeseci; *liječenje blage do umjerene koreje kod Huntingtonove bolesti kada drugi lijekovi nisu efikasni ili ih pacijent ne podnosi*: oralno, odrasli, 2-10 mg dnevno u 1-2 podijeljene doze, dozu podešavati prema odgovoru u intervalima 1-3 dana; stariji, početi sa polovinom najniže doze za odrasle, zatim postepeno podešavati prema odgovoru do maks. 5 mg dnevno; doze više od 5 mg

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

dnevno razmatrati samo kod pacijenata koji tolerišu više doze i nakon ponovne procjene odnosa korist-rizik; *blaga do umjerena koreja kod Huntingtonove bolesti kada drugi lijekovi nisu efikasni ili ih pacijent ne podnosi i kada oralna terapija nije prikladna:* i.m. odrasli 2-5 mg, doza se može ponavljati svakih sat vremena, maks. 10 mg dnevno; stariji, početi sa 1 mg, doze se mogu po potrebi ponavljati svakih sat vremena do maks. 5 mg dnevno, doze više od 5 mg dnevno razmatrati samo kod pacijenata koji tolerišu više doze i nakon ponovne procjene odnosa korist-rizik; *profilaksa postoperativne mučnine i povraćanja kada drugi lijekovi nisu efikasni ili ih pacijent ne podnosi:* i.m. odrasli 1-2 mg pri uvođenju u anesteziju ili 30 min. prije završetka anestezije; stariji, 0,5 mg pri uvođenju u anesteziju ili 30 min. prije završetka anestezije; *kombinovana terapija postoperativne mučnine i povraćanja kada drugi lijekovi nisu efikasni ili ih pacijent ne podnosi:* i.m. odrasli 1-2 mg; stariji 0,5 mg; Haldol depo: *terapija održavanja šizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja:* kod pacijenata čije je stanje prethodno uravnoteženo peroralnim liječenjem, duboko i.m. početna doza 50 mg svake 4 nedjelje, ukoliko je neophodno povećavati po 50 mg do 300 mg svake 4 nedjelje; kod starijih bolesnika početna doza 12,5 do 25 mg svake 4 nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HALOPERIDOL KRKA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- ▲ Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (1 staklena bočica sa 30 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta [2 mg/1 tableta] 25 tableta (1 staklena bočica sa 25 tableta), u kutiji
- ▲ ZU otopina za injekciju [5 mg/1 mL] 10 ampula po 1 ml otopine za injekciju, u kutiji

HALOPERIDOL KRKA DEPO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- ▲ ZU otopina za injekciju [50 mg/1 mL] 5 ampula po 1 ml otopine za injekciju, u kutiji

HALO-SWISS - SWISS PARENTERALS LIMITED.

- ▲ ZU rastvor za injekciju [5 mg/1 mL] 10 staklenih ampula od čilibarnog stakla sa po 1 mL rastvora za injekciju, u kartonskoj kutiji

N05AE Derivati indola

N05AE04 ziprazidon

Doziranje: šizofrenija, treman maničnih ili kombinovanih epizoda srednje-ozbiljnih bipolarnih poremećaja kod djece i adolescenata uzrasta od 10-17 godina: odrasli 40 mg 2 puta dnevno, maks. do 80 mg 2 puta dnevno; doza održavanja 2 puta dnevno 20 mg; parenteralno, i.m. samo kod pacijenata kod kojih se oralni način primjene lijeka ne smatra odgovarajućim: inicijalno 10 mg prema potrebi, do maks. 40 mg dnevno; doze od 10 mg mogu se davati svaka 2 sata; u nekim slučajevima inicijalno 20 mg, a zatim 10 mg po isteku 4 sata, zatim nastaviti sa 10 mg svaka 2 sata do maks. 40 mg dnevno; što prije prijeći na oralnu primjenu

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ZELDOX - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- ▲ Rp kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/AI blistera po 10 kapsula) u kutiji
- ▲ Rp kapsula, tvrda [40 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/AI blistera po 10 kapsula), u kutiji
- ▲ Rp kapsula, tvrda [60 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/AI blistera po 10 kapsula) u kutiji
- ▲ Rp kapsula, tvrda [80 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/AI blistera po 10 kapsula), u kutiji

- ▲ ZU prašak i otapalo za otopinu za injekciju [20 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa praškom i 1 ampula sa otapalom (voda za injekciju), u kutiji

N05AH**Diazepini, oksazepini, tiazepini i oksepin****N05AH02****klozapin**

Doziranje: *šizofrenija kod pacijenata koji ne reaguju na, ili ne podnose, konvencionalnu terapiju antipsihoticima:* oralno, odrasli, početna doza je 12,5 mg jednom ili dva puta (stariji preko 60 god. 12,5 mg jednom) prvi dan, zatim 25-50 mg drugog dana (stariji preko 60 god. 25-37,5 mg), zatim povećati postepeno ako se dobro podnosi po 25-50 mg dnevno (stariji preko 60 god. maks. povećanje 25 mg dnevno) tokom 2-3 sedmice do maksimalno 300 mg dnevno u podijeljenim dozama (veća doza uveče, do 200 mg može biti uzeto uveče pred spavanje); nakon toga ako je potrebno doza se može povećati postepeno po 50-100 mg dnevno svakih pola sedmice ili u intervalima od sedmice dana, što je poželjnije; uobičajena doza 200-450 mg dnevno (maks. 900 mg dnevno); *psihoze kod Parkinsonove bolesti:* oralno, odrasli, 12,5 mg pred spavanje, zatim postepeno povećavati prema odgovoru po 12,5 mg do dva puta nedjeljno; uobičajeno se daje 25-37,5 mg uveče pred spavanje i maks. 50 mg; u izuzetnim slučajevima doze se mogu dalje postepeno povećavati po 12,5 mg nedjeljno do maks. 100 mg dnevno u jednoj ili dvije podijeljene doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:**CLOZAPIN SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.**

- ▲ Rp tableta [100 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PP/AI blistera po 10 tableta) u kutiji
- ▲ Rp tableta [25 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PP/AI blistera po 10 tableta) u kutiji

CLOZAPINE REMEDICA - REMEDICA LIMITED

- ▲ Rp tableta [100 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/AI blistera sa 10 tableta), u kutiji

LEPONEX - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- ▲ Rp tableta [100 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/PE/PVDC - blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta [25 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/PE/PVDC - blistera po 10 tableta), u kutiji

NEOZAPIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- ▲ Rp oralna disperzibilna tableta [100 mg/1 tableta] 50 oralnih disperzibilnih tableta (5 PVC/PVDC/AI blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp oralna disperzibilna tableta [200 mg/1 tableta] 50 oralnih disperzibilnih tableta (5 PVC/PVDC/AI blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp oralna disperzibilna tableta [25 mg/1 tableta] 50 oralnih disperzibilnih tableta (5 PVC/PVDC/AI blistera po 10 tableta), u kutiji

N05AH03**olanzapin**

Doziranje: *šizofrenija, kombinovana terapija manije, sprečavanje recidiva bipolarnog poremećaja:* oralno, odrasli 10 mg dnevno, podešavati dozu unutar raspona 5-20 mg dnevno; početne doze veće od 10 mg preporučuje se samo nakon odgovarajuće kliničke procjene; maks. 20 mg dnevno; *monoterapija manije:* odrasli preko 18 god. oralno 15 mg dnevno, podešavati prema uobičajenoj dozi od 5-20 mg dnevno; početne doze veće od 15 mg preporučuje se samo nakon odgovarajuće kliničke procjene; maks. 20 mg dnevno;

REGISTROVANI LIJEKOVI:**OLANDIX - PLIVA HRVATSKA D.O.O.**

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

△ Rp	raspadljiva tableta za usta [10 mg/1 tableta] 28 raspadljivih tableta za usta (4 OPA/Al/PVC//Al blistera po 7 tableta), u kutiji
△ Rp	raspadljiva tableta za usta [5 mg/1 tableta] 28 raspadljivih tableta za usta (4 OPA/Al/PVC//Al blistera po 7 tableta), u kutiji
OLANZAPIN REPLEK FARM - REPLEK AD SKOPJE	
△ Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
△ Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
OLFREX - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	
△ Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Al/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
△ Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji
TREANA - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA	
△ Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 oPA/Al/PVC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji
△ Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 oPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
VAIRA - V - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO	
△ Rp	raspadljiva tableta za usta [10 mg/1 tableta] 28 raspadljivih tableta za usta (4 OPA/Al/PVC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji
△ Rp	raspadljiva tableta za usta [5 mg/1 tableta] 28 raspadljivih tableta za usta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera po 14 raspadljivih tableta za usta), u kutiji
ZALASTA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO	
△ Rp	tableta [10 mg/1 tableta] 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
△ Rp	tableta [5 mg/1 tableta] 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
ZALASTA Q-TAB - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO	
△ Rp	raspadljiva tableta za usta [10 mg/1 tableta] 28 raspadljivih tableta za usta (4 Al/OPA/Al/PVC blistera po 7 tableta), u kutiji
△ Rp	raspadljiva tableta za usta [20 mg/1 tableta] 28 raspadljivih tableta za usta (4 Al/OPA/Al/PVC blistera po 7 tableta), u kutiji
△ Rp	raspadljiva tableta za usta [5 mg/1 tableta] 28 raspadljivih tableta za usta (4 Al/OPA/Al/PVC blistera po 7 tableta), u kutiji
ZAPIN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.	
△ Rp	film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 blistera po 10 tableta), u kutiji
△ Rp	film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 blistera po 10 tableta), u kutiji
ZYPREXA - CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH	
△ Rp	obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 obloženih tableta (4 PVC/oPA/Al//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji
△ Rp	obložena tableta [5 mg/1 tableta] 28 obloženih tableta (4 PVC/oPA/Al//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji

N05AH04

kvetiapin

Doziranje: šizofrenija: oralno, tablete sa trenutnim oslobađanjem, odrasli 25 mg 2 puta dnevno prvog dana, 50 mg 2 puta dnevno drugog dana, 100 mg 2 puta dnevno trećeg dana, 150 mg 2 puta dnevno četvrtog dana, zatim podešavati prema postignutom

odgovoru, uobičajena doza 300-450 mg dnevno u 2 podijeljene doze; maks. 750 mg dnevno; oralno, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, odrasli 300 mg jednom dnevno prvog dana, zatim 600 mg jednom dnevno drugog dana, zatim podešavati prema odgovoru, uobičajena doza 600 mg jednom dnevno, maks. 800 mg dnevno; stariji, početna doza 50 mg jednom dnevno, postepeno podešavati prema postignutom odgovoru po 50 mg dnevno; *terapija manije povezane sa bipolarnim poremećajem*: oralno, tablete sa trenutnim oslobađanjem, odrasli 50 mg 2 puta dnevno prvog dana; 100 mg 2 puta dnevno drugog dana, 150 mg 2 puta dnevno trećeg dana, 200 mg 2 puta dnevno četvrtog dana, zatim podešavati prema postignutom odgovoru postepeno po 200 mg dnevno do maks. 800 mg dnevno; uobičajena doza 400-800 mg dnevno podijeljeno u 2 doze; oralno, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, odrasli 300 mg jednom dnevno tokom prvog dana, zatim 600 mg jednom dnevno tokom drugog dana, zatim podešavati prema odgovoru, uobičajena doza 400-800 mg jednom dnevno; stariji, početna doza 50 mg jednom dnevno, postepeno podešavati prema postignutom odgovoru po 50 mg dnevno; *depresije povezane sa bipolarnim poremećajem*: oralno, tablete sa trenutnim oslobađanjem, odrasli 50 mg jednom dnevno (pred spavanje) prvog dana, 100 mg jednom dnevno drugog dana, 200 mg jednom dnevno tokom trećeg dana, 300 mg jednom dnevno četvrtog dana; podešavati prema odgovoru, uobičajena doza 300 mg jednom dnevno, maks. 600 mg dnevno; oralno, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, odrasli 50 mg jednom dnevno tokom prvog dana, pred spavanje, zatim 100 mg jednom dnevno tokom drugog dana, zatim 200 mg jednom dnevno tokom trećeg dana, zatim 300 mg jednom dnevno tokom četvrtog dana, podesiti prema odgovoru, uobičajena doza 300 mg jednom dnevno, maks. 600 mg dnevno; *prevencija manije i depresije povezane sa bipolarnim poremećajem*: oralno, tablete sa trenutnim oslobađanjem, odrasli nastaviti sa dozom efikasnom za tretman bipolarnog poremećaja i zatim podešavati prema najnižoj efikasnoj dozi; uobičajena doza 300-800 mg u 2 podijeljene doze; oralno, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, odrasli nastaviti sa dozom efikasnom za tretman bipolarnog poremećaja i zatim podešavati prema najnižoj efikasnoj dozi; uobičajena doza 300-800 mg jednom dnevno; *dodatak terapiji velike depresije*: oralno, tablete sa modifikovanim oslobađanjem, odrasli 50 mg jednom dnevno uveče pred spavanje tokom 2 dana, zatim podešavati prema odgovoru, uobičajeni raspon doza 150-300 mg jednom dnevno; stariji, inicijalno 50 mg jednom dnevno tokom 3 dana, zatim povećati ukoliko je neophodno na 100 mg jednom dnevno tokom 4 dana; zatim dozu podešavati postepeno po 50 mg prema odgovoru, uobičajeni raspon doza 50-300 mg jednom dnevno (doza od 300 mg ne bi trebala biti postignuta prije 22 dana terapije)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KVENTIAX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- △ Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Al blister po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [150 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [300 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

KVENTIAX SR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- △ Rp tableta s produženim oslobađanjem [150 mg/1 tableta] 60 tableta s produženim oslobađanjem (6 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

- △ Rp tableta s produženim oslobađanjem [200 mg/1 tableta] 60 tableta s produženim oslobađanjem (6 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta s produženim oslobađanjem [300 mg/1 tableta] 60 tableta s produženim oslobađanjem (6 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- KVEPIN - BOSNALIJEK D.D.**
 - △ Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al/PVC blistera sa po 10 film tableta), u kutiji
 - △ Rp film tableta [200 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al/PVC blistera sa po 10 film tableta), u kutiji
 - △ Rp film tableta [25 mg/1 tableta] 60 film tableta (6 Al/PVC blistera sa po 10 film tableta), u kutiji
- PENTIAx - GOODWILL PHARMA DOO ZA TRGOVINU, USLUGE, EXPORT-IMPORT SUBOTICA**
 - ▲ Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
 - ▲ Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Q-PIN - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO**
 - △ Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (4 PVC/Al blistera blistera po 15 tableta), u kutiji
 - △ Rp filmom obložena tableta [200 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (4 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
 - △ Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (2 PVC/Al blistera po 30 tableta), u kutiji

N05AL Benzamidi

N05AL01 sulpirid

Doziranje: liječenje *akutnih i hroničnih psihoza, neurotski, psihofunkcionalni i psihoafektivni poremećaji udruženi sa somatskim stanjima*: oralno, odrasli, 50-1600 mg dnevno, djeca preko 6 god. 5 mg/kg/dan (maks. do 10 mg/kg/dan); za više informacija o doziranju konsultovati informacije o lijeku; *liječenje vrtoglavice periferno-labirintnog tipa*: oralno, odrasli, početi sa 50-150 mg, doza održavanja 150-300 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BOSNYL - BOSNALIJEK D.D.

- △ Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

EGLONYL - ALKALOID AD SKOPJE

- △ Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 Al/PVC blistera po 10 kapsula) u kutiji
- △ Rp oralni rastvor [25 mg/5 mL] 1 bočica od tamnog, neutralnog stakla, sa dozerom i plastičnim zatvaračem na navoj, sa 120 ml oralnog rastvora, u kutiji

EGLONYL FORTE - ALKALOID AD SKOPJE

- ▲ Rp tableta [200 mg/1 tableta] 1 Al/PVC blister sa 10 tableta, u kutiji

SULPIRID FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- △ Rp kapsula, tvrda [50 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 15 kapsula), u kutiji

N05AX**Ostali antipsihotici****N05AX08****risperidon**

Doziranje: *akutne i hronične psihoze:* oralno, odrasli 2 mg u jednoj do dvije podijeljene doze prvog dana, zatim 4 mg u jednoj ili u 2 podijeljene doze drugog dana; uobičajena doza 4-6 mg dnevno; doze iznad 10 mg samo ako korist primijene nadvladava rizik (maks. 16 mg dnevno); stariji, početna doza 0,5 mg 2 puta dnevno, povećavati postepeno po 0,5 mg 2 puta dnevno do 1-2 mg 2 puta dnevno; *manija:* oralno, odrasli početna doza 2 mg jednom dnevno, povećavati ukoliko je neophodno postepeno po 1 mg dnevno; uobičajeni opseg doza 1-6 mg dnevno; stariji, početna doza 0,5 mg 2 puta dnevno, povećavati postepeno po 0,5 mg 2 puta dnevno do 1-2 mg 2 puta dnevno; *perzistentna agresija kod pacijenata sa Alchajmer-ovom demencijom* (kratkotrajna terapija do 6 nedjelja) bez odgovora na nefarmakološke metode liječenja i kada postoji rizik da pacijent ozlijedi sebe ili druge: početna doza 0,25 mg 2 puta dnevno; povećavati prema odgovoru po 0,25 mg 2 puta dnevno svaki drugi dan; uobičajena doza 0,5 mg 2 puta dnevno (može biti potrebno do 1 mg 2 puta dnevno); *kratkotrajna terapija (do 6 mjeseci) perzistentne agresije kod poremećaja ponašanja:* djeca preko 5 god. tjelesne mase ispod 50 kg 0,25 mg jednom dnevno, povećavati prema odgovoru po 0,25 mg svaki drugi dan; uobičajena doza 0,5 mg dnevno; djeca preko 5 god. tjelesne mase iznad 50 kg 0,5 mg jednom dnevno, povećavati prema odgovoru po 0,5 mg svaki drugi dan; uobičajena doza 1 mg dnevno; **parenteralno-suspenzija sa produženim djelovanjem:** *šizofrenija (kod pacijenata koji su trenutno stabilizovani oralnim antipsihotikom):* duboko i.m. kod pacijenata koji su uzimali do 4 mg risperidona dnevno, početna doza 25 mg svake 2 nedjelje; kod pacijenata koji su uzimali preko 4 mg risperidona dnevno, početna doza 37,5 mg svake 2 nedjelje; doze podešavati u intervalima od najmanje 4 nedjelje postepeno po 12,5 mg do maks. 50 mg svake 2 nedjelje; ne preporučuje se djeci ispod 18 god.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ANTARZA - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.**

- △ Rp film tableta [1 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/ALU blistera po 10 film tableta) u kutiji
- △ Rp film tableta [2 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/ALU blistera po 10 film tableta) u kutiji
- △ Rp film tableta [3 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/ALU blistera po 10 film tableta) u kutiji
- △ Rp film tableta [4 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/ALU blistera po 10 film tableta) u kutiji

PHARMADON - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

- △ Rp filmom obložena tableta [1 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 AL/PVC blistera sa po 10 tableta) u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [2 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 AL/PVC blistera sa po 10 tableta) u kutiji

PROSPERA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- △ Rp filmom obložena tableta [1 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (1 PVC/PE/PVDC/Al blister sa 20 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [2 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (1 PVC/PE/PVDC/Al blister sa 20 tableta), u kutiji

RICUS - BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S.

- △ Rp filmom obložena tableta [1 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [2 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

RISPOLEPT CONSTA - JANSSEN-CILAG KFT.

- ▲ ZU prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem [25 mg/1 viala] 1 staklena bočica sa 65,6 mg praška, 2 ml rastvarača u šprici, adapter za bočicu, 2 (Terumo SurGuard 3) igle za i.m. primjenu, u kutiji
- ▲ ZU prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem [37.5 mg/1 viala] 1 staklena bočica sa 98,4 mg praška, 2 ml rastvarača u šprici, adapter za bočicu, 2 (Terumo SurGuard 3) igle za i.m. primjenu, u kutiji
- ▲ ZU prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem [50 mg/1 viala] 1 staklena bočica sa 131,2 mg praška, 2 ml rastvarača u šprici, adapter za bočicu, 2 (Terumo SurGuard 3) igle za i.m. primjenu, u kutiji

RISSAR - ALKALOID AD SKOPJE

- △ Rp film tableta [1 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [2 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [3 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

RISSET - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

- △ Rp filmom obložena tableta [1 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [2 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

TORENDO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- △ Rp filmom obložena tableta [1 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC/PE/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [2 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC/PE/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [3 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC/PE/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [4 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC/PE/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

TORENDO Q-TAB - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- △ Rp raspadljiva tableta za usta [0.5 mg/1 tableta] 30 raspadljivih tableta za usta (3 Al//OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji
- △ Rp raspadljiva tableta za usta [1 mg/1 tableta] 30 raspadljivih tableta za usta (3 Al//OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji
- △ Rp raspadljiva tableta za usta [2 mg/1 tableta] 30 raspadljivih tableta za usta (3 Al//OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji

N05AX12 aripiprazol

Doziranje: *šizofrenija*: oralno, odrasli, 10-15 mg jednom dnevno, uobičajena doza održavanja 15 mg jednom dnevno; maks. 30 mg jednom dnevno; djeca 15-17 god. 10 mg jednom dnevno, liječenje započeti nižom dozom i dozu titrirati; *manične epizode u bipolarnom poremećaju tipa I*: oralno, odrasli, početna doza 15 mg jedanput dnevno, po potrebi povećati; maks. 30 mg dnevno; djeca 13-18 god. početna doza 2 mg jednom dnevno tokom 2 dana, povećati na 5 mg jednom dnevno tokom 2 dana, zatim povećati na uobičajenu dozu od 10 mg jednom dnevno; dalje po potrebi postepeno povećavati po 5 mg na maks. 30 mg; maks. trajanje terapije 12 nedjelja; *prevencija novih maničnih epizoda u bipolarnom poremećaju tipa I*: odrasli, preko 18 god, oralno, kod pacijenata koji već uzimaju lijek u obliku monoterapije ili kombinovane terapije, nastaviti s primjenom terapije u istoj dozi

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ABIZOL - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.**

- ▲ Rp oralni rastvor [1 mg/1 mL] 1 PET bočica sa 150 ml oralnog rastvora, sa polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem za djecu, odmjernom čašicom od 30 ml, špricom od 5 ml i zatvaračem, u kutiji
- ▲ Rp tableta [10 mg/1 tableta] 28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta [15 mg/1 tableta] 28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta [5 mg/1 tableta] 28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji

ARIPREXA - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO

- ▲ Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/PVC/PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta [15 mg/1 tableta] 30 tableta (3 Al/PVC/PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

ARIPRIZOL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- ▲ Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
- ▲ Rp tableta [15 mg/1 tableta] 30 tableta (5 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 6 tableta) u kutiji
- ▲ Rp tableta [30 mg/1 tableta] 30 tableta (5 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 6 tableta) u kutiji

ARYZALERA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- ▲ Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Alu/PVC-Alu blistera po 10 tableta) u kutiji
- ▲ Rp tableta [15 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Alu/PVC-Alu blistera po 10 tableta) u kutiji
- ▲ Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Alu/PVC-Alu blistera po 10 tableta) u kutiji
- ▲ Rp tableta [30 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Alu/PVC-Alu blistera po 10 tableta) u kutiji

LUMINEL - BOSNALIJEK D.D.

- ▲ Rp oralna disperzibilna tableta [10 mg/1 tableta] 30 oralnih disperzibilnih tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp oralna disperzibilna tableta [15 mg/1 tableta] 30 oralnih disperzibilnih tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

TREFERO - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- ▲ Rp oralna disperzibilna tableta [10 mg/1 tableta] 30 oralnih disperzibilnih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp oralna disperzibilna tableta [15 mg/1 tableta] 30 oralnih disperzibilnih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji

N05AX13**paliperidon**

Doziranje: šizofrenija (kod pacijenata čija je bolest stabilizovana oralnim paliperidonom ili risperidonom), šizofrenija (kod pacijenata koji su prethodno odgovorili na terapiju oralnim paliperidonom ili risperidonom): duboka i.m. inj.150 mg prvog dana terapije i 100 mg nedjelju dana kasnije (8. dan), zatim podesiti na mjesečne intervale prema odgovoru; preporučena doza održavanja 75 mg (opseg doza 25-150 mg) mjesečno; poslije druge

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

doze, mjesečne doze za održavanje se mogu davati ili u deltoidni ili u glutealni mišić; za propuštene doze konsultovati literaturu proizvođača; prelaz na Trevictu (3-mjesečna injekcija) je indikovano kod pacijenata koji su liječeni paliperidon-palmitatom u obliku 1-mjesečnih injekcija tokom 4 ili više mjeseci, za više informacija konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LESCIT - STADA ARZNEIMITTEL AG

- △ ZU Suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenom injekcionom špricu [100 mg/1 mL] plastični uložak u kojem se nalaze: 1 napunjeni injekcioni špric sa graničnikom (backstop-er) i komercijalnim sredstvom za primjenu, odnosno 2 sigurnosne igle, u kutiji
- △ ZU Suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenom injekcionom špricu [150 mg/1.5 mL] plastični uložak u kojem se nalaze: 1 napunjeni injekcioni špric sa graničnikom (backstop-er) i komercijalnim sredstvom za primjenu, odnosno 2 sigurnosne igle, u kutiji
- △ ZU Suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenom injekcionom špricu [50 mg/0.5 mL] plastični uložak u kojem se nalaze: 1 napunjeni injekcioni špric sa graničnikom (backstop-er) i komercijalnim sredstvom za primjenu, odnosno 2 sigurnosne igle, u kutiji
- △ ZU Suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenom injekcionom špricu [75 mg/0.75 mL] plastični uložak u kojem se nalaze: 1 napunjeni injekcioni špric sa graničnikom (backstop-er) i komercijalnim sredstvom za primjenu, odnosno 2 sigurnosne igle, u kutiji

PALIPERIDON TEVA - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

- △ ZU suspenzija za injekciju s produženim oslobađanjem [100 mg/1 mL] 1 napunjena šprica sa 1 ml suspenzije za rastvor za injekciju s produženim oslobađanjem i 2 igle, u kutiji
- △ ZU suspenzija za injekciju s produženim oslobađanjem [50 mg/0.5 mL] 1 napunjena šprica sa 0,5 ml suspenzije za rastvor za injekciju s produženim oslobađanjem i 2 igle, u kutiji
- △ ZU suspenzija za injekciju s produženim oslobađanjem [75 mg/0.75 mL] 1 napunjena šprica sa 0,75 ml suspenzije za rastvor za injekciju s produženim oslobađanjem i 2 igle, u kutiji
- △ ZU suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem [150 mg/1.5 mL] 1 napunjena šprica sa 1,5 ml suspenzije za rastvor za injekciju s produženim oslobađanjem i 2 igle, u kutiji

TREVICTA - JANSSEN-CILAG KFT.

- △ ZU suspenzija za injekciju s produženim oslobađanjem [263 mg/1.315 mL] 1,315 ml suspenzije za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenoj šprici i 2 injekcione igle, u kutiji
- △ ZU suspenzija za injekciju s produženim oslobađanjem [350 mg/1.75 mL] 1,750 ml suspenzije za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenoj šprici i 2 injekcione igle, u kutiji
- △ ZU suspenzija za injekciju s produženim oslobađanjem [525 mg/2.625 mL] 2,625 ml suspenzije za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenoj šprici i 2 injekcione igle, u kutiji

XEPLION - JANSSEN-CILAG KFT.

- △ ZU suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem [100 mg/1 mL] 1 ml suspenzije za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenoj šprici i 2 injekcione igle, u kutiji
- △ ZU suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem [150 mg/1.5 mL] 1,5 ml suspenzije za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenoj šprici i 2 injekcione igle, u kutiji
- △ ZU suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem [75 mg/0.75 mL] 0,75 ml suspenzije za injekciju sa produženim oslobađanjem u napunjenoj šprici i 2 injekcione igle, u kutiji

N05B**Anksiolitici****N05BA****Derivati benzodiazepina****N05BA01****diazepam**

Doziranje: *anksioznost:* oralno 2 mg 3 puta dnevno, ako je potrebno povećati do 15-30 mg dnevno podijeljenih u više doza; starijim ili iscrpljenim polovina navedene doze; *nesanica udružena sa anksioznošću* 5-15 mg pred spavanje; *teška akutna anksioznost, akutni panični napadi i akutne alkoholne apstinencije:* i.m. ili spora i.v.inj. 10 mg, može se ponoviti na 4 sata, ako je potrebno; *akutni spazam skeletne muskulature:* 10 mg i.m. ili kao spora i.v. inj, ponoviti nakon 4 sata ako je potrebno; *tetanus:* 0,1-0,3 mg/kg, i.v., u intervalima od 1 do 4 sata, ili kontinuiranom inf. 3-10 mg/kg u toku 24 sata; *mišićni spazmi povezani sa cerebralnom spastičnošću ili postoperativni spazmi skeletne muskulature:* oralno, djeca 1-11 mjeseci, početna doza 250 mcg/kg 2 puta dnevno, djeca 1-4 god. početna doza 2,5 mg 2 puta dnevno, djeca 5-11 god. početna doza 5 mg 2 puta dnevno, djeca 12-17 god. početna doza 10 mg 2 puta dnevno, maks. 40 mg dnevno; *epileptičke i febrilne konvulzije:* odrasli: 10-20 mg; lijek se daje u obliku i.v. inj. brzinom 0,5 ml (2,5 mg) u toku 30 s; djeca: 0,2-0,3 mg/kg (ili 1 mg po god. života); *status epilepticus, febrilne konvulzije, konvulzije prouzrokovane trovanjem:* i.v. inj. novorođenče 0,3-0,4 mg/kg, zatim 0,3-0,4 mg/kg nakon 10 min. ukoliko je potrebno dati tokom 3-5 min; djeca 1 mjesec-11 god. 0,3-0,4 mg/kg (maks. po dozi 10 mg) zatim 0,3-0,4 mg/kg nakon 10 min. ukoliko je potrebno, dati tokom 3-5 min; djeca 12-17 god. 10 mg, zatim 10 mg nakon 10 min. ukoliko je potrebno, dati tokom 3-5 min; odrasli, početna doza 10 mg, zatim 10 mg, dati brzinom 1 ml (5 mg) po min; rektalno, novorođenčad 1,25-2,5 mg, zatim 1,25-2,5 mg nakon 10 min. ukoliko je potrebno; djeca 1 mjesec-1 god. 5 mg, zatim 5 mg nakon 10 min. ukoliko je potrebno; djeca 2-11 god. 5-10 mg, zatim 5-10 mg nakon 10 min. ukoliko je potrebno; djeca 12-17 god. 10-20 mg, zatim 10-20 mg nakon 10 min. ukoliko je potrebno; odrasli 10-20 mg, zatim 10-20 mg nakon 10-15 min ukoliko je potrebno, stariji 10 mg, zatim 10 mg nakon 10-15 min. ukoliko je potrebno; *premedikacija:* oralno, odrasli 5-10 mg dati 1-2 sata prije procedure; i.v. 0,1-0,2 mg/kg (obično 10-20 mg) prilagođeno odgovoru pacijenta; kod starih i iscrpljenih pacijenata potrebno je uobičajene doze smanjiti na polovinu; *akušerstvo:* i.v. ili i.m. 10-20 mg; *kardioverzija, endoskopska, radiološka ispitivanja, manje hirurške procedure:* i.v. odrasli, 10 mg - 30 mg; djeca, 0,1 mg/kg - 0,2 mg/kg

REGISTROVANI LIJEKOVI:**APAUROIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO**

- ▲ ZU otopina za injekciju [10 mg/2 mL] 10 ampula po 2 mL otopine za injekciju (2 blistera po 5 ampula), u kutiji
- △ Rp obložena tableta [2 mg/1 tableta] 30 obloženih tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji
- △ Rp obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 obloženih tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji

△ Rp	tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji
BENSEDIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD	
▲ ZU	rastvor za injekciju/ infuziju [10 mg/2 mL] 10 staklenih ampula po 2 ml rastvora, u kutiji
△ Rp	tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
△ Rp	tableta [2 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
△ Rp	tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
BOSAURIN - BOSNALIJEK D.D.	
△ Rp	tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
△ Rp	tableta [2 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
△ Rp	tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
DIAZEPAM ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE	
▲ ZU	rastvor za injekciju [10 mg/2 mL] 2 blistera sa po 5 ampula, ampula od 2 ml, od neutralnog stakla, hidrolitički tip I, smeđe boje, u kartonskoj kutiji
△ Rp	obložena tableta [2 mg/1 tableta] 30 obloženih tableta (2 AL/PVC blistera po 15 tableta), u kutiji
△ Rp	obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 obloženih tableta (2 AL/PVC blistera po 15 tableta) u kutiji
DIAZEPAM HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA	
△ Rp	tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
△ Rp	tableta [2 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
△ Rp	tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

N05BA04 oksazepam

Doziranje: *anksioznost* (kratkotrajna primjena); *ublažavanje apstinencijalnog sindroma kod alkoholičara:* 15-30 mg (stariji 10-20 mg) 3-4 puta dnevno; djeci se ne preporučuje; *nesanica povezana sa anksioznošću:* 15-25 mg (maks. 50 mg) sat vremena prije spavanja.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PRAXITEN 15 - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

△ Rp	tableta [15 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

N05BA06 lorazepam

Doziranje: *kratkotrajna terapija anksioznosti:* oralno 1-4 mg u podijeljenim dozama; starijim ili iscrpljenim polovinu doze za odrasle; *kratkotrajna terapija nesanice povezana sa anksioznošću:* 1-2 mg pred spavanje; *u premedikaciji, prije hirurških ili obimnijih stomatoloških intervencija:* 2-3 mg veče pred intervenciju i 2-4 mg 1-2 h prije intervencije

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LORAZEPAM HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- ▲ Rp tableta [1 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji
- ▲ Rp tableta [2.5 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

LORSILAN - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

- ▲ Rp tableta [1 mg/1 tableta] 30 tableta (3 oPA/Al/PVC//Al - blistera sa 10 tableta) u kutiji
- ▲ Rp tableta [2.5 mg/1 tableta] 20 tableta (2 oPA/Al/PVC//Al - blistera sa 10 tableta) u kutiji

N05BA08 bromazepam

Doziranje: *anksioznost:* uobičajeno 1,5-3 mg 2-3 puta dnevno; maks. 60 mg dnevno; terapija treba da traje što kraće; treba koristiti najnižu moguću dozu koja kontroliše simptome

REGISTROVANI LIJEKOVI:**BROMAZEPAM HF - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA**

- △ Rp tableta [1.5 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [3 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [6 mg/1 tableta] 20 tableta (1 PVC/Al - blister sa 20 tableta), u kutiji

LEXAURIN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- △ Rp tableta [1.5 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [3 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [6 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC//Al blistera po 15 tableta), u kutiji

LEXILIUM - ALKALOID AD SKOPJE

- △ Rp tableta [1.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
- △ Rp tableta [3 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
- △ Rp tableta [6 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

N05BA11 prazepam

Doziranje: *anksioznost:* uobičajeno 30 mg dnevno u jednoj ili više doza, raspon dnevne doze 10-60 mg u skladu sa reakcijom pacijenta, ne primjenjivati duže od 4 nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:**PRAZEPAM HEMOFARM - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA**

- △ Rp tableta [10 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al - blistera sa po 10 tableta), u kutiji

N05BA12 alprazolam

Doziranje: *kratkotrajna terapija anksioznosti:* oralno, odrasli 0,25-0,5 mg 3 puta dnevno; kod starijih bolesnika: 0,25 mg 2-3 puta dnevno podijeljeno u više doza; povećavati ukoliko je neophodno do ukupno 3 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALZAM - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

- △ Rp tableta [0,25 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVDC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [0,5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [1 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

ANAXAL - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- △ Rp tableta [0,5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [0.25 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [1 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

HELEX - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- △ Rp tableta [0.25 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [0.5 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

HELEX SR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- △,§ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [1 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
- △,§ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [2 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

KSALOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- △ Rp tableta [0.25 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [0.5 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [1 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji

MAPRAZAX - ALKALOID AD SKOPJE

- △ Rp tableta [0,25 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [0,5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [1 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

MISAR - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- △ Rp tableta [0.25 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [0.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [1 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

MISAR SR - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- △ Rp tableta s produljenim oslobađanjem [0.5 mg/1 tableta] 30 tableta s produljenim oslobađanjem (5 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 6 tableta), u kutiji

- △ Rp tableta s produljenim oslobađanjem [1 mg/1 tableta] 30 tableta s produljenim oslobađanjem (5 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 6 tableta), u kutiji

XANAX - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- △ Rp tableta [0.25 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
- △ Rp tableta [0.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

XANAX SR - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- △ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [0.5 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [1 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/Al blister po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [2 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

N05C

Hipnotici i sedativi

N05CD

Derivati benzodiazepina

N05CD02

nitrazepam

Doziranje: *nesanica:* odrasli, 5-10 mg, prije spavanja; stariji ili iscrpljeni pacijenti, 2,5-5 mg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CERSON - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- ▲ Rp tableta [5 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/Al - blister) u kutiji

TRAZEM - BOSNALIJEK D.D.

- ▲ Rp tableta [5 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/Al - blister), u kutiji
- ▲ Rp tableta [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

N05CD08

midazolam

Doziranje: *bazalna sedacija u budnom stanju:* kod dijagnostičkih ili hirurških zahvata izvršenih pod lokalnom anestezijom, primenjuje se spora i.v. inj. (otprilike 2 mg/minut) 5–10 minuta prije procedure, a početna doza je 2-2,5 mg (stariji 0,5-1mg), ukoliko je potrebno mogu se aplikovati sljedeće doze od 1 mg (stariji 0,5-1mg); uobičajena ukupna doza 3,5-5 mg (maks. 7,5 mg; stariji maks. 3,5 mg); kod djece se aplikuje i.v. inj., u trajanju od 2-3 min. kod djece od 6 mjeseci do 5 god. početna doza iznosi 50-100 mcg/kg (ako je neophodno doza se postepeno povećava do maksimalne ukupne doze od 6 mg); za djecu od 6-12 god. početna doza je 25-50 mcg/kg (ako je neophodno doza se postepeno povećava do maksimalne ukupne doze od 10 mg); i.m. inj. za djecu 1-15 godina iznosi 50-150 mcg/kg; maksimalno 10 mg; *sedacija u kombinaciji sa anestezijom:* i.v. inj. 30-100 mcg/kg, uz ponavljanje prema potrebama ili kao kontinuirana i.v. infuzijom 30–100 mcg/kg/h (starijima su potrebne niže doze), a djeci se ne preporučuje; *premedikacija:* dubokom i.m. inj., odrasli preko 18 god. 70-100 mcg/kg (kod starijih i iscrpljenih 25-50 mcg/kg) 20-60 min. prije indukcije; kod djece 1-15 god. 80–200 mcg/kg; i.v. injekcijom, odrasli preko 18 god. 1-2 mg 5-30 min. prije procedure, ponoviti ukoliko je potrebno (stariji ili iscrpljeni 0,5 mg, ponoviti polako ako je potrebno); *indukcija* (rijetko se koristi): u obliku spore i.v. inj. u dozi od 150–200 mcg/kg (kod starijih i iscrpljenih, 50–150 mcg/kg), u podijeljenim dozama (maks. 5 mg) u intervalima od 2 min. do maks. ukupne doze 600 mcg/kg; *sedacija pacijenata na intenzivnoj njezi:* sporom i.v. injekcijom, početna doza 30-300 mcg/kg, sa povećanjem 1-2,5 mg svakih 2 min., onda sporom i.v. inj. ili kontinuiranom

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

i.v. infuzijom 30-200 mcg/kg/h; doza se smanjuje (ili smanjuje ili se daje kao početna doza) u hipovolemiji, vazokonstrikciji ili hipotermiji; niže doze takođe mogu biti adekvatne ako se koriste opioidni analgetici; kod neonatusa ispod 32 nedjelje gestacione starosti primjenjuje se kontinuirana i.v. infuzija u dozi od 30 mcg/kg/h, dok kod neonatusa od 32 nedjelja gestacione starosti i djeci ispod 6 mjeseci, doza iznosi 60 mcg/kg/h, a djeci preko 6 mjeseci starosti, početna doza je 50–200 mcg/kg, a potom se dodaje, u zavisnosti od efekta, doza održavanja 60–120 mcg/kg/h u obliku kontinuirane i.v. infuzije; *produženi, akutni, konvulzivni napadi kod djece i adolescenata (5-18 god.):* oromukozalno, djeca 5-10 god. 7,5 mg, djeca 10-18 god. 10 mg, ukoliko napad ne prestane u roku od 10 min. mora se pozvati hitna medicinska pomoć

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MIDAZOLAM HF - STADA ARZNEIMITTEL AG

- ▲ Rp rastvor za usnu sluznicu [10 mg/1 Spric] 4 napunjena oralna šprica u zaštitnoj plastičnoj tubi, u kutiji.
- ▲ Rp rastvor za usnu sluznicu [7,5 mg/1 Spric] 4 napunjena oralna šprica u zaštitnoj plastičnoj tubi, u kutiji.

MIDAZOLAM PANPHARMA - PANPHARMA S.A.

- ▲ ZU rastvor za injekciju [5 mg/1 mL] 10 ampula po 3 mL rastvora za injekciju, u kutiji.

MIDAZOLAM SERRA CLINIC - LABORATORIOS SERRA PAMIES S.A.

- ▲ ZU rastvor za injekciju/ infuziju [5 mg/1 mL] 50 ampula od 3 mL u kutiji

MIDAZOLAM TROIKAA - TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED

- ▲ ZU rastvor za injekciju/ infuziju [5 mg/1 mL] 5 bezbojnih staklenih ampula od 10 mL rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji
- ▲ ZU rastvor za injekciju/ infuziju [5 mg/1 mL] 5 bezbojnih staklenih ampula od 3 mL rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

MIDOLAM - PHARMADA ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ

- ▲ ZU rastvor za injekciju [15 mg/3 mL] 5 ampula sa po 3 mL rastvora za injekciju, u kutiji

N05CF

Lijekovi srodni benzodiazepinima

N05CF02

zolpidem

Doziranje: *nesanica* (kratkotrajna terapija-do 4 nedjelje): odrasli preko 18 god, 10 mg uveče pred spavanje; stariji (ili iscrpljeni) 5 mg.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LUNATA - ALKALOID AD SKOPJE

- ▲ Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 Al/PVC blister po 10 tableta) u kutiji
- ▲ Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji
- ▲ Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 Al/PVC blister po 10 tableta) u kutiji.
- ▲ Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta) u kutiji

SANVAL - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- ▲ Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 Al/ PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 Al/ PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

SOMNIS - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

- ▲ Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

- ▲ Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 AL/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

ZASAN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- ▲ Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 blistera po 10 tableta), u kutiji
- ▲ Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 blistera po 10 tableta), u kutiji

N05CM Ostali hipnotici i sedativi

N05CM suhi ekstrakt korijena odoljena, suhi ekstrakt pasiflore

Doziranje: *tradicionalno se upotrebljava za olakšavanje blagih stresnih stanja zbog uznemirenosti i napetosti: odrasli i djeca preko 12 god, 2 kaps. 2 puta dnevno; kao pomoć pri spavanju kod nesanice: 1 kaps. pola sata do sat prije odlaska na spavanje*

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NEOPERSEN - ADIPHARM EAD

- △ BRp kapsula, tvrda [140 mg/1 kapsula+ 175 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (2 aklar/PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

N05CM suhi ekstrakt korijena odoljena, suhi ekstrakt lista matičnjaka, suhi ekstrakt lista pitome nane

Doziranje: *tradicionalno se preporučuje za olakšavanje blagih simptoma mentalnog stresa i kao pomoć pri uspavljivanju: adolescenti stariji od 12 god, odrasli, stariji, za olakšanje blagih simptoma mentalnog stresa, 3-4 Persen obložene tablete 3 puta dnevno, odnosno 2 Persen forte kapsule 2 puta dnevno; kod nesanice, 3-4 Persen obložene tablete pola sata do sat pred spavanje sa ranijom dozom tokom večeri, ako je neophodno, odnosno 2 Persen forte kapsule pola sata do sat pred spavanje sa ranijom dozom tokom večeri, ako je neophodno; maks. dnevna doza: 4 pojedinačne doze; ako simptomi i dalje postoje ili se čak i pogoršaju tokom upotrebe Persena, treba se posavjetovati sa kvalifikovanim zdravstvenim radnikom ili ljekarom.*

REGISTROVANI LIJEKOVI:

Persen - SOPHARMA AD

- BRp obložena tableta [35 mg/1 tableta+ 17.5 mg/1 tableta+ 17.5 mg/1 tableta] 40 obloženih tableta (4 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

Persen forte - ADIPHARM EAD

- BRp kapsula, tvrda [87.5 mg/1 kapsula+ 17.5 mg/1 kapsula+ 17.5 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (2 Alu /PVC/PVDC/PVC blistera sa 10 kapsula, tvrdih), u kutiji

N05CM18 deksmedetomidin

Doziranje: *za održavanje sedacije tokom intenzivne njege: i.v.inf. 0,7 mcg/kg/sat, podesiti prema odgovoru; uobičajena doza održavanje 0,2-1,4 mcg/kg/sat; za sedaciju neintubiranih odraslih pacijenata prije i/ili tokom dijagnostičkih ili hirurških procedura za koje je potrebna sedacija, tj. svjesna sedacija/ sedacija u budnom stanju: i.v. početi sa 1 mcg/kg tokom 10 minuta, za manje invazivne procedure, kao što je oftalmološka hirurgija, može se početi sa 0,5 mcg/kg tokom 10 minuta; održavanje se započinje sa 0,6 do 0,7 mcg/kg/sat i titrira do postizanja željenog efekta sa dozama u rasponu 0,2 do 1 mcg/kg/sat*

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEKSMEDETOMIDIN EVER PHARMA - EVER VALINJECT GMBH

- ▲ ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [100 µg/1 mL] 25 bezbojnih staklenih ampula (staklo tip I) od 2 ml (s volumenom punjenja od 2 ml), u kutiji
- ▲ ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [100 µg/1 mL] 5 bezbojnih staklenih ampula (staklo tip I) od 10 ml (s volumenom punjenja od 10 ml), u kutiji.

DEKSMEDETOMIDIN EVER PHARMA - EVER VALINJECT GMBH

- ▲ ZU Koncentrat za otopinu za infuziju [100 µg/1 mL] 5 bezbojnih staklenih ampula (staklo tip I) od 5 ml (s volumenom punjenja od 4 ml), u kutiji

DEKSMEDETOMIDIN PHARMIDEA - PHARMIDEA SIA

- ▲ ZU koncentrat za rastvor za infuziju [100 µg/1 mL] 25 bezbojnih staklenih bočica po 2 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

DEKSMEDETOMIDINE KALCEKS - AS KALCEKS

- ▲ ZU koncentrat za rastvor za infuziju [200 µg/2 mL] 5 bezbojnih staklenih (tip I) ampula po 2 mL, u kutiji

N06 PSIHOANALEPTICI

N06A Antidepresivi

N06AA Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina

N06AA09 amitriptilin

Doziranje: *veliki depresivni poremećaj:* oralno, odrasli, početi sa 25 mg dva puta na dan, zatim po potrebi povećavati 25 mg dnevno ili 25 mg svaki drugi dan, maksimalno 150 mg dnevno u 2 podijeljene doze; kod starijih pacijenata (preko 65 god.) i pacijenata koji imaju kardiovaskularnu bolest početi sa 10-25 mg dnevno, doza se može povećati na 100-150 mg dnevno podijeljena u dvije doze, doze više od 100 mg potrebno je primjenjivati sa oprezom; *neuropatski bol, profilaktičko liječenje migrene, profilaktičko liječenje hronične tenzijske glavobolje:* oralno, odrasli, početi sa 10-25 mg dnevno, uveče, zatim povećati, ukoliko se podnosi u koracima po 10-25 mg svakih 3-7 dana u 1-2 podijeljene doze; uobičajena dnevna doza 25-75 mg, dnevno, doza se uzima uveče, doze više od 100 mg trebaju biti uzete sa oprezom (doze više od 75 mg trebaju biti uzete sa oprezom kod starijih pacijenata i pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima), maksimalna pojedinačna doza 75 mg; *liječenje noćne enureze kod djece u dobi od 6 godina i više:* oralno, djeca 6-10 god. 10-20 mg; djeca preko 11 god. 25-50 mg dnevno; doza se uzima 1-1,5 sati pred odlazak na spavanje, ciklus liječenja ne smije biti duži od 3 mjeseca

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AMYZOL - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- △ Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 100 filmom obloženih tableta (4 PP/Al blistera po 25 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [25 mg/1 tableta] 25 filmom obloženih tableta (1 PP/Al blister po 25 tableta), u kutiji

N06AB Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina

N06AB03 fluoksetin

Doziranje: *depresija:* odrasli, 20 mg dnevno, povećati nakon 3-4 nedjelje ukoliko je neophodno, a zatim u odgovarajućim intervalima; maks. 60 mg dnevno (stariji obično maks. 40 mg dnevno, ali se može uzeti 60 mg); djeca 8-18 god. 10 mg dnevno, povećati nakon 1-2 nedjelje ukoliko je neophodno, maks. 20 mg dnevno; napomena: dnevna doza može biti data kao pojedinačna doza ili u podijeljenim dozama; *bulimija nervoza:* odrasli,

60 mg dnevno kao pojedinačna doza ili u podijeljenim dozama (stariji uobičajeno maks. 40 mg dnevno ali se može uzeti 60 mg); *opsesivno-kompulzivni poremećaj*: odrasli 20 mg dnevno; povećavati postepeno ukoliko je neophodno do maks. 60 mg dnevno (stariji obično maks. 40 mg dnevno, ali se može uzeti 60 mg); u slučaju neadekvatnog odgovora nakon 10 nedjelja preispitati opravdanost terapije; napomena: dnevna doza može biti data kao pojedinačna doza ili u podijeljenim dozama

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FLUNISAN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

△ Rp tableta [20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/Al - blistera sa 10 tableta), u kutiji

FLUOXETIN ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

△ Rp kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

FLUOXETIN FARMAVITA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

△ Rp kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 Al/PVC/PVDC blistera po 10 kapsula, tvrdih), u kutiji

FLUSETIN - BOSNALIJEK D.D.

△ Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

△ Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

N06AB05 paroksetin

Doziranje: *epizode velike depresije, socijalno anksiozni poremećaj, posttraumatski stresni poremećaj, generalizovani anksiozni poremećaj*: odrasli, preko 18 god. preporučena doza 20 mg svako jutro; maks. 50 mg dnevno (stariji 40 mg); ne preporučuje se djeci ispod 18 god; *opsesivno - kompulzivni poremećaj*: odrasli preko 18 god. početna doza je 20 mg svako jutro, povećavati postepeno po 10 mg do preporučene doze od 40 mg dnevno; maks. 60 mg dnevno (stariji 40 mg); *panični poremećaj*: odrasli preko 18 god. početna doza je 10 mg svako jutro, povećavati postepeno po 10 mg do preporučene doze od 40 mg dnevno; maks. 60 mg dnevno (stariji 40 mg)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DIPRESAN - BOSNALIJEK D.D.

△ Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PE/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

PAKSTON - ALKALOID AD SKOPJE

△ Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PE/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

△ Rp film tableta [30 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PE/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

PAROXAL - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

△ Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

SEROXAT - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

△ Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

N06AB06 sertralin

Doziranje: *depresija*: odrasli, početna doza 50 mg dnevno, povećavati ukoliko je neophodno po 50 mg u intervalima ne kraćim od nedjelju dana do maks. 200 mg dnevno; uobičajena doza održavanja 50 mg dnevno; *opsesivno kompulzivni poremećaj*: odrasli i

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

djeca starija od 12 god. početna doza 50 mg dnevno, povećavati ukoliko je neophodno po 50 mg dnevno u intervalima ne kraćim od nedjelju dana; maks. 200 mg dnevno; djeca 6-12 god. početna doza 25 mg, povećati na 50 mg dnevno nakon jedne sedmice, dalje povećavati ukoliko je neophodno po 50 mg u intervalima od najmanje nedjelju dana; maks. 200 mg dnevno; *panični poremećaji, posttraumatski stresni poremećaj i socijalna anksioznost*: odrasli preko 18 god. početna doza 25 mg dnevno, nakon jedne sedmice dozu povećati na 50 mg dnevno; ukoliko je odgovor djelimičan i ukoliko se lijek dobro podnosi, doze povećavati postepeno po 50 mg u intervalima ne kraćim od jednu nedjelju do maks. 200 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ASENTRA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- △ Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 PVC/Al blistera sa po 7 tableta) u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta) u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 PVC/Al blistera sa po 7 tableta) u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

LISETRA - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- △ Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 30 film tableta (blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 blistera po 10 tableta), u kutiji

MISOL - NOBEL ILAČ SANAYII VE TİCARET A. Ş.

- △ Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 14 tableta), u kutiji

SERTAN - BOSNALIJEK D.D.

- △ Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 28 film tableta (4 PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [100 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 28 film tableta (4 PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

SIDATA - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- △ Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/ PVdC// Al blistera po 14 tableta), u kutiji

ZOLOFT - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- △ Rp filmom obložena tableta [100 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

N06AB10 escitalopram

Doziranje: *depresija, generalizovani anksiozni poremećaj, opsesivno-kompulzivni poremećaj*: oralno, odrasli, 10 mg jednom dnevno, povećavati ukoliko je neophodno do maks. 20 mg dnevno; stariji, početna doza pola doze za odrasle; niže doze održavanja mogu biti dovoljne, maks. 10 mg dnevno; *panični poremećaji*: oralno, odrasli, početna doza 5 mg jednom dnevno, povećati na maks. 10 mg dnevno nakon 7 dana; stariji, početna doza pola doze za odrasle; niže doze održavanja mogu biti dovoljne; maks. 10

mg dnevno; *socijalno anksiozni poremećaj*: oralno, odrasli, početna doza 10 mg jednom dnevno, podešavati nakon 2-4 nedjelje; uobičajena doza 5-20 mg dnevno;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CITALEA - BOSNALIJEK D.D.

- △ Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

CITRALES - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- △ Rp oralna disperzibilna tableta [10 mg/1 tableta] 30 oralnih disperzibilnih tableta (2 Al/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

CITRAM - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- △ Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera po 14 filmom obloženih tableta), u kutiji

ELICEA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- △ Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 OPA/Al/PVC//PET/Al blistera po 7 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//PET/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 OPA/Al/PVC//PET/Al blistera po 7 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//PET/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (4 OPA/Al/PVC//PET/Al blistera po 7 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//PET/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ESCITA - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO

- △ Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ESRAM - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

- △ Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 14 tableta), u kutiji

FILEX - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- △ Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/ ALU blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/ALU blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVDC/ALU blistera po 10 tableta), u kutiji

ZEPIRA - ALKALOID AD SKOPJE

- △ Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Aclar-Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [15 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Aclar-Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Aclar-Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/Aclar-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

N06AX Ostali antidepresivi

N06AX05 trazodon

Doziranje: *depresija:* početna doza 150 mg (stariji 100 mg) dnevno u podijeljenim dozama poslije jela ili kao pojedinačna doza prije odlaska na spavanje; po potrebi 300 mg dnevno; hospitalizovanim pacijentima se može davati do 600 mg dnevno, podijeljeno u dvije doze; stariji - početna doza je 100 mg dnevno (jedna doza prije spavanja), po potrebi, povećavati dozu do 300 mg dnevno; terapiju treba započeti uveče; povećanjem doze, režim uzimanja lijeka se mijenja; djeci se ne preporučuje; *anksioznost:* 75 mg dnevno, povećavati ukoliko je neophodno do 300 mg dnevno; djeci se ne preporučuje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TRITTICO RETARD - AZIENDE CHIMICHE RIUNITA ANGELINI FRANCESCO-

A.C.R.A.F. S.P.A.

- △ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [150 mg/1 tableta] 20 tableta sa produženim oslobađanjem (1 blister sa 20 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta sa produženim oslobađanjem [150 mg/1 tableta] 20 tableta sa produženim oslobađanjem (2 PVC/Al blistera sa po 10 tableta) u kutiji

N06AX11 mirtazapin

Doziranje: *epizode velike depresije:* uobičajena početna doza 15-30 mg dnevno, povećavati tokom 2-4 nedjelje prema odgovoru; maks. 45 mg dnevno kao pojedinačna doza uveče pred spavanje ili u 2 podijeljene doze; djeci ispod 18 god. se ne preporučuje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CALIXTA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- △ Rp filmom obložena tableta [15 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC//Al - blister), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [30 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 15 tableta), u kutiji

MIRZATEN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- △ Rp filmom obložena tableta [30 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp filmom obložena tableta [45 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

N06AX12 bupropion

Doziranje: *depresija major:* preporučena početna doza je 150 mg jednom dnevno; u kliničkim ispitivanjima nije ustanovljena optimalna doza; ako se nakon 4 sedmice liječenja dozom od 150 mg dnevno ne primjećuje poboljšanje, doza se može povećati na 300 mg jednom dnevno; razmak između 2 doze treba biti najmanje 24 sata.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

WELLBUTRIN XR - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

- △ Rp tableta s prilagođenim oslobađanjem [150 mg/1 tableta] 30 tableta s prilagođenim oslobađanjem (1 bijela neprozirna HDPE bočica), u kutiji

N06AX14 tianeptin

Doziranje: *depresija major:* 1 tbl. 3 puta dnevno prije glavnih obroka; kod pacijenata preko 70 god. i sa renalnom insuficijencijom, dozu smanjiti na 2 tbl. dnevno; kod hroničnih alkoholičara, bez obzira na postojanje ciroze, ne treba podešavati dozu

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TIALERA - LABORATORIOS LICONSA S.A.

- △ Rp film tableta [12.5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PvDC/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

N06AX16 venlafaksin

Doziranje: *velika depresija, prevencija rekurentnih epizoda depresije major:* odrasli, oralno, oblici sa trenutnim i produženim oslobađanjem, početna doza 75 mg dnevno u 2 podijeljene doze povećavati ukoliko je neophodno u intervalima od najmanje 2 nedjelje; maks. 375 mg dnevno; ne preporučuje se djeci ispod 18 god; napomena, kod nekih pacijenata može biti neophodna brža titracija doze; *generalizovani anksiozni poremećaj:* odrasli, oralno, oblici sa produženim oslobađanjem, početna doza 75 mg dnevno, zatim povećati ukoliko je neophodno na 225 mg jednom dnevno, dozu povećavati u intervalima od najmanje 2 nedjelje; *socijalni anksiozni poremećaj:* odrasli, oralno, oblici sa produženim oslobađanjem, početna doza 75 mg dnevno, nema dokaza da su više doze efikasnije, ukoliko je neophodno povećati na 225 mg jednom dnevno, dozu povećavati u intervalima od najmanje 2 nedjelje; *panični poremećaj:* odrasli, oralno, oblici sa produženim oslobađanjem, početna doza 37,5 mg dnevno tokom 7 dana, zatim povećati na 225 mg jednom dnevno, dozu povećavati u intervalima od najmanje 2 nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VELAFAX - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- △ Rp tableta [37.5 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [75 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

VELAFAX XL - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- △ Rp kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda [75 mg/1 kapsula] 28 tvrdih kapsula (2 Al/PVC/PvDC blistera po 14 kapsula), u kutiji
- △ Rp kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda [150 mg/1 kapsula] 28 tvrdih kapsula (2 Al/PVC/PvDC blistera po 14 kapsula), u kutiji

VEXANA - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- △ Rp tableta [37,5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta) u kutiji
- △ Rp tableta [50 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa po 15 tableta) u kutiji
- △ Rp tableta [75 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/PVDC/Al blister sa po 15 tableta) u kutiji

ZANFEXA - ALKALOID AD SKOPJE

- △ Rp tableta [37.5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [50 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
- △ Rp tableta [75 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

N06AX21 duloksetin

Doziranje: *veliki depresivni poremećaj:* odrasli 60 mg jedanput dnevno; *generalizovani anksiozni poremećaj:* odrasli inicijalno 30 mg dnevno, ukoliko je neophodno povećavati do 60 mg jednom dnevno, maks. 120 mg dnevno; *bol kod dijabetičke periferne neuropatije:* odrasli 60 mg jednom dnevno; maks. 120 mg dnevno u podijeljenim dozama; napomena: kod dijabetičke neuropatije, prekinuti davanje ukoliko nema adekvatnog odgovora nakon 2 mjeseca; ispitati opravdanost terapije najmanje svaka 3 mjeseca; *umjerena do teška stresna urinarna inkontinencija:* odrasli, žene, 40 mg dva puta dnevno,

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

nakon 2 nedjelje procijenti korist i podnošljivost terapije; alternativno, može se uzeti inicijalno 20 mg 2 puta dnevno, tako da se neželjena dejstva minimiziraju, zatim da se poveća na 40 mg 2 puta dnevno, nakon 2-4 nedjelje treba procijeniti korist i podnošljivost terapije

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DULSEVIA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- △ Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [30 mg/1 kapsula] 30
gastorezistentnih kapsula, tvrdih (3 Blistera (OPA/Al/[HDPE/PE + DES od CaO/HDPE] folija – Al/PE folija) sa po 10 kapsula), u kutiji
- △ Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [60 mg/1 kapsula] 30
gastorezistentnih kapsula, tvrdih (3 blistera (OPA/Al/[HDPE/PE + DES od CaO/HDPE] folija – Al/PE folija) sa po 10 kapsula), u kutiji

DUOTIN - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- △ Rp želučanootporna kapsula, tvrda [30 mg/1 kapsula] 28
želučanootpornih kapsula, tvrdih (4 Al//Al blistera sa po 7 kapsula), u kutiji
- △ Rp želučanootporna kapsula, tvrda [60 mg/1 kapsula] 28
želučanootpornih kapsula, tvrdih (4 Al//Al blistera sa po 7 kapsula), u kutiji

DUXET - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

- △ Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [30 mg/1 kapsula] 28
gastorezistentnih kapsula, tvrdih (2 blistera po 14 kapsula) u kutiji
- △ Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [60 mg/1 kapsula] 28
gastorezistentnih kapsula, tvrdih (2 blistera po 14 kapsula) u kutiji

NEXETIN - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

- △ Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [20 mg/1 kapsula] 28
gastorezistentnih kapsula, tvrdih (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera sa po 14 kapsula), u kutiji
- △ Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [40 mg/1 kapsula] 28
gastorezistentnih kapsula, tvrdih (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera sa po 14 kapsula), u kutiji

TAITA - HEMOFARM A.D. VRŠAC

- △ Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [30 mg/1 kapsula] 28
gastorezistentnih kapsula, tvrdih (2 PVC/PCTFE/PVC/Al blistera po 14 kapsula), u kutiji
- △ Rp gastorezistentna kapsula, tvrda [60 mg/1 kapsula] 28
gastorezistentnih kapsula, tvrdih (2 PVC/PCTFE/PVC/Al blistera po 14 kapsula), u kutiji

N06AX26 vortiksetin

Doziranje: *velika depresija:* oralno, odrasli, početi sa 10 mg jednom dnevno, podešavati prema odgovoru na 5-20 mg dnevno;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VORTIFLEX - STADA ARZNEIMITTEL AG

- △ Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 28 film tableta (4
PVC/PVdC/aluminijumska blistera sa 7 film tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 28 film tableta (4
PVC/PVdC/aluminijumska blistera sa 7 film tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 28 film tableta (4
PVC/PVdC/aluminijumska blistera sa 7 film tableta), u kutiji

N06B **Psihostimulansi i nootropni lijekovi** **N06BC** **Derivati ksantina**

N06BC01 **kofein**

Doziranje: *primarna apneja nedonoščeta:* udarna doza i.v inf. 1 ml/kg tjelesne mase (20 mg/kg tjelesne mase); doza održavanja i.v. inf. ili peroralno 0,25 ml/kg tjelesne mase (5 mg/kg tjelesne mase), svaka 24 sata (sa dozom održavanja se počinje 24 sata nakon udarne doze)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KAFESIT - BERKO ILAČ VE KIMYA SAN. A.Ş.

ZU rastvor za infuziju i oralni rastvor [20 mg/1 mL] 10 staklenih bočica sa po 3 ml rastvora za infuziju i oralnog rastvora, u kutiji

KOFEIN CITRAT GEN 20 - GEN ILAČ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ZU otopina za infuziju i oralna otopina [20 mg/1 mL] 10 ampula od 1ml, u kutiji

KOFEIN CITRAT GEN 60 - GEN ILAČ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ZU otopina za infuziju i oralna otopina [20 mg/1 mL] 10 ampula, od 3ml, u kutiji

PEYONA - CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH

ZU otopina za infuziju i oralna otopina [20 mg/1 mL] 10 staklenih ampula po 1 ml otopine, u kutiji

N06BX **Ostali psihostimulansi i nootropni lijekovi**

N06BX **cinarizin, piracetam**

Doziranje: cerebro-vaskularna insuficijencija, posttraumatska cerebrastenija, encefalopatija različitog porijekla, psiho-organski sindrom koji vodi poremećajima memorije i drugih kognitivnih funkcija, labirintopatija-vrtoglavica, tinitus, mučnina, povraćanje, nistagmus, Menijerov sindrom, profilaksa kinetoza: odrasli, 1-2 kapsule 3 puta dnevno u toku 1 do 3 mjeseca, u zavisnosti od jačine bolesti; djeca, 1-2 kapsule, 1-2 puta dnevno; ne smije se uzimati duže od 3 mjeseca!

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PHEZAM - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

Rp kapsula, tvrda [400 mg/1 kapsula] 60 kapsula, tvrdih (6 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

N06BX03 **piracetam**

Doziranje: *liječenje mioklonusa kortikalnog porijekla:* doze se određuju individualno: preporučena početna doza 7,2 g dnevno u 2-3 podijeljene doze, koja bi se trebala povećavati svaka 3 do 4 dana za 4,8 g dnevno, do maksimalne doze od 24 g dnevno podijeljeno u 2-3 doze; *liječenje disleksije kod djece u kombinaciji sa terapijom govora:* djeca uzrasta 8-13 god, 3,2 g u dvije podijeljene pojedinačne doze; *terapija vertiga centralnog i perifernog porijekla:* 2,4 g u tri podijeljene doze od po 0,8 g u trajanju od 8 sedmica;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BIOCETAM - BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S.

Rp filmom obložena tableta [1200 mg/1 tableta] 40 filmom obloženih tableta (4 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp filmom obložena tableta [800 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

CEREBRYL - KWIZDA PHARMA GMBH

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

Rp	filmom obložena tableta [1200 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 Al//PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [1200 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 Al//PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [800 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 Al//PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
Rp	filmom obložena tableta [800 mg/1 tableta] 60 filmom obloženih tableta (6 Al//PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
SMART - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.	
Rp	tableta [800 mg/1 tableta] 60 tableta (1 HDPE bočica) u kutiji

N06BX16 **pramiracetam**

Doziranje: poremećaj koncentracije i pamćenja kod starijih pacijenata povezan sa degenerativnim ili vaskularnim poremećajima: oralno, 600 mg svakih 12 sati

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PRAMISTAR - BERLIN-CHEMIE AG

Rp	filmom obložena tableta [600 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa 10 filmom obloženih tableta).

N06BX18 **vinpocetin**

Doziranje: simptomatsko olakšanje psihičkih ili neurološkog poremećaja izazvanih insuficijencijom cerebralne cirkulacije kod starijih bolesnika; pomoćno liječenje vaskularnih bolesti uha; pomoćno liječenje vaskularnih bolesti oka: 5-10 mg 3 puta dnevno (15-30 mg dnevno)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CERENORM - BIOFARM SP. Z.O.O.

Rp	tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blistera sa 30 tableta), u kutiji
Rp	tableta [5 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

INNPOCETIN - COVEX S.A.

Rp	tableta [5 mg/1 tableta] 50 tableta (2 PVC/Al blistera po 25 tableta), u kutiji

INNPOCETIN FORTE - COVEX S.A.

Rp	tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

MEMOXA - ACONITUM PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY

Rp	tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (1 PVC/PVdC-Alu blister), u kutiji
Rp	tableta [5 mg/1 tableta] 50 tableta (2 PVC/PVdC-Alu blistera po 25 tableta), u kutiji

N06D **Lijekovi za terapiju demencije**

N06DA **Antiholinesteraze**

N06DA02 **donepezil**

Doziranje: slaba do umjerena demencija kod Alzheimerove bolesti: početna doza 5 mg jednom uveče, a nakon mjesec dana doza se može povećati na 10 mg uveče; maks. 10 mg dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DENZIL - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

- △ Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC//Alu blistera po 14 tableta), u kutiji.
- △ Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC//Alu blistera po 14 tableta), u kutiji.

DOZYL EASY - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

- △ Rp raspadljiva tableta za usta [10 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/Aclar-Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji.
- △ Rp raspadljiva tableta za usta [5 mg/1 tableta] 28 tableta (2 PVC/Aclar-Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji.

TREGONA D - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

- △ Rp oralna disperzibilna tableta [10 mg/1 tableta] 28 oralnih disperzibilnih tableta (2 PVC/PCTFE/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- △ Rp oralna disperzibilna tableta [5 mg/1 tableta] 28 oralnih disperzibilnih tableta (2 PVC/PCTFE/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

YASNAL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- △ Rp raspadljiva tableta za usta [10 mg/1 tableta] 30 raspadljivih tableta za usta (3 blistera OPA/Alu/PVC film-PET/Alu folija po 10 tableta), u kutiji
- △ Rp raspadljiva tableta za usta [5 mg/1 tableta] 30 raspadljivih tableta za usta (3 blistera OPA/Alu/PVC film-PET/Alu folija, po 10 tableta), u kutiji

N06DA03 rivastigmin

Doziranje: *slaba do umjerena demencija kod Alzheimerove bolesti ili kod Parkinsonove bolesti:* oralno, početna doza 1,5 mg 2 puta dnevno; nakon 2 nedjelje liječenja, doza se može povećati na 3 mg 2 puta dnevno, i zatim na 6 mg dva puta dnevno; doza održavanja 3-6 mg, 2 puta dnevno; maks. 6 mg 2 puta dnevno; ako je liječenje prekinuto duže od nekoliko dana, ponovno uvođenje terapije počinje postepeno, sa inicijalnom dnevnom dozom da bi se smanjila mogućnost neželjenih djelovanja;

REGISTROVANI LIJEKOVI:**EXELON - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG**

- △ Rp kapsula, tvrda [1.5 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al - blistera po 14 kapsula), u kutiji
- △ Rp kapsula, tvrda [3 mg/1 kapsula] 28 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al - blistera po 14 kapsula), u kutiji

N06DA52 donepezil, memantin

Doziranje: *Alchajmerova bolest:* 1 tableta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**DROKSIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD**

- △ Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta] 28 film tableta (4 PVC/PE.EVOH.PE/PCTFE-Al blistera sa 7 tableta), u kutiji
- △ Rp film tableta [10 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta] 28 film tableta (4 PVC/PE.EVOH.PE/PCTFE-Al blistera sa 7 tableta), u kutiji

N06DX **Ostali lijekovi za terapiju demencije**

N06DX01 **memantin**

Doziranje: *umjerena do teška demencija kod Alzheimerove bolesti:* početi sa 5 mg dnevno, povećavati postepeno po 5 mg u nedjeljnim intervalima do maks. 20 mg dnevno; doza održavanja 20 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEMAX - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

△ Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PE/PVDC//AI blistera po 10 tableta) u kutiji

△ Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC-PE-PVDC//AI blistera po 14 tableta), u kutiji

MEMALIS - ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

△ Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/PVDC blistera sa po 14 filmom obloženih tableta) u kutiji

△ Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/PVDC blistera sa po 14 filmom obloženih tableta) u kutiji

MEMANDO - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

△ Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tablete (2 PVC/PVDC//AI blistera po 14 tableta), u kutiji

△ Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC//AI blistera po 10 tableta), u kutiji

△ Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC//AI blistera po 14 tableta), u kutiji

△ Rp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC//AI blistera po 10 tableta), u kutiji

MEMANTIN AMSAL - AMSAL PHARMACEUTICALS D.O.O. SARAJEVO

△ Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC//AI blistera po 10 tableta) u kutiji

MEMANTIN PLIVA - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

△ Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC//AI blistera po 10 tableta), u kutiji

MEMENTO - BOSNALIJEK D.D.

△ Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PVdC//AI blistera po 10 tableta), u kutiji

MEMORION - STADA ARZNEIMITTEL AG

△ Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PE/PVDC/Aluminium blistera po 14 tableta), u kutiji

△ Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PE/PVDC/Aluminium blistera po 14 tableta), u kutiji

MEXIA - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

△ Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera sa 14 film tableta), u kutiji

△ Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 50 film tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 25 tableta), u kutiji

△ Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 14 tableta), u kutiji

YMANA - ALKALOID AD SKOPJE

△ Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 28 film tableta (4 Al/PVC blistera po 7 film tableta), u kutiji

△ Rp film tableta [20 mg/1 tableta] 28 film tableta (4 Al/PVC blistera po 7 film tableta), u kutiji

N06DX02 ginkgo biloba, list

Doziranje: poboljšanje kognitivnih poremećaja (povezanih s godinama) i poboljšanje kvaliteta života kod blagih oblika demencije kod odraslih, poremećaj cirkulacije u ekstremitetima: 80-240 mg/dan podjeljeno u 2-3 doze.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BILOBIL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp kapsula, tvrda [40 mg/1 kapsula] 60 kapsula, tvrdih (6 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

BILOBIL FORTE - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp kapsula, tvrda [80 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

BRp kapsula, tvrda [80 mg/1 kapsula] 60 kapsula, tvrdih (6 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

BILOBIL INTENSE 120 MG - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp kapsula, tvrda [120 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

BRp kapsula, tvrda [120 mg/1 kapsula] 60 kapsula, tvrdih (6 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

N07A Parasimpatomimetici

N07AA Antiholinesteraze

N07AA01 neostigmin

Doziranje: *Myasthenia Gravis:* odrasli i djeca preko 12 god. 1-2,5 mg i.m. ili s.c. više puta dnevno (trajanje dejstva 2-4 sata), ukupna dnevna doza iznosi 5-20 mg; *neonatalna Myasthenia Gravis:* početna doza 0,1 mg i.m., doza se nakon toga individualno titrira i obično iznosi 0,05-0,25 mg svaka 4 sata, liječenje obično nije potrebno poslije 8 nedjelja starosti osim u rijetkim slučajevima; djeca 1 mjesec-12 god, prema potrebi 0,2-0,5 mg; *mijastenjska kriza (s otežanim disanjem i gutanjem):* i.v. 0,25-0,5 mg, zatim s.c. u kratkim vremenskim intervalima; *postoperativna atonija crijeva i mokraćnog mjehura, prevencija, uključujući retenciju urina:* s.c. ili i.m. 0,25 mg, što je ranije moguće nakon operacije, a zatim svakih 4 do 6 sati tokom 3 do 4 dana; *antagonizovanje nedepolarizirajuće neuromuskularne blokade:* odrasli i djeca jednokratna doza od 0,05-0,07 mg/kg sporom i.v. injekcijom tokom jednog minuta, maksimalna doza kod odraslih je 5 mg, a kod djece 2,5 mg; prije ili u toku davanja neostigmina primjenjuje se atropin sulfat u dozi od 0,02-0,03 mg/kg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PROZERIN - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "PHARMACEUTICAL FIRM DARNYTSIA"

ZU rastvor za injekciju [0,5 mg/1 mL] 10 ampula (2 x 5 ampula od 1 mL rastvora za injekciju u blisteru), u kutiji

N07AA02 piridostigmin

Doziranje: *mijastenija gravis:* oralno, odrasli, 120-720 mg podijeljeno u 2-4 doze (pojedinačna doza ne smije biti veća od 180 mg, niti manja od 60 mg); djeca do 6 god, početna doza 30 mg, djeca 6-12 god, početna doza 60 mg; dnevna doza 30-360 mg; za

doze manje od 60 mg moraju se koristiti lijekovi sa nižim sadržajem aktivne supstance (npr. tablete sa 10 mg piridostigmina)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MESTINON - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 150 filmom obložena tableta (1 staklena bočica sa 150 tableta) u kutiji
- Rp film tableta [60 mg/1 tableta] 20 filmom obložena tableta (1 staklena bočica sa 20 tableta), u kutiji

N07B Lijekovi za liječenje bolesti zavisnosti

N07BA Lijekovi za liječenje nikotinske zavisnosti

N07BA01 nikotin

Doziranje: dodatna terapija liječenja ovisnosti o duvanu u odraslih ublažavanjem simptoma suzdržavanja prilikom pokušaja prestanka pušenja ili smanjenja prije potpunog prestanka pušenja: za doziranje konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NICORETTE - MCNEIL AB

- BRp sprej za usnu sluznicu, otopina [1 mg/1 Potisak] 13,2 ml otopine u plastičnoj (PET) bočici. Jedna bočica sadrži 150 potisaka spreja od 1 mg. Bočice se nalaze u dozatoru s mehaničkom pumpicom za raspršivanje i potisnikom, u kutiji.

NICORETTE FRESHMINT - MCNEIL AB

- BRp ljevakovita guma za žvakanje [2 mg/1 Guma za žvakanje] 30 ljevakovitih guma za žvakanje (2 PVC/PVDC//Al blistera sa po 15 guma za žvakanje) u kutiji

NICORETTE FRESHMINT - MCNEIL AB

- BRp ljevakovita guma za žvakanje [4 mg/1 Guma za žvakanje] 30 ljevakovitih guma za žvakanje (2 PVC/PVDC//Al blistera sa po 15 guma za žvakanje) u kutiji

NICORETTE INVISIPATCH - LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG

- BRp transdermalni flaster [-] 7 (7x1) flastera (flasteri su pojedinačno pakirani u termički zatvorenu višeslojnu vrećicu načinjenu od papira, filma polietilentereftalata (PET) i aluminijskog akrilnitrilakopimera), u kutiji
- BRp transdermalni flaster [10 mg/16 Hr] 7 (7x1) flastera (flasteri su pojedinačno pakirani u termički zatvorenu višeslojnu vrećicu načinjenu od cikloolefin kopolimer koekstrudata), u kutiji
- BRp transdermalni flaster [10 mg/16 Hr] 7 (7x1) flastera (flasteri su pojedinačno pakirani u termički zatvorenu višeslojnu vrećicu načinjenu od papira, filma polietilentereftalata (PET) i aluminijskog akrilnitrilakopimera), u kutiji
- BRp transdermalni flaster [15 mg/16 Hr] 7 (7x1) flastera (flasteri su pojedinačno pakirani u termički zatvorenu višeslojnu vrećicu načinjenu od cikloolefin kopolimer koekstrudata), u kutiji
- BRp transdermalni flaster [15 mg/16 Hr] 7 (7x1) flastera (flasteri su pojedinačno pakirani u termički zatvorenu višeslojnu vrećicu načinjenu od papira, filma polietilentereftalata (PET) i aluminijskog akrilnitrilakopimera), u kutiji
- BRp transdermalni flaster [25 mg/16 Hr] 7 (7x1) flastera (flasteri su pojedinačno pakirani u termički zatvorenu višeslojnu vrećicu načinjenu od cikloolefin kopolimer koekstrudata), u kutiji

N07BC**Lijekovi za liječenje zavisnosti od opijuma****N07BC01 buprenorfin**

Doziranje: supstituciona terapija u terapiji odvikavanja kod osoba (odrasli i adolescenti stariji od 16 godina) sa ovisnošću na opijate, u okviru medicinskog, psihološkog i socijalnog tretmana: sublingvalno, inicijalno 0,8-4 mg kao pojedinačna dnevna doza, podešavati prema odgovoru po 2-4 mg dnevno do uobičajene doze od 12-24 mg dnevno (maks. 32 mg dnevno); povlačiti postepeno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**BUPRENORFIN ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE**

- ▲,§ Rp sublingvalna tableta [2 mg/1 tableta] 28 sublingvalnih tableta (4 PVC/ Al blistera po 7 tableta), u kutiji
- ▲,§ Rp sublingvalna tableta [2 mg/1 tableta] 7 sublingvalnih tableta (1 PVC/ Al blister), u kutiji
- ▲,§ Rp sublingvalna tableta [8 mg/1 tableta] 28 sublingvalnih tableta (4 PVC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji
- ▲,§ Rp sublingvalna tableta [8 mg/1 tableta] 7 sublingvalnih tableta (1 PVC/ Al blister), u kutiji

N07BC02 metadon

Doziranje: detoksikacija, terapija održavanja u programima za liječenje heroinske i drugih vrsta (morfijumske) zavisnosti i za prevenciju ponovljene upotrebe drugih opioidnih lijekova: početna doza iznosi 10-20 mg dnevno, doza se povećava za 10-20 mg na dan, dok se ne povuku simptomi apstinencije ili intoksikacije; uobičajena doza je 20-40 mg na dan (2 do 4 ml); nakon postizanja stabilnog doziranja, stabilizacija se može nastaviti još 2-3 dana, zatim se količina metadona postepeno smanjuje; analgezija: 2,5-10 mg svakih 4 do 12 sati; uobičajeno 5-10 mg svakih 6-8 sati u zavisnosti od jačine bola

REGISTROVANI LIJEKOVI:**HEPTANON - PLIVA HRVATSKA D.O.O.**

- ▲,§ Rp tableta [5 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

METADON ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

- ▲,§ ZU oralni rastvor [10 mg/1 mL] smeđa staklena boca sa 1000 mL oralnog rastvora, zatvorena PP - zatvaračem, u kutiji
- ▲,§ Rp oralne kapi, rastvor [10 mg/1 mL] 10 ml oralnih kapi, rastvora u staklenoj bočici s plastičnim zatvaračem i nastavkom za kapanje, u kutiji
- ▲,§ ZU oralna otopina [10 mg/1 mL] 1 boca od 500 ml jantarne boje od neplastificiranog PVC-a, zatvorena polipropilen/polietilen čepom i mjerna čašica u kutiji
- ▲,§ ZU oralni rastvor [10 mg/1 mL] 100 ml oralnog rastvora u staklenoj bočici s plastičnim zatvaračem. Priložena je plastična graduirana pipeta od 5 ml (podjela po 0,2 ml), u kutiji

N07BC05 levometadon

Doziranje: supstituciona terapija zavisnosti od opioida kao dio integrisanog programa koji uključuje medicinsku, socijalnu i psihološku njegu; privremena supstitucija u slučaju hospitalizacije: početi prvog dana sa 15-20 mg levometadona ujutro (ekvivalent 3-4 ml rastvora), po potrebi još 10-25 mg (ekvivalent 2-5 ml rastvora) uveče, poslije prvog do šestog dana doza se uzima jednom dnevno (ujutro) 5 mg (1 ml), po potrebi dozu povećati za 5 -10 mg (1-2 ml) dnevno; doza održavanja se obično postiže u periodu između prvog i šestog dana, doza može biti i do 60 mg levometadona (12 ml)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LEFISYO - ALKALOID AD SKOPJE

- ▲,§ ZU oralni rastvor [5 mg/1 mL] 100 ml oralnog rastvora, u kutiji
- ▲,§ ZU oralni rastvor [5 mg/1 mL] 1000 ml oralnog rastvora, u kutiji
- ▲,§ ZU oralni rastvor [5 mg/1 mL] 500 ml oralnog rastvora, u kutiji

N07BC51 buprenorfin, nalokson

Doziranje: *Dodatak terapiji opioidne zavisnosti:* izraženo kao buprenorfin, odrasli i djeca preko 15 god. početna doza 2-4 mg jednom dnevno (dodatna doza od 2-4 mg može biti primijenjena prvog dana u zavisnosti od individualnih pacijentovih zahtjeva), povećavati postepeno po 2-8 mg prema odgovoru; maks. 24 mg dnevno; ukupna nedjeljna doza može biti podijeljena i data svakog drugog dana ili 3 puta nedjeljno (ali maks. 24 mg dnevno)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BULNEXO - ALKALOID AD SKOPJE

- ▲,§ Rp sublingvalna tableta [2 mg/1 tableta+ 0,5 mg/1 tableta] 28 sublingvalnih tableta (4 PA/Alu/PVC/Alu-PET blistera sa po 7 tableta), u kutiji
- ▲,§ Rp sublingvalna tableta [2 mg/1 tableta+ 0,5 mg/1 tableta] 7 sublingvalnih tableta (1 PA/Alu/PVC/Alu-PET blister sa 7 tableta), u kutiji
- ▲,§ Rp sublingvalna tableta [8 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta] 28 sublingvalnih tableta (4 PA/Alu/PVC/Alu-PET blistera sa po 7 tableta), u kutiji
- ▲,§ Rp sublingvalna tableta [8 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta] 7 sublingvalnih tableta (1 PA/Alu/PVC/Alu-PET blister sa 7 tableta), u kutiji

BUPRENORFIN / NALOKSON MYLAN - MYLAN GERMANY GMBH

- ▲,§ Rp sublingvalna tableta [2 mg/1 tableta+ 0,5 mg/1 tableta] 7 sublingvalnih tableta (1 OPA/Al/PVC//Al blister sa 7 tableta), u kutiji
- ▲,§ Rp sublingvalna tableta [8 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta] 7 sublingvalnih tableta (1 OPA/Al/PVC//Al blister sa 7 tableta), u kutiji

N07C Lijekovi protiv vertiga

N07CA Lijekovi protiv vertiga

N07CA01 betahistin

Doziranje: *vertigo, tinitus i gubitak sluha udružen sa Menierovim sindromom:* početna doza 16 mg 3 puta dnevno uz jelo; doza održavanja 24-48 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BETASERC - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- Rp tableta [24 mg/1 tableta] 20 tableta (1 PVC/PVdC/Al - blister sa 20 tableta), u kutiji
- Rp tableta [24 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/PVdC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

HISTINAX - BOSNALIJEK D.D.

- Rp tableta [24 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVdC blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp tableta [24 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/PVdC blistera po 10 tableta), u kutiji

URUTAL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

- Rp tableta [8 mg/1 tableta] 100 tableta (5 PVC/PVDC//Al blistera po 20 tableta), u kutiji

URUTAL 24 MG - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp tableta [24 mg/1 tableta] 50 tableta (5 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

URUTAL FORTE - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp tableta [16 mg/1 tableta] 60 tableta (4 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

VERTO - STADA ARZNEIMITTEL AG

Rp tableta [16 mg/1 tableta] 60 tableta (6 PVC/PVDC-Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [24 mg/1 tableta] 60 tableta (6 PVC/PVDC-Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

Rp tableta [8 mg/1 tableta] 100 tableta (10 PVC/PVDC-Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

N07CA02 cinarizin

Doziranje: vestibularni poremećaji kao što su vrtoglavica, tinitus (šum u ušima), mučnina i povraćanje kod Menierove bolesti: 1 tableta 1-2 puta na dan, maksimalno 3 tablete na dan; simptomi poremećaja periferne cirkulacije: 1 tableta 3 puta dnevno; simptomi poremećaja cerebralne cirkulacije: 1 tableta 1-3 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CINEDIL - ALKALOID AD SKOPJE

△ Rp tableta [75 mg/1 tableta] 45 tableta (3 PVC/Al blistera sa 15 tableta), u kutiji

N07CA52 dimenhidrinat, cinarizin

Doziranje: terapija simptoma vertiga različitog porijekla: oralno, jedna tableta tri puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ARLEVERT - HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG

△ Rp tableta [40 mg/1 tableta+20mg/1 tableta] 20 tableta (1 PVC/PVDC-Alu blister po 20 tableta), u kutiji

△ Rp tableta [40 mg/1 tableta+20mg/1 tableta] 50 tableta (2 PVC/PVDC-Alu blistera po 25 tableta), u kutiji

N07X Ostali lijekovi koji djeluju na nervni sistem

N07X Ostali lijekovi koji djeluju na nervni sistem

Doziranje: senilna demencija Alchajmerovog i vaskularnog tipa: 10-30 ml dnevno tokom 4 nedjelje, liječenje se može ponoviti u nekoliko ciklusa nakon 2 mjeseca, do izostanka daljeg poboljšanja; simptomi post apoplektičkih komplikacija: 20-50 ml dnevno tokom 10-21 dana; traumatične povrede mozga (moždana kontuzija ili potres mozga): 20-50 ml dnevno tokom 7-30 dana; i.m. primjena do 5 ml, i.v. do 10 ml, doze veće od 10 ml se primjenjuju u infuziji

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CEREBROLYSIN - EVER NEURO PHARMA GMBH

ZU rastvor za injekciju [215.2 mg/1 mL] 10 staklenih ampula sa po 1 ml rastvora za injekciju, u kutiji

ZU rastvor za injekciju [215.2 mg/1 mL] 5 staklenih ampula sa po 10 ml rastvora za injekciju, u kutiji

ZU rastvor za injekciju [215.2 mg/1 mL] 5 staklenih ampula sa po 5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

N07XX Ostali lijekovi koji djeluju na nervni sistem

N07XX02 riluzol

Doziranje: za produžavanje života kod pacijenata sa *amiotrofičnom lateralnom sklerozom*, liječenje započinje ljekar specijalista sa iskustvom u liječenju bolesti motornih neurona: 50 mg dva puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SCLEFIC - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

Rp film tableta [50 mg/1 tableta] 56 film tableta (4 Al/PVC blistera po 14 tableta), u kutiji

N07XX04 natrijum oksibat

Doziranje: *narkolepsija sa katepsijom*: oralno, početi sa 4,5 g/dan u dvije jednake doze od 2,25 g/dozi, zatim povećavati u koracima po 1,5 g dnevno (odnosno 0,75 g/dozi), podešavanje doze prema odgovoru vršiti u intervalu 1- 2 nedjelje; titraciju doze treba ponoviti ukoliko pacijent prekine uzimanje lijeka više od 14 uzastopnih dana; maksimalno 9 g dnevno u 2 podijeljene doze; ako se koristi zajedno sa valproatom, preporučuje se smanjenje doze za 20%;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SODIUM OXYBATE KALCEKS - AS KALCEKS

Rp oralni rastvor [500 mg/1 mL] 180 mL oralnog rastvora u jantarnoj PET bočici od 200 mL koja je zatvorena polipropilenskim/HDPE poklopcem otpornim za djecu sa prstenom, u kutiji

N07XX08 tafamidis

Doziranje: terapija transtiretinske amiloidoze divljeg tipa ili nasljedne kod odraslih pacijenata s kardiomiopatijom: odrasli, oralno, jedna kapsula jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VYNDAQEL MEKA KAPSULA - PFIZER INC.

Rp kapsula, meka [61 mg/1 kapsula] 30 mekih kapsula (3 PVC/PA/Al/PVC-Al perforirani blister s jediničnim dozama, po 10 kapsula), u kutiji

P **ANTIPARAZITICI, INSEKTICIDI I REPELENTI**
P01 **ANTIPROTOZOICI**
P01A **Amebicidi i drugi lijekovi za liječenje bolesti koje su izazvane protozoama**
P01AB **Derivati nitroimidazola**

P01AB01 **metronidazol**

Doziranje: *amebijaza*: odrasli 400-800 mg na 8 sati tokom 5-10 dana, a djeca 35-50 mg/kg/dan podijeljeno u 3 doze tokom 5-10 dana; *lamblija*: odrasli, 2 g dnevno tokom 3 dana ili 400 mg na 8 sati tokom 5 dana ili 500 mg na 12 sati tokom 7-10 dana; djeca 15 mg/kg/dan podijeljeno u 3 doze tokom 3 dana; *urogenitalna trihomonijaza* (oba partnera) 2 g jednokratno ili 250 mg na 8 h u toku 7 dana ili 400-500 mg na 12 sati u toku 5-7 dana ili 800 mg ujutro i 1200 mg uveče tokom 2 dana ili 2 g u jednoj dozi; djeca: 15 mg/kg dnevno podijeljeno u 3 doze, tokom 7 dana; *anaerobne infekcije*: terapija, odrasli i djeca preko 12 god. 500 mg na 8 sati, u slučaju posebno teških simptoma povećati dozu do maks. 4 g na 24 sata; djeca, 8 sedmica do 12 god. 20-30 mg/kg ili 7,5 mg/kg na 8 sati, doza se može povećati do 40 mg/kg tjelesne težine; dužina terapije je obično 7 do 14 dana; profilaksa, odrasli i djeca starija od 12 god. početi sa 1000 mg, a zatim 500 mg svakih 8 sati, tokom 24 sata prije operativnog zahvata; djeca mlađa od 12 god. 20-30 mg/kg, kao pojedinačna doza primjenjena 1-2 sata prije operativnog zahvata; *psedomembranozni kolitis*: 500 mg na 8 h tokom 5-10 dana; djeca 30 mg/kg/dan podijeljeno na 3-4 doze; *Cronova bolest*: oralno, odrasli, 500 mg dnevno, liječenje može trajati 3-6 mjeseci; *eradikacija Helicobacter pylori* (u kombinaciji sa amoksisicilnom ili klaritromicinom i H2 blokatorom): 400 mg na 8 ili 12 sati; *ulceracije na nogama i dekubitalne rane*: 400 mg na 8 h tokom 7 dana; *bakterijska vaginoza*: 400-500 mg na 12 h tokom 5-7 dana ili 2 g u jednoj dozi; *akutni ulcerozni gingivitis*: odrasli, 250 mg tri puta na dan u toku 3 dana; *djeca*, 35-50 mg/kg tri puta na dan podijeljeno u tri doze u trajanju od 3 dana; *akutne dentalne infekcije*: odrasli, 500 mg tri puta na dan u trajanju 5 do 7 dana; djeca, 7,5 mg/kg tri puta na dan u trajanju 5-7 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MEDAZOL - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

△ Rp tableta [250 mg/1 tableta] 20 tableta u polipropilenskoj bočici, u kutiji

△ Rp tableta [400 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

METROZOL - BOSNALIJEK D.D.

△ Rp tableta [500 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/PVdC//Al - blister) u kutiji

△ Rp tableta [500 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVdC//Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

ORVAGIL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

△ Rp film tableta [400 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/Alu/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

P01AB02 **tinidazol**

Doziranje: *liječenje anaerobnih infekcija*: početna doza 2 g dnevno, nastaviti sa dozom od 1 g ili 500 mg dva puta dnevno, uobičajeno tokom 5-6 dana; *nespecifični vaginitis i akutni ulcerozni gingivitis*: 2 g kao pojedinačna doza; *prevencija postoperativne infekcije*: pojedinačna doza od 2 g otprilike 12 h prije operacije; *eradikacija H. pylori*: 500 mg dva puta na dan u sklopu kompletne terapije u periodu od 7 dana; *urogenitalna trihomonijaza*: 2 g jednokratno oba partnera; *giardijaza*: odrasli 2 g, djeca 50-75 mg/kg tjelesne mase,

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

dozu može biti potrebno ponoviti; *crijevna amebijaza*: 2 g dnevno 2-3 dana, djeca 50-60 mg/kg tjelesne mase za svaki od 3 uzastopna dana; *jetrena amebijaza*: započeti sa jednokratnom dnevnom dozom 1,5-2 g 3 uzastopna dana, terapija se može produžiti na 6 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TINAZOL - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 14 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
Rp film tableta [500 mg/1 tableta] 4 film tablete (1 PVC/PVDC/Al blister), u kutiji

P01B **ANTIMALARICI**

P01BA **Aminokvinolini**

P01BA02 **hidroksihlorohin**

Doziranje: reumatoidni artritis, diskoidni i sistemski lupus eritematodesa, kožna oboljenja uzrokovana ili pogoršana pod uticajem sunčeve svjetlosti: oralno, odrasli, primjeniti minimalnu efikasnu dozu, 200 mg ili 400 mg dnevno (doza ne bi trebala preći 6,5 mg/kg/dan); u pedijatrijskoj populaciji se koristi kod juvenilnog idiopatskog artritisa (u kombinaciji sa drugim lijekovima), diskoidnog i sistemskog lupus eritematodesa - za doziranje konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MALCOVIR - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- Rp film tableta [200 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/ALU blistera sa po 10 tableta), u kutiji

P02 **ANTHELMINTICI**

P02C **Lijekovi protiv nematoda**

P02CA **Derivati benzimidazola**

P02CA01 **mebendazol**

Doziranje: *askarijaza*, *trihurijaza*, *ankilostomijaza*, *nekatorijaza* i *mješovite infekcije*: oralno, odrasli i djeca starija od 2 god, 100 mg (5 ml) dva puta dnevno tokom 3 uzastopna dana; *enterobijaza*: oralno, odrasli i djeca starija od 2 god, 100 mg (5 ml) kao jedna doza; ukoliko se sumnja na reinfekciju, ponoviti poslije 2 do 4 nedjelje;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SOLTRIK - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- Rp oralna suspenzija [100 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 30 ml oralne suspenzije i kašikom za doziranje zapremine 5 ml, u kutiji

- R** **RESPIRATORNI SISTEM**
R01 **NAZALNI PREPARATI (LIJEKOVI ZA LIJEČENJE**
BOLESTI SLUZNICE NOSA)
R01A **Dekongestivi i ostali nazalni lijekovi za lokalnu**
primjenu
R01AA **Simpatomimetici, monokomponentni**

R01AA05 **oksimetazolin**

Doziranje: akutni rinitis, alergijski rinitis, rinosinuzitis, endoskopska hirurgija u nosu, otitis media: odrasli i djeca školskog uzrasta: 1-2 kapi 0.05% rastvora ili 1-2 sprej doze 0.05% spreja u svaku nosnicu 2-3 puta na dan; djeca uzrasta 2-7 godina: 1-2 kapi 0.025% rastvora ili 1-2 sprej doze 0.025% spreja u svaku nosnicu 2-3 puta na dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NAZOPASS - ALKALOID AD SKOPJE

BRp kapi za nos, rastvor [0,25 mg/1 mL] 10 ml kapi za nos, rastvora u LDPE bočici sa PP zatvaračem, u kutiji

BRp kapi za nos, rastvor [0,5 mg/1 mL] 10 ml kapi za nos, rastvora u LDPE bočici sa PP zatvaračem, u kutiji

OPERIL - LABORATORIOS ALCALA FARMA, S.L.

BRp kapi za nos, otopina [0.5 mg/1 mL] 1 plastična bočica (PE) s kapaljkom sa 10 ml kapi za nos, otopine, u kutiji

BRp sprej za nos, rastvor [0.5 mg/1 mL] 1 PE bočica sa 10 ml spreja za nos, rastvora, u kutiji

OPERIL P - LABORATORIOS ALCALA FARMA, S.L.

BRp kapi za nos, otopina [0.25 mg/1 mL] 1 plastična bočica (PE) s kapaljkom sa 10 ml kapi za nos, otopine u kutiji

BRp sprej za nos, rastvor [0.25 mg/1 mL] 1 PE bočica sa 10 ml spreja za nos, rastvora, u kutiji

TENSIS - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

BRp kapi za nos, otopina [0,25 mg/1 mL] 10 ml kapi za nos, otopine (1 LDPE plastična bočica sa PP zatvaračem) u kutiji

BRp kapi za nos, otopina [0,5 mg/1 mL] 10 ml kapi za nos, otopine (1 LDPE plastična bočica a PP zatvaračem) u kutiji

R01AA07 **ksilometazolin**

Doziranje: nazalna kongestija: sprej za nos 0,1%: odrasli i djeca preko 6 god. 1 sprej u svaku nozdrvnu po potrebi 1-3 puta dnevno, maks. do 5 dana; djeca 2-6 god. sprej za nos 0,05% 1-3 puta dnevno po jedan sprej u svaku nosnicu, do 5 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MERALYS - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

BRp sprej za nos, otopina [10 mg/10 mL] 10 mL otopine u bočici sa sprej pumpicom, u kutiji

BRp sprej za nos, otopina [5 mg/10 mL] 10 mL otopine u bočici sa sprej pumpicom, u kutiji

MERALYS HA - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

BRp sprej za nos, otopina [0,5 mg/1 mL] 1 plastična bočica sa 10 ml otopine (zatvorena odmjernim plastičnim sustavom za raspršivanje, s nastavkom za nos i zaštitnim poklopcem), u kutiji

BRp sprej za nos, otopina [1 mg/1 mL] 1 plastična bočica sa 10 ml otopine (zatvorena odmjernim plastičnim sustavom za raspršivanje, s nastavkom za nos i zaštitnim poklopcem), u kutiji

OLYNTH - DELPHARM ORLÉANS

- BRp sprej za nos, otopina [0.5 mg/1 mL] 10 ml otopine u smeđoj staklenoj (tip III) bočici s odmjernim plastičnim (polietilen/polipropilen/polioksimetilen) sustavom za raspršivanje i bijelim polietilenskim zatvaračem, u kutiji
- BRp sprej za nos, otopina [1 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 10 ml spreja za nos, otopine, u kutiji

OLYNTH HA - FAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U.

- BRp sprej za nos, otopina [1 mg/1 mL] plastična bočica sa odmjernim sistemom za raspršivanje sa 10 ml spreja za nos, otopine, u kutiji

RINOFF - GALENIKA A.D. BEOGRAD

- BRp sprej za nos, rastvor [0,5 mg/1 mL] smeđa staklena bočica od 10ml (hidrolitičke otpornosti III), sa pumpicom sa aplikatorom za nos i zaštitnom kapicom, u kutiji
- BRp sprej za nos, rastvor [1 mg/1 mL] smeđa staklena bočica od 10ml (hidrolitičke otpornosti III), sa pumpicom sa aplikatorom za nos i zaštitnom kapicom, u kutiji

SNUP 0,05% - HEMOFARM A.D. VRŠAC

- BRp sprej za nos, rastvor [5 mg/10 mL] 10 ml spreja za nos rastvora (HDPE bočica sa PP/PE čelik sprej pumpom za doziranje i plastičnim poklopcem) u kutiji

SNUP 0,1% - HEMOFARM A.D. VRŠAC

- BRp sprej za nos, rastvor [10 mg/10 mL] 10 ml spreja za nos, rastvora (HDPE bočica sa PP/PE čelik sprej pumpom za doziranje i plastičnim poklopcem) u kutiji

XILOZIN - BOSNALIJEK D.D.

- BRp sprej za nos, otopina [1 mg/1 mL] 10 ml spreja za nos, otopine (u staklenoj bočici sa pumpicom sa aplikatorom i zaštitnom kapicom), u kutiji

XILOZIN P - BOSNALIJEK D.D.

- BRp sprej za nos, otopina [0,5 mg/1 mL] 10 ml spreja za nos, otopine (u staklenoj bočici sa pumpicom sa aplikatorom za nos i zaštitnom kapicom), u kutiji

R01AA08 nafazolin

Doziranje: brzo ublažavanje simptoma zapušenog nosa kod rinitisa i rinosinuzitisa: odrasli, 1-2 kapi na 6 do 8 sati, ali ne češće od 6 sati; liječenje nafazolinom ne smije trajati duže od 5 dana uzastopno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NAFAZOL - HEMOFARM A.D. VRŠAC

- BRp kapi za nos, rastvor [1 mg/1 mL] 1 polietilenska bočica sa 10 ml kapi za nos, rastvora, u kutiji

R01AB *Simpatomimetici, kombinacije, isključujući kortikosteroide*

R01AB06 ksilometazolin, lizozim

Doziranje: dekongestija sluznice nosa kod prehlade (virusnog rinitisa), vazomotornog rinitisa i alergijskog rinitisa, za olakšanje pražnjenja sekreta iz nosa kod upale paranazalnih sinusa i kataralne upale srednjeg uha kod prehlade: 1 pritisak spreja 2-3 puta na dan; ne primjenjivati duže od 7 dana; Rinobact P- za djecu uzrasta 2-6 god.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

RINOBACT - BOSNALIJEK D.D.

BRp sprej za nos, otopina [1 mg/1 mL+ 0,5 mg/1 mL] 10 ml otopine za sprej za nos u staklenoj bočici s pumpicom s aplikatorom za nos i zaštitnom kapicom, u kutiji

RINOBACT P - BOSNALIJEK D.D.

BRp sprej za nos, otopina [0,5 mg/1 mL+ 0,5 mg/1 mL] 10 ml otopine za sprej za nos u staklenoj bočici s pumpicom s aplikatorom za nos i zaštitnom kapicom, u kutiji

R01AB06 deksamptenol, ksilometazolin

Doziranje: dekongestija sluznice nosa tokom rinitisa, te kao potporna terapija kod zacjeljivanja lezija kože i sluznice; ublažavanje vazomotornog rinitisa; liječenje nazalne respiratorne opstrukcije nakon operacije nosa: odrasli i djeca iznad 6 godina: 3 puta po jedno uštrcavanje doze za odrasle (50+1) mg/ml; djeca od 2 do 6 godina: 3 puta po jedno uštrcavanje doze za djecu (50+0,5) mg/ml; liječenje ne treba trajati duže od 7 dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SEPTANAZAL ZA DJECU - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp sprej za nos, otopina [50 mg/1 mL+ 0.5 mg/1 mL] 1 plastična bočica sa 10 ml spreja za nos, otopine, u kutiji

SEPTANAZAL ZA ODRASLE - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp sprej za nos, otopina [50 mg/1 mL+ 1 mg/1 mL] 1 plastična bočica sa 10 ml spreja za nos, otopine, u kutiji

SNUP D - HEMOFARM A.D. VRŠAC

BRp sprej za nos, rastvor [50 mg/1 mL+ 0,5 mg/1 mL] 10 ml spreja za nos, rastvora u HDPE bočici, u kutiji

BRp sprej za nos, rastvor [50 mg/1 mL+ 1 mg/1 mL] 10 ml spreja za nos, rastvora u HDPE bočici, u kutiji

R01AC Antialergijski lijekovi (antialergici), isključujući kortikosteroide

R01AC03 azelastin

Doziranje: alergijski rinitis: odrasli i djeca preko 12 god. po jedna aplikacije spreja u svaku nosnicu dva puta dnevno; djeca 6-11 god. po jednu aplikacija spreja u svaku nozdrvu dva puta dnevno, maksimalno trajanje terapije 4 nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALLERGODIL - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

BRp sprej za nos, rastvor [1.5 mg/1 mL] 1 bočica sa 10 ml spreja za nos, rastvora u kutiji

BRp sprej za nos, rastvor [1.5 mg/1 mL] 1 bočica sa 5 ml spreja za nos, rastvora, u kutiji

R01AD Kortikosteroidi

R01AD08 flutikazon

Doziranje: profilaksa i terapija alergijskog rinitisa i perenijalni rinitis: 100 mcg (2 inhalacije spreja) u svaku nosnicu jednom na dan (preporučuje se ujutro); povećati na maks. 2 puta dnevno po potrebi; nakon postizanja kontrole smanjiti na 50 mcg (1 sprej) u svaku nosnicu; djeca 4-11 god. 50 mcg (jedna inhalacija) u svaku nosnicu jednom dnevno (preporučuje se ujutro); povećati po potrebi na maks. dva puta dnevno;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FLIXONASE - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

- Rp sprej za nos, suspenzija [50 µg/1 doza] 120 doza u bočici sa dozatorom i poklopcem, u kutiji
- FLUTEL - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Š.**
- Rp sprej za nos, suspenzija [50 µg/1 doza] Jedna staklena bočica sa 120 doza spreja za nos, suspenzije, u kutiji

R01AD09 mometazon

Doziranje: *alergijski rinitis:* odrasli i djeca preko 12 god, 100 mcg (dva spreja) u svaku nosnicu jedanput dnevno ukoliko je neophodno dozu povećati do maks. 200 mcg (četiri spreja) u svaku nosnicu jedanput dnevno; kada se simptomi ublaže smanjiti dozu na 50 mcg (jedan sprej) u svaku nosnicu jedanput dnevno; djeca od 3-11 god, 50 mcg (jedan sprej) u svaku nosnicu jedanput dnevno; *nosna polipoza:* odrasli preko 18 god, 100 mcg (dva spreja) u svaku nosnicu jedanput dnevno, povećavati ukoliko je neophodno nakon 5-6 nedjelja do 100 mcg (dva spreja) u svaku nosnicu dva puta dnevno (razmotriti druge načine liječenja ukoliko se ne postigne uspjeh nakon 5-6 sedmica ovakve terapije); kada je kontrola postignuta smanjiti do najmanje efikasne doze.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MOMETAZON SANDOZ - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp sprej za nos, suspenzija [50 µg/1 doza] 1 bijela HDPE bočica sa pumpicom za sprej za nos sa 140 doza, u kutiji

MONALIZ - DEVA HOLDING A.S.

- Rp sprej za nos, suspenzija [50 µg/1 doza] 1 plastična bočica s pumpicom, ručnim aktivatorom spreja i aplikatorom za nazalnu primjenu sa 140 doza (18 g suspenzije), u kutiji.

R01AD12 flutikazon

Doziranje: *alergijski rinitis:* odrasli i djeca iznad 12 godina: uobičajena početna doza je 2 inhalacije spreja u svaku nosnicu jednom na dan; nakon postizanja kontrole simptoma doza se može smanjiti na 1 inhalaciju spreja u svaku nosnicu jednom na dan; djeca 6-11 godina: 1 inhalacija spreja u svaku nosnicu jednom dnevno; ne primjenjuje se kod djece ispod 6 godina starosti.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AVAMYS - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

- Rp sprej za nos, suspenzija [27,5 µg/1 doza] 1 staklena bočica sa 120 doza spreja za nos, suspenzije, u kutiji

R01AD58 azelastin, flutikazon

Doziranje: umjereni do teški sezonski i višegodišnji alergijski rinitis (ukoliko se korištenje samog intranazalnog antihistaminika ili kortikosteroida ne smatra dovoljnim): odrasli i djeca preko 12 god, jedno prskanje u svaku nosnicu dva puta dnevno (ujutro i naveče).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DUONASE - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

- Rp sprej za nos, suspenzija [137 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 1 bočica od smeđeg stakla tipa I sa sprej pumpicom, nazalnim polipropilenskim aplikatorom i zaštitnom kapicom sa 23 g suspenzije u bočicama od 25 ml (najmanje 120 aktivacija) u kutiji

DYMISTA - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

- Rp sprej za nos, suspenzija [137 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 1 staklena bočica zapremine 10 ml sa 4 ml (6,4 g) spreja za nos, suspenzije u kutiji (najmanje 28 doza spreja)
- Rp sprej za nos, suspenzija [137 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 1 staklena bočica zapremine 25 ml sa 17 ml (23 g) spreja za nos, suspenzije u kutiji (najmanje 120 doza spreja)

FLUFETAN - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp sprej za nos, suspenzija [137 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 1 staklena bočica sa 23 g (120 doza) spreja za nos, suspenzije, u kutiji

FULAIR - STADA ARZNEIMITTEL AG

Rp sprej za nos, suspenzija [50 µg/1 doza+ 137 µg/1 doza] bočica sa 25 ml sprej za nos, suspenzije; u kutiji

NEZALLIX - ADALVO LIMITED

Rp sprej za nos, suspenzija [137 µg/1 Potisak+ 50 µg/1 Potisak] 1 staklena bočica zapremine 25 ml sa 23 g spreja za nos, suspenzije, u kutiji (najmanje 120 doza spreja)

R01B Nazalni dekongestivi za sistemsku primjenu
R01BA Simptomimetici

R01BA52 ibuprofen, pseudoefedrin

Doziranje: *ublažavanje simptoma prehlade i gripa:* **Defrinol forte:** odrasli i djeca starija od 12 godina, 1-3 tablete dnevno, po potrebi, u razmacima od najmanje 8 sati; najduže 3 dana; **Defrinol:** odrasli i djeca preko 12 god. 3 puta dnevno po 1-2 tablete, u razmacima od najmanje 4 sata, maks. 6 tbl. dnevno; sirup, djeca 6-12 god, 5 ml (1 kafena kašičica) sirupa, 3 puta dnevno; djeca 12-18 god, 10 ml (2 kafene kašičice) sirupa, 3 puta dnevno; razmak između pojedinačnih doza treba da bude najmanje 4 sata; primjenjivati najduže 5 dana kontinuirano; **Defrinol duo:** adolescenti (15-17 god.) i odrasli 200 mg/30 mg svakih 4-6 sati maks. 6 puta dnevno; u slučaju težih simptoma 400 mg/60 mg, po potrebi ponoviti nakon 6 sati, maks. 3 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**DEFRINOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD**

BRp sirup [100 mg/5 mL+ 30 mg/5 mL] 1 staklena boca sa 100 ml sirupa, u kutiji
 △ BRp film tableta [200 mg/1 tableta+ 30 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
 △ BRp sirup [100 mg/5 mL+ 30 mg/5 mL] 1 staklena boca sa 100 ml sirupa, u kutiji

DEFRINOL DUO - GALENIKA A.D. BEOGRAD

△ BRp granule za oralni rastvor [400 mg/1 kesica+ 60 mg/1 kesica] 6 kesica od PET/Al/PE koja sadrži 5 g granula za oralni rastvor podijeljenih u dvije polovine kesice sa po 2,5 g granula, u kutiji

DEFRINOL FORTE - GALENIKA A.D. BEOGRAD

△ BRp film tableta [400 mg/1 tableta+ 60 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 ALU/PVC - PVC blister sa 10 film tableta), u kutiji

R01BA52 askorbinska kiselina, paracetamol, pseudoefedrin

Doziranje: simptomatsko liječenje prehlade i gripa (kongestija sluznice nosa i sinusa i/ili sinusna bol, povišena tjelesna temperatura, glavobolja, mišićna bol): odrasli i djeca starija od 12 godina: 1 do 2 šumeće tablete otopiti u čaši vode svakih 6 sati po potrebi, dok traju simptomi (ne duže od 7 dana); maks. dnevno 8 šumećih tableta; preparat se ne preporučuje djeci mlađoj od 12 godina.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**MAXFLU - PLIVA HRVATSKA D.O.O.**

△ BRp šumeća tableta [60 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta+ 30 mg/1 tableta] 10 šumećih tableta u polipropilenskoj tubi, sa zatvaračem (PE) sa silikagelom i sigurnosnim prstenom, u kutiji

R01BA52 paracetamol, pseudoefedrin

Doziranje: *liječenje simptoma prehlade i gripa:* odrasli i djeca preko 12 godina, tablete, po 2 tabl. maks. 4 puta dnevno; djeca 6-12 god: po 1 tabl. maks. 4 puta dnevno; intervali između uzimanja lijeka ne smiju biti kraći od 4 sata; granule za oralni rastvor: 2-3 vrećice na dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

RHINOSTOP HOT - BOSNALIJEK D.D.

- △ BRp granule za oralnu otopinu [500 mg/1 vrećica+ 60 mg/1 vrećica] 8 vrećica sa po 1,5 g granula za oralnu otopinu, u kutiji

R01BA52 dektrometorfan, hlordenamin, paracetamol, pseudoefedrin

Doziranje: *simptomatsko liječenje prehlade i gripa:* djeca od 6-11 godina: 10 mL (2 kašičice sirupa); doze se mogu ponavljati svakih 4-6 sati, do maks. 4 doze u 24 sata.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TYLOL COLD SYRUP - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

- △ BRp sirup [5 mg/5 mL+ 1 mg/5 mL+ 160 mg/5 mL+ 15 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 100 ml sirupa i doznom kašičicom (5 ml), u kutiji

R01BA52 pseudoefedrin, triprolidin

Doziranje: *ublažavanje simptoma prouzrokovanih alergijskim rinitisom, vazomotornim rinitisom i prehladom:* odrasli i djeca iznad 12 god. 1 tableta na 4-6 sati (maksimalna dnevna doza 240 mg pseudoefedrina); ne preporučuje se primjena lijeka kod djece mlađe od 12 god;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

RHINOZAD - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- △ BRp tableta [60 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

RINASEK - HEMOFARM A.D. VRŠAC

- △ BRp tableta [60 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta] 1 PVC/Al blister sa 10 tableta, u kutiji

R01BA52 hlordenamin, paracetamol, pseudoefedrin

Doziranje: *ublažavanje simptoma prehlade i gripe: Tylol Hot i Tylol Hot D:* odrasli i djeca starija od 12 godina: 1 vrećicu rastvoriti u 160 ml (2/3 čaše) vruće vode i odmah popiti; sljedeću dozu uzeti nakon 6 h; maks. dnevno 4 vrećice. **Tylol Hot Pediatric:** djeca od 6-12 godina: 1 vrećicu rastvoriti u 80 ml (1/3 šolje) vruće vode i odmah popiti; sljedeću dozu uzeti nakon 6 h; maks. dnevno 4 vrećice;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TYLOL HOT - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

- △ BRp šumeće granule [4 mg/1 kesica+ 500 mg/1 kesica+ 60 mg/1 kesica] 12 PET/Al/LLDP kesica sa 20 g šumećih granula, u kutiji
- △ BRp šumeće granule [4 mg/1 kesica+ 500 mg/1 kesica+ 60 mg/1 kesica] 6 PET/Al/LLDPE kesica po 20 g šumećih granula, u kutiji

TYLOL HOT D - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

- △ BRp šumeće granule [4 mg/1 kesica+ 500 mg/1 kesica+ 60 mg/1 kesica] 12 (PET/Al/LLDPE) kesica sa po 6 g šumećih granula, u kutiji

TYLOL HOT PEDIATRIC - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

- △ BRp šumeće granule [2 mg/1 vrećica+ 250 mg/1 vrećica+ 30 mg/1 vrećica] 12 PET/Al/LLDP folija (vrećica) sa po 10 g šumećih granula, u kutiji

R01BA52 acetil salicilna kiselina, pseudoefedrin

Doziranje: *simptomatsko liječenje kongestije nosne sluznice, bola i temperature koje prate prehladu:* odrasli 1-2 kesice rastvoreno u čaši vode; po potrebi pojedinačnu dozu ponoviti u intervalu od 4-8 sati; maks. doza je 6 kesica; ne preporučuje se primjena kod djece mlađe od 16 godina; ne uzimati duže od 3 dana bez konsultacije sa ljekarom.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ASPIRIN COMPLEX - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**

△ - BRp granule za oralnu suspenziju [500 mg/1 kesica+ 30 mg/1 kesica] 10 vrećica sa granulama za oralnu suspenziju, u kutiji

GRIPPOSTAD COMPLEX - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

△ - BRp granule za oralnu suspenziju [500 mg/1 kesica+ 30 mg/1 kesica] 10 kesica, u kutiji

R01BA52 askorbinska kiselina, dekstrometorfan, paracetamol, pseudoefedrin

Doziranje: *simptomatsko liječenje prehlade i gripa:* odrasli i djeca preko 12 godina 1 tableta do četiri puta dnevno, sa minimalnim intervalima uzimanja tableta od 4 sata; maksimalna pojedinačna doza su 2 tablete, a maksimalna dnevna doza su 2 tablete četiri puta dnevno; lijek ne treba uzimati duže od 5 dana; ne preporučuje se djeci mlađoj od 12 godina.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**CAFFETIN COLD - ALKALOID AD SKOPJE**

△ BRp film tableta [60 mg/1 tableta+ 15 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta+ 30 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PVDC//Al - blister), u kutiji

PHARMAFLU - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

△ BRp filmom obložena tableta [60 mg/1 tableta+ 15 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta+ 30 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 Al folija-PVC/PVDC folija sa po 10 tableta), u kutiji

R01BA53 askorbinska kiselina, fenilefrin, paracetamol

Doziranje: simptomatska terapija prehlade i gripa praćenog kašljem, rinitisom (i rinorejom), povišenom temperaturom i bolovima (glavobolja i bolovi u mišićima): odrasli i djeca preko 16 godina: 1 prašak na svakih 4-6 sati po potrebi, maks. 4 praška dnevno; prašak se prije upotrebe rastvori u čaši tople vode; ne koristiti duže od 7 dana bez savjeta ljekara.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**THERAFLU MAX PLUS C - HALEON HUNGARY KFT**

BRp prašak za oralni rastvor [40 mg/1 kesica+ 10 mg/1 kesica+ 1000 mg/1 kesica] 10 kesica (PET/PE/Al surlin laminirane kesice) sa 6,427 g praška za oralni rastvor, u kutiji

BRp prašak za oralni rastvor [40 mg/1 kesica+ 10 mg/1 kesica+ 1000 mg/1 kesica] 5 kesica (PET/PE/Al surlin laminirane kesice) sa 6,427 g praška za oralni rastvor, u kutiji

R01BA53 fenilefrin, hlufenamin, paracetamol

Doziranje: *ublažavanje simptoma prehlade i gripe:* odrasli i djeca preko 12 god. 1 dozu svakih 6-8 sati, po potrebi na 4-6 sati; maks. broj doza u toku dana je 6; prašak za oralnu suspenziju i šumeće granule prethodno rastvoriti u čaši vode

REGISTROVANI LIJEKOVI:**TYLOLFEN HOT - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.**

△ - BRp šumeće granule [10 mg/1 vrećica+ 4 mg/1 vrećica+ 500 mg/1 vrećica] 12 PET/Al/LLDPE vrećica sa po 20 g šumećih granula u kutiji

R01BA53 fenilefrin, paracetamol

Doziranje: simptomatsko liječenje prehlade i gripa (glavobolja, grlobolja, bolovi u mišićima, nazalne kongestije i groznica): odrasli i djeca starija od 16 godina: 1 kesicu rastvorenu u vodi, maks. dnevno 4 kesice; razmak između pojedinačnih doza ne smije biti manji od 4 sata;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CAFFETIN COLDMAX - ALKALOID AD SKOPJE

BRp prašak za oralni rastvor [12,2 mg/1 kesica+ 1000 mg/1 kesica] kutija sa 10 jednodoznih kesica sa 5,15 g praška, u kutiji

R02 LIJEKOVI ZA LOKALNU TERAPIJU SLUZNICE ŽDRIJELA

R02A Lijekovi za lokalnu terapiju sluznice ždrijela
R02AA Antiseptici

R02AA benzokain, enoksolon, hlorheksidin

Doziranje: simptomatsko olakšanje kod blagih infekcija i upalnih stanja orofaringealne regije: odrasli i djeca preko 12 godina, 1 pastila na svaka 2-3 sata se polako otopi u ustima; maks. 8 pastila dnevno; djeca između 6 i 12 godina, 1 pastila svakih 4-5 sati se polako otopi u ustima, maks. 6 pastila dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ANZIBEL PASTILE SA OKUSOM MEDA I LIMUNA - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

BRp pastila [4 mg/1 pastila+ 3 mg/1 pastila+ 5 mg/1 pastila] 20 pastila (2 bijela neprozirna PVC/PE/PVDC/Al blistera po 10 pastila), u kutiji

ANZIBEL PASTILE SA OKUSOM MENTOLA - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

BRp pastila [4 mg/1 pastila+ 3 mg/1 pastila+ 5 mg/1 pastila] 20 pastila (2 bijela neprozirna PVC/PE/PVDC/Al blistera po 10 pastila), u kutiji

R02AA cetilpiridin, lidokain, lizozim

Doziranje: lokalni tretman akutnih upalnih bolesti sluznice usne šupljine i ždrijela (stomatitis, gingivitis, afte); pomoćni lokalni tretman kod bolnog, nadraženog i upaljenog grla i ždrijela; uz preporuku ljekara, predoperativno i postoperativno kod tonzilektomije, operacije grkljana, povreda ili apscesa, te nakon ekstrakcije zuba: za pojedinačnu dozu, potrebno je pet puta pritisnuti pumpicu za raspršivanje; postupak se može ponoviti 3-6 puta na dan, sa minimalnim razmacima od 2h između doziranja.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LYSOBACT COMPLETE SPRAY S AROMOM PEPERMINTA - BOSNALIJEK D.D.

BRp sprej za usnu sluznicu, otopina [1.5 mg/1 mL+ 0.5 mg/1 mL+ 20 mg/1 mL] 30 ml otopine u bočici od smeđeg stakla, s pumpicom za raspršivanje i aplikatorom za sprej raspršivač, u kutiji

R02AA cetilpiridin, lizozim

Doziranje: akutne upale sluznice usne šupljine i ždrijela (stomatitis, gingivitis, afte); pomoćna terapija kod laringitisa ili faringitisa; predoperativno i postoperativno kod tonzilektomije, operacije grkljana, povreda ili apscesa, te nakon ekstrakcije zuba (uz

preporuku ljekara): sprej, odrasli i djeca starija od 6 god. pojedinačna doza, pet puta pritisnuti pumpicu za raspršivanje, postupak se može ponoviti 3-6 puta na dan, sa minimalnim razmacima od 2h; lozenge: odrasli i djeca iznad 6 godina, 3-6 lozengi dnevno, sa minimalnim razmacima od 2h između doziranja; tablete istopiti u ustima, najbolje pod jezikom; ne primjenjuje se kod djece mlađe od 6 god.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LYSOBACT DUO - BOSNALIJEK D.D.

BRp komprimovana lozenga [1.5 mg/1 lozenga+ 20 mg/1 lozenga] 20 komprimovanih lozengi (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 komprimovanih lozengi), u kutiji

LYSOBACT SPRAY S AROMOM PEPERMINTA - BOSNALIJEK D.D.

BRp sprej za usnu sluznicu, otopina [1.5 mg/1 mL+ 20 mg/1 mL] 1 smeđa staklena bočica (30 mL) sa pumpicom za raspršivanje i zaštitnom kapicom i aplikatorom za sprej raspršivač, u kutiji

R02AA05 hlorheksidin, lidokain

Doziranje: simptomatsko i lokalno ublažavanje bolova u ždrijelu i drugih tegoba koje prati draženje ždrijela, lokalno liječenje upale ždrijela: odrasli i djeca preko 12 godina, 6-10 pastila na dan ili 3-5 uštrcaja spreja na bolno mjesto, 6-10 puta na dan; djeca 6-12 godina, 3-5 pastila na dan ili 2-3 uštrcaja spreja na bolno mjesto, 3-5 puta na dan; ne preporučuje se primjena kod djece mlađe od 6 godina.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ANGAL - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

BRp pastila [5 mg/1 tableta+ 1 mg/1 tableta] 24 pastile (2 Alu /PVC/ PCTFE blistera po 12 pastila), u kutiji

ANGAL S - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

BRp sprej za usnu sluznicu, rastvor [2 mg/1 mL+ 0.5 mg/1 mL] 1 smeđa staklena bočica sa glavom za prskanje od polietilena i sa 30 mL rastvora, u kutiji

PHARYNGAL - BOSNALIJEK D.D.

BRp sprej za usnu sluznicu, otopina [2 mg/1 mL+ 0.5 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 30 ml spreja za usnu sluznicu, otopine, u kutiji

R02AA15 povidon jod

Doziranje: profilaksa i terapija infekcija usta i ždrijela (stomatitis, gingivitis, afte, površinski ili herpetički apscesi); profilaksa infekcija prije ili poslije oralnih i dentalnih intervencija; suzbijanje neprijatnog zadaha iz usta: 3-4 puta dnevno grgutati grlo i ispirati usta s 5 ml (1 kafena kašika) rastvora za grgljanje; za održavanje higijene u ustima, usta se ispiraju s 5 ml rastvora u toku 30 sekundi jedanput dnevno; može se primjenjivati i razblažen (najviše razblaženje smije biti 1 ml rastvora u 10 ml vode); ne smije se primjenjivati kod djece mlađe od šest godina.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BETADINE - ALKALOID AD SKOPJE

BRp rastvor za grgljanje [1 g/100 mL] Plastična, polipropilenska bočica, tamno braon boje sa ugrađenom plastičnom, polietilenskom kapaljkom i plastičnim, polipropilenskim zatvaračem na navoj, sa 100 ml rastvora za grgljanje, u kutiji

R02AA20 benzidamin, cetilpiridin

Doziranje: *antiinflamatorno, analgetičko i antiseptičko liječenje nadražaja u grlu, ustima, desni, kod gingivitisa i faringitisa:* odrasli, 3-4 pastile dnevno (jednu pastilu otopiti u ustima svakih 3-6 sati), djeca 6-12 god. 3 pastile dnevno (jednu pastilu otopiti u ustima svakih 3-

6 sati); *antiinflamatorno, analgetičko i antiseptičko liječenje nadražaja u grlu, ustima, desni, kod gingivitisa, faringitisa i laringitisa*: sprej - odrasli i djeca preko 12 god. jedna doza glavu spreja pritisnuti 1-2 puta, može se ponoviti svaka 2 sata, 3-5 puta na dan;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SEPTOLETE TOTAL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp sprej za usnu sluznicu, otopina [1.5 mg/1 mL+ 5 mg/1 mL] 1 plastični spremnik (HDPE) sa 30 ml spreja za usnu sluznicu, otopine, u kutiji

SEPTOLETE TOTAL LIMUN I MED - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp pastila [1 mg/1 pastila] 16 pastila (2 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 8 pastila), u kutiji

BRp pastila [1 mg/1 pastila] 24 pastile (3 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 8 pastila), u kutiji

SEPTOLETE TOTAL LIMUN I ZOVA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp pastila [1 mg/1 pastila] 16 pastila (2 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 8 pastila), u kutiji

BRp pastila [1 mg/1 pastila] 24 pastile (3 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 8 pastila), u kutiji

R02AA20 2,4-dihlorbenzil alkohol, amilmetakrezol

Doziranje: *ublažavanje simptoma infekcije usne duplje i ždrijela*: odrasli i djeca starija od 6 godina na svaka 2-3 sata po 1 pastilu otapati u ustima, maks. 12 pastila tokom dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

STREPSILS COOL - RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED

BRp pastila [1,2 mg/1 pastila+ 0,6 mg/1 pastila] 16 pastila (2 PVC/PVdC/Al blistera po 8 pastila), u kutiji

BRp pastila [1,2 mg/1 pastila+ 0,6 mg/1 pastila] 24 pastile (3 PVC/PVdC/Al blistera po 8 pastila), u kutiji

BRp pastila [1,2 mg/1 pastila+ 0,6 mg/1 pastila] 36 pastila (3 PVC/PVdC/Al blistera po 12 pastila), u kutiji

STREPSILS LIMUN BEZ ŠEĆERA - RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED

BRp pastila [1.2 mg/1 Pastila, Lozenga+ 0.6 mg/1 Pastila, Lozenga] 24 pastile (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 12 pastila) u kutiji

STREPSILS MED I LIMUN - RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED

BRp pastila [1.2 mg/1 Pastila, Lozenga+ 0.6 mg/1 Pastila, Lozenga] 24 pastile (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 12 pastila) u kutiji

R02AA20 2,4-dihlorbenzil alkohol, amilmetakrezol, lidokain

Doziranje: *ublažavanje simptoma infekcije usne duplje i ždrijela, uključujući i jaku grlobolju*: odrasli i djeca starija od 12 godina, po potrebi 1 pastilu polako otapati u ustima svaka 2 sata, maks. 8 pastila na dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

STREPSILS PLUS - RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED

BRp pastila [1,2 mg/1 pastila+ 0,6 mg/1 pastila+ 10 mg/1 pastila] 24 pastile (3 blistera po 8 pastila) u kutiji

R02AA20 2,4-dihlorbenzil alkohol, amilmetakrezol, askorbinska kiselina

Doziranje: *ublažavanje simptoma infekcije usne duplje i ždrijela:* odrasli i djeca starija od 6 godina na svaka 2-3 sata po 1 pastilu otapati u ustima, maks. 12 pastila tokom dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:**STREPSILS NARANDŽA SA VITAMINOM C - RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED**

BRp pastila [1.2 mg/1 Pastila, Lozenga+ 0.6 mg/1 Pastila, Lozenga+ 100 mg/1 Pastila, Lozenga] 24 pastile (2 PVC/PVDC//AI - blistera po 12 pastila) u kutiji

R02AA20 2,4-dihlorbenzil alkohol, amilmetakrezol, levomentol

Doziranje: *ublažavanje simptoma infekcije usne duplje i ždrijela:* odrasli i djeca starija od 6 godina na svaka 2-3 sata po 1 pastilu otapati u ustima;

REGISTROVANI LIJEKOVI:**NEO-ANGIN - KLOSTERFRAU BERLIN GMBH**

BRp pastila [1.2 mg/1 Pastila, Lozenga+ 0.6 mg/1 Pastila, Lozenga+ 5.9 mg/1 Pastila, Lozenga] 24 pastile (2 PVC/PVDC//AI blistera po 12 pastila), u kutiji

NEO-ANGIN BEZ ŠEĆERA - KLOSTERFRAU BERLIN GMBH

BRp pastila [1.2 mg/1 Pastila, Lozenga+ 0.6 mg/1 Pastila, Lozenga+ 5.72 mg/1 Pastila, Lozenga] 24 pastile (2 PVC/PVDC//AI blistera po 12 pastila), u kutiji

STREPSILS MENTOL I EUKALIPTUS - RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED

BRp pastila [1.2 mg/1 Pastila, Lozenga+ 0.6 mg/1 Pastila, Lozenga+ 8 mg/1 Pastila, Lozenga] 24 pastile (2 PVC/PVDC//AI - blistera po 12 pastila) u kutiji

R02AA20 lizozim, piridoksin

Doziranje: *pomoćni lokalni tretman ograničenih bolesti sluznice usta i orofarinksa, uključujući i afte:* **komprimovane lozenge** - 6-8 komprimovanih lozengi polako otopiti ispod jezika tokom dana; između svakog uzimanja mora postojati razmak od najmanje 1 sata; ne preporučuje se primjena pastila u djece mlađe od 6 godine; **sprej** - djeca 2-6 god. 5 puta pritisnuti pumpicu za raspršivanje, 3 puta na dan; djeca starija od 6 god. i odrasli, 5 puta pritisnuti pumpicu za raspršivanje, 6-8 puta na dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**LYSOBACT - BOSNALIJEK D.D.**

BRp komprimovana lozenga [20 mg/1 lozenga+ 10 mg/1 lozenga] 50 komprimovanih lozengi (5 PVC//AI blistera po 10 lozengi), u kutiji

BRp komprimovana lozenga [20 mg/1 pastila+ 10 mg/1 pastila] 10 komprimovanih lozengi (1 PVC//AI blister sa 10 lozengi), u kutiji

BRp komprimovana lozenga [20 mg/1 pastila+ 10 mg/1 pastila] 30 komprimovanih lozengi (3 PVC//AI blistera po 10 lozengi), u kutiji

LYSOBACT P SPRAY S AROMOM BANANE - BOSNALIJEK D.D.

BRp sprej za usnu sluznicu, otopina [20 mg/1 mL+ 10 mg/1 mL] 30 ml spreja za usnu sluznicu, otopine u smeđoj staklenoj bočici, u kutiji

R02AA21 oktenidin

Doziranje: *upala sluznice usta i grla sa simptomima kao što su bol, crvenilo i otok:* odrasli i djeca preko 12 god. otopiti u ustima po jednu pastilu svaka 2-3 sata, maks. dnevno 6 pastila

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OCTEANGIN - KLOSTERFRAU BERLIN GMBH

BRp	pastila [2,6 mg/1 pastila]	12 pastila (1 PVC/PVDC /Al blister), u kutiji
BRp	pastila [2,6 mg/1 pastila]	16 pastila (2 PVC/PVDC /Al blistera po 8 pastila), u kutiji
BRp	pastila [2,6 mg/1 pastila]	20 pastila (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 pastila), u kutiji
BRp	pastila [2,6 mg/1 pastila]	24 pastile (2 PVC/PVDC/Al blistera po 12 pastila), u kutiji

R02AX Ostali preparati za grlo

R02AX01 flurbiprofen

Doziranje: *kratkotrajno simptomatsko ublažavanje bola u grlu:* odrasli i djeca starija od 12 god. - lozenge, 1 lozenga se otapa u ustima na svakih 3-6 sati po potrebi, maks. 5 lozengi u toku 24 sata; odrasli stariji od 18 god. sprej za usnu sluznicu - jedna doza (3 potiska) se naprska u zadnji dio grla svakih 3-6 sati po potrebi, maksimalno 5 puta u toku 24 sata

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FLURBISEPT - GALENIKA A.D. BEOGRAD

BRp	lozenga [8,75 mg/1 lozenga]	12 lozengi (1 PVC/PVdC-Al blister sa 12 lozengi), u kutiji

OROFAR AKUT - GEISER PHARMA, S.L.U.

BRp	lozenga [8,75 mg/1 lozenga]	24 lozenge (2 PVC-PVDC/Al blistera sa po 12 lozengi), u kutiji
BRp	sprej za usnu sluznicu, rastvor [8,75 mg/1 doza]	HDPE bočica od 15 ml sa pumpom za doziranje, u kutiji

R02AX03 cetilpiridin

Doziranje: *antiinflamatorno, analgetičko i antiseptičko liječenje nadražaja u grlu, ustima, desni, kod gingivitisa i faringitisa:* odrasli, 3-4 pastile dnevno (jednu pastilu otopiti u ustima svakih 3-6 sati), djeca 6-12 god. 3 pastile dnevno (jednu pastilu otopiti u ustima svakih 3-6 sati); *antiinflamatorno, analgetičko i antiseptičko liječenje nadražaja u grlu, ustima, desni, kod gingivitisa, faringitisa i laringitisa:* sprej - odrasli i djeca preko 12 god. jedna doza glavu spreja pritisnuti 1-2 puta, može se ponoviti svaka 2 sata, 3-5 puta na dan; djeca 6-12 god. za jednu dozu glavu spreja pritisnuti jednom, može se ponoviti svaka 2 sata, 3-5 puta na dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SEPTOLETE TOTAL LIMUN I MED - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp	pastila [1 mg/1 pastila]	16 pastila (2 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 8 pastila), u kutiji
BRp	pastila [1 mg/1 pastila]	24 pastile (3 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 8 pastila), u kutiji

SEPTOLETE TOTAL LIMUN I ZOVA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp	pastila [1 mg/1 pastila]	16 pastila (2 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 8 pastila), u kutiji
BRp	pastila [1 mg/1 pastila]	24 pastile (3 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 8 pastila), u kutiji

R02AX03 benzydamin, cetilpiridin

Doziranje: *antiinflamatorno, analgetičko i antiseptičko liječenje nadražaja u grlu, ustima, desni, kod gingivitisa i faringitisa:* odrasli, 3-4 pastile dnevno (jednu pastilu otopiti u ustima

svakih 3-6 sati), djeca 6-12 god. 3 pastile dnevno (jednu pastilu otopiti u ustima svakih 3-6 sati);

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SEPTOLETE TOTAL - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp sprej za usnu sluznicu, otopina [1.5 mg/1 mL + 5 mg/1 mL] 1 plastični spremnik (HDPE) sa 30 ml spreja za usnu sluznicu, otopine, u kutiji

SEPTOLETE TOTAL COLA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp pastila [3 mg/1 pastila+ 1 mg/1 pastila] 16 pastila (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa 8 pastila), u kutiji

SEPTOLETE TOTAL EUKALIPTUS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp pastila [3 mg/1 pastila+ 1 mg/1 pastila] 16 pastila (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 8 pastila), u kutiji

BRp pastila [3 mg/1 pastila+ 1 mg/1 pastila] 32 pastile (4 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 8 pastila), u kutiji

SEPTOLETE TOTAL LIMUN I ĐUMBIR - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp pastila [3 mg/1 pastila+ 1 mg/1 pastila] 16 pastila (2 PVC/PVDC/PVC//Al blistera po 8 pastila) u kutiji

R02AX03 benzidamin

Doziranje: *liječeje simptoma boli i iritacije u usnoj duplji i grlu:* odrasli i djeca iznad 6 god, 1 pastila 3 puta dnevno; djeca 6-11 god. liječenje provoditi pod nadzorom odrasle osobe

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TANTUM VERDE - AZIENDE CHIMICHE RIUNITA ANGELINI FRANCESCO-A.C.R.A.F. S.P.A.

BRp pastila [3 mg/1 Pastila, Lozenga] 20 pastila (2 PVC/PE/PVdC-AL blistera sa po 10 pastila) u kutiji

R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH PLUĆNIH BOLESTI

R03A Adrenergici, inhalacioni

R03AC Selektivni agonisti beta-2-adrenergičkih receptora

R03AC02 salbutamol

Doziranje: *suspenzija za inhalaciju pod pritiskom:* akutni napad astme: kod odraslih i djece preko 12 godina, 1-2 inhalacije maksimalno 8 inhalacija dnevno; kod djece od 4-11 godina uobičajna doza je 1 inhalacija, može se povećati na dvije; *prevencija astmatičnog napada prije izlaganja alergenu ili fizičkom naporu:* kod odraslih i djece preko 12 godina, 2 inhalacije 10-15 minuta prije izlaganja izazivačima; kod djece od 4-11 godina uobičajna doza je 1 inhalacija, može se povećati na dvije; *hronična terapija astme:* 2 inhalacije do 4 puta dnevno; **rastvor za raspršivanje:** *tretmani hroničnog bronhospazma kod pacijenata koji ne odgovaraju na konvencionalnu terapiju; tretman akutne teške astme (Status asthmaticus):* povremena primjena: 0,5-1,0 ml rastvora razrijeđeno fiziološkim rastvorom do 2 ili 2,5 ml inhalirati pomoću nebulizatora (raspršivača) sve dok ne nestane aerosol (oko 10 min) ili nerazrijeđeno 2,0 ml rastvora inhalirati pomoću nebulizatora (3-5 min); može se ponoviti 4 puta dnevno; kontinuirana primjena: 1 do 2 ml rastvora se razblaži do 100 ml tečnosti i inhalira pomoću nebulizatora (1-2 mg po satu).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SALBUAL - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Rp suspenzija za inhaliranje pod pritiskom [100 µg/1 doza] 200 doza
suspenzije za inhaliranje pod pritiskom u aluminijskom spremniku, u
kutiji

SALRES - DEVA HOLDING A.S.

Rp suspenzija za inhaliranje pod pritiskom [100 µg/1 doza] 200 doza
suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u aluminijskom spremniku),
u kutiji

SPALMOTIL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp rastvor za raspršivanje [5 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 10 ml
rastvora za raspršivanje, u kutiji

VENTOLIN - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

Rp rastvor za raspršivanje [5 mg/1 mL] 1 bočica sa 20 ml rastvora za
raspršivanje, u kutiji

VENTOLIN INHALER - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

Rp suspenzija za inhalaciju pod pritiskom [100 µg/1 doza] 1 inhaler sa
200 doza suspenzije za inhalaciju pod pritiskom, u kutiji

R03AC13 formoterol

Doziranje: reverzibilna opstrukcija disajnih puteva kod pacijenata koji zahtijevaju dugotrajnu redovnu terapiju bronhodilatatorima, noćna astma kod pacijenata koji zahtijevaju dugotrajnu redovnu terapiju bronhodilatatorima, profilaksa bronhospazama izazvanih vježbanjem kod pacijenata koji zahtijevaju dugotrajnu redovnu terapiju bronhodilatatorima, hronična astma kod pacijenata koji redovno upotrebljavaju inhalacione kortikosteroide: prašak za inhaliranje - djeca 6-11 god. 12 mcg 2 puta dnevno, dnevna doza 24 mcg trebala bi biti dovoljna za većinu djece, osim za mlađe starije-grupe, više doze bi trebale biti rijetko upotrijebljene, i to samo onda kada se kontrola ne može postići nižim dozama; djeca 12-17 god. 12 mcg 2 puta dnevno, doza se može povećati kod jake opstrukcije disajnih puteva na 24 mcg 2 puta dnevno; dnevna doza 24 mcg trebala bi biti dovoljna za većinu djece, osim za mlađe starije-grupe, više doze bi trebale biti rijetko upotrijebljene, i to samo onda kada se kontrola ne može postići nižim dozama; odrasli: 12 mcg 2 puta dnevno, doza se može povećati kod jake opstrukcije disajnih puteva na 24 mcg 2 puta dnevno; hronična opstruktivna plućna bolest: prašak za inhaliranje, odrasli, 12 mcg 2 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FOTEROL - DEVA HOLDING A.S.

Rp prašak za inhaliranje, tvrda kapsula [12 µg/1 kapsula] 60 tvrdih
kapsula sa praškom za inhaliranje (6 Al/OPA-Al-PVC blistera sa po
10 kapsula) i 1 uređaj, jednodozni za inhaliranje suhog praška, u
kutiji

R03AC18 indakaterol

Doziranje: *terapija održavanja hronične opstruktivne plućne bolesti:* odrasli preko 18 godina 150 mcg jednom dnevno, povećati do maks. 300 mcg. jednom dnevno (isključivo po preporuci ljekara). Onbrez Breezhaler kapsule moraju se primjenjivati samo uz pomoć Onbrez Breezhaler inhalatora (kapsule se ne smiju progutati)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ONBREZ BREEZHALER - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp prašak za inhalaciju, tvrda kapsula [150 µg/1 kapsula] 30 tvrdih
kapsula sa praškom za inhalaciju (3 PA/Al/PVC - blistera po 10
kapsula) i inhalator, u kutiji

R03AK *Adrenergici u kombinaciji sa kortikosteroidima ili drugim lijekovima, isključujući antiholinergike*

R03AK06 flutikazon, salmeterol

Doziranje: redovno liječenje astme za koju je indicirana primjena kombinovanog lijeka (dugodjeljućeg beta-2 agonista i inhalacijskog kortikosteroida): odrasli i djeca iznad 12 god. dvije inhalacije suspenzije ili jedna inhalacija praška (formulacija u obliku diska ili tvrde kapsule) u dozi koju odredi ljekar, dva puta na dan; djeca 4-12 god. dvije inhalacije suspenzije 25 mcg salmeterola/50 mcg flutikazona dva puta na dan ili jedna inhalacija praška 50 mcg salmeterola/100 mcg flutikazona dva puta dnevno; hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP): odrasli, dvije inhalacije suspenzije (25 mcg salmeterola/250 mcg flutikazona) dva puta dnevno ili jedna inhalacija praška (formulacija u obliku diska ili tvrde kapsule u dozi 50 mcg salmeterola/500 mcg flutikazona); ne postoje podaci o primjeni kod djece mlađe od 4 godine.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AIRFLUSAL FORSPIRO - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

- Rp prašak za inhaliranje, podijeljeni [250 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 1 plastični inhalator koji sadrži OPA/Al/PVC/Al blister trakice sa 60 doza praška, u kutiji
- Rp prašak za inhaliranje, podijeljeni [500 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 1 plastični inhalator koji sadrži OPA/Al/PVC/Al blister trakice sa 60 doza praška, u kutiji

BREQUAL - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

- Rp prašak za inhalaciju, tvrda kapsula [100 µg/1 kapsula+ 50 µg/1 kapsula] 60 kapsula (6 Al/Al blistera po 10 kapsula) i Qhaler inhalacioni uređaj, u kutiji
- Rp prašak za inhalaciju, tvrda kapsula [250 µg/1 kapsula+ 50 µg/1 kapsula] 60 kapsula (6 Al/Al blistera po 10 kapsula) i Qhaler inhalacioni uređaj, u kutiji
- Rp prašak za inhalaciju, tvrda kapsula [500 µg/1 kapsula+ 50 µg/1 kapsula] 60 kapsula (6 Al/Al blistera po 10 kapsula) i Qhaler inhalacioni uređaj, u kutiji

FLONSENO - ALKALOID AD SKOPJE

- Rp suspenzija za inhalaciju pod pritiskom [125 µg/1 doza+ 25 µg/1 doza] aluminijumski kontejner pod pritiskom (inhaler) sa 120 doza suspenzije za inhalaciju, u kutiji
- Rp suspenzija za inhalaciju pod pritiskom [250 µg/1 doza+ 25 µg/1 doza] aluminijumski kontejner pod pritiskom (inhaler) sa 120 doza suspenzije za inhalaciju, u kutiji
- Rp suspenzija za inhalaciju pod pritiskom [50 µg/1 doza+ 25 µg/1 doza] aluminijumski kontejner pod pritiskom (inhaler) sa 120 doza suspenzije za inhalaciju, u kutiji

RESPIRO - DEVA HOLDING A.S.

- Rp suspenzija za inhaliranje pod pritiskom [125 µg/1 doza+ 25 µg/1 doza] 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/125 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom, u kutiji
- Rp suspenzija za inhaliranje pod pritiskom [250 µg/1 doza+ 25 µg/1 doza] 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/250 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom, u kutiji

Rp	suspenzija za inhaliranje pod pritiskom [50 µg/1 doza+ 25 µg/1 doza] 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/50 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom u kutiji
RESPIRO-D - DEVA HOLDING A.S.	
Rp	prašak za inhaliranje, tvrda kapsula [100 µg/1 kapsula+ 50 µg/1 kapsula] 60 tvrdih kapsula (6 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula) i 1 jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška
Rp	prašak za inhaliranje, tvrda kapsula [250 µg/1 kapsula+ 50 µg/1 kapsula] 60 tvrdih kapsula (6 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula) i 1 jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška
Rp	prašak za inhaliranje, tvrda kapsula [500 µg/1 kapsula+ 50 µg/1 kapsula] 60 tvrdih kapsula (6 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula) i 1 jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška
SALDISK - CELON PHARMA S.A.	
Rp	prašak inhalata, dozirani [100 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji
Rp	prašak inhalata, dozirani [250 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji
Rp	prašak inhalata, dozirani [500 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji
SERETIDE DISKUS - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED	
Rp	prašak za inhaliranje [100 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 1 plastični dozator (diskus) sa mjeracem doza sa blister trakom sa 60 pojedinačnih doza praška za inhaliranje, u kutiji
Rp	prašak za inhaliranje [250 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 1 plastični dozator (diskus) sa mjeracem doza sa blister trakom sa 60 pojedinačnih doza praška za inhaliranje, u kutiji
Rp	prašak za inhaliranje [500 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 1 plastični dozator (diskus) sa mjeracem doza sa blister trakom sa 60 pojedinačnih doza praška za inhaliranje, u kutiji
SERETIDE INHALER - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED	
Rp	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom [125 µg/1 doza+ 25 µg/1 doza] 1 metalni spremnik (sa 120 doza) s odmjernim ventilom, u plastičnom raspršivaču u kutiji
Rp	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom [250 µg/1 doza+ 25 µg/1 doza] 1 metalni spremnik (sa 120 doza) s odmjernim ventilom, u plastičnom raspršivaču u kutiji
Rp	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom [50 µg/1 doza+ 25 µg/1 doza] 1 metalni spremnik (sa 120 doza) s odmjernim ventilom, u plastičnom raspršivaču u kutiji
SPYRO - ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC.	
Rp	prašak za inhalaciju, podijeljeni [500 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 60 Al/Al traka sa po dva blistera ispunjena sa praškom za inhalaciju + 1 inhalator Elpenhaler, u kutiji
Rp	prašak za inhaliranje, podijeljeni [100 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 60 Al/Al traka sa po dva blistera ispunjena sa praškom za inhalaciju + 1 inhalator Elpenhaler, u kutiji

Rp prašak za inhaliranje, podijeljeni [250 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza] 60 Al/Al traka sa po dva blistera ispunjena sa praškom za inhalaciju + 1 inhalator Elpenhaler, u kutiji

R03AK07 budesonid, formoterol

Doziranje: redovno liječenje astme za koju je indikovana primjena kombinovanog lijeka (dugodjelujućeg beta-2 agonista i inhalacijskog kortikosteroida): odrasli, 18 godina i više, dva puta dnevno (ujutro i uveče) po 1-2 inhalacije budesonid/formoterol u dozi 160/4,5 mcg, odnosno 2 puta dnevno po 1 inhalaciju budesonid/formoterol u dozi 320/9 mcg, maksimalno 2 inhalacije dva puta dnevno; bolesnici koji uzimaju dnevnu dozu održavanja za održavanje kontrole bolesti mogu dodatno da uzmu po potrebi dozu lijeka sa nižom dozom, za brzo olakšavanje tegoba u zavisnosti od simptoma (odjednom se ne smije uzeti više od 6 inhalacija, a maks. dnevna doza je 8 inhalacija); djeca 12-17 god. 1-2 inhalacije 160/4,5 mcg 2 puta dnevno; hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP): odrasli, 18 god. i stariji, dvije inhalacije dva puta dnevno (budesonid/formoterol u dozi 160/4,5 mcg) odnosno jedna inhalacija dva puta dnevno (budesonid/formoterol u dozi 320/9 mcg)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AIRBUO FORSPIRO - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Rp prašak za inhalaciju, podijeljeni [160 µg/1 doza+ 4,5 µg/1 doza] 1 plastični inhalator koji sadrži blister (OPA/Al/PVC-Al) sa 60 doza praška za inhaliranje, podjeljenog, u kutiji

Rp prašak za inhalaciju, podijeljeni [160 µg/1 doza+ 4,5 µg/1 doza] 2 plastična inhalatora koji sadrže blister (OPA/Al/PVC-Al) sa po 60 doza praška za inhaliranje, podjeljenog, u kutiji

DUORESP SPIROMAX - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

Rp prašak inhalata [160 µg/1 doza+ 4.5 µg/1 doza] 120 doza (aluminijumska bočica u plastičnom raspršivaču), u kutiji

Rp prašak inhalata [320 µg/1 doza+ 9 µg/1 doza] 60 doza (aluminijumska bočica u plastičnom raspršivaču), u kutiji

R03AK08 beklometazon, formoterol

Doziranje: u terapiji astme u slučaju kada je potrebno primijeniti kombinovani lijek (inhalacioni kortikosteroid u kombinaciji sa dugodjelujućim β2 agonistom): odrasli iznad 18 god, 1-2 inhalacije 2 puta dnevno, maksimalna dnevna doza 4 inhalacije; ne primjenjuje se za liječenje akutnih napada astme; hronična opstruktivna plućna bolest: odrasli iznad 18 god, 2 puta dnevno 2 udaha

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AFORBE - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

Rp rastvor za inhaliranje pod pritiskom [100 µg/1 doza+ 6 µg/1 doza] 1 inhalator sa 120 doza, u kutiji

BLOCETTA - PHARMAS D.O.O.

Rp stlačeni inhalat, otopina [100 µg/1 Potisak+ 6 µg/1 Potisak] Aluminijski spremnik s odmjernim ventilom, uložen u plastični inhalator koji se aktivira potiskom i zatvoren zaštitnim poklopcem, u kutiji.

FOROBEC - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

Rp rastvor za inhalaciju pod pritiskom [100 µg/1 doza+ 6 µg/1 doza] 1 aluminijski spremnik pod pritiskom sa 180 doza, u kutiji

FOSTER - CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH

Rp stlačeni inhalat, otopina [200 µg/1 doza+ 6 µg/1 doza] 1 inhalator sa 180 doza, u kutiji

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

- Rp stlačeni inhalat, otopina [200 µg/1 doza+ 6 mg/1 doza] 1 inhalator sa 120 doza, u kutiji
- FOSTER 100 MG/6 MG - CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH**
- Rp stlačeni inhalat, otopina [100 µg/1 doza+ 6 µg/1 doza] 1 aluminijumski spremnik sa 120 doza stlačenog inhalata, otopine, u kutiji
- Rp stlačeni inhalat, otopina [100 µg/1 doza+ 6 µg/1 doza] 1 aluminijumski spremnik sa 180 doza stlačenog inhalata, otopine, u kutiji
- FOSTER NEXTHALER - CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH**
- Rp prašak za inhaliranje [100 µg/1 doza+ 6 µg/1 doza] 1 inhalator sa 1,5 g praška za inhaliranje (120 doza), u zaštitnoj zatvorenoj vrećici, u kutiji
- RESPIREX - STADA ARZNEIMITTEL AG**
- Rp rastvor za inhalaciju pod pritiskom [100 µg/1 doza+ 6 µg/1 doza] 1 aluminijumski spremnik sa mjernim ventilom i aktivatorom sa 180 doza rastvora za inhalaciju pod pritiskom, u kutiji

R03AK10 flutikazon, vilanterol

Doziranje: *astma:* odrasli i adolescenti u dobi od 12 i više godina, 1 inhalacija lijeka od 92/22 mikrograma jednom na dan (doza se može povećati na 184/22 mikrograma u slučaju bolje kontrole ili povećane potrebe); *hronična opstruktivna bolest pluća:* odrasli iznad 18 god, 1 inhalacija lijeka 92/22 mikrograma jednom na dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

RELVAR ELLIPTA - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

- Rp prašak za inhalaciju, podijeljeni [184 µg/1 doza+ 22 µg/1 doza] 1 inhalator od 30 doza, u kutiji
- Rp prašak za inhalaciju, podijeljeni [92 µg/1 doza+ 22 µg/1 doza] 1 inhalator od 30 doza, u kutiji

R03AK11 flutikazon, formoterol

Doziranje: *profilaksa astme:* inhalacijom aerosola, FLUTIFORM 50 djeca 5-17 god. 2 potiska 2 puta dnevno, odrasli 2 potiska 2 puta dnevno; FLUTIFORM 125 djeca 12-17 god. 2 potiska 2 puta dnevno, odrasli 2 potiska 2 puta dnevno; FLUTIFORM 250 odrasli 2 potiska 2 puta dnevno;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FLUTIFORM - MUNDIPHARMA DC B.V.

- Rp suspenzija za inhaliranje pod pritiskom [125 µg/1 doza+ 5 µg/1 doza] 1 inhalator sa 120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom, u Al kesici, u kutiji
- Rp suspenzija za inhaliranje pod pritiskom [250 µg/1 doza+ 10 µg/1 doza] 1 inhalator sa 120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom, u Al kesici, u kutiji
- Rp suspenzija za inhaliranje pod pritiskom [50 µg/1 doza+ 5 µg/1 doza] 1 inhalator sa 120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom, u Al kesici, u kutiji

R03AK14 indakaterol, mometazon

Doziranje: *profilaksa astme:* inhalacijom praška, jedna inhalacija jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ATECTURA BREEZHALER - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp prašak za inhalaciju, tvrda kapsula [125 µg/1 kapsula+ 127,5 µg/1 kapsula] 30 kapsula (3 PA/Al/PVC-Aluminijski performirani blister sa po 10 kapsula s jediničnim dozama i inhalerom), u kutiji

R03AL *Adrenergici u kombinaciji sa antiholinergicima uključujući trostruke kombinacije sa kortikosteroidima*

R03AL02 ipratropijum bromid, salbutamol

Doziranje: *bronhospazam u hroničnoj opstruktivnoj plućnoj bolesti:* inhalacijom rastvora za raspršivanje, odrasli i djeca preko 12 god. 1 ampula (2,5 ml) 3-4 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IPRATROPIJEV BROMID/SALBUTAMOL CIPLA - CIPLA EUROPE

Rp rastvor za raspršivanje [0,5 mg/1 ampula+ 2,5 mg/1 ampula] 60 ampula po 2,5 ml rastvora za raspršivanje (12 kesica po 5 ampula), u kutiji

R03AL04 glikopironijum bromid, indakaterol

Doziranje: *terapija održavanja kod hronične opstruktivne plućne bolesti:* inhalacija sadržaja jedne kapsule jedanput na dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ULTIBRO BREEZHALER - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp prašak za inhalaciju, tvrda kapsula [43 µg/1 doza+ 85 µg/1 doza] 30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju (3 blistera sa po 10 kapsula) i inhalator, u kutiji

R03AL05 aklidinijum bromid, formoterol

Doziranje: *terapija održavanja kod bolesnika s HOBP:* odrasli, 1 inhalacija 2 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BRIMICA GENUAIR - BERLIN-CHEMIE AG

Rp prašak za inhaliranje [396 µg/1 doza+ 11.8 µg/1 doza] 1 inhalator sa 60 doza (u zaštitnoj vrećici), u kutiji

Rp prašak za inhaliranje [396 µg/1 doza+ 11.8 µg/1 doza] 3 inhalatora po 60 doza (u zaštitnim vrećicama), u kutiji

R03AL06 olodaterol, tiotropijum-bromid

Doziranje: *terapija održavanja hronične opstruktivne plućne bolesti:* inhalaciono, odrasli 2 potiska jedanput dnevno, u isto doba svakog dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SPIOLTO RESPIMAT - BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO.KG

Rp rastvor za inhaliranje [2,5 µg/1 doza+ 2,5 µg/1 doza] 1 Respimat inhalator i 1 uložak (30 doza), u kutiji

R03AL09 beklometazon, formoterol, glikopironijum bromid

Doziranje: *umjerena do teška hronična opstruktivne plućna bolest; terapija održavanja astme:* inhalacijom aerosola, odrasli 2 inhalacije 2 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TRIMBOW - CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH

Rp stlačeni inhalat, otopina [87 µg/1 doza+ 5 µg/1 doza+ 9 µg/1 doza] 1 inhalator od 180 doza, u kutiji

R03AL12 **glikopironijum bromid, indakaterol, mometazon**

Doziranje: *profilaksa astme:* inhalacijom praška, jedna inhalacija jednom dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ENERZAIR BREEZHALER - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp prašak inhalata, dozirani [58 µg/1 doza+ 114 µg/1 doza+ 136 µg/1 doza] 30 kapsula i 1 inhalator

R03B ***Ostali lijekovi za liječenje opstruktivnih plućnih bolesti, inhalacioni***

R03BA ***Glukokortikoidi***

R03BA01 **beklometazon**

Doziranje: *profilaktičko liječenje blage astme:* 100 do 200 mcg dnevno, podijeljeno u 2 doze; *profilaktičko liječenje umjerene astme:* 200 do 400 mcg dnevno, podijeljeno u 2 doze i *profilaktičko liječenje teške astme:* 400 do 800 mcg dnevno, podijeljeno u 2 doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:

QVAR AUTOHALER - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

Rp rastvor za inhaliranje pod pritiskom [100 µg/1 doza] 200 doza u aluminijskom spremniku od 10 ml s odmjernim ventilom u plastičnom aktivatoru, u kutiji

R03BA02 **budesonid**

Doziranje: prašak za inhalaciju-profilaksa umjerene do teške astme, hronična opstruktivna bolest pluća: odrasli i djeca preko 12 godina, početna doza 200-400 mcg 2 puta dnevno, maks. 800 mcg 2 puta dnevno; djeca 6-12 godina: početna doza 200 mcg 2 puta dnevno ili 200-400 mcg jednom dnevno, maks. 400 mcg 2 puta dnevno; u slučaju doziranja jednom dnevno, dozu uzeti u večernjim satima; suspenzija za raspršivanje - bronhijalna astma: početak liječenja, odrasli i djeca starija od 12 god. 1-2 mg dva puta dnevno; djeca 3 mjeseca do 12 god. 0,5 - 1 mg dva puta dnevno; terapija održavanja, odrasli i djeca preko 12 god. 0,5 - 1 mg dva puta dnevno; pedijatrijska populacija djeca 3 mjeseca do 12 god. 0,25 - 0,5 mg dva puta dnevno; *kod novorođenčadi i djece koji boluju od krupa (akutna virusna infekcija gornjeg dijela respiratornog trakta poznata i kao virusni laringotraheobronhitis ili subglotislari laringitis) kod kojih je indikovana hospitalizacija:* 2 mg odjednom ili podijeljeno po 1 mg na 30 min, doziranje se može ponoviti na svakih 12 sati do maksimalno 36 sati, ili do kliničkog poboljšanja

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BUDEKORT - STADA ARZNEIMITTEL AG

Rp suspenzija za raspršivanje [0,5 mg/2 mL] 20 ampula (4 kesice od PET/Al/PE folije po 5 LDPE ampula) u kutiji

Rp suspenzija za raspršivanje [1 mg/2 mL] 20 ampula (4 kesice od PET/Al/PE folije po 5 LDPE ampula) u kutiji

BUDELIN NOVOLIZER - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

Rp prašak za inhalaciju [200 µg/1 doza] 1 inhalator i 1 umetak sa 200 doza, u kutiji

CORTAIR - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Rp suspenzija za raspršivanje [0,25 mg/1 mL] 20 jednodoznih LDPE bočica, jediničnog volumena 2ml, pakovano u hermetički zatvorene omotnice od aluminijske folije (4 omotnice od aluminijumske folije, svaka sadrži 5 bočica s jednom dozom od 2ml), u kartonskoj kutiji.

Rp suspenzija za raspršivanje [0,5 mg/1 mL] 20 jednodoznih LDPE bočica, jediničnog volumena 2ml, pakovano u hermetički zatvorene

omotnice od aluminijske folije (4 omotnice od aluminijumske folije , svaka sadrži 5 bočica s jednom dozom od 2ml), u kartonskoj kutiji.

R03BA05 flutikazon

Doziranje: *prevencija astme:* odrasli i djeca starija od 16 godina, blaga astma do 250 mcg dva puta na dan, umjereno teška astma 250 do 500 mcg dva puta na dan, teška astma 500 do 1000 mcg dva puta na dan; djeca starija od 4 godine: 50 do 100 mcg dva puta na dan; *hronična opstruktivna bolest pluća:* odrasli, 500 mcg dva puta na dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FLIXON - DEVA HOLDING A.S.

- Rp suspenzija za inhaliranje pod pritiskom [125 µg/1 doza] 120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u spremniku sa ventilom za doziranje, raspršivačem i zaštitnom kapicom), u kutiji
- Rp suspenzija za inhaliranje pod pritiskom [50 µg/1 doza] 120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u spremniku sa ventilom za doziranje, raspršivačem i zaštitnom kapicom), u kutiji

FLIXOTIDE INHALER - GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

- Rp suspenzija za inhalaciju pod pritiskom [125 µg/1 doza] 1 inhaler/60 doza, u kutiji
- Rp suspenzija za inhalaciju pod pritiskom [250 µg/1 doza] 1 inhaler/60 doza, u kutiji
- Rp suspenzija za inhalaciju pod pritiskom [50 µg/1 doza] 1 inhaler/120 doza

R03BB Antiholinergici

R03BB01 ipratropijum bromid

Doziranje: *otopina za inhalaciju;* reverzibilni bronhospazam povezan sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolešću, liječenje reverzibilne opstrukcije disajnih puteva u akutnoj i hroničnoj astmi kada je potrebno liječenje u kombinaciji sa inhalacionim β2 agonistima: terapija održavanja: odrasli i adolescenti iznad 12 godina, 1,0 ml (20 kapi=0,25 mg) do 2,0 ml (40 kapi=0,5 mg) 3-4 puta dnevno; djeca 6-12 godina, 1,0 ml 3-4 puta dnevno; djeca do 5 godina starosti, 0,4-1,0 ml (8-20 kapi=0,1-0,25 mg) 3-4 puta dnevno; akutni napadi: odrasli i djeca iznad 12 godina, 2,0 ml; djeca 6-12 godina: 1,0 ml do 2,0 ml; djeca do 5 godina starosti: 0,4-1,0 ml; vremenski interval doziranja određuje ljekar; ipratropijum bromid se ne primjenjuje češće od svakih 6 sati kod djece ispod 5 godina; **aerosol za inhalaciju;** sprečavanje i liječenje bronhospazma kod hronične opstruktivne bolesti respiratornog trakta; blage do umjereno teške bronhijalne astme (gdje beta-2-mimetici nisu indikovani ili kao dodatak beta-2-mimeticima za liječenje akutnih napada): profilaksa i trajno liječenje: odrasli i djeca iznad 6 godina, 1-2 inhalacije, više puta dnevno; prosječna dnevna doza je 1-2 inhalacije 3-4 puta na dan; ukupna dnevna doza ne bi smjela biti veća od 12 inhalacija.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ATROVENT - BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO.KG

- Rp otopina za nebulizator [0.25 mg/1 mL] 1 smeđa staklena bočica sa 20 ml otopine s polietilenskom kapaljkom i polipropilenskim čepom, u kutiji

R03BB04 tiotropijum-bromid

Doziranje: inhalacijom praška, *terapija održavanja hronične opstruktivne plućne bolesti:* odrasli, jedna kapsula jednom dnevno (isporučena doza Spiriva praška za inhalaciju i Braltus praška za inhalaciju su iste - 10 mcg); **RespiMAT** (rastvor za inhalaciju) -

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

inhalacijom, *terapija održavanja hronične opstruktivne plućne bolesti*, odrasli preko 18 god, 5 mcg (2 potiska) jedanput dnevno; *terapija održavanja astme*: odrasli preko 18 god. 5 mcg (2 potiska) jedanput dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ACOPAIR - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

Rp prašak za inhalaciju, tvrda kapsula [18 µg/1 kapsula] 30 tvrdih kapsula (3 Aluminij / Aluminij-PVC blistera sa po 10 kapsula) i NeumoHaler uređaj za inhalaciju, u kutiji

ATRUS ARVOHALER - ARVEN ILAC SAN. VE TIC.A.S.

Rp prašak za inhalaciju [0,0217 mg/1 inhalacija] 1 inhalator sa 30 doza praška za inhalaciju (u Al /Al strip blisteru) u kutiji

BRALTUS - TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

Rp prašak za inhaliranje, tvrda kapsula [10 µg/1 doza] 30 kapsula u bočici i 1 inhalator Zonda, u kutiji

BRONTIO - DEVA HOLDING A.S.

Rp prašak za inhalaciju, tvrda kapsula [22 µg/1 kapsula] 30 kapsula tvrdih (3 PVC/PVDC-Alu blistera sa po 10 kapsula) u aluminijskoj vrećici i jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška, u kutiji

CORIVA - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp prašak inhalata, tvrda kapsula [14 µg/1 kapsula] 30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju u HDPE bočici sa sigurnosnim zatvaračem za djecu i uređaj za inhalaciju, u kutiji

Rp prašak inhalata, tvrda kapsula [18 µg/1 kapsula] 1 HDPE bočica sa 30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju i 1 inhaler, u kutiji.

SPIRIVA - BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO.KG

Rp prašak za inhalaciju, tvrda kapsula [18 µg/1 kapsula] 30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju (3 Al/PVC/Al - blistera po 10 kapsula) i uređaj za inhalaciju "HandiHaler", u kutiji

Rp prašak za inhalaciju, tvrda kapsula [18 µg/1 kapsula] 30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju (3 Al/PVC/Al - blistera po 10 kapsula), u kutiji

SPIRIVA RESPIMAT - BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO.KG

Rp rastvor za inhalaciju [2,5 µg/1 doza] 1 Respimat inhalator i 1 uložak sa 4 mL rastvora za inhalaciju za 60 potisaka (30 terapijskih doza), u kutiji

TIOSAL - ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC.

Rp prašak za inhaliranje, podijeljeni [10 µg/1 doza] 30 doza (papir/PET/aluminij-PVC/aluminij/OPA blister traka, upakovanih u PET/ALU/PE vrećice zajedno sa desikant vrećicom i uređajem za inhaliranje Elpenhaler), u kutiji

R03BB05 aklidinijum

Doziranje: *terapija održavanja kod hronične opstruktivne plućne bolesti*: odrasli preko 18 god. 1 inhalacija 2 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BRETARIS GENUAIR - BERLIN-CHEMIE AG

Rp prašak za inhaliranje [322 µg/1 doza] 1 inhalator sa 60 doza praška za inhaliranje, u kutiji

Rp prašak za inhaliranje [322 µg/1 doza] 3 inhalatora sa po 60 doza praška za inhaliranje, u kutiji

R03BB06 glikopironijum bromid

Doziranje: *terapija održavanja kod hronične obstruktivne bolesti pluća:* odrasli preko 18 godina inhalirati sadržaj jedne kapsule jednom dnevno, svakog dana u isto vrijeme; ne uzimati više od jedne doze dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MASARU - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp prašak za inhalaciju, tvrda kapsula [50 µg/1 kapsula] 30 kapsula (3 Al-Al blister sa 10 kapsula) i 1 inhalator, u kutiji

Rp prašak za inhalaciju, tvrda kapsula [50 µg/1 kapsula] 90 kapsula (9 Al-Al blistera sa po 10 kapsula) i 1 inhalator, u kutiji

SEBRALER - DEVA HOLDING A.S.

Rp prašak za inhaliranje, tvrda kapsula [44 µg/1 doza] 30 providnih narandžastih kapsula (3 OPA/AL/PVC blistera po 10 kapsula) i 1 inhalator, u kartonskoj kutiji

SEEBRI BREEZHALER - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp prašak za inhaliranje, tvrda kapsula [44 µg/1 doza] 30 tvrdih kapsula (3 PA/Alu/PVC – Alu blistera po 10 kapsula) i 1 inhalator u kutiji

R03C Adrenergici za sistemsku primjenu
R03CC Selektivni agonisti beta-2-adrenergičkih receptora

R03CC02 salbutamol

Doziranje: *astma i druga stanja povezana sa reverzibilnom opstrukcijom disajnih puteva:* odrasli 4 mg, 3-4 puta dnevno, maksimalno 8 mg 3-4 puta dnevno; djeca starija od 12 god. 2-4 mg 3-4 puta dnevno; djeca 6-12 godina 2 mg 3-4 puta dnevno; djeca 2-6 godina 1-2 mg 3-4 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ONTRIL - BOSNALIJEK D.D.

Rp sirup [2 mg/5 mL] 200 mL sirupa u smeđoj staklenoj boci sa sigurnosnim zatvaračem za djecu (CRC/TE), u kutiji

Rp tableta [2 mg/1 tableta] 60 tableta (3 PVC/PVDC//AI - blistera po 20 tableta), u kutiji

SPALMOTIL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp oralni rastvor [2 mg/5 mL] 1 staklena boca sa 200 ml oralnog rastvora i kašika za doziranje od 5ml, u kutiji

Rp oralni rastvor [2 mg/5 mL] 1 staklena boca sa 200 ml oralnog rastvora i kašikom za doziranje od 5ml, u kutiji

Rp tableta [2 mg/1 tableta] 60 tableta (4 blistera po 15 tableta)

R03D Ostali lijekovi za sistemsku primjenu u terapiji
opstruktivnih plućnih bolesti

R03DA Ksantini

R03DA04 teofilin

Doziranje: *terapija i prevencija respiratornih poremećaja izazvanih opstrukcijom disajnih puteva (bronhokonstrikcija) kod pacijenata sa perzistentnom astmom i hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (hronični bronhitis i emfizem pluća):* odrasli i djeca 6-17 god. 200 mg 2 puta dnevno, podešavati prema odgovoru do 400 mg 2 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TEOKAP SR - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

Rp	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda [100 mg/1 kapsula] 30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih (2 PVC/Al - blistera po 15 kapsula) u kutiji
Rp	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda [200 mg/1 kapsula] 30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih (2 PVC/Al - blistera po 15 kapsula) u kutiji
Rp	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda [300 mg/1 kapsula] 30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih (2 PVC/Al - blistera po 15 kapsula) u kutiji
TEOTARD - KRKA, TOVARNA ZDRAVLJ, D.D., NOVO MESTO	
Rp	kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda [200 mg/1 kapsula] 40 kapsula s produženim oslobađanjem, tvrdih (4 PVC/Al - blistera po 10 kapsula), u kutiji
Rp	kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda [350 mg/1 kapsula] 40 kapsula s produženim oslobađanjem, tvrdih (4 PVC/Al - blistera po 10 kapsula) u kutiji

R03DA05 aminofilin

Doziranje: terapija i profilaksa bronhospazma kod astme, hronične opstruktivne bolesti pluća i hroničnog bronhitisa; insuficijencija lijeve komore, kongestivna srčana insuficijencija: i.v. određivanje doze vrši se praćenjem koncentracije teofilina u plazmi, za više informacija o doziranju konsultovati literaturu proizvoda; oralno, tablete sa trenutnim oslobađanjem početna doza 1 tableta 2 puta na dan prvih 7 dana, zatim 1 tableta tri do četiri puta na dan na svakih 6-8 sati; oralno, tablete sa produženim djelovanjem 1 tableta 2 puta na dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AMINOFILIN ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

Rp	film tableta [100 mg/1 tableta] 50 film tableta (5 PVC/Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji
Rp	tableta s produženim oslobađanjem [350 mg/1 tableta] 20 tableta sa produženim oslobađanjem (2 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

AMINOFILIN BRAWN - BRAWN LABORATORIES LIMITED

ZU	rastvor za injekciju [25 mg/1 mL] 50 staklenih ampula od 10 ml, u kutiji

AMINOFILIN UNION - UNION-MEDIC DOO NOVI SAD

Rp	tableta sa produženim oslobađanjem [350 mg/1 tableta] 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

R03DC Antagonisti leukotrijenskih receptora

R03DC03 montelukast

Doziranje: liječenje astme kao dodatna terapija kod pacijenata dobi 6 mjeseci -5 god. sa blagom do umjereno teškom trajnom astmom koja nije dobro kontrolisana uzimanjem inhalacionih kortikosteroida i kod kojih se primjenom kratkodjelujućih β -agonista "po potrebi" ne može postići odgovarajuća klinička kontrola astme; *alternativa liječenju niskim dozama inhalacionih kortikosteroida* kod pacijenata dobi 2-5 god. s blagom trajnom astmom koji u anamnezi nisu imali nedavne teške napade astme zbog kojih je trebalo uzimati oralne kortikosteroide i kod pacijenata koji ne mogu uzimati inhalacione kortikosteroide; *profilaksa astme* kod pacijenata dobi od 2 godine i starijih kod kojih je prevladavajuća komponenta bolesti bronhokonstrikcija izazvana naporom: odrasli i djeca starija od 15 god. 10 mg jednom dnevno uveče, djeca 6-14 god. 5 mg jednom dnevno

uveče; djeca 6 mjeseci do 5 god. 4 mg jednom dnevno uveče; *otklanjanje simptoma sezonskog alergijskog rinitisa kod pacijenata sa astmom*: odrasli i djeca 15-17 mg, 10 mg jednom dnevno, uveče

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALECAST - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 PA/Al/PVC blistera po 14 tableta) u kutiji

AVADIL - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

Rp tableta [10 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp tableta za žvakanje [5 mg/1 tableta] 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

CULENTO - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Š.

Rp granule [4 mg/1 kesica] 28 papirnih kesica sa granulama, u kutiji

MONKASTA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

Rp tableta za žvakanje [4 mg/1 tableta] 28 tableta za žvakanje (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 tableta za žvakanje), u kutiji

Rp tableta za žvakanje [5 mg/1 tableta] 28 tableta za žvakanje (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 tableta za žvakanje), u kutiji

MONLAST - FARMAVITA D.O.O. SARAJEVO

Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp tableta za žvakanje [5 mg/1 tableta] 28 tableta za žvakanje (2 OPA/Al/PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

ONCEAIR - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Al/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp tableta za žvakanje [4 mg/1 tableta] 28 tableta za žvakanje (2 Al/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp tableta za žvakanje [5 mg/1 tableta] 28 tableta za žvakanje (2 Al/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

SINGULAIR - N.V. ORGANON

Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 28 filmom obloženih tableta (2 OPA/PVC/Al blistera po 14 filmom obloženih tableta), u kutiji

SINGULAIR JUNIOR - N.V. ORGANON

Rp tableta za žvakanje [5 mg/1 tableta] 28 tableta za žvakanje (2 OPA/PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

SINGULAIR MINI - N.V. ORGANON

Rp granule [4 mg/1 vrećica] 28 vrećica sa granulama, u kutiji

Rp tableta za žvakanje [4 mg/1 tableta] 28 tableta za žvakanje (2 OPA/PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

TELUKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 28 film tableta (4 PA/Al/PVC//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji

ZESPIRA - BILIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp film tableta [10 mg/1 tableta] 28 film tableta (2 Al/Al blistera po 14 tableta) u kutiji

**R03DX Ostali lijekovi za sistemsku primjenu u terapiji
opstruktivnih plućnih bolesti**

R03DX05 omalizumab

Doziranje: profilaksa teške perzistentne alergijske astme; hronični rinosinuzitis s nosnim polipima: s.c.inj. doziranje prema koncentraciji IgE antitijela i tjelesnoj masi (konsultovati literaturu proizvoda); **Dodatak terapiji hronične spontane urtikarije kod pacijenata koji nisu odgovorili na liječenje antagonistima H1 receptora:** s.c. 300 mg svake 4 nedjelje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

XOLAIR - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [150 mg/1 mL] 1 staklena napunjena šprica sa 1 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU/Rp	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [75 mg/0.5 mL] 1 staklena napunjena šprica sa 0,5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE

R05 suhi ekstrakt korijena pelargonije

Doziranje: tradicionalni biljni lijek za simptomatsko liječenje prehlade: oralno, djeca preko 12 god, odrasli i stariji, 2,5 ml sirupa 3 puta dnevno, djeca 6-11 god. 2,5 ml sirupa 2 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PELARIA - PHYTOPHARM KLEKA S.A.

BRp	sirup [20 mg/2.5 mL] 1 boca (smeđe staklo) sa 100 mL sirupa i LDPE špricom od 5 ml, u kutiji

**R05C Ekspektoransi, isključujući kombinacije sa
antitusicima**

**R05CA Destilat mješavine pročišćenih eteričnih ulja
eukaliptusa, slatke naranče, mirte i limuna**

**R05CA destilat mješavine pročišćenih eteričnih ulja
eukaliptusa, slatke naranče, mirte i limuna**

Doziranje: blaži oblici akutnog i hroničnog bronhitisa i sinuzitisa, pomoćna terapija kod težih oblika akutnog i hroničnog bronhitisa i sinuzitisa: odrasli, za akutna inflamatorna stanja uzima se jedna kapsula 3-4 puta na dan, kod hroničnih stanja, jedna kapsula se primjenjuje 2 puta na dan; djeca mlađa od 10 god, pola (1/2) doze preporučene za odrasle.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GELOMYRTOL FORTE - G.POHL BOSKAMP GMBH & CO.KG

BRp	gastrorezistentna kapsula, meka [-] 20 gastrorezistentnih kapsula, mekih (2 PVC/PVDC-Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

R05CA vodeni ekstrakt mješavine korijena jagorčevine i herbe timijana

Doziranje: tradicionalno se koristi za lakše iskašljavanje kod prehlada praćenih kašljem: odrasli i djeca preko 12 god, 1 kašiku za doziranje sirupa 4 puta dnevno; djeca 4-12 god, 1 kašiku za doziranje sirupa 3 puta dnevno; primjena sirupa kod djece mlađe od 4 god. se ne preporučuje; neposredno nakon uzimanja lijeka ne treba ništa jesti ni piti; preporučuje se da bolesnik uzima dovoljno čaja i toplih napitaka za vrijeme primjene

sirupa ako se simptomi ne povuku nakon 7 dana, neophodno je zatražiti savjet ljekara ili farmaceuta.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HERBION SIRUP OD JAGORČEVINE - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp sirup [3.08 g/5 mL] 1 smeđa staklena bočica s 150 ml sirupa i sa mjernom kašikom od 5 ml, u kutiji

R05CA10 **tečni ekstrakt korijena bijelog sljeza, tečni ekstrakt timijana**

Doziranje: *tradicionalni biljni lijek, ublažava iritiranu sluznicu grla i djeluje kao ekspektorans kod kašlja povezanog sa prehladom:* odrasli i adolescenti iznad 12 god. 10 ml svaka 3 sata (maks. do 6 puta na dan, maks. dnevna doza do 60 ml); djeca 4-11 god. 5 ml svaka 3 sata (maks. do 6 puta na dan, maks. dnevna doza do 30 ml); ne preporučuje se upotreba kod djece mlađe od 4 god.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BRONCHOSTOP SIRUP PROTIV KAŠLJA - KWIZDA PHARMA GMBH

BRp sirup [0,66 g/5.7 g+ 0,77 g/5.7 g] 150 ml sirupa (1 staklena bočica) i čašica za doziranje

R05CA10 **suhi ekstrakt timijana, tečni ekstrakt korijena bijelog sljeza**

Doziranje: *tradicionalni biljni lijek, ublažava iritiranu sluznicu grla i djeluje kao ekspektorans kod kašlja povezanog sa prehladom:* odrasli i adolescenti iznad 12 god. 15 ml svaka 3-4 sata (4-6 puta dnevno, maks. dnevna doza do 90 ml); djeca 4-12 god. 7,5 ml svaka 3-4 sata (4-6 puta dnevno, maks. dnevna doza do 45 ml); djeca 2-4 god. (samo uz konsultaciju sa ljekarom) 7,5 ml svaka 3-4 sata (4-6 puta dnevno; maks. dnevna doza do 45 ml); ne preporučuje se za djecu mlađu od 2 god.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BRONCHOSTOP SINE SIRUP PROTIV KAŠLJA - KWIZDA PHARMA GMBH

BRp sirup [0.12 g/15 mL+ 0,83 g/15 mL] 120 ml sirupa (1 staklena)

R05CA10 **suhi ekstrakt timijana**

Doziranje: *tradicionalni biljni lijek koji podstiče iskašljavanje postojane viskozne sluzi kod produktivnog kašlja nastalog usljed prehlade:* odrasli, adolescenti i djeca starija od 12 god. 1-2 pastile otopiti u ustima na 3-4 sata (4-6 puta na dan); djeca 6-12 god. 1 pastilu otopiti u ustima 3 puta dnevno; kod djece mlađe od 6 god. se ne preporučuje

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BRONCHOSTOP PASTILE PROTIV KAŠLJA - KWIZDA PHARMA GMBH

BRp pastila [59.5 mg/1 pastila] 20 pastila (2 PVC/PE/PVdC/Al blistera po 10 pastila), u kutiji

R05CA12 **suhi ekstrakt lista bršljana**

Doziranje: *ublažavanje simptoma hroničnih inflamatornih oboljenja bronhija; akutnih upala respiratornog trakta praćenih kašljem:* pastile, odrasli i djeca starija od 12 god. 1 pastilu 3-4 puta na dan; djeca 6-12. god. 1 pastilu 2 puta na dan; šumeća tableta, odrasli i djeca starija od 12 god. 1 šumeću tabletu ujutro i 1/2 šumeće tablete uveče; djeca 6-12. god. 1/2 šumeće tablete 2 puta na dan; oralna otopina, odrasli i djeca starija od 12 god. 5 ml 3 puta na dan, djeca 6-12. god. 5 ml 2 puta na dan; sirup, djeca 2-6 god. 2-2,5 ml 2 puta na dan, djeca 6-12. god. 2,8-5 ml 2 puta na dan, odrasli i djeca starija od 12 god. 4-5 ml 3 puta na dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BRONHOKLIR SIRUPI BRŠLJAN - HEMOFARM A.D. VRŠAC

BRp	sirup [35,1 mg/5 mL] bočica sa 125 ml sirupa i kašika za doziranje, u kutiji
HERBIFIT HEDERIN SIRUP - PHARMAMED D.O.O. TRAVNIK	
BRp	sirup [20 mg/5 mL - 40 mg/5 mL] 1 smeđa staklena bočica sa 100 ml sirupa i dozirna pipeta, u kutiji
HERBION BRŠLJAN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO	
BRp	pastila [35 mg/1 pastila] 16 pastila (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 8 pastila), u kutiji
BRp	pastila [35 mg/1 pastila] 24 pastile (3 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 8 pastila), u kutiji
BRp	sirup [7 mg/1 mL] 150 mL sirupa (1 staklena boca klase III (PhEur) sa 150 mL sirupa), u kutiji sa mjernom kašikom
PROSPAN AKUT - ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG	
BRp	šumeća tableta [65 mg/1 tableta] 10 šumećih tableta (5 strip-pakovanja po 2 šumeće tablete), u kutiji
PROSPAN LIQUID - ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG	
BRp	oralna otopina [35 mg/5 mL] 15 vrećica po 5 ml oralne otopine u kutiji
BRp	oralna otopina [35 mg/5 mL] 21 vrećica po 5 ml oralne otopine u kutiji
PROSPAN LIQUID - ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG	
BRp	oralna otopina [7 mg/1 mL] 1 boca sa 100 ml oralne otopine, u kutiji
BRp	oralna otopina [7 mg/1 mL] 1 boca sa 200 ml oralne otopine, u kutiji
PROSPAN SIRUP - ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG	
BRp	oralna otopina [0.7 g/100 mL] 1 smeđa staklena bočica sa 100 ml oralne otopine i dozna čašica od 10 ml u kartonskoj kutiji
BRp	sirup [7 mg/1 mL] smeđa staklena bočica sa 200 mL oralne otopine i dozna čašica od 10 mL, u kutiji

R05CA13 cineol

Doziranje: liječenje simptoma bronhitisa i prehlade; suportivna terapija u liječenju hroničnih inflamatornih stanja respiratornog trakta (npr. paranazalnih sinusa): odrasli i adolescenti preko 12 god. 200 mg 3 puta na dan, može se povećati na 200 mg 4 puta na dan, doza održavanja 200 mg 2 puta na dan; djeca u dobi 8-12 god. (25-43 kg) 100 mg do 3 puta dnevno; djeca 6-8 god. (20-24 kg) 100 mg do 3 puta na dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SINOLPAN - ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG

BRp gastorezistentna kapsula, meka [100 mg/1 mkapsula] 21 kapsula (1 PVC blister/ aluminijska folija sa 21 kapsulom), u kutiji

SINOLPAN FORTE - ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG

BRp gastorezistentna kapsula, meka [200 mg/1 kapsula] 21 kapsula (1 PVC blister /aluminijska folija sa 21 kapsulom) u kutiji

SINOLPAN FORTE - ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG

BRp gastorezistentna kapsula, meka [200 mg/1 kapsula] 50 kapsula (2 PVC blister /aluminijska folija po 25 kapsula), u kutiji

R05CB Mukolitici

R05CB01 acetilcistein

Doziranje: poremećaji disajnih organa praćeni prekomjernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta (akutni i hronični bronhitis i njegove egzacerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazije): djeca 2-5 god. 100 mg 4 puta dnevno; djeca 6-14 god. 200 mg 3 puta dnevno; odrasli i djeca preko 14 god. 600 mg jedanput dnevno ili 200 mg

tri puta dnevno; granule i šumeće tablete se upotrebljavaju rastvorene u vodi; ne preporučuju se kod djece mlađe od 2 god;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FLUIMUCIL 100 - ZAMBON S.P.A.

BRp granule za oralni rastvor [100 mg/1 g] 30 kesica sa po 1 g granula za oralni rastvor, u kartonskoj kutiji

FLUIMUCIL 200 - ZAMBON S.P.A.

BRp granule za oralni rastvor [200 mg/1 g] 30 kesica sa po 1 g granula za oralni rastvor, u kartonskoj kutiji

FLUIMUCIL 600 - ZAMBON S.P.A.

BRp šumeća tableta [600 mg/1 tableta] 10 šumećih tableta (5 blistera sa po 2 šumeće tablete), u kartonskoj kutiji

FLUIMUKAN AKUT - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

BRp šumeća tableta [600 mg/1 tableta] 10 šumećih tableta u PP tubi, u kutiji

FLUIMUKAN PLUS - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

BRp šumeća tableta [600 mg/1 tableta] 10 šumećih tableta (5 Al/papir folija sa 2 šumeće tablete) u kutiji

FLUIMUKAN ZA DJECU - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

BRp oralni rastvor [20 mg/1 mL] staklena bočica sa 100 ml oralnog rastvora i mjerna čašica, u kutiji

TRAKTUS - NOBEL ILAČ SANAYII VE TİCARET A. Ş.

BRp prašak za oralni rastvor [600 mg/1 vrećica] 10 (PET/Al/PET/PE) vrećica, u kutiji.

BRp prašak za oralni rastvor [600 mg/1 vrećica] 30 (PET/Al/PET/PE) vrećica, u kutiji.

R05CB02 bromheksin

Doziranje: liječenje akutnih i hroničnih bolesti disajnih puteva praćenih izlučivanjem gustog i ljepljivog sekreta (traheobronhitis, hronični opstruktivni bronhitis sa emfizemom, upale pluća, bronhiektazije, sinusitis); **sirup** - odrasli i djeca iznad 10 godina, 3 puta dnevno 10-20 ml; djeca 7-10 godina: 3 puta dnevno 5 ml; djeca 2-6 godina: 3 puta dnevno 2,5 ml. (Bisolex sirup se ne preporučuje djeci mlađoj od 7 godina zbog malog sadržaja alkohola); **oralne kapi, otopina** - oralna primjena, odrasli i djeca iznad 12 godina: 4 ml (60 kapi) 3 puta dnevno; djeca od 6-12 godina: 2 ml (30 kapi) 3 puta dnevno; djeca od 2-6 godina: 1,3 ml (20 kapi) 3 puta dnevno; djeca ispod 2 godine: 0,7 ml (10 kapi) 3 puta dnevno; inhalacijska primjena, odrasli: 4 ml (60 kapi) 2 puta dnevno; djeca starija od 12 god: 2 ml (30 kapi), 2 puta dnevno; djeca 6-12 god. 1 ml (15 kapi) 2 puta dnevno; djeca 2-6 god: 0,7 ml (10 kapi), 2 puta dnevno; djeca mlađa od 2 god: 0,3 ml (5 kapi), 2 puta dnevno; **tableta** - odrasli, 3 puta dnevno 8-16 mg, djeca iznad 10 godina: 3 puta dnevno 8 mg; djeca 6-10 god: 3 puta dnevno 4 mg; kod djece ispod 6 god. prikladnija je primjena tečnih farmaceutskih oblika

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BISOLEX - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

BRp oralne kapi, otopina [2 mg/1 mL] 30 ml oralnih kapi, otopine u staklenoj bočici sa nastavkom za kapanje, u kartonskoj kutiji

BRp sirup [4 mg/5 mL] 200 ml sirupa u staklenoj bočici boje jantara s polipropilenskim zatvaračem i dozirnim čašicom s mjernim oznakama, u kutiji

BRp tableta [8 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

BISOLEX F - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

BRp	tableta [16 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
BISOLVON - SANOFI-AVENTIS GROUPE	
BRp	oralna otopina [4 mg/2 mL] 40 mL oralne otopine u smeđoj staklenoj bočici, u kutiji
BRp	sirup [4 mg/5 mL] 200 ml sirupa u smeđoj staklenoj bočici i dozirna plastična čašica, u kutiji
BRp	tableta [8 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/PVDC//Al-blistera po 10 tableta), u kutiji

R05CB03 karbocistein

Doziranje: *smanjenje viskoziteta bronhijalnog sekreta:* odrasli, djeca 12-17 god, u početku 2,25 g dnevno u podijeljenim dozama, zatim 1,5 g dnevno u podijeljenim dozama pod uslovom poboljšanja stanja; djeca 2-5 god. 62,5-125 mg 4 puta dnevno, 5-12 god. 250 mg 3 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BRONCHOBOS - BOSNALIJEK D.D.

BRp	kapsula, tvrda [375 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/Al - blistera po 10 kapsula), u kutiji
BRp	sirup [125 mg/5 mL] 200 mL sirupa u smeđoj staklenoj boci sa CRC/TE zatvaračem za djecu i dozirna kašika, u kutiji
BRp	sirup [250 mg/5 mL] 200 mL sirupa u smeđoj staklenoj boci sa CRC/TE zatvarčem za djecu i dozirna kašika, u kutiji

BRONLES - ALKALOID AD SKOPJE

BRp	kapsula, tvrda [375 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

KARBOCISTEIN NATURA PHARM - NATURA PHARM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

BRp	kapsula, tvrda [375 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 kapsula) u kutiji

MUCODYNE - HEMOFARM A.D. VRŠAC

BRp	kapsula, tvrda [375 mg/1 kapsula] 30 kapsula, tvrdih (3 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji
BRp	sirup [125 mg/5 mL] staklena boca sa 100 ml sirupa i kašičicom, u kutiji
BRp	sirup [250 mg/5 mL] staklena boca sa 100 ml sirupa i kašičicom, u kutiji

R05CB06 ambroksol

Doziranje: *akutne i hronične bronhopulmonalne bolesti povezane sa poremećajem formiranja i transporta mukusa:* djeca do 2 god. 7,5 mg dva puta dnevno; djeca 2-5 god. 7,5 mg tri puta dnevno; djeca 6-12 god. 15 mg dva do tri puta dnevno; djeca preko 12 god. i odrasli 30 mg dva do tri puta dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AMBROSAN - PRO.MED.CS PRAHA A.S.

BRp	tableta [30 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

FLAVAMED - BERLIN-CHEMIE AG

BRp	tableta [30 mg/1 tableta] 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

FLAVAMED FORTE - BERLIN-CHEMIE AG

BRp	oralna otopina [30 mg/5 mL] staklena bočica sa 100 ml oralne otopine i dozirnom kašičicom, u kutiji

BRp šumeća tableta [60 mg/1 tableta] 10 šumećih tableta u polipropilenskoj tubi, u kutiji

FLAVAMED SIRUP - BERLIN-CHEMIE AG

BRp oralna otopina [15 mg/5 mL] 100 mL oralne otopine u staklenoj boci u kutiji

R05CB13 dornaza alfa

Doziranje: *cistična fibroza:* preporučena doza sadržaj jedne ampule (2500 jedinica) inhalirati pomoću raspršivača 1 puta (po potrebi bolesnici stariji od 21 godinu 2 puta) na dan, svakodnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PULMOZYME - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

Rp rastvor za raspršivanje [1 mg/1 mL] 2,5 ml otopine u plastičnoj (polietilen) ampuli, 6 ampula u zaštitnoj foliji, u kartonskoj kutiji

R05D *Antitusici, isključujući kombinacije sa ekspektoransima*

R05D askorbinska kiselina, tečni ekstrakt lista bokvice i cvijeta crnog sljeza

Doziranje: *tradicionalno se koristi kao antitusik kod suhog, nadražajnog kašlja koji prati bolesti gornjih disajnih puteva:* odrasli i djeca preko 14 god. 2 kašike za doziranje 3 do 5 puta dnevno; djeca 7-14 god. 1 do 2 kašike za doziranje 3 puta dnevno, djeca 4-7 god. 1 kašika za doziranje 3 puta dnevno; ne preporučuje se djeci ispod 4 god.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HERBION SIRUP OD BOKVICE - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp sirup, sirup [65 mg/5 mL, 2.5 g/5 mL] 1 smeđa staklena bočica sa 150 ml sirupa i mjerna kašika, u kutiji

R05D gusti ekstrakt islandskog lišaja

Doziranje: *tradicionalno se koristi kod: suhog, nadražujućeg kašlja, blage upale gornjih disajnih puteva i nadraženosti sluznice usta i ždrijela, uključujući promuklost i grlobolju:* odrasli i adolescenti stariji od 16 god: 15 ml sirupa (3 mjerne kašike), 4 puta dnevno; djeca 10-16 god: 10 ml sirupa (2 mjerne kašike), 4 puta dnevno; djeca 4-10 god: 5 ml sirupa (1 mjerna kašika), 4 puta dnevno; djeca 1-4 god. (samo nakon prethodne konsultacije sa ljekarom: 2,5 ml sirupa (1 mjerne kašike), 4 puta dnevno; ne primjenjuje se kod djece mlađe od godinu dana; ne treba uzimati hranu ili tečnost odmah nakon primjene jer se lijek može prerano ukloniti sa sluznice usta i ždrijela; za vrijeme primjene sirupa preporučuje se uzimati mnogo čaja ili drugih toplih napitaka, no ne odmah nakon primjene lijeka; pastile, djeca preko 12 god. i odrasli, jednu pastilu do osam puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HERBION ISLANDSKI LIŠAJ - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp pastila [3 mg/1 pastila] 16 pastila (2 PVC/PE/PVDC/Alu blistera sa po 8 pastila), u kutiji.

BRp sirup [6 mg/1 mL] staklena boca sa 150 ml sirupa i mjernom žličicom, u kutiji

R05DA Alkaloidi opijuma i derivati

R05DA04 kodein

Doziranje: suvi iritativni i neproduktivni kašalj u oboljenjima respiratornog trakta: odrasli i djeca iznad 12 god: 15-30 mg 3 ili 4 puta dnevno, maksimalno 240 mg/dan; za liječenje akutne umjerene boli za koju se smatra da ne može biti uklonjena drugim analgeticima, kao što je čisti paracetmol ili čisti ibuprofen (kod djece iznad 12 god), ublažavanje blage do umjerene boli: odrasli, 30 do 60 mg svaka 4 sata, do maks. doze 240 mg/dan; djeca iznad 12 god: 30 do 60 mg na svakih 6 sati, do maks. doze 240 mg kodeina dnevno (doza se određuje prema tjelesnoj težini (0,5 mg/kg do 1 mg/kg))

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CODEINI PHOSPHATIS ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

▲,SRp tableta [30 mg/1 tableta] 10 tableta (1 AL/AL blister sa 10 tableta) u kutiji

R05DB Ostali antitusici

R05DB13 butamirat

Doziranje: *akutni i hronični nadražajni suvi kašalj bilo kojeg izvora:* doziranje zavisi od uzrasta, učestalosti i intenziteta kašlja, tablete, odrasli 2-3 puta po 40 mg, odnosno 2-3 puta po 50 mg; djeca 12-18 god. 3 puta po 20 mg, odnosno 1-2 puta po 50 mg; djeca 6-12 god. dva puta po 20 mg; sirup 4 mg/5 ml, odrasli 3-4 puta po 30 ml, djeca starija od 12 god. 4 puta po 15 ml, djeca starija od 9 god. 4 puta po 15 ml, djeca 6-9 god. 3 puta po 15 ml, djeca 3-6 god. 3 puta po 10 ml, djeca 1-3 god. 3 puta po 5 ml, dojenčad 6 mjeseci do 1 god. 4 puta 2,5 ml; sirup 7,5 mg/5 ml, odrasli 4 puta po 15 ml, djeca starija od 12 god. 3 puta po 15 ml, djeca starija od 9 god. 3 puta po 10 ml, djeca 6-9 god. 3 puta po 10 ml, djeca 3-6 god. 3 puta po 5 ml

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NOTUSS - ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Rp sirup [7,5 mg/5 mL] 1 obojena staklena boca od 100 ml sa zaštitnim poklopcem za djecu, u kutiji

OMNITUS - HEMOFARM A.D. VRŠAC

BRp sirup [4 mg/5 mL] 1 staklena boca sa 200 ml sirupa i plastičnom kašikom, u kutiji

OMNITUS FORTE - HEMOFARM A.D. VRŠAC

BRp film tableta sa modifikovanim oslobađanjem [50 mg/1 tableta] 10 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem (1 PVC/PVdC-Al blister), u kutiji

PANATUS - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp filmom obložena tableta [20 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al blister) u kutiji

BRp sirup [4 mg/5 mL] 200 ml sirupa u smeđoj staklenoj boci, u kutiji

PANATUS FORTE - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

BRp filmom obložena tableta [50 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al blister) u kutiji

BRp sirup [7.5 mg/5 mL] 200 ml sirupa u smeđoj staklenoj boci, u kutiji

R05X**Ostali preparati protiv prehlade****R05X tinktura korijena pelargonije**

Doziranje: *tradicionalni biljni lijek za simptomatsko liječenje prehlade:* oralno, djeca preko 12 god, odrasli i stariji, 30 kapi 3 puta dnevno, djeca 6-11 god. 20 kapi 2 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**PELARIA - PHYTOPHARM KLEKA S.A.**

- BRp oralne kapi, rastvor [0,8 mg/1 mL] 1 smeđa staklena boca od 50 mL, u kutiji
- BRp oralne kapi, rastvor [0,8 mg/1 mL] smeđa staklena boca od 20 mL, u kutiji

R05X askorbinska kiselina, feniramin, paracetamol

Doziranje: *prehlada, rinitis, nazofaringitis, gripozna stanja:* odrasli i djeca starija od 15 god. oralno, sadržaj jedne kesice razmutiti u dovoljnoj količini vode, razmak između doza najmanje 4 sata, maksimalno dnevno 3 doze

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ROXACET COLD - GALENIKA A.D. BEOGRAD**

- BRp prašak za oralni rastvor [200 mg/1 kesica+ 25 mg/1 kesica+ 500 mg/1 kesica] 8 kesica od papir/aluminijum/polietilena, u kutiji

R05X fenilefrin, gvaifenezin, paracetamol

Doziranje: *kratkoročno ublažavanje simptoma prehlade, groznice i gripe:* odrasli i djeca starija od 16 god. 20 ml, po potrebi ponoviti dozu svaka 4 sata, maks. 4 doze dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:**TYLOL HOT LIQUID DAY - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.**

- BRp oralni rastvor [10 mg/20 mL+ 200 mg/20 mL+ 500 mg/20 mL] 1 PET plastična bočica od 250 mL sa plastičnom odmjernom čašicom od 20 mL, u kutiji

R05X askorbinska kiselina, hlordenamin, kofein, paracetamol

Doziranje: *simptomi prehlade (glavobolja i bolovi u udovima, nazalna kongestija, suvi kašalj), povišena tjelesna temperatura:* oralno, kapsule, odrasli i adolescenti stariji od 12 godina, 3 puta dnevno po 2 kapsule; prašak za oralnu otopinu, 3 puta dnevno po jednu kesicu

REGISTROVANI LIJEKOVI:**GRIPPOSTAD C - STADA ARZNEIMITTEL AG**

- BRp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula+ 2.5 mg/1 kapsula+ 25 mg/1 kapsula+ 200 mg/1 kapsula] 10 kapsula, tvrdih (1 PVC/PVDC//Al - blister sa 10 kapsula) u kutiji
- BRp kapsula, tvrda [150 mg/1 kapsula+ 2.5 mg/1 kapsula+ 25 mg/1 kapsula+ 200 mg/1 kapsula] 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 kapsula) u kutiji

TYLOL HOT C - NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A. S.

- △ BRp prašak za oralnu otopinu [300 mg/1 vrećica+ 5 mg/1 vrećica+ 50 mg/1 vrećica+ 400 mg/1 vagitorija] 12 vrećica (1 PET/AL/PE vrećica sa 4 g praška za oralnu otopinu), u kutiji

R06 **ANTIISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU**
R06A **Antihistaminici za sistemsku primjenu**
R06AA **Aminoalkil etri**

R06AA02 **dimenhidrinat**

Doziranje: prevencija mučnine, povraćanja i/ili vrtoglavice kod bolesti putovanja; prevencija i liječenje mučnine i povraćanja uzrokovanih Menier-ovom bolešću i drugim vestibularnim poremećajima: odrasli i djeca starija od 14 god, početna doza 1 tableta (50 mg), a zatim 1-2 tablete (50 -100 mg) tri puta na dan (ne preporučuje se davanje više od 400 mg na dan); u prevenciji bolesti kretanja lijek treba uzeti 30 minuta prije početka kretanja; djeca, 7-14 godina 1/2 tablete - 1 tableta (25-50 mg) svakih 6-8 sati po potrebi, ne više od 150 mg na dan; djeca 2-6 god. 25 mg (1/2 tablete) svakih 6-8 sati po potrebi, ne više od 75 mg na dan; u starijih osoba lijek treba primijeniti u najnižoj preporučenoj dozi za odrasle, budući da su osjetljiviji na antiholinergičke efekte lijeka.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AVIOMARIN - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

△ BRp tableta [50 mg/1 tableta] 5 tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji

DIMIGAL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

△ BRp tableta [50 mg/1 tableta] 10 tableta (1 blister Alu/PVC//PVC/PVdC), u kutiji

DRAMINA - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

△ BRp tableta [50 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji

△ BRp tableta [50 mg/1 tableta] 5 tableta (1PVC/Al blister), u kutiji

RODAVAN N - BOSNALIJEK D.D.

△ BRp tableta [50 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

R06AA09 **doksilamin**

Doziranje: *simptomatsko liječenje povremenih nesanica:* odrasli stariji od 18 god, 7,5-15 mg 30 min. prije odlaska u krevet, po potrebi povećati na 30 mg dnevno, maksimalno 50 mg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CALMESAN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

△ BRp filmom obložena tableta [15 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister), u kutiji

R06AB **Supstituisani alkilamini**

R06AB03 **dimetinden**

Doziranje: ublažavanje svraba različite etiologije (endogeni svrab, ekcem, svrab koji se javlja uz dermatoze, ubode insekata, urtikarija), simptomatsko ublažavanje sezonskog i hroničnog alergijskog rinitisa, simptomatsko liječenje alergija na lijekove i hranu, prevencija alergijskih reakcija tokom desenzibilizacije: odrasli i djeca iznad 12 godina: uobičajena doza: 20-40 kapi 3 puta na dan; bolesnicima koji su skloni pospanosti daje se 40 kapi uveče i 20 kapi ujutru, djeca: uobičajena doza: 0,1 mg/kg; odnosno 2 kapi ko kilogramu tjelesne težine podijeljeno u 3 doze (1 mjesec-1 godina: 3-10 kapi 3 puta na dan; 1-3 godine: 10-15 kapi 3 puta na dan; 3-12 godina: 15-20 kapi 3 puta na dan).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FENISTIL 1MG/ML ORALNE KAPI - HALEON HUNGARY KFT

Rp oralne kapi, otopina [1 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 20 mL oralnih kapi, otopine, u kutiji

R06AC Supstituisani etilendiamini**R06AC03 hloropiramin**

Doziranje: akutne alergijske reakcije, posebno rane gdje se oslobađa velika količina histamina: urtikarija, angioedem, preosjetljivost uzrokovana lijekovima, ubodi insekata, serumska bolest, polenoza; u kombinaciji s ostalim lijekovima u liječenju anafilaktičkog šoka; i.v. ili duboko i.m. odrasli, 1 ampula do tri puta na dan; djeca 1/4 - 1 ampule; doza se obično računa prema tjelesnoj masi i iznosi 0,20 mg/kg tjelesne mase

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SYNOPEN - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- ▲ ZU otopina za injekciju [20 mg/2 mL] 10 ampula po 2 ml otopine za injekciju, u kutiji

R06AD Derivati fenotiazina**R06AD03 tietilperazin**

Doziranje: liječenje mučnine i povraćanja (nakon hiruških zahvata, nakon citotoksične hemoterapije, kod terapija sa zračenjem, nakon uzimanja lijekova s emetičnim učinkom: odrasli 1-3 puta po 6,5 mg; ne preporučuje se primjena kod mlađih od 15 godina.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TORECAN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- ▲ ZU otopina za injekciju [6.5 mg/1 mL] 50 ampula po 1 mL otopine za injekciju, u kutiji
- △ Rp obložena tableta [6.5 mg/1 tableta] 50 obloženih tableta u staklenoj bočici, u kutiji

R06AE Derivati piperazina**R06AE07 cetirizin**

Doziranje: olakšavanje nosnih i očnih simptoma sezonskog i cjelogodišnjeg alergijskog rinitisa, olakšavanje simptoma hronične idiopatske urtikarije: djeca od 6-12 god. 5 mg dvaput na dan; odrasli i adolescenti stariji od 12 god. 10 mg jedanput na dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LETIZEN - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp filmom obložena tableta [10 mg/1 tableta] 10 filmom obloženih tableta (1 Al/PVC blister) u kutiji

R06AE09 levocetirizin

Doziranje: simptomatsko liječenje alergijskog rinitisa (uključujući perzistentni alergijski rinitis) i hronične idiopatske urtikarije: oralno, odrasli i djeca starija od 12 god. 5 mg dnevno;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LAVRENA - STADA ARZNEIMITTEL AG

- BRp film tableta [5 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PVDC/AL blister sa 10 tableta), u kutiji

R06AX Ostali antihistaminici za sistemsku primjenu

R06AX13 loratadin

Doziranje: *simptomatska terapija alergijskog rinitisa i hronične idiopatske urtikarije:* odrasli i djeca starija od 12 godina, 10 mg jedanput dnevno; djeca 2-12 godina tjelesne mase veće od 30 kg: 10 mg jedan put dnevno, a tjelesne mase ispod 30 kg: 5 mg jedan put dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BELODIN - BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

BRp tableta [10 mg/1 tableta] 7 tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji

FLONIDAN - SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

BRp tableta [10 mg/1 tableta] 10 tableta (1 Al/PVC blister sa 10 tableta) u kutiji

Rp oralna suspenzija [5 mg/5 mL] 120 ml oralne suspenzije u staklenoj bočici i mjerna kašičica, u kutiji

Rp tableta [10 mg/1 tableta] 20 tableta (2 Al/PVC blistera sa po 10 tableta) u kutiji

LORAMIN - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

BRp tableta [10 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister), u kutiji

LOSTOP - BOSNALIJEK D.D.

BRp tableta [10 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

Rp sirup [5 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 100 ml sirupa i graduiranom kašičicom, u kutiji

PRESSING - HEMOFARM A.D. VRŠAC

BRp sirup [5 mg/5 mL] staklena boca sa 120 mL sirupa i plastičnom kašičicom od 5 ml, u kutiji

BRp tableta [10 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/Al - blister), u kutiji

R06AX17 ketotifen

Doziranje: profilaksa bronhijalne astme (naročito praćene atopijskim simptomima), simptomatska terapija alergijskih manifestacija kod alergijskog rinitisa i alergijskog konjuktivitisa: oralno, odrasli 1 mg 2 puta dnevno uz obrok, po potrebi dozu povećati do 2 mg 2 puta dnevno; kod pacijenata koji se lako sediraju, liječenje se započinje sa 0,5-1 mg uveče tokom prvih nekoliko dana liječenja; djeca od 2-3 godine: 0,05 mg (=0,25 ml sirupa 1mg/5ml) po kilogramu tjelesne težine dva puta dnevno (ujutro i uveče); djeca starija od 3 godine: 1 mg 2 puta dnevno;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GALITIFEN - GALENIKA A.D. BEOGRAD

△ Rp sirup [1 mg/5 mL] 100 ml sirupa u staklenoj bočici i kašika za doziranje od 5 ml, u kutiji

R06AX26 feksofenadin

Doziranje: *sezonski alergijski rinitis:* odrasli i djeca iznad 12 godina starosti 120 mg jednom dnevno;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALERIX - BOSNALIJEK D.D.

BRp film tableta [120 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PVdC/Al blister), u kutiji

ALLEGRA - SANOFI-AVENTIS GROUPE

BRp film tableta [120 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PE/PVDC/Al blister), u kutiji

R06AX27 desloratadin

Doziranje: *olakšavanje simptoma kod alergijskog rinitisa, urtikarije:* odrasli i djeca starija od 12 godina: 1 film-tableta ili 10 ml sirupa 0,5 mg/ml (5 mg) jednom na dan; djeca dobi 1-5 godina: 2,5 ml sirupa (1,25 mg) jednom dnevno; djeca dobi 6-11 godina: 5 ml sirupa (2,5 mg) jednom dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**AEROGAL - GALENIKA A.D. BEOGRAD**

- BRp film tableta [5 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 Alu/PVC-PVC blister), u kutiji
 Rp sirup [0,5 mg/1 mL] 1 staklena boca sa 60 ml sirupa, u kutiji
 Rp sirup [0,5 mg/1 mL] 1 staklena boca sa zatvaračem od polietilena sa 60 ml sirupa, u kutiji

ALRINAST - ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

- Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 20 film tableta (2 PVC-PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), kutiji

DASSELTA - KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO

- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 1 OPA/Al/PVC/Al blister sa 10 filmom obloženih tableta, u kutiji
 Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

DELOR - ZADA PHARMACEUTICALS D.O.O.

- Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 PVC/PVDC//Al blister), u kutiji

DOXTADIN - DEVA HOLDING A.S.

- Rp filmom obložena tableta [5 mg/1 tableta] 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ESCONTRAL - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

- Rp oralna otopina [0.5 mg/1 mL] staklena bočica sa 60 ml oralne otopine, u kutiji

ESCONTRAL DIREKT - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

- Rp raspadljiva tableta za usta [5 mg/1 tableta] 30 raspadljivih tableta za usta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

LORDES - NOBEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

- BRp film tableta [5 mg/1 tableta] 10 film tableta (1 providni PVC/PE/PVDC-Al blister) u kutiji
 Rp film tableta [5 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 providna PVC/PE/PVDC-Al blistera po 10 tableta) u kutiji
 Rp sirup [2.5 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 60 ml sirupa u kutiji
 Rp sirup [2.5 mg/5 mL] 150 ml sirupa u staklenoj bočici, sa dozirnom kašičicom od 5 ml, u kutiji

R06AX28 rupatadin

Doziranje: *alergijski rinitis, urtikarija:* oralno, djeca 2-11 god. koji imaju 25 kg ili više 5 mg oralnog rastvora jednom dnevno, djeca koja imaju više od 10 kg a manje od 25 kg, 2,5 mg oralnog rastvora jednom dnevno; djeca starija od 12. god i odrasli 10 mg jednom dnevno (u obliku tableta)

REGISTROVANI LIJEKOVI:**RUPAFIN - NOUCOR HEALTH, S.A.**

- Rp oralni rastvor [1 mg/1 mL] 120 ml rastvora u bočici, u kutiji
 Rp tableta [10 mg/1 tableta] 10 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

R06AX29 bilastin

Doziranje: *simptomatsko liječenje alergijskog rino-konjunktivitisa i urtikarije:* odrasli i djeca preko 12 god. 20 mg jednom dnevno, djeca 6-11 god. (čija težina iznosi najmanje 20 kg) 10 mg; oralna otopina je namijenjena djeci uzrasta 2-11 god. čija tjelesna masa iznosi najmanje 15 kg, 10 mg jednom dnevno; zbog interakcije, savjetovati pacijentima da bilastin uzimaju 1 sat prije ili 2 sata poslije uzimanja grejpfruta

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ACTINE - MSN LABS EUROPE LIMITED

- Rp tableta [20 mg/1 tableta] 10 tableta (1 OPA/Alu/PVC/Alu blister po 10 tableta), u kutiji
Rp tableta [20 mg/1 tableta] 30 tableta (3 OPA/Alu/PVC/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji

APRixa - SANECA PHARMACEUTICALS

- BRp tableta [20 mg/1 tableta] 10 tableta (1 Al/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

XADOS - BERLIN-CHEMIE AG

- BRp tableta [20 mg/1 tableta] 10 tableta (1 oPA/Al/PVC/Al blister), u kutiji
Rp oralna disperzibilna tableta [10 mg/1 tableta] 10 oralnih disperzibilnih tableta (1 OPA/AlPVC//Al blister sa 10 tableta), u kutiji
Rp oralna otopina [2,5 mg/1 mL] 1 bočica sa 120 ml oralne otopine, u kutiji

**R07 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI
RESPIRATORNOG SISTEMA**

**R07A Ostali lijekovi za liječenje bolesti respiratornog
sistema**

R07AA Plućni surfaktanti

R07AA esencijalni fosfolipidi

Doziranje: respiratorni distres sindrom (RDS) kod prijevremeno rođene djece, sa težinom na rođenju od 700 g ili većom; profilaktička primjena kod prijevremeno rođene djece <32 nedjelje gestacijske starosti kod koje postoji rizik od pojave RDS, a potrebna im je intubacija za stabilizaciju ili imaju dokazanu deficijenciju surfaktanta: endotrahealnom tubom, 100 mg fosfolipida po kg tjelesne mase na rođenju u zapremini koja ne prelazi 4 ml/kg, terapija- prvu dozu primjeniti što je prije moguće nakon što se potvrdi RDS radiografskim ili kliničkim nalazima, doza se može ponoviti u roku od 48 sati u intervalima od najmanje 6 sati, a mogu se primjeniti najviše 4 doze; profilaksa - prvu dozu primjeniti što je prije moguće nakon rođenja, preporučuje se u roku od 15 min, doza se može ponoviti u roku od 48 sati u intervalima od najmanje 6 sati, a mogu se primjeniti najviše 4 doze.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SURVANTA - ABBVIE INC.

- ZU suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje [25 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 4 mL suspenzije za endotraheopulmonalno ukapavanje zatvorena gumenim zapušačem i Al-peritlom, u kutiji
ZU suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje [25 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 8 mL suspenzije za endotrahealno ukapavanje zatvorena gumenim zapušačem i Al - peritlom, u kutiji

R07AA02 prirodni fosfolipidi

Doziranje: terapija respiratornog distres sindroma kod novorođenčadi porođajne težine iznad 600 g: 100-200 mg/kg, zatim 100 mg/kg svakih 12 sati po potrebi, maks. ukupna doza od 300-400 mg/kg; profilaksa respiratornog distres sindroma u nedonoščadi rođene u gestacijskoj dobi između 24. i 31. nedjelje: 100-200 mg/kg potrebno je primijeniti što je moguće prije nakon rođenja (po mogućnosti u roku od 15 min.); daljnje doze od 100 mg/kg mogu se ponoviti 6-12 sati nakon prve doze, a zatim 12 sati kasnije u novorođenčadi s perzistentnim znakovima RDS i koja ovisi o respiratoru; maks. ukupna doza od 300-400 mg/kg

REGISTROVANI LIJEKOVI:**CUROSURF - CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH**

ZU	ukapna tekućina za dušnik i pluća, suspenzija [120 mg/1.5 mL] 1 staklena bočica sa 1,5 ml ukapne tekućine za dušnik i pluća, suspenzije, u kutiji
ZU	ukapna tekućina za dušnik i pluća, suspenzija [120 mg/1.5 mL] 2 staklene bočice po 1,5 ml ukapne tekućine za dušnik i pluća, suspenzije, u kutiji.

S **SENZORNI ORGANI**
S01 **LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA**
S01A **Antiinfektivni**
S01AA **Antibiotici**

S01AA01 **hloramfenikol**

Doziranje: infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osjetljivim na hloramfenikol, kada drugi antibiotici nemaju dejstva ili su kontraindikovani: odrasli, uključujući i starije, i djeca starija od 2 god. malu količinu masti nanijeti u konjunktivalnu kesu svaka 3 sata tokom prvih 48 sati terapije, poslije toga, interval između doza povećati; terapiju produžiti najmanje 48 sati po nestanku znakova infekcije; liječenje može trajati najduže 5 dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CHLORAMPHENICOL ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

Rp mast za oči [10 mg/1 g] 5 g masti za oči u Al-tubi sa polietilenskim zatvaračem, u kutiji

CHLORAMPHENICOL GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp mast za oči [10 mg/1 g] 1 Alu tuba sa 5 g masti za oči, u kutiji

S01AA12 **tobramicin**

Doziranje: infekcije vanjskog dijela oka izazvane bakterijama osjetljivim na tobramicin: lakše i srednje infekcije 1-2 kapi u oboljelo oko svaka 4 sata ili oko 1,5 cm masti aplicirati 2-3 puta na dan; teške infekcije: po 2 kapi u oko svakog sata ili 1,5 cm masti u oboljelo oko svaka 3-4 sata do poboljšanja simptoma.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OFTAMYCIN - DEVA HOLDING A.S.

Rp kapi za oko, otopina [3 mg/1 mL] 1 bočica sa 5 ml kapi za oko, otopine, u kutiji

TOBRAVIS - BALKANPHARMA-RAZGRAD AD

Rp mast za oči [3 mg/1 g] aluminijska tuba sa 5 g masti, u kutiji

Rp kapi za oči, rastvor [3 mg/1 mL] 5 ml kapi za oči, rastvora u LDPE bočici, u kutiji

TOBREX - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp kapi za oko, otopina [3 mg/1 mL] bočica sa 5 ml kapi za oko, otopine, u kutiji

Rp mast za oči [3 mg/1 g] 3,5 g masti za oči u tubi u kutiji

S01AA13 **fusidinska kiselina**

Doziranje: stafilokokna infekcija oka: u oko, odrasli i djeca, 1 kap u oko, 2 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FUSIDIX 1% - DEVA HOLDING A.S.

Rp kapi za oko, otopina [10 mg/1 g] 5 g kapi za oko, otopine u savitljivoj tubi, u kutiji

S01AA30 **bacitracin, neomicin**

Doziranje: bakterijske infekcije spoljašnjeg segmenta oka, kože, spoljašnjeg uva: mast: 1-3 puta dnevno nanijeti u tankom sloju na posuvraćeni donji kapak i konjunktivu odnosno na oboljelo mjesto; terapija ne treba da traje duže od 7 dana bez ponovne procjene ljekara

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ENBECIN - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp mast za oči [500 i.j./1 g+ 3300 i.j./1 g] 1 Al tuba sa 5 g masti za oči u kutiji

S01AD Antivirolici

S01AD03 aciklovir

Doziranje: *herpes simplex keratitis:* čim se pojave prvi znakovi bolesti 1 cm masti nanijeti u donju konjunktivalnu kesu bolesnog oka 5 puta dnevno, u razmacima oko 4 h (ne primjenjivati tokom noći); nakon nestanka simptoma bolesti, mast primjenjivati još najmanje 3 dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ACIKLOVIR ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

Rp mast za oči [30 mg/1 g] Al-tuba sa 5 g masti za oči, u kutiji

ACIKLOVIS - BALKANPHARMA-RAZGRAD AD

Rp mast za oči [30 mg/1 g] Aluminijska tuba sa kanilom, koja sadrži 5 g aciklovira 30 mg/g masti za oči. Svaka tuba je upakovana u kartonsku kutiju.

S01AE Fluorohinoloni

S01AE03 ciprofloksacin

Doziranje: *ulkusi rožnjače:* odrasli, novorođenčad (0-27 dana), odojčad i mala djeca (28 dana do 23 mjeseca), djeca (2-11 godina) i adolescenti (12-16 godina), 1. dan: u toku prvih 6 sati svakih 15 min. po 2 kapi u bolesno oko (ako je potrebno pridržavati se rasporeda i tokom noći), zatim svakih 30 min. po 2 kapi; 2.dan. na svakih sat vremena 2 kapi ukapati u bolesno oko; 3. do 14. dan: na svaka 4 sata ukapati 2 kapi u bolesno oko; ukoliko bude potrebna terapija duže od 14 dana, ljekar individualno određuje doziranje; *površinske infekcije oka:* 1 ili 2 kapi u oboljelo oko, četiri puta dnevno; u slučaju težih infekcija, u toku prva dva dana ukapati 1 ili 2 kapi na svaka dva sata, osim tokom spavanja; maks. trajanje terapije 21 dan

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MAROCEN - HEMOFARM A.D. VRŠAC

Rp kapi za oči , rastvor [3 mg/1 mL] 5 mL rastvora u LDPE bočici sa HDPE zatvaračem s prstenom i LDPE kapaljkom, u kutiji

S01AE07 moksifloksacin

Doziranje: *purulentni bakterijski konjunktivitis uzrokovan sojevima osjetljivim na moksifloksacin:* 1 kap u bolesno oko/oči tri puta dnevno; ukoliko se u roku od 5 dana od početka terapije ne primijeti poboljšanje, treba preispitati dijagnozu i/ili propisanu terapiju.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEMOKIF 0,5% - DEVA HOLDING A.S.

Rp kapi za oko, otopina [5 mg/1 mL] polietilenska bočica sa 5 ml kapi za oko, otopine, u kutiji

MOXIVISION - PHARMAVISION EUROPE LTD.

Rp kapi za oči , rastvor [5 mg/1 mL] 1 LDPE bočica sa 5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji

VIGAMOX - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp kapi za oko, otopina [5 mg/1 mL] polietilenska (LDPE) bočica sa 5 ml kapi, u kutiji

S01AX Ostali antiinfektivni**S01AX22 moksifloksacin**

Doziranje: *purulentni bakterijski konjunktivitis uzrokovan sojevima osjetljivim na moksifloksacin:* odrasli i djeca preko 1 mjeseca, 1 kap u bolesno oko/oči tri puta dnevno (nastavi se sa terapijom 2-3 dana nakon poboljšanja simptoma infekcije; ukoliko se u roku od 5 dana od početka terapije ne primijeti poboljšanje, treba preispitati dijagnozu i/ili propisanu terapiju)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MOKSACIN - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

Rp kapi za oko, otopina [5 mg/1 mL] 5 ml kapi za oko, otopine (1 LDPE bočica) u kutiji

S01B Antiinflamatorni lijekovi**S01BA Kortikosteroidi, monokomponentni****S01BA01 deksametazon**

Doziranje: liječenje upalnih stanja palpebralne i bulbarne konjunktive, rožnjače i prednjeg segmenta oka koji reaguju na tretman steroidima, uključujući postoperativne upale: kapi, kod blažih upala svakih 3-4 sata dok se ne dobije željeni odgovor; jake ili akutne upale, kapi se nanose u konjunktivnu vrećicu svakih 30-60 min. u nastavku terapije kada se uoči poboljšanje, smanjiti na 3-4 puta dnevno; hronične upale, svakih 3-6 sati ili onoliko koliko je potrebno; mast, nanijeti 1-1,5 cm masti u konjunktivnu kesicu 1-4 puta dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MAXIDEX - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp kapi za oko, suspenzija [1 mg/1 mL] 5 ml kapi za oči, suspenzije
Rp mast za oči [1 mg/1 g] tuba sa 3,5 g masti za oči u kutiji

S01BA02 hidrokortizon

Doziranje: alergijske promjene na kapku ili vežnjači; neinfektivne upale vežnjače, rožnjače i bjeonjače; nebakterijske upale dužice, cilijarnog tijela, sudovnjače i mrežnjače: lokalno 1-3 puta dnevno u tankom sloju, mazati unutrašnju stranu donjeg kapka jednog ili oba oka.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HYDROCORTISON GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp mast za oči [10 mg/1 g] 1 alu-tuba sa 5 g masti za oči, u kutiji

S01BC Nesteroidni antiinflamatorni lijekovi**S01BC03 diklofenak**

Doziranje: *profilaksa preoperativne mioze:* po 1 kap 4 puta tokom 2 sata prije operacije (u razmacima od oko 30 min.); *kontrola postoperativne upale:* po 1 kap 4 puta dnevno do 28 dana; *kontrola bola i nelagodnosti kod fotorefraktivne keratektomije (PRK):* po 1 kap 2 puta u toku 1 sata prije operacije, po 1 kap 2 puta u razmaku od 5 minuta odmah nakon PRK operacije, i onda postoperativno po 1 kap na svakih 2-5 sati kada je pacijent budan, do 24 h; *kontrola bolova oka povezana sa oštećenjima epitela rožnjače nakon slučajne nepenetrirajuće traume:* po 1 kap 4 puta dnevno do 2 dana; *kontrola upale nakon argonske laserske trabekuloplastike (ALT):* po 1 kap 4 puta dnevno tokom 2 sata prije ALT operacije, i poslije 1 kap 4 puta dnevno do 7 dana; *olakšanje simptoma sezonske alergijske reakcije:* po 1 kap 4 puta dnevno sve dok je potrebno; *tretman upale i neugoda nakon operacije strabizma:* po 1 kap 4 puta dnevno u prvoj sedmici, 3 puta dnevno u

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

drugo sedmici, 2 puta dnevno u trećoj sedmici, i po potrebi u četvrtoj sedmici; *tretman bolova oka i neugode nakon radijalne keratotomije*: preoperativno 1 kap prije operacije, postoperativno 1 kap odmah nakon operacije, i nakon toga 1 kap 4 puta dnevno do 2 dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DIKLOVIS - S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L.

Rp kapi za oči, rastvor [1 mg/1 mL] 1 bijela (LDPE) bočica od 5 ml, u kutiji

REDICLON 0,1% - DEVA HOLDING A.S.

Rp kapi za oko, otopina [1 mg/1 mL] 20 jednodoznih bočica (LDPE) sa po 0,3 ml kapi za oko, otopine (2 vrećice sa po 10 bočica), u kutiji

Rp kapi za oko, otopina [1 mg/1 mL] 60 jednodoznih bočica (LDPE) sa po 0,3 ml kapi za oko, otopine (6 vrećica sa po 10 bočica), u kutiji

UNICLOPHEN 0,1% - UNIMED PHARMA SPOL. S.R.O.

Rp kapi za oči, rastvor [1 mg/1 mL] 1 LDPE bočica sa 10 ml rastvora, u kutiji

S01BC10 nepafenak

Doziranje: prevencija i liječenje postoperativne boli i upale povezane sa operacijom katarakte; smanjenje rizika od postoperativnog makularnog edema povezanog sa operacijom katarakte kod pacijenata sa dijabetesom: odrasli, konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NEVANAC - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp kapi za oko, suspenzija [1 mg/1 mL] 1 bočica (LDPE) sa 5 ml kapi za oči, u kutiji

S01C Antiinflamatorni lijekovi i antiinfektivni u kombinaciji

S01CA Kortikosteroidi i antiinfektivni u kombinaciji

S01CA01 deksametazon, neomicin, polimiksin B sulfat

Doziranje: kratkotrajno liječenje stanja oka koja reaguju na steroide kada je potrebno i profilaktičko liječenje antibiotskim, nakon isključivanja prisustva gljivične i virusne infekcije: djeca i odrasli, 1 ili 2 kapi u svako oboljelo oko do 6 puta dnevno ili češće ukoliko je potrebno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TRIO VISION - BALKANPHARMA-RAZGRAD AD

Rp kapi za oči, suspenzija [1 mg/1 mL+ 3500 i.j./1 mL+ 6000 i.j./1 mL] Bijela plastična bočica sa kapaljkom - aplikatorom, zatvorena čepom na zavrtanje sa zaštitnim prstenom.

S01CA01 deksametazon, neomicin

Doziranje: inflamatorna stanja oka koja reaguju na terapiju steroidima kada je istovremeno potrebna i antibiotska terapija: početi sa 1-2 kapi u konjunktivalnu kesu svakog sata tokom dana i svaka 2 sata tokom noći, nakon postizanja terapijskog odgovora nastaviti sa 1 kapi svaka 4 sata, zatim smanjiti na jednu kap 3-4 puta dnevno; kapi ne treba davati duže od 7 dana, osim pod nadzorom stručnjaka

REGISTROVANI LIJEKOVI:

NEODEKSACIN - HEMOFARM A.D. VRŠAC

Rp kapi za oči, rastvor [1 mg/1 mL+ 3.5 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 10 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji

S01CA01 deksametazon, neomicin, polimiksin B

Doziranje: upalna stanja oka koja reaguju na steroide i kod kojih je indikovano liječenje kortikosteroidima, te istovremeno prisutna bakterijska infekcija ili postoji opasnost njenog razvoja: kapi za oči, 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesicu oboljelog oka svaka 2-4 sata; u teškim slučajevima, kapi se mogu primjenjivati svaki sat; kada se postigne zadovoljavajući terapijski odgovor, odnosno kad se upala smanji, doza se postepeno smanjuje do potpunog prestanka primjene lijeka; u tretmanu blagih upala, kapi se mogu primjenjivati svakih 4-6 sati; mast, aplicirati malu količinu (1-1,5 cm) masti u konjunktivalnu vrećicu tri do četiri puta na dan ili primjenjivati zajedno sa kapima uveče pred spavanje.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**MAXITROL - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG**

- Rp kapi za oko, suspenzija [1 mg/1 mL+ 3500 i.j./1 mL+ 6000 i.j./1 mL]
5 ml kapi za oči, suspenzije
- Rp mast za oči [1 mg/1 g+ 3500 i.j./1 g+ 6000 i.j./1 g] 3,5 g masti za oči

S01CA01 deksametazon, tobramicin

Doziranje: liječenje upale oka; sprečavanje infekcije nakon operacije katarakte: kapi za oči, 1-2 kapi se ukapavaju u konjunktivalnu vrećicu svakih 4 do 6 sati, u toku prvih 24 do 48 sati doza se može povećati za još 1 kap svaka 2 sata; doziranje je neophodno nastaviti tokom 14 dana i ne prekoračiti maks. period trajanja terapije od 24 dana; kod težih oblika oboljenja, 1-2 kapi se ukapavaju svaki sat do stavljanja upale pod kontrolu; nakon operacije katarakte 1 kap se ukapava 4 puta na dan, od dana obavljanja operacije u toku 24 dana; s primjenom je moguće početi dan prije operacije; mast: malu količinu (dužine 1.5 cm) nanijeti 3-4 puta dnevno, postepeno smanjivati; nakon korektivne operacije katarakte, mala količina (dužine 1.5 cm) se nanosi u konjunktivalnu vrećicu svakih 6 h do 24-og dana nakon operacije; mast se može nanositi prije spavanja u kombinaciji sa primjenom kapi u toku dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**TOBRADEX - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG**

- Rp kapi za oči, suspenzija [1 mg/1 mL+ 3 mg/1 mL] 1 bočica sa 5 mL suspenzije (LDPE - bočica sa PP zatvaračem) u kutiji
- Rp mast za oči [1 mg/1 g+ 3 mg/1 g] tuba sa 3,5 g masti za oči (Al - tuba obložena epoksi-fenolom sa polietilenskim vrhom i polietilenskim zatvaračem) u kutiji

TOBRAVIS COMBO - PHARMAVISION EUROPE LTD.

- Rp mast za oči [1 mg/1 g+ 3 mg/1 g] 1 aluminijska tuba sa 5 g masti, sa opremljenoj kanilom, sa plastičnim poklopcem na zavrtnje, u kutiji
- Rp kapi za oči, suspenzija [1 mg/1 mL+ 3 mg/1 mL] 5 ml kapi za oči, suspenzije u LDPE bočici, u kutiji

S01E Lijekovi za liječenje glaukoma i miotici
S01EA Simptomimetici u terapiji glaukoma

S01EA05 brimonidin

Doziranje: povećani intraokularni pritisak kod pacijenata sa glaukomom otvorenog ugla ili očnom hipertenzijom: 1 kap dva puta dnevno u oboljelo oko, približno u razmaku od 12 sati; ako se primjenjuju i drugi oftalmološki preparati, vremenski razmak između primjene mora biti 5-15 minuta

REGISTROVANI LIJEKOVI:**BIMANOX - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.**

Rp kapi za oko, otopina [2 mg/1 mL] 5 ml kapi za oko, otopine (1 plastična bočica sa umetkom za kapanje i plastičnim zatvaračem), u kutiji

S01EC Inhibitori karboanhidraze

S01EC03 dorzolamid

Doziranje: dodatna terapija beta blokatorima, monoterapija kod bolesnika kod kojih liječenje beta blokatorima nije uspješno ili kod kojih je primjena beta blokatora kontraindikovana, liječenju povišenog očnog pritiska kod pacijenata sa očnom hipertenzijom, glaukomom otvorenog ugla i pseudoeksfolijativnim glaukomom: monoterapija, 1 kap u konjunktivnu vrećicu tri puta na dan; kombinovana terapija sa lokalnim beta blokatorima: 1 kap dva puta na dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DORZOL - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

Rp kapi za oko, otopina [20 mg/1 mL] 1 plastična bočica s uloženicima nastavkom za kapanje sa 5 ml kapi za oko, otopine, u kutiji

TRUSOPT - SANTEN OY

Rp kapi za oči, rastvor [20 mg/1 mL] 1 bočica (LDPE) kapi za oči, rastvora po 5 mL, u kutiji

S01EC04 brinzolamid

Doziranje: smanjenje intraokularnog pritiska kod očne hipertenzije i glaukoma otvorenog ugla ili kao dodatak terapiji beta-blokatorima ili analozima prostaglandinima ili kao monoterapija kod pacijenata koji ne reaguju na beta-blokatore ili kada su beta-blokatori kontraindikovani: 1 kap u donju konjunktivnu vrećicu bolesnog oka 2 puta na dan, ujutro i uveče, ukoliko je neophodno povećati na tri puta dnevno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AZOPT - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp kapi za oči, suspenzija [10 mg/1 mL] 1 bočica sa 5 ml kapi za oči, suspenzije, u kutiji

BRINZOVIS - PHARMAVISION EUROPE LTD.

Rp kapi za oči, suspenzija [10 mg/1 mL] 1 LDPE oftalmološki dozator sa kapaljkom sa 5 ml kapi za oči, suspenzije, u kutiji

BRINZUNO - PHARMATHEN S.A.

Rp kapi za oko, suspenzija [10 mg/1 mL] 5 ml kapi za oko, suspenzije (1 LDPE bočica od 10 ml, sa zapečaćenom LDPE kapaljkom i bijelom PP ili HDPE nepropusnom kapicom), u kutiji

S01EC54 brimonidin, brinzolamid

Doziranje: povišeni intraokularni pritisak kod glaukoma otvorenog ugla i kod očne hipertenzije kad monoterapija nije dovoljna: aplikovati jednu kap 2 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SIMBRINZA - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp kapi za oči, suspenzija [2 mg/1 mL + 10 mg/1 mL] 1 LDPE bočica sa 5 ml kapi za oči, suspenzije, u kutiji

S01ED Blokatori beta-adrenergičnih receptora

S01ED01 timolol

Doziranje: povišen očni pritisak (očna hipertenzija, hronični glaukom otvorenog ugla kao i afakički glaukom, neki oblici sekundarnog glaukoma): liječenje se, obično, započinje

0,25% rastvorom, jedna kap u oko, 1-2 puta dnevno; u težim slučajevima preporučuje se primjena 0,5% rastvora 2 puta dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GLAUMOL - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp kapi za oči, rastvor [5 mg/1 mL] 5 ml kapi za oči, rastvora u plastičnoj (LDPE) bočici sa kapaljkom, zatvorenoj zatvaračem sa sigurnosnim prstenom (PP), u kutiji

NORMATIN - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Š.

Rp kapi za oči, rastvor [6,83 mg/1 mL] 5 ml kapi za oči, rastvora, u bočici, u kutiji

TIMADREN - HEMOFARM A.D. VRŠAC

Rp kapi za oči, rastvor [5 mg/1 mL] 1 bočica (LDPE) sa 5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji

TIMALEN - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

Rp kapi za oko, otopina [5 mg/1 mL] 1 plastična bočica sa 5 ml kapi za oko, otopine sa kapaljkom, u kutiji

TIMOLOL ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

Rp kapi za oči, rastvor [5 mg/1 mL] Staklena bočica sa 5 ml rastvora i sterilna kapaljka u polietilenskoj vrećici, u kutiji

UNITIMOLOL 0,5 % - UNIMED PHARMA SPOL. S.R.O.

Rp kapi za oči, rastvor [5 mg/1 mL] 1 LDPE bočica sa 10 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji

S01ED02 betaksolol

Doziranje: hronični glaukom otvorenog ugla i/ili povišeni očni pritisak: 1 kap dva puta na dan u oboljelo oko (oči).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BETOPTIC S - IMMEDICA PHARMA AB

Rp kapi za oči, suspenzija [2.5 mg/1 mL] 1 LDPE bočica sa 5 ml kapi za oči, suspenzije u kutiji

S01ED51 latanoprost, timolol

Doziranje: smanjenje povišenog intraokularnog pritiska kod bolesnika sa glaukomom otvorenog ugla i bolesnika sa očnom hipertenzijom koji ne reaguju na lokalno primijenjene beta blokatore ili analoge prostaglandina: 1 kap dnevno u bolesno oko (oči); ukoliko se upotrebljava više od jednog topikalnog oftalmološkog lijeka, trebaju se uzimati u razmaku od minimalno 5 min; kontaktna sočiva izvaditi prije stavljanja kapi za oči (mogu se vratiti nakon 15 min.)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

XALACOM - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

Rp kapi za oči, rastvor [50 µg/1 mL + 5 mg/1 mL] 1 bočica od polietilena (LDPE) sa 2,5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji

S01ED51 dorzolamid, timolol

Doziranje: povišen očni pritisak kod bolesnika sa glaukomom otvorenog ugla ili sa pseudoeksfolijativnim glaukomom, kada lokalna primjena beta-blokatora nije dovoljna: 2 puta dnevno po 1 kap; ukoliko se upotrebljava više od jednog topikalnog oftalmološkog lijeka, neophodno je da razmak između aplikovanja bude najmanje 10 min.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

COSOPT - SANTEN OY

Rp kapi za oči, rastvor [20 mg/1 mL + 5 mg/1 mL] 1 bočica (tip-6) sa 5 ml rastvora, u kutiji

DORTIMOL - DEVA HOLDING A.S.

Rp kapi za oko, otopina [20 mg/1 mL + 5 mg/1 mL] 1 polietilenska bočica od 5 ml sa kapaljkom, u kutiji

DORZOVIS COMBO - PHARMAVISION EUROPE LTD.

Rp kapi za oči, rastvor [20 mg/1 mL + 5 mg/1 mL] 1 polietilenska bočica sa 5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji

GLAUMAX - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

Rp kapi za oko, otopina [20 mg/1 mL + 5 mg/1 mL] 5 ml kapi za oko, otopine (1 plastična bočica sa uložnim nastavkom za kapanje), u kutiji

S01ED51 timolol, travoprost

Doziranje: smanjenje povišenog intraokularnog pritiska kod bolesnika sa glaukomom otvorenog ugla ili bolesnika sa očnom hipertenzijom koji ne reaguju na lokalno primijenjene beta blokatore ili analoge prostaglandina: odrasli, uključujući i stariju populaciju, 1 kap u konjunktivnu vrećicu bolesnog oka/očiju jednom dnevno, ujutro ili uveče (u isto vrijeme svakog dana); ukoliko pacijent propusti uzeti jednu dozu, terapiju treba nastaviti uzimanjem sljedeće doze u predviđeno vrijeme; maks. doza 1 kap dnevno u bolesno oko/oči.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DUOTRAV - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp kapi za oko, otopina [5 mg/1 mL + 40 µg/1 mL] LDPE bočica sa 2,5 ml kapi za oko, otopine sa kapaljkom, u kutiji

S01ED51 brinzolamid, timolol

Doziranje: povećan očni pritisak kod odraslih pacijenata sa glaukomom otvorenog ugla ili očnom hipertenzijom kod kojih monoterapija ne osigurava dovoljno sniženje očnog pritiska: 1 kap u konjunktivnu vrećicu bolesnog oka/očiju dvaput dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AZARGA - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp kapi za oči, suspenzija [10 mg/1 mL + 5 mg/1 mL] neprozirna polietilenska bočica od 5 ml, u kutiji

S01EE Analoz i prostaglandina

S01EE01 latanoprost

Doziranje: *povišen intraokularni pritisak kod glaukoma otvorenog ugla; očna hipertenzija:* 1 kap dnevno u oboljelo oko; najbolje uveče; koristi se i u pedijatrijskoj populaciji

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LATANOX - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

Rp kapi za oko, otopina [50 µg/1 mL] 1 bočica sa 2,5 ml kapi za oko, otopine u kutiji

LATASOPT - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ş.

Rp kapi za oči, rastvor [0,05 mg/1 mL] 2,5 ml kapi za oči, rastvora, u bočici, kutiji

UNILAT - UNIMED PHARMA SPOL. S.R.O.

Rp kapi za oči, rastvor [50 µg/1 mL] 1 LDPE bočica sa 2,5 ml kapi za oči, rastvora u kutiji

XALATAN - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

Rp kapi za oči, rastvor [50 µg/1 mL] 1 PE-bočica sa navojnim čepom i zaštitnom kapicom od polietilena sa 2,5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji

S01EE04 travoprost

Doziranje: *snizavanje povišenog intraokularnog pritiska kod pacijenata sa očnom hipertenzijom ili glaukomom otvorenog ugla:* 1 kap dnevno u konjunktivnu vrećicu; optimalan efekat postiže se primjenom uveče.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**TRAVATAN - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG**

Rp kapi za oko, otopina [40 µg/1 mL] LDPE bočica sa 2,5 mL kapi za oko, otopine, u kutiji,

TRAVOVIS - PHARMAVISION EUROPE LTD.

Rp kapi za oči , rastvor [40 µg/1 mL] 1 zaštitna PET/Al/PE kesica sa polipropilenskom bočicom od 5 ml sa 2,5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji

S01EE05 tafluprost

Doziranje: *snizavanje povišenog intraokularnog pritiska kod pacijenata sa očnom hipertenzijom ili glaukomom otvorenog ugla:* 1 kap dnevno u konjunktivnu vrećicu; optimalan efekat postiže se primjenom uveče.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**SAFLUTAN - SANTEN OY**

Rp kapi za oči, rastvor [15 µg/1 mL] 1 bočica (LDPE) kapi za oči, rastvora po 3 mL rastvora, u kutiji

S01G Dekongestivi i antialergici
S01GA Simptomimetici kao dekonjestivi

S01GA01 nafazolin

Doziranje: *dekonjestiv za privremeno ublažavanje tegoba poput svrabi i crvenila uzrokovane različitim iritansima:* ukapati 1-2 kapi u konjunktivnu kesu, najviše 4 puta na dan; preporučeno vrijeme trajanja tretmana je 3 do 4 dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**PROCULIN - ALKALOID AD SKOPJE**

BRp kapi za oči , rastvor [0.3 mg/1 mL] 10 mL rastvora u LDPE - bočici sa PP - zatvaračem u kutiji

S01GA02 tetrazolin

Doziranje: *dekonjestiv sluznice oka kod pacijenata s neinfektivnim nadražajem oka nastalim djelovanjem dima, prašine, vjetra, hlorisane vode, svjetla ili nastalim kao posljedica alergijske upale (peludna groznica):* odrasli i adolescenti stariji od 12 god, 1 kap u svako oko 2-3 puta na dan;

REGISTROVANI LIJEKOVI:**VISIKLEAR - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**

BRp kapi za oko, otopina [0,5 mg/1 mL] 15 ml kapi za oko, otopine u plastičnoj bočici s nastavkom za kapanje i sigurnosnim zatvaračem za djecu, u kutiji

VISINE CLASSIC - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

BRp kapi za oko, otopina [0.5 mg/1 mL] prozirna plastična (LDPE) bočica s umetkom (LDPE) za kapanje i bijelim plastičnim (HDPE/PP) sigurnosnim zatvaračem za djecu, sa 15 ml kapi za oko, otopine, u kutiji

VIZOL - JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D.

BRp kapi za oko, otopina [0,5 mg/1 mL] 10 ml kapi za oko, otopine u plastičnoj bočici, u kutiji

S01GX Ostali antialergici

S01GX07 azelastin

Doziranje: liječenje i prevencija simptoma sezonskog alergijskog konjunktivitisa odraslih i djece starije od 4 godine; liječenje simptoma nesezonskog alergijskog konjunktivitisa odraslih i djece starije od 12 godina: po 1 kap u oba oka 2 puta dnevno; ukoliko je neophodno, može se povećati do 4 puta dnevno; ne koristiti duže od 6 sedmice u kontinuitetu bez prethodne konsultacije sa ljekarom.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALLERGODIL - BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH

Rp kapi za oči, rastvor [0.5 mg/1 mL] 1 bočica (HD polietilen visoke gustine) sa 6 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji

S01GX09 olopatadin

Doziranje: liječenje oftalmičkih znakova i simptoma sezonskog alergijskog konjunktivitisa; uobičajena doza je jedna kap u konjunktivalnu vrećicu zahvaćenog oka dva puta na dan (svakih 8 sati); ako se istovremeno koristi više oftalmoloških lijekova, primjenu treba odvojiti 5-10 minuta; lijek se smije davati djeci (u dobi od 3 godine i starijim), a dozira se jednako kao u odraslih.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OPALERG - UNIMED PHARMA SPOL. S.R.O.

Rp kapi za oči, rastvor [1 mg/1 mL] 1 bočica sa 10 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji

OPATANOL - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

Rp kapi za oko, otopina [1 mg/1 mL] LDPE bočica sa 5 ml kapi za oko, otopine, u kutiji

PALLADA - WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ş.

Rp kapi za oči, rastvor [1 mg/1 mL] LDPE bočica sa 5 ml kapi za oko, rastvora, u kutiji

S01L Lijekovi za liječenje vaskularnih bolesti oka **S01LA Antineovaskularni lijekovi**

S01LA04 ranibizumab

Doziranje: neovaskularna (vlažna) starošću uslovljena makularna degeneracija (ADM); dijabetički makularni edem (DME); proliferativna dijabetička retinopatija; makularni edem nastao kao posljedica okluzije retinalne vene, horoidalna neovaskularizacija: intravitrealna primjena, inicijalno 0,5 mg jednom mjesečno, dok se ne postigne maksimalna oština vida i/ili dok nema znakova aktivnosti bolesti, tj. nema promjena u oštrini vida i u drugim znakovima i simptomima bolesti tokom kontinuirane terapije, za nastavak terapije i sljedeći dozni interval-konsultovati literaturu proizvoda; ukoliko nema poboljšanja u parametrima oštine vida i anatomske parametrima, prekinuti terapiju; istovremeno liječenje dijabetičkog makularnog edema ili makularnog edema nastalog kao posljedica okluzije retinalne vene sa laserskom fotokoagulacijom: intravitrealno, 0,5 mg najmanje 30 min. poslije laserske fotokoagulacije; liječenje retinopatije nedonoščadi: intravitrealno, 0,2 mg

REGISTROVANI LIJEKOVI:

LUCENTIS - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

- ZU rastvor za injekciju [10 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 0,23 ml rastvora za injekciju u kutiji sa jednom filterskom iglom za izvlačenje rastvora iz bočice

S01LA05 aflibercept

Doziranje: *neovaskularne (vlažne) starošću uslovljene makularne degeneracije (nAMD):* intravitrealnom injekcijom, odrasli preko 18 god, 2 mg u zahvaćeno oko jednom mjesečno tri uzastopna mjeseca, zatim svaka dva mjeseca; *razmotriti učestalost terapije nakon 12 mjeseci; makularni edem kao posljedica okluzije retinalne vene (okluzije ogranka retinalne vene (BRVO) ili okluzije centralne retinalne vene (CRVO)):* intravitrealnom injekcijom, odrasli preko 18 god, 2 mg u zahvaćeno oko jednom mjesečno; vizuelni i anatomski ishod pratiti na mjesečnom nivou; nastaviti terapiju dok vizuelni i anatomski ishod ne budu stabilni tokom tromjesečne procjene (prekinuti sa terapijom ukoliko nema poboljšanja u vizuelnom i anatomskom ishodu nakon početne 3 injekcije); po potrebi sledeće doze se mogu dati odvojeno najmanje jednom mjesečno; *dijabetički makularni edem (DME):* intravitrealnom injekcijom, odrasli preko 18 god. 2 mg u zahvaćeno oko jednom mjesečno tokom 5 mjeseci, a nakon toga svaka 2 mjeseca; nakon 12 mjeseci razmotriti učestalost terapije (prekinuti sa terapijom ukoliko nema poboljšanja u vizuelnom i anatomskom ishodu); *liječenje oštećenja vida zbog horoidalne neovaskularizacije kod kratkovidnosti:* intravitrealnom injekcijom, preporučena doza je 2 mg; interval između dvije doze ne smije biti kraći od jednog mjeseca; Eylea otopina za injekciju 114,3 mg/ml se primjenjuje u dozi od 8 mg kod indikacija *nAMD i DME*, za više informacija o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EYLEA - BAYER AKTIENGESellschaft

- ZU otopina za injekciju [114,3 mg/1 mL] 1 bočica (staklo tip I) sa 0,263 ml otopine i 18 G filter igla, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [40 mg/1 mL] 1 bočica sa 100 mikrolitara otopine za injekciju, u kutiji

S01LA06 brolucizumab

Doziranje: *neovaskularna (vlažna) senilna makularna degeneracija:* intravitrealnom injekcijom 6 mg jednom mjesečno za prve 3 doze, za nastavak terapije i naredne intervale doziranja konsultovati literaturu proizvođa; prekinuti terapiju ukoliko nema poboljšanja u vizuelnim i anatomskim ishodima; *dijabetički makularni edem:* intravitrealnom injekcijom 6 mg svakih 6 nedjelja za prvih 5 doza, za nastavak terapije i naredne intervale doziranja konsultovati literaturu proizvođa

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BEOVU - NOVARTIS PHARMA SERVICES AG

- ZU rastvor za injekciju [120 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 0,23 ml rastvora i 1 filter igla, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju u napunjenom špricu [120 mg/1 mL] 1 napunjena šprica od stakla (u PETG blister kutiji)

S01LA09 faricimab

Doziranje: *neovaskularna (vlažna) senilna makularna degeneracija, dijabetički makularni edem; oštećenje vida uzrokovano makularnim edemom kao posljedicom okluzije mrežnične vene:* intravitrealnom injekcijom, za informacije o doziranju konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VABYSMO - F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

ZU	otopina za injekciju [120 mg/1 mL] 1 staklena bočica od 0,24 ml i 1 igla s filtrom, u kutiji

S01X Ostali lijekovi za liječenje bolesti oka

S01XA Ostali lijekovi za liječenje bolesti oka

S01XA18 ciklosporin

Doziranje: povećanje produkcije suza kod pacijenata kod kojih je produkcija suza prema pretpostavkama potisnuta usljed upale oka povezane sa keratokonjuktivitisom sicca: 2 puta dnevno (na 12 h) po 1 kap u oba oka

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEPORES 0.05% - DEVA HOLDING A.S.

Rp kapi za oči, emulzija [0,5 mg/1 mL] 3 PET/Al/PE vrećice sa po 10 jednodoznih LDPE bočica, u kutiji

**S02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI UHA
(OTOLOGICI)**

S02A ANTIINFEKTIVI

S02AA Antiinfektivni

S02AA15 ciprofloksacin

Doziranje: akutno zapaljenje vanjskog uha: odrasli i djeca uzrasta 1 god. i starija, ukapati sadržaj jednog jednodoznog kontejnera u oboljelo uho 2 puta dnevno tokom 7 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CETRAXAL - LABORATORIOS SALVAT, S.A.

Rp kapi za uši, rastvor [2 mg/1 mL] 15 jednodoznih spremnika (LDPE) sa 0,25 ml rastvora, u aluminijumskoj kesici, u kutiji

S02C Kortikosteroidi i antiinfektivni u kombinaciji

S02CA Kortikosteroidi i antiinfektivni u kombinaciji

S02CA01 prednizolon, tetrakain, tirotricin

Doziranje: suzbijanje bola i zapaljenskih reakcija u spoljašnjem ušnom kanalu, koje prate nekomplikovano, akutno zapaljenje spoljašnjeg uha: kod odraslih pacijenata na svakih sat vremena ukapati 5-6 kapi u oboljelo uho, ili natopiti sterilnu gazu i uvući u slušni kanal, a kod djece starije od 2 godine 2-4 kapi.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OTOL H - HEMOFARM A.D. VRŠAC

Rp kapi za uši, rastvor [1 mg/1 g+ 10 mg/1 g+ 0.1 mg/1 g] 1 staklena bočica sa 10 g kapi za uši, rastvora, sa zatvaračem sa kapaljkom za viskozne rastvore, u kutiji

S02CA05 ciprofloksacin, fluocinolon acetonid

Doziranje: akutna upala vanjskog uha, akutna upala srednjeg uha kod pacijenata sa ugrađenim ventilacionim cjevčicama: djeca od 6 mjeseci i starija, odrasli i stariji pacijenti, ukapati 6-8 kapi u vanjski ušni kanal bolnog uha na svakih 12 sati tokom 7 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CETRAXAL PLUS - LABORATORIOS SALVAT, S.A.

Rp kapi za uši, rastvor [3 mg/1 mL+ 0,25 mg/1 mL] 1 LDPE bočica sa 10 ml rastvora sa kapaljkom(LDPE) i čepom (HDPE), u kutiji

S03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I UHA
S03A Antiinfektivni
S03AA Antiinfektivni

S03AA ofloksacin

Doziranje: oftalmologija: liječenje bakterijskih infekcija prednjeg očno segmenta izazvanih patogenim uzročnicima osjetljivim na ofloksacin; prevencija infekcija oka u sklopu preoperativne pripreme, nakon intraokularnih operacija, uklanjanja stranog tijela i povreda oka; odrasli: tokom prva dva dana ukapava se 1-2 kapi na svaka 2-4 sata, a zatim 4 puta dnevno; trajanje liječenja treba da bude najmanje 7 dana (uz dodatna 3 dana nakon prestanka lučenja gnojnog sekreta), ali ne duže od 10 dana; djeca starija od 1 godine: ljekar mora da posebno propiše korišćenje i doziranje preparata, uobičajena doza iznosi 1 kap, 4 puta dnevno tokom 7 dana. Otolologija: liječenje bakterijskih infekcija izazvanih patogenima osjetljivim na ofloksacin: otitis externa i otitis media chronica suppurativa (sa oštećenjem bubne opne): kod odraslih i djece starije od 12 godina uobičajena doza iznosi 10 kapi, 2 puta dnevno tokom 10 dana (otitis externa), odnosno tokom 14 dana (otitis media chronica suppurativa); zapaljenja spoljašnjeg ušnog kanala i akutnog zapaljenja srednjeg uha sa timpanostomijom: kod djece uzrasta od 1 do 11 godina preporučena doza iznosi 5 kapi, 2 puta dnevno tokom 10 dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

UNIFLOX 0,3% - UNIMED PHARMA SPOL. S.R.O.

Rp kapi za uši/oči, rastvor [3 mg/1 mL] LDPE bočica sa 10 ml kapi za uši/oči, rastvora i kapaljkom, u kutiji

S03AA06 gentamicin

Doziranje: *bakterijske infekcije oka:* odrasli, uključujući starije osobe i djecu, 1-2 kapi u oboljelo oko do 6 puta dnevno, ili češće ako je potrebno (u slučaju težih infekcija biće potrebna primjena 1-2 kapi svakih 15-20 min. u početku, smanjujući postepeno učestalost kapanja kako se infekcija dovodi pod kontrolu); *bakterijske infekcije uha:* 2-3 kapi u oboljelo uho 3-4 puta dnevno i u toku noći, ili češće ako je potrebno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GENTOKULIN - HEMOFARM A.D. VRŠAC

Rp kapi za uši/oči, rastvor [3 mg/1 mL] 1 bočica od polietilena niske gustine (LDPE) 10 mL, sa kapaljkom od polietilena niske gustine (LDPE) i zatvaračem od polietilena visoke gustine (HDPE), u kutiji

S03AA07 ciprofloksacin

Doziranje: oftalmologija: *kornealni ulceri:* prvi dan po dvije kapi ukapavati u zahvaćeno oko svakih 15 minuta tokom prvih 6 sati, a zatim po dvije kapi svakih 30 minuta preostali dio prvog dana; drugi dan po 2 kapi svakih sat vremena i od 3.-14. dana po 2 kapi svaka 4 sata; *bakterijske infekcije:* 1 do 2 kapi u oko 4 puta na dan, kod težih infekcija prva dva dana doza može biti 1-2 kapi svaka 2 sata (maksimalno trajanje terapije 21 dan). otologija: *infekcije uva (upala ušnog kanala ili srednjeg uva):* odrasli: 4 kapi u ušni kanal 2 puta na dan; djeca starija od 1 godine: 3 kapi 2 puta na dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CITERAL - ALKALOID AD SKOPJE

Rp kapi za uši/oči, rastvor [3 mg/1 mL] bočica sa 5 ml kapi za oči i uši, rastvora, i plastična kapaljka, u kutiji

S03C *Kortikosteroidi i antiinfektivni u kombinaciji*

S03CA *Kortikosteroidi i antiinfektivni u kombinaciji*

S03CA01 deksametazon, neomicin

Doziranje: inflamatorna stanja oka i spoljašnjeg ušnog kanala koja reaguju na terapiju steroidima kada je istovremeno potrebna profilaktička antibiotska terapija (poslije isključenja postojanja virusnog i gljivičnog oboljenja): 1-2 kapi u oboljelo oko 6 puta na dan u zavisnosti od težine inflamacije ili 2-3 kapi u ušni kanal 3-4 puta na dan; kapi ne treba davati duže od 7 dana

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEXAMETHASON-NEOMYCIN GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

Rp kapi za uši/oči, rastvor [1 mg/1 mL+ 3.5 mg/1 mL] 1 plastična (LDPE) bočica sa kapaljkom, koja sadrži 10 ml rastvora i zatvorena je zatvaračem sa sigurnosnim prstenom (PP), u kutiji

V	OSTALO
V03	OSTALI NERAZVRSTANI TERAPIJSKI PROIZVODI
V03A	Ostali nerazvrstani terapijski proizvodi
V03AB	Antidoti

V03AB14 **protamin**

Doziranje: *neutralisanje antikoagulantnog efekta heparina* (prije operacije, poslije bubrežne dijalize, poslije operacije na otvorenom srcu, kod većih krvarenja, kod predožiranja heparinom): spora i.v. inj tokom 10 min. doza zavisi od količine i vrste heparina koji treba neutralisati

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PROMIN - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

ZU rastvor za injekciju/ infuziju [5000 i.j./1 ampula] 1 ampula (staklo tip I) sa 5 mL rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

PROTAMIN SULFAT GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

ZU rastvor za injekciju [50 mg/5 mL] 5 staklenih ampula po 5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

V03AB35 **sugamadeks**

Doziranje: *rutinska reverzija neuromuskularne blokade izazvane rokuronijumom ili vekuronijumom:* i.v.inj. početi sa 2-4 mg/kg, zatim po potrebi 4 mg/kg, ako je nakon blokade izazvane rokuronijumom ili vekuronijumom postignut oporavak, za detalje konsultovati informacije o proizvodu; *neposredna reverzija blokade izazvane rokuronijumom:* i.v.inj. odrasli 16 mg/kg (konsultovati informacije o proizvodu)

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SUGAMMADEX MSN - MSN LABS EUROPE LIMITED

ZU rastvor za injekciju [100 mg/1 mL] 10 bočica od 2 mL (staklo tip I) , u kutiji

AXONIN - HEMOFARM PROIZVODNJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA D.O.O. BANJA LUKA

ZU rastvor za injekciju [100 mg/1 mL] 10 bočica sa 2ml rastvora za injekciju, u kutiji

ZU rastvor za injekciju [100 mg/1 mL] 10 bočica sa 5ml rastvora za injekciju, u kutiji

V03AC **Gvožđe kompleksirajući agensi**

V03AC03 **deferasiroks**

Doziranje: transfuzije povezane sa hroničnim preopterećenjem gvožđem kod pacijenata sa major beta talasemijom koji su često primali transfuzije krvi (7 ml/kg/mjesec ili više koncentrata eritrocita): oralno, odrasli i djeca preko 6 god. u početku 7-21 mg/kg jednom dnevno prema koncentraciji feritina u serumu i količini krvi koja je upotrijebljena za transfuziju (konsultovati literaturu proizvoda); doza održavanja, podesiti dozu svakih 3-6 mjeseci u koracima od po 3,5-7 mg/kg prema koncentraciji feritina u serumu; dozu održavanja podesiti prema koncentraciji feritina u serumu; maks. 28 mg/kg dnevno, uobičajeno maks. 21 mg/kg dnevno; transfuzije povezane sa hroničnim preopterećenjem gvožđem kada je deferoksamin kontraindikovao ili neadekvatan kod pacijenata sa major beta talasemijom koji su rijetko primali transfuzije krvi (manje od 7 ml/kg/mjesec koncentrata eritrocita); transfuzije povezane sa hroničnim preopterećenjem gvožđem kada je deferoksamin kontraindikovao ili neadekvatan kod pacijenata sa drugim anemijama: oralno, odrasli i djeca preko 2 god. u početku 7-21 mg/kg jednom dnevno

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

prema koncentraciji feritina u serumu i količini krvi koja je upotrijebljena za transfuziju (konsultovati literaturu proizvoda); doza održavanja, podesiti dozu svakih 3-6 mjeseci u koracima od po 3,5-7 mg/kg prema koncentraciji feritina u serumu; dozu održavanja podesiti prema koncentraciji feritina u serumu; maks. 28 mg/kg dnevno, uobičajeno maks. 21 mg/kg dnevno; hronično preopterećenje gvožđem kada je deferoksamini kontraindikovani ili neadekvatni kod pacijenata sa sindromom talasemije nezavisnim od transfuzija: odrasli i djeca preko 10 god. početna doza 7 mg/kg jednom dnevno; doza održavanja, podesiti dozu svakih 3-6 mjeseci u koracima po 3,5-7 mg/kg prema koncentraciji feritina u serumu i u jetri (konsultovati literaturu proizvoda); maks. 14 mg/kg dnevno

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEFERASIROKS PLIVA - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- Rp tableta za oralnu suspenziju [500 mg/1 tableta] 30 tableta za oralnu suspenziju (10 PVC/PE/PVDC/PE/PVC-Al blistera sa po 3 tablete), u kutiji

EXABEL - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

- Rp filmom obložena tableta [180 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PE/PVDC-Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [360 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PE/PVDC-Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
- Rp filmom obložena tableta [90 mg/1 tableta] 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PE/PVDC-Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

FUARTE - ABDI İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- Rp tableta za oralnu suspenziju [125 mg/1 tableta] 28 tableta za oralnu suspenziju (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp tableta za oralnu suspenziju [250 mg/1 tableta] 28 tableta za oralnu suspenziju (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
- Rp tableta za oralnu suspenziju [500 mg/1 tableta] 28 tableta za oralnu suspenziju (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

THALADEF - MSN LABS EUROPE LIMITED

- Rp film tableta [360 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji
- Rp film tableta [90 mg/1 tableta] 30 film tableta (3 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ZEOKS - SYNTHON B.V.

- Rp film tableta [180 mg/1 tableta] 30 film tableta (1 PVC/PVDC/Al blister po 30 tableta) u kutiji
- Rp film tableta [360 mg/1 tableta] 30 film tableta (1 PVC/PVDC/Al blister po 30 tableta) u kutiji
- Rp film tableta [90 mg/1 tableta] 30 film tableta (1 PVC/PVDC/Al blister od 30 tableta) u kutiji

V03AE *Lijekovi za liječenje hiperkalemije i hiperfosfatemije*

V03AE02 sevelamer

Doziranje: hiperfosfatemija kod pacijenata na hemodijalizi ili peritonealnoj dijalizi; hiperfosfatemija kod pacijenata s hroničnom bubrežnom bolesti koji nisu na dijalizi, a kod kojih je serumski fosfor $\geq 1,78$ mmol/l; u sklopu višestrukog terapijskog pristupa koji može uključivati dodatno uzimanje kalcijuma, te 1,25-dihidroksi vitamina D3 ili nekog od njegovih analoga u svrhu sprečavanja razvoja renalne osteodistrofije: odrasli preko 18 god, 2,4-4,8 g dnevno u 3 podijeljene doze uz obrok, podešavati prema nivou serumskog fosfora (uobičajeni opseg doza 2,4-12 g dnevno podijeljeno u 3 doze)

REGISTROVANI LIJEKOVI:**DIASEV - SYNTHON HISPANIA S.L.**

Rp filmom obložena tableta [800 mg/1 tableta] 180 filmom obloženih tableta (u HDPE bočici sa polipropilenskim čepom) u kutiji

PERFOSE - VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM Sirketi

Rp filmom obložena tableta [800 mg/1 tableta] 180 filmom obloženih tableta (18 neprozirnih PVC/PE/PVDC blistera sa 10 tableta), u kutiji

SEVASOL - SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICALS CO,LTD

Rp filmom obložena tableta [800 mg/1 tableta] HDPE bočica sa 180 filmom obloženih tableta, u kutiji

Rp filmom obložena tableta [800 mg/1 tableta] HDPE bočica sa 30 filmom obloženih tableta, u kutiji

V03AE03**lantan karbonat**

Doziranje: hiperfosfatemija kod pacijenata sa hroničnom renalnom insuficijencijom koji su na hemodijalizi ili kontinuiranoj ambulantnoj peritonealnoj dijalizi (CAPD); hiperfosfatemija kod pacijenata sa hroničnim oboljenjem bubrega koji nisu na dijalizi, s nivoom fosfata u serumu 1,78 mmol/l ili više koja se ne može kontrolisati dijetom sa niskim unosom fosfata: oralno, odrasli, 1,5-3 g dnevno u podijeljenim dozama, doze se podešavaju prema koncentraciji fosfata u serumu svake 2-3 nedjelje, uzima se sa ili neposredno poslije obroka

REGISTROVANI LIJEKOVI:**ANTAX - NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.**

Rp oralni prašak [1000 mg/1 kesica] 1 kartonska kutija u kojoj se nalazi 9 manjih kartonskih kutija sa po 10 (PET/Al/PET/PE) kesica od 3,2 g

Rp oralni prašak [750 mg/1 kesica] 1 kartonska kutija u kojoj se nalazi 9 manjih kartonskih kutija sa po 10 (PET/Al/PET/PE) kesica od 2,4 g

V03AF**Lijekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima****V03AF01****mesna**

Doziranje: *prevencija urotelijalne toksičnosti kod pacijenata liječenih oksazafosforinom (ifosfamidom, ciklofosfamidom, trofosfamidom):* daje se i.v. inj. doza se izračunava na osnovu odgovarajuće doze oksazafosforina - za više informacija konsultovati literaturu proizvoda.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**UROMITEXAN - BAXTER AG**

ZU rastvor za injekciju [400 mg/4 mL] 15 ampula po 4 ml rastvora za injekciju

V03AF03**kalcijum-folinat**

Doziranje: *prevencija metotreksatom izazvanih neželjenih efekata:* uobičajeno se počinje 12-24 sata poslije infuzije metotreksatom, i.m. inj. ili i.v. inj. ili i.v. inf. 15 mg, ponoviti svakih 6 h tokom 72 sata; za više informacija konsultovati lokalne protokole liječenja; *očekivano predoziranje metotreksatom:* i.v. inj. ili i.v. inf. (maks. brzina 160 mg/min.), početna doza se određuje prema primjenjenom protokolu metotreksata u srednjim i visokim dozama; *dodatak terapiji fluorouracilom u citotoksičnoj terapiji:* konsultovati literaturu proizvoda

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FOLINSKA KISELINA KALCEKS - AS KALCEKS

- ZU rastvor za injekciju/ infuziju [1 ml/10 mg] 10 bočica (prozirno staklo)
po 30 mL rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju/ infuziju [1 ml/10 mg] 10 bočica (prozirno staklo)
po 50 mL rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju/ infuziju [10 mg/1 mL] 10 bočica (prozirno staklo)
po 10 mL rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju/ infuziju [10 mg/1 mL] 10 bočica (prozirno staklo)
po 100 mL rastvora za injekciju /infuziju, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju/ infuziju [10 mg/1 mL] 10 bočica (prozirno staklo)
po 20 mL rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju/ infuziju [10 mg/1 mL] 10 bočica (prozirno staklo)
po 5 mL rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

KALCIJEV FOLINAT PLIVA 10 MG/ML - PLIVA HRVATSKA D.O.O.

- ZU otopina za injekciju/ infuziju [100 mg/10 mL] 1 staklena bočica sa 10
ml otopine za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju/ infuziju [300 mg/30 mL] 1 staklena bočica sa 30
ml otopine za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju/ infuziju [50 mg/5 mL] 1 staklena bočica sa 5 ml
otopine za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju/ infuziju [500 mg/50 mL] 1 staklena bočica sa 50
ml otopine za injekciju/infuziju, u kutiji

V03AN *Medicinski gasovi*

V03AN01 kiseonik

Doziranje: liječenje ili prevencija stanja hipoksije i hipoksemije (infarkt miokarda, akutna plućna oboljenja, plućne embolije, mladi bolesnici u status astmatikusu, hronična opstruktivna oboljenja pluća za vrijeme infektivne egzacerbacije, predoziranje lijekovima koji djeluju depresivno na centar za respiraciju, muskuloskeletna trauma i trauma glave); kao dio dotoka svježeg gasa u anesteziji ili intenzivnoj njezi; za liječenje akutnog napada Klaster glavobolje; stanje šoka; trovanje ugljen monoksidom; teška anemija; lokalana ishemija tkiva (ishemija miokarda, cerebralna ishemija, periferna ishemija, usljed vaskularne okluzije); sindrom apnee u snu; za liječenje ronilačke bolesti dekompresije; zračne embolije drugog porijekla i trovanja ugljen-monoksidom; dodatna terapija kod teških osteoradionevroza i mionekroze izazvane klostridijumom (gasne gangrene): za doziranje konsultovati literaturu proizvođa

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MEDICINSKI KISEONIK TGT - TGT A.D. LAKTAŠI

- ZU medicinski gas, kriogeni [99,5 % v/v/1 inhalacija] Pokretna
rashladna posuda (rendžer) zapremine 1000L

MEDICINSKI KISEONIK KRAS - KRAS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU LAKTAŠI

- ZU medicinski gas, kriogeni [99,5 % v/v/1 inhalacija] Autocisterna,
zapremine 25 000 litara. Autocisterna je izrađena od nehrđajućeg
čelika, namjenjena za ponovno punjenje i transport. Pritisak: od 2
do 3 bara.
- ZU medicinski gas, kriogeni [99,5 % v/v/1 inhalacija] Mobilna kriogena
posuda, zapremine 498 litara. Mobilna kriogena posuda je izrađena
od nehrđajućeg čelika, namjenjena za ponovno punjenje i transport.
Pritisak: od 2 do 13,5 bara

**MEDICINSKI KISEONIK KRAS - KRAS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
LAKTAŠI**

ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] 50 L kiseonika, u boci za gas
ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] Baterija boca za gas, zapremine 12x40 litara. Baterija boca za gas je izrađena od čelika i sadrži on/off ventil za punjenje i ispuštanje gasa. Pritisak: 150 ili 200 bara
ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] Baterija boca za gas, zapremine 12x50 litara. Baterija boca za gas je izrađena od čelika i sadrži on/off ventil za punjenje i ispuštanje gasa. Pritisak: 150 ili 200 bara
ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] Boca za gas, zapremine 10 litara. Boca za gas je izrađena od čelika i sadrži on/off ventil za punjenje i ispuštanje gasa. Boca je obojena bijelom bojom u gornjem i donjem dijelu. Pritisak: 150 ili 200 bara
ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] Boca za gas, zapremine 14 litara. Boca za gas je izrađena od čelika i sadrži on/off ventil za punjenje i ispuštanje gasa. Boca je obojena bijelom bojom u gornjem i donjem dijelu. Pritisak: 150 ili 200 bara
ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] Boca za gas, zapremine 20 litara. Boca za gas je izrađena od čelika i sadrži on/off ventil za punjenje i ispuštanje gasa. Boca je obojena bijelom bojom u gornjem i donjem dijelu. Pritisak: 150 ili 200 bara
ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] Boca za gas, zapremine 3 litra. Boca za gas je izrađena od čelika i sadrži on/off ventil za punjenje i ispuštanje gasa. Boca je obojena bijelom bojom u gornjem i donjem dijelu. Pritisak: 150 ili 200 bara
ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] Boca za gas, zapremine 30 litara. Boca za gas je izrađena od čelika i sadrži on/off ventil za punjenje i ispuštanje gasa. Boca je obojena bijelom bojom u gornjem i donjem dijelu. Pritisak: 150 ili 200 bara
ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] Boca za gas, zapremine 40 litara. Boca za gas je izrađena od čelika i sadrži on/off ventil za punjenje i ispuštanje gasa. Boca je obojena bijelom bojom u gornjem i donjem dijelu. Pritisak: 150 ili 200 bara
ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] Boca za gas, zapremine 5 litara. Boca za gas je izrađena od čelika i sadrži on/off ventil za punjenje i ispuštanje gasa. Boca je obojena bijelom bojom u gornjem i donjem dijelu. Pritisak: 150 ili 200 bara

MEDICINSKI KISEONIK TGT - TGT A.D. LAKTAŠI

ZU	medicinski gas, kriogeni [99,5 % v/v/1 inhalacija] medicinski gas, kriogeni u pokretnoj rashladnoj posudi (cisterna) volumena 23 000 L
ZU	medicinski gas, kriogeni [99,5 % v/v/1 inhalacija] medicinski gas, kriogeni u pokretnoj rashladnoj posudi (cisterna) volumena 19 000 L
ZU	medicinski gas, kriogeni [99,5 % v/v/1 inhalacija] Pokretna rashladna posuda (rendžer) zapremine 180L
ZU	medicinski gas, kriogeni [99,5 % v/v/1 inhalacija] Pokretna rashladna posuda (rendžer) zapremine 600L
ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] baterija čeličnih boca za gas pod pritiskom od 150 bara ili 200 bara: 12 x 50 L

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] baterija čeličnih boca za gas pod pritiskom od 150 bara ili 200 bara: 16 x 50 L
ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] Čelična boca za gas pod pritiskom od 150 bara ili 200 bara, zapremine 10 L
ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] Čelična boca za gas pod pritiskom od 150 bara ili 200 bara, zapremine 2 L
ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] Čelična boca za gas pod pritiskom od 150 bara ili 200 bara, zapremine 3L
ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] Čelična boca za gas pod pritiskom od 150 bara ili 200 bara, zapremine 40 L
ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] Čelična boca za gas pod pritiskom od 150 bara ili 200 bara, zapremine 5 L
ZU/Rp	medicinski gas, komprimovani [99,5 % v/v/1 inhalacija] Čelična boca za gas pod pritiskom od 150 bara ili 200 bara, zapremine 50 L

MEDICINSKI KISIK MESSER - MESSER TEHNOPLIN D.O.O.

ZU/Rp	medicinski gas, komprimirani [99,5 % v/v/1 inhalacija] baterija boca za gas: 4x150 l (čelična, 150 ili 200 bar)

MEDICINSKI KISIK MESSER - MESSER TEHNOPLIN D.O.O.

ZU	medicinski gas, kriogeni [99,5 % v/v/1 inhalacija] pokretna kriogena posuda (čelična cisterna) do 24000kg
ZU	medicinski gas, kriogeni [99,5 % v/v/1 inhalacija] pokretna kriogena posuda (čelični rendžer) 1x 1000 l
ZU	medicinski gas, kriogeni [99,5 % v/v/1 inhalacija] pokretna kriogena posuda (čelični rendžer) 1x 180 l
ZU/Rp	medicinski gas, komprimirani [99,5 % v/v/1 inhalacija] baterija boca za gas: 6x150 l (čelična, 150 ili 200 bar)
ZU/Rp	medicinski gas, komprimirani [99,5 % v/v/1 inhalacija] boca za gas: 1x 10l (čelična, 150 ili 200 bar)
ZU/Rp	medicinski gas, komprimirani [99,5 % v/v/1 inhalacija] boca za gas: 1x 14l (čelična, 150 ili 200 bar)
ZU/Rp	medicinski gas, komprimirani [99,5 % v/v/1 inhalacija] boca za gas: 1x 20l (čelična, 150 ili 200 bar)
ZU/Rp	medicinski gas, komprimirani [99,5 % v/v/1 inhalacija] boca za gas: 1x 27 l (čelična, 150 ili 200 bar)
ZU/Rp	medicinski gas, komprimirani [99,5 % v/v/1 inhalacija] boca za gas: 1x 3l (čelična, 150 ili 200 bar)
ZU/Rp	medicinski gas, komprimirani [99,5 % v/v/1 inhalacija] boca za gas: 1x 40 l (čelična, 150 ili 200 bar)
ZU/Rp	medicinski gas, komprimirani [99,5 % v/v/1 inhalacija] boca za gas: 1x 50l (čelična, 150 ili 200 bar)
ZU/Rp	medicinski gas, komprimirani [99,5 % v/v/1 inhalacija] boca za gas: 1x 5l (čelična, 150 ili 200 bar)
ZU/Rp	medicinski gas, komprimirani [99,5 % v/v/1 inhalacija] boca za gas: 1x1l (čelična, 150 ili 200 bar)

V03AX

Ostali terapijski proizvodi

V03AX

kalcijum-fosfat, kalcijum-karbonat, kamilica, magnezijum-fosfat, željezo-fosfat

Doziranje: podsticanje spontanog saniranja problema koji se javlja kod dojenčadi tokom nicanja zubića praćenog intenzivnim bolom, povišenom temperaturom, dijarejom, razdražljivošću, mirom i nesanicom: djeca 4 mjeseca - 6 god. svakih 30 minuta stavite

oko 8 globula na djetetov jezik, a u slučaju jake boli, svakih 15 minuta; čim se ublaže tegobe, globule treba davati rjeđe; trajanje tretmana nije ograničeno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OSADENT - DR. A. & L. SCHMIDGALL GMBH & CO KG

BRp pilule [3.8 mg/1 g+ 0.8 mg/1 g+ 3.8 mg/1 g+ 0.8 mg/1 g+ 0.8 mg/1 g] 7,5 g pilula (1 polipropilenska tuba) u kutiji

V06 Opšti nutrienti

V06D Ostali nutrienti

V06DD Aminokiseline, uključujući kombinacije sa polipeptidima

V06DD histidin, ketoaminokiseline, lizin, tirozin, treonin, triptofan

Doziranje: prevencija i liječenje oštećenja nastalih usljed nepravilnog ili manjkavog metabolizma proteina kod pacijenata sa hroničnom bubrežnom bolešću u vezi sa unosom proteina putem hrane ograničenim na 40 g/dan ili manje (odrasli pacijenti; ovo se obično odnosi na pacijente sa brzinom glomerularne filtracije ispod 25 ml/min: odrasli (70 kg tjelesne mase) 4-8 tableta tri puta dnevno tokom obroka

REGISTROVANI LIJEKOVI:

KETOSTERIL - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

Rp filmom obložena tableta [38 mg/1 tableta+ 67 mg/1 tableta+ 101 mg/1 tableta+ 68 mg/1 tableta+ 86 mg/1 tableta+ 59 mg/1 tableta+ 105 mg/1 tableta+ 30 mg/1 tableta+ 53 mg/1 tableta+ 23 mg/1 tableta] 100 filmom obloženih tableta (5 Al/PVC/PVDC blistera sa po 20 tableta u zaštitnoj aluminijskoj vrećici), u kutiji

V07 SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI

V07A Svi ostali neterapijski proizvodi

V07AB Rastvarači i razblaživači, uključujući rastvore za ispiranje

V07AB voda za injekciju

Doziranje: za rastvaranje preparata u obliku suve supstance za parenteralnu primjenu, za razrjeđivanje injekcionih rastvora do potrebnog volumena: kada se koristi za razrjeđivanje i rastvaranje lijekova, uputstva i svojstva dodatnih lijekova određivače potrebnu količinu pripremljenog rastvora i način davanja

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AQUA AD INIECTABILIA ALKALOID - ALKALOID AD SKOPJE

BRp rastvarač za parenteralnu upotrebu [5 ml/1 viala] 50 ampula po 5 ml (10 PVC uložaka po 5 ampula), u kutiji

AQUA BIDEŠT. „FRESENIUS“ - FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

BRp rastvarač za parenteralnu upotrebu [10 ml/1 ampula] 20 polietilenskih ampula po 10 mL vode za injekcije, u kutiji

Rp rastvarač za parenteralnu upotrebu [500 ml/1 boca] 10 polietilenskih boca po 500 mL vode za injekcije, u kutiji

VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA - GALENIKA A.D. BEOGRAD

BRp rastvarač za parenteralnu upotrebu [5 ml/1 ampula] 50 staklenih ampula po 5 ml rastvarača za parenteralnu upotrebu, u kutiji

VODA ZA INJEKCIJU LEKHM - JOINT STOCK COMPANY LEKHM-KHARKIV

- Rp rastvarač za parenteralnu upotrebu [10 ml/1 ampula] 10 ampula sa po 10 mL rastvarača za parenteralnu upotrebu, u kutiji
- Rp rastvarač za parenteralnu upotrebu [5 ml/1 ampula] 10 ampula sa po 5 mL rastvarača za parenteralnu upotrebu, u kutiji

V08 **KONTRASNA SREDSTVA**
V08A **Jodirana rentgenska kontrasna sredstva**
V08AB **Nefrotropna, niskoosmolarna rentgenska kontrasna sredstva, rastvorljiva u vodi**

V08AB02 **joheksol**

Doziranje: odrasli i djeca: angiografija, urografija, flebografija, CT pretrage kontrastom; lumbalna, torakalna, cervikalna mijelografija, kompjutorizovana tomografija bazalnih cisterni nakon subarahnoidalne injekcije; artrografija, endoskopska retrogradna pankreatografija (ERP), endoskopska retrogradna kolangiopankreatografija (ERCP), herniografija, histerosalpingografija, sijalografija, pretrage gastrointestinalnog trakta: i.v., intraarterijski i intratekalno i unutar tjelesnih šupljina; doziranje zavisi od tipa ispitivanja, starosti, tjelesne mase, minutnog volumena srca i opšteg stanja bolesnika, kao i od tehnike snimanja; uobičajeno se koristi ista koncentracija i zapremina joda kao i kod drugih jodnih kontrastnih sredstava; neophodno je obezbijediti adekvatnu hidrataciju prije i nakon snimanja

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OMNIPAQUE - GE HEALTHCARE AS

- ZU otopina za injekciju [647 mg/1 mL] 10 polipropilenskih bočica sa 50 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [647 mg/1 mL] 10 polipropilenskih bočica sa po 100 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [755 mg/1 mL] 10 polipropilenskih boca sa po 200 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [755 mg/1 mL] 10 polipropilenskih bočica po 100 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [755 mg/1 mL] 10 polipropilenskih bočica sa po 50 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [755 mg/1 mL] 6 polipropilenskih boca sa po 500 ml otopine za injekciju, u kutiji

V08AB04 **jopamidol**

Doziranje: lumbalna i torako-cervikalna mijelografija, cerebralna angiografija, periferna angiografija, venografija, poboljšanje kompjuterizovane tomografije, urografija, artrografija, angiokardiografija i lijeva ventrikulografija, koronarna arteriografija, aortografija-retrogradna, selektivna renalna arteriografija, selektivna viscelarna angiografija, digitalna subtrakcijska angiografija: za informacije o doziranju i načinu primjene konsultovati literaturu proizvođača

REGISTROVANI LIJEKOVI:

EMRAD - BIEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

- ZU otopina za injekciju [612,4 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 50 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [755,2 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 100 ml otopine za injekciju, u kutiji

IOPAMIRO 300 - BRACCO S.P.A.

- ZU otopina za injekciju [612 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 50 ml otopine za injekciju, u kutiji

IOPAMIRO 370 - BRACCO S.P.A.

- ZU otopina za injekciju [755.3 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 100 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [755.3 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 200 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [755.3 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 50 ml otopine za injekciju, u kutiji

V08AB05 jopromid

Doziranje: dijagnostičke svrhe: angiografija, angiokardiografija, digitalna subtraksijska angiografija (DSA), pojačavanje kontrastom kod kompjuterizovane tomografije (CT), urografija, vizualizacija tjelesnih šupljina (izuzetak: mijelografija, ventrikulografija, cisternografija); kod odraslih žena kod mamografije pojačane kontrastom za procjenu i detekciju poznatih ili suspektih lezija dojke (kao dodatak mamografiji-sa ultrazvukom ili bez ultrazvuka) ili kao alternativa snimanju magnetnom rezonancom ukoliko je snimanje magnetnom rezonancom kontraindikovano ili nije dostupno: dozu treba prilagoditi u skladu sa godinama pacijenta, tjelesnom težinom pacijenta, srčanom i bubrežnom funkcijom pacijenta, opštim stanjem, značajnim kliničkim pitanjima, kao i sa primijenjenom tehnikom pregleda i područjem koje se pregleda; ukupna dopuštena doza od 1,5 g joda po kg tjelesne težine se ne smije prekoračiti; za Ultravist 300 to odgovara količini od 5 ml po kg tjelesne težine, a za Ultravist 370 količini od oko 4 ml po kg tjelesne težine; doziranje je uslovljeno vrstom snimanja i određuje se prema posebnom protokolu; preparat se smije otvoriti samo neposredno prije primjene; u principu, jedan gumeni zatvarač može se samo jedanput probušiti, a za bušenje gumenog zatvarača i izvlačenje kontrastnog sredstva treba koristiti cjevčice sa dugim vrhom određenog promjera. Rastvor jopromida predviđen je za jednokratnu upotrebu.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ULTRAVIST-300 OTOPINA ZA INJEKCIJU ILI OTOPINA ZA INFUZIJU ILI ORALNA OTOPINA - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

- ZU otopina za injekciju/ infuziju [623.4 mg/1 mL] 10 staklenih bočica po 100 ml otopine za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju/ infuziju [623.4 mg/1 mL] 10 staklenih bočica po 50 ml otopine za injekciju/infuziju, u kutiji

ULTRAVIST-370 OTOPINA ZA INJEKCIJU ILI OTOPINA ZA INFUZIJU ILI ORALNA OTOPINA - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

- ZU otopina za injekciju/ infuziju [768.86 mg/1 mL] 10 staklenih boca po 200 ml otopine za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju/ infuziju [768.86 mg/1 mL] 10 staklenih bočica po 100 ml otopine za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju/ infuziju [768.86 mg/1 mL] 10 staklenih bočica po 50 ml otopine za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju/ infuziju [768.86 mg/1 mL] 8 staklenih boca po 500 ml otopine za injekciju/infuziju, u kutiji

V08AB07 joversol

Doziranje: Optiray 300- cerebralna, periferna ili viscelarna angiografija uključujući intraarterijsku i intravensku digitalnu subtrakcionu angiografiju (IA DSA i IV DSA), venografiju, intravensku urografiju i kompjuterizovanu tomografiju (CT) glave i tijela; može se koristiti kod djece u cerebralnoj, perifernoj ili viscelarnoj angiografiji i u intravenskoj urografiji; Optiray 350 - angiografija kardiovaskularnog sistema uključujući koronarnu,

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

perifernu, viscelarnu i renalnu angiografiju, aortografiju i lijevu ventrikulografiju, kompjuterizovana tomografija (CT) glave i tijela, intravenska urografija, venografija i intravenska i intraarterijska digitalna subtraktivna angiografija; doziranje zavisi od vrste snimanja.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OPTIRAY 300 - GUERBET

- ZU rastvor za injekciju/ infuziju [636 mg/1 mL] 10 staklenih boca po 50 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju/ infuziju [636 mg/1 mL] 10 staklenih boca sa 100 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju/ infuziju [636 mg/1 mL] 10 staklenih boca sa 200 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

OPTIRAY 350 - GUERBET

- ZU rastvor za injekciju/ infuziju [741 mg/1 mL] 10 staklenih boca sa 100 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju/ infuziju [741 mg/1 mL] 10 staklenih boca sa 200 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju/ infuziju [741 mg/1 mL] 10 staklenih boca sa 500 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju/ infuziju [741 mg/1 mL] 25 staklenih boca sa 50 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

V08AB09 jodiksanol

Doziranje: odrasli: kardioangiografija, cerebralna angiografija (konvencionalna), periferna arteriografija (konvencionalna), urografija, CT pretrage, pretrage gastrointestinalnog trakta, lumbalna, torakalna i cervikalna mijelografija; djeca: kardioangiografiju, urografiju, CT pretrage i pretrage gornjeg dijela gastrointestinalnog sistema; doziranje je različito u zavisnosti od vrste pretrage, starosti, mase, udarnog volumena srca, opšteg stanja pacijenta, te primijenjene tehnike.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

VISIPAQUE - GE HEALTHCARE AS

- ZU otopina za injekciju [652 mg/1 mL] 10 polipropilenskih bočica sa 100 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [652 mg/1 mL] 10 polipropilenskih bočica sa 200 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [652 mg/1 mL] 10 polipropilenskih bočica sa 50 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [652 mg/1 mL] 6 polipropilenskih bočica sa 500 ml otopine za injekciju, u kutiji

V08AB10 jomeprol

Doziranje: nejonsko radiografsko kontrastno sredstvo za: perifernu arteriografiju, venografiju, aortografiju, angiokardiografiju i lijevu ventrikulografiju, cerebralnu arteriografiju, koronarnu arteriografiju, visceralnu arteriografiju, digitalnu subtraktivnu angiografiju, pojačanu kompjutersku tomografiju, urografiju, ERCP (endoskopsku retrogradnu holangiopankreatografiju), dakriocitografiju, sijalografiju, fistulografiju, galaktografiju, mijelografiju: doziranje je uslovljeno vrstom snimanja, uzrastom, tjelesnom težinom i starosnom dobi

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IOMERON - BRACCO IMAGING S.P.A,

- ZU otopina za injekciju [612,4 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 100 ml otopine za injekciju, u kutiji

ZU	otopina za injekciju [612,4 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 200 ml otopine za injekciju, u kutiji
ZU	otopina za injekciju [612,4 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 50 ml otopine za injekciju, u kutiji
ZU	otopina za injekciju [612,4 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 500 ml otopine za injekciju, u kutiji
ZU	otopina za injekciju [714,4 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 100 ml otopine za injekciju, u kutiji
ZU	otopina za injekciju [714,4 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 200 ml otopine za injekciju, u kutiji
ZU	otopina za injekciju [714,4 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 50 ml otopine za injekciju, u kutiji
ZU	otopina za injekciju [714,4 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 500 ml otopine za injekciju, u kutiji
ZU	otopina za injekciju [816,5 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 100 ml otopine za injekciju, u kutiji
ZU	otopina za injekciju [816,5 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 200 ml otopine za injekciju, u kutiji
ZU	otopina za injekciju [816,5 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 50 ml otopine za injekciju, u kutiji
ZU	otopina za injekciju [816,5 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 500 ml otopine za injekciju, u kutiji

V08AB11 jobitridol

Doziranje: intravenska urografija, komjuterizovana tomografija, intravenska digitalna subtrakciona angiografija, arteriografija, angiokardiografija, endoskopska retrogradna holangiopankreatografija, artrografija, histerosalpingografija; doziranje po protokolu, zavisno od vrste snimanja, intravenska, intraarterijska, intraartikularna, intrauterina primjena

REGISTROVANI LIJEKOVI:**XENETIX - GUERBET**

ZU	rastvor za injekciju [658.1 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 100 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU	rastvor za injekciju [658.1 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 50 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU	rastvor za injekciju [767.8 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 200 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU	rastvor za injekciju [658.1 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 200 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU	rastvor za injekciju [767.8 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 100 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ZU	rastvor za injekciju [767.8 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 50 ml rastvora za injekciju, u kutiji

V08C**Kontrasna sredstva za magnetnu rezonancu****V08CA****Paramagnetna kontrasna sredstva****V08CA02 gadoterična kiselina**

Doziranje: magnetna rezonanca (bolesti mozga i kičmene moždine i okolnih tkiva), snimanje magnetnom rezonancom cijelog tijela: odrasli, djeca i dojenčad: 0,1 mmol/kg (0,2 ml/kg); MR angiografija: odrasli, tokom angiografije može se, zavisno od rezultata pretrage koja se provodi i ukoliko je to potrebno, dati još jedna injekcija; u nekim izuzetnim

Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji

slučajevima, npr. dijagnostička potvrda izolovanih metastaza ili otkrivanje leptomeningealnih tumora, može se dati još jedna doza od 0,2 mmol/kg, tj. 0,4 ml/kg tjelesne težine;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CLARISCAN - GE HEALTHCARE AS

- ZU otopina za injekciju [0,5 mmol/1 mL] 10 staklenih bočica sa po 15 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [0,5 mmol/1 mL] 10 staklenih bočica sa po 10 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [0,5 mmol/1 mL] 10 staklenih bočica sa po 20 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki [0,5 mmol/1 mL] 10 napunjenih injekcionih štrcaljki sa po 10 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki [0,5 mmol/1 mL] Štrcaljke su pakovane u pojedinačna sekundarna pakovanja (20 ml), a potom se 10 pojedinačnih pakovanja pakuje u 1 kartonsku kutiju (10x20mL, 10 napunjenih štrcaljki sa 20ml otopine)
- ZU otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki [0,5 mmol/1 mL] Štrcaljke su pakovane u pojedinačna sekundarna pakovanja (15 ml), a potom se 10 pojedinačnih pakovanja pakuje u 1 kartonsku kutiju (10x 15 ml, 10 napunjenih štrcaljki sa 15 ml otopine)

DOTAGRAF - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

- ZU otopina za injekciju [0,5 mmol/1 mL] 1 bočica sa 10 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [0,5 mmol/1 mL] 1 bočica sa 15 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [0,5 mmol/1 mL] 1 bočica sa 20 ml otopine za injekciju, u kutiji

DOTAREM - GUERBET

- ZU rastvor za injekciju [0,5 mmol/1 mL] 1 staklena bočica sa 10 mL rastvora za injekciju, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju [0,5 mmol/1 mL] 1 staklena bočica sa 15 ml rastvora za injekciju, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju [0,5 mmol/1 mL] 1 staklena bočica sa 20 ml rastvora za injekciju, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [0,5 mmol/1 mL] 1 napunjena plastična šprica sa 10 mL rastvora za injekciju, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju u napunjenoj šprici [0,5 mmol/1 mL] 1 napunjena plastična šprica sa 20 mL rastvora za injekciju, u kutiji
- ZU rastvor za injekciju u napunjenom špricu [0,5 mmol/1 mL] 1 napunjena plastična šprica sa 15 mL rastvora za injekciju, u kutiji

V08CA08 gadobenat

Doziranje: magnetna rezonanca (MRI) jetre: 0,05 mmol/kg tjelesne težine (što odgovara 0,1 ml/kg 0,5 M otopine);

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MULTIHANCE - BRACCO S.P.A.

- ZU otopina za injekciju [0,5 mmol/1 mL] 1 staklena bočica sa 10 ml otopine za injekciju, u kutiji
- ZU otopina za injekciju [0,5 mmol/1 mL] 1 staklena bočica sa 15 ml otopine za injekciju, u kutiji

ZU otopina za injekciju [0,5 mmol/1 mL] 1 staklena bočica sa 20 ml otopine za injekciju, u kutiji

V08CA09 gadobutrol

Doziranje: kontrastno pojačanje kod kranijalne i spinalne magnetne rezonance (MRI), kontrastom pojačana magnetna rezonanca drugih tjelesnih regija (jetra, bubrezi) kod pacijenata kod kojih je potvrđeno postojanje ili postoji jaka sumnja na postojanje fokalnih lezija, kako bi se one klasifikovale kao benigne ili maligne, kontrastno pojačanje kod magnetne rezonance angiografije (CE-MRA), može se koristiti za prikaz magnetnom rezonancom (MRI) patoloških struktura u cijelom tijelu; i.v. primjena, doze zavise od vrste snimanja, pojedinačna i.v. injekcija od 0,1 mmol/kg tjelesne težine (odgovara 0,1 ml/kg TT 1,0 M otopine) je obično dovoljna za odrasle i djecu stariju od 2 god.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GADOVIST - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

ZU otopina za injekciju [604,72 mg/1 mL] 10 bočica sa 30 ml otopine za injekciju, u kutiji

ZU otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki [604,72 mg/1 mL] 5 napunjenih injekcionih šprica sa 7,5 ml otopine za injekciju, u kutiji

GADOVIST 1,0 MMOL/ML OTOPINA ZA INJEKCIJU - BAYER

AKTIENGESELLSCHAFT

ZU otopina za injekciju [604.72 mg/1 mL] 1 bočica sa 15 ml otopine za injekciju, u kutiji

ZU otopina za injekciju [604.72 mg/1 mL] 1 bočica sa 7,5 ml otopine za injekciju, u kutiji

GENBUTROL 15 - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş., (SKRAČENO GEN)

ZU otopina za injekciju [604,72 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 15 ml otopine za injekciju, u kutiji

GENBUTROL 7,5 - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş., (SKRAČENO GEN)

ZU otopina za injekciju [604,72 mg/1 mL] 1 staklena bočica sa 7,5 ml otopine za injekciju, u kutiji

V08CA10 gadoksetinska kiselina

Doziranje: T1 - magnetna rezonanca (MR) jetre: i.v. bolus injekcijom 0,1 ml/kg tjelesne mase

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PRIMOVIIST - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

ZU otopina za injekciju [181,43 mg/1 mL] 1 napunjena plastična injekciona šprica sa 10 ml otopine za injekciju, u kutiji

V09 V09F V09FX

DIJAGNOSTIČKI RADIOFARMACEUTICI ŠTITNA ŽLIJEZDA

Različiti radiofarmaceutici za dijagnostiku štitne žlijezde

V09FX01 tehnećijum (99mTc) pertehnetat

Doziranje: za dijagnostičke svrhe: za više informacija konsultovati informacije o lijeku

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MON.TEK⁹⁹MO/^{99m}TC GENERATOR - CURIUM NUKLEER TIP A.S.

ZU radionuklidni generator [5 gigaBq/1 dan i sat kalibracije - 50 gigaBq/1 dan i sat kalibracije] metalna kutija zaštićena punjenjem od stiropora sadrži: 1 radionuklidni generator, 2 kartonske kutije sa vakuumskim bočicama za eluiranje (u svakoj kutiji se nalazi po 5 vakuumskih bočica i 5 pakovanja antiseptičkih 70%-nih izopropilnih alkoholnih tufera), 1 kartonsku kutiju sa 5 bočica po 10 ml sterilnog rastvora 0,9 % NaCl, 1 kartonsku kutiju sa 5 bočica po 5 ml sterilnog rastvora 0,9 % NaCl, 1 zaštitu za vakuumske bočice (daje se uz prvu isporuku).

POLTECHNET - NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH

ZU radionuklidni generator [-] 1 radionuklidni generator

ULTRA-TECHNEKOW FM - CURIUM NETHERLANDS B.V.

ZU radionuklidni generator [2,15 gigaBq/1 dan i sat kalibracije - 43 gigaBq/1 dan i sat kalibracije+ 1,9 gigaBq/1 boca - 38,1 gigaBq/1 boca] 1 kartonska kutija sa 1 zaštićenim radionuklidnim generatorom, kitom za eluciju i držačem eluenta u hermetički zatvorenom (zapečaćenom) limu

UNIVERZALNI 99MO/99MTC GENERATOR (UREĐAJ SA PRIBOROM) - INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE 'VINČA', INSTITUT OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU, UNIVERZITET U BEOGRADU

ZU radionuklidni generator [2 gigaBq/1 dan i sat kalibracije - 40 gigaBq/1 dan i sat kalibracije] 1 univerzalni 99Mo/99mTc generator i 1 pribor za eluiranje, u kutiji

V09FX03 natrijum-jodid (131 I)

Doziranje: terapija karcinoma štitne žlijezde, toksične nodularne guše, difuzne toksične guše, hipertireoze; dijagnostičke svrhe: oralno, za informacije o doziranju konsultovati literaturu proizvođa

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MON.IYOT-131 - CURIUM NUKLEER TIP A.S.

ZU kapsula, tvrda [0,37 megaBq/1 kapsula - 7400 megaBq/1 kapsula] 1 kapsula; unutrašnje pakovanje: PP plastična tuba sa PMMA pipetom, vanjsko pakovanje olovni kontejner prekriven plastikom u kartonskoj kutiji

V09I TUMORSKA DETEKCIJA

V09IX Ostali dijagnostički radiofarmaceutici za tumorsku detekciju

V09IX04 fludeoksiglukoza (18F)

Doziranje: koristi se u dijagnostičke svrhe: za više informacija konsultovati literaturu proizvođa

REGISTROVANI LIJEKOVI:

FDG-RMC - RUĐER MEDICOL CIKLOTRON D.O.O.

ZU otopina za injekciju [185 megaBq/1 mL] 1 bezbojna staklena bočica od 15 mL otopine za injekcije (1 višedozna bočica sadrži 0,5-12 mL otopine), u zaštitnom spremniku, u transportnoj kutiji

MON.FDG (18F) - CURIUM NUKLEER TIP A.S.

ZU rastvor za injekciju [250 megaBq/1 dan i sat kalibracije] 1 višedozna staklena bočica od 10 ml u olovnom kontejneru

V10 **TERAPIJSKI RADIOFARMACEUTICI**
V10X **DRUGI TERAPIJSKI RADIOFARMACEUTICI**
V10XA **jedinjenja joda (131I)**

V10XA01 **natrijum-jodid (131 I)**

Doziranje: **MON.IYOT-131:** *terapija karcinoma štitne žlijezde, toksične nodularne guše, difuzne toksične guše, hipertireoze; dijagnostičke svrhe:* oralno, za informacije o doziranju konsultovati literaturu proizvoda; **Sodium Iodide (I-131), Natrijum jodid - Na¹³¹I:** *hipertireoidizam (terapija Graves-ove bolesti, toksične multinodularne strume ili autonomnih nodusa); terapija papilarnih i folikularnih karcinoma štitne žlijezde, uključujući i metastatske bolesti:* oralno, za informacije o doziranju konsultovati literaturu proizvoda; **IODOPOL:** *hipertireoidizam (terapija Graves-ove bolesti, toksične multinodularne strume ili autonomnih nodusa); terapija papilarnih i folikularnih karcinoma štitne žlijezde, uključujući i metastatske bolesti; terapija velike eutroidne (netoksične) strume:* oralno, za informacije o doziranju konsultovati literaturu proizvoda;

REGISTROVANI LIJEKOVI:

IODOPOL - NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH

ZU kapsula, tvrda [37 megaBq/1 kapsula - 7400 megaBq/1 kapsula] 1 kapsula, tvrda pakovana u 1 polipropilenskoj bočici, u olovnom spremniku, u transportnoj kutiji

MON.IYOT-131 - CURIUM NUKLEER TIP A.S.

ZU kapsula, tvrda [0,37 megaBq/1 kapsula - 7400 megaBq/1 kapsula] 1 kapsula; unutrašnje pakovanje: PP plastična tuba sa PMMA pipetom, vanjsko pakovanje olovni kontejner prekriven plastikom u kartonskoj kutiji

NATRIJUM JODID - NA131I KAPSULE ZA TERAPIJU - INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE 'VINČA', INSTITUT OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU, UNIVERZITET U BEOGRADU

ZU kapsula, tvrda [111 megaBq/1 kapsula - 3700 megaBq/1 kapsula] 1 kapsula, tvrda pakovana u polipropilensku tubu sa pripadajućim zatvaračem, koja se stavlja u olovni kontejner. Olovni kontejner je postavljen u stiroporski uložak koji se nalazi u kartonskoj kutiji

SODIUM IODIDE (I-131) CAPSULES T - CURIUM NETHERLANDS B.V.

ZU kapsula, tvrda [-] 1 kapsula u 1 PETP bočici, u olovnom štitu

HOMEOPATSKI LIJEKOVI

V03AX

kalcijum-fosfat, kalcijum-karbonat, kamilica, magnezijum-fosfat, željezo-fosfat

Doziranje: podsticanje spontanog saniranja problema koji se javlja kod dojenčadi tokom nicanja zubića praćenog intenzivnim bolom, povišenom temperaturom, dijarejom, razdražljivošću, nemirom i nesanicom: djeca 4 mjeseca - 6 god. svakih 30 minuta stavite oko 8 globula na djetetov jezik, a u slučaju jake boli, svakih 15 minuta; čim se ublaže tegobe, globule treba davati rjeđe; trajanje tretmana nije ograničeno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OSADENT - DR. A. & L. SCHMIDGALL GMBH & CO KG

BRp pilule [3.8 mg/1 g+ 0.8 mg/1 g+ 3.8 mg/1 g+ 0.8 mg/1 g+ 0.8 mg/1 g] 7,5 g pilula (1 polipropilenska tuba) u kutiji

bryonia trit. D2, gelsemium trit. D3, aconitum trit. D3, ipecacuanha trit. D3, eupatorium perfoliatum trit. D1, phosphorus trit. D5

Doziranje: *prehlade praćene povišenom tjelesnom temperaturom:* odrasli, u akutnim stanjima 1 tbl. na svaki sat, do najviše 12 tbl. dnevno, dok ne nastupi poboljšanje; u nastavku terapije 1-2 tbl. 3 puta dnevno; djeca do 11 god. u akutnom stanju 1 tbl. na svaka 2 sata, do najviše 8 tbl. dnevno, dok ne nastupi poboljšanje; u nastavku terapije 1 tbl. 3 puta dnevno; djeca uzrasta 12 god. i starija, u akutnim stanjima 1 tbl. na svaki sat, do najviše 12 tbl. dnevno, dok ne nastupi poboljšanje; u nastavku terapije 1-2 tbl. 3 puta dnevno; ne preporučuje se djeci ispod 1 god; za *prevenciju* prehlade praćene groznicom i bolesti sličnih gripi, odrasli 1-2 tbl. 3 puta dnevno, djeca 1-11 god. 1 tbl. 3 puta dnevno, djeca 12 god. i starija 1-2 tbl. 3 puta dnevno; tabletu treba pustiti da se rastopi u ustima, kod male djece tablete se mogu rastvoriti u malo vode; interval između unosa hrane i lijeka treba iznositi najmanje pola sata

REGISTROVANI LIJEKOVI:

INFLUCID - DR. GUSTAV KLEIN GMBH & CO.KG

BRp tableta [25 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta] 40 tableta (2 PVC/ALU blistera sa 20 tableta) u kutiji

cardiospermum, galfimia glauca dil. D3, luffa operculata D4 trit.

Doziranje: *ublažavanje simptoma alergijskih oboljenja gornjih disajnih puteva kao što su peludna groznica ili trajni alergijski rinitis:* odrasli, u akutnim stanjima 1 tbl. uzimati svaki dan, do najviše 12 tbl. dnevno, dok ne nastupi poboljšanje; u nastavku terapije 1-2 tbl. 3 puta dnevno; djeca do 12 god. kod akutnih stanja 1 tbl. svaka 2 sata, do najviše 8 tbl. dnevno, dok ne nastupi poboljšanje; u nastavku terapije 1 tbl. 3 puta dnevno; djeca uzrasta 12 god. i starija, kod akutnih stanja 1 tbl. na svaki sat, do najviše 12 tbl. dnevno, dok ne nastupi poboljšanje; u nastavku terapije 1-2 tbl. 3 puta dnevno; tabletu treba pustiti da se rastopi u ustima, kod male djece tablete se mogu rastvoriti u malo vode; interval između unosa hrane i lijeka treba iznositi najmanje pola sata

REGISTROVANI LIJEKOVI:

POLINOL - DR. GUSTAV KLEIN GMBH&CO. KG

BRp tableta [25 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta] 60 tableta (3 PVC/Alu blistera sa po 20 tableta) u kutiji

cinnabaris trit. D3, Echinacea trit. D1, hydrastis trit. D3, kalium bichromicum trit. D3

Doziranje: *akutni ili hronični sinuzitis:* odrasli, kod akutnih stanja 1 tableta svakih sat vremena do najviše 12 tableta dnevno, dok ne nastupi poboljšanje; u nastavku liječenja uzeti 1-2 tablete 3 puta dnevno; u hroničnom stanju 1 tableta 3 puta dnevno; adolescenti, 12 god i stariji: kod akutnih stanja 1 tableta svakih sat vremena do najviše 12 tableta dnevno, dok ne nastupi poboljšanje; u nastavku liječenja uzeti 1-2 tablete 3 puta dnevno; djeca 6-11 god, kod akutnih stanja 1 tableta svaka 2 sata do najviše 6 tableta dnevno, dok ne nastupi poboljšanje; u nastavku liječenja uzeti 1 tabletu 3 puta dnevno; djeca 2 do 5 god. kod akutnih stanja 1 tableta 3 puta dnevno, dok ne nastupi poboljšanje; u nastavku liječenja uzeti 1 tabletu 3 puta dnevno; kod hroničnih stanja, djeca i odrasli 1 tabletu 3 puta dnevno, preporučeno trajanje liječenja 4-6 sedmica

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CINNABSIN - DR. GUSTAV KLEIN GMBH&CO. KG

BRp tableta [25 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta] 60 tableta (3 PVC/Alu blistera sa po 20 tableta) u kutiji

atropin sulfuricum trit. D5, kalium bichromicum trit. D4, hepar sulfuris trit. D3, silicea trit. D2, mercurius bijodatus trit. D8

Doziranje: akutni i hronični ponavljajući tonzilitis i povećanje tonzila u djetinjstvu i liječenje nakon hirurškog uklanjanja tonzila: odrasli, u akutnim stanjima 1 tbl. dnevno na svaki sat, najviše 12 tbl. dnevno; u nastavku terapije ili kod hroničnih stanja, 1-2 tbl. 3 puta dnevno; djeca 2-6 god. kod akutnih stanja, u nastavku terapije i kod hroničnih stanja, 1 tbl. 3 puta dnevno; djeca 6-12 god, kod akutnih stanja 1 tbl. na svaka 2 sata, do najviše 6 tbl. dnevno dok ne nastupi poboljšanje; u nastavku terapije ili kod hroničnih stanja 1 tbl. 3 puta dnevno; adolescenti 12 god. i stariji, kod akutnih stanja 1 tbl. na svaki sat do najviše 12 tbl. dnevno dok ne nastupi poboljšanje; u nastavku terapije ili kod hroničnih stanja 1 tbl. 3 puta dnevno; kod hroničnih i hronično-recidivirajućih stanja preporučuje se ponovljena terapija više puta godišnje po 6-8 sedmica; tabletu treba pustiti da se rastopi u ustima, kod male djece tablete se mogu rastvoriti u malo vode; interval između unosa hrane i lijeka treba iznositi najmanje pola sata

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TONSILOTREN - DR. GUSTAV KLEIN GMBH & CO.KG

BRp tableta [12,5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta] 40 tableta (2 PVC/ ALU blistera sa po 20 tableta) u kutiji

Spisak proizvođača i njihovih zastupnika sa lijekovima za koje su nosioci dozvole

LABORATORIOS ALCALA FARMA, S.L.

Avenida de Madrid, 82, Alcala de Henares, 28802 Madrid \ \ Španija

Zastupnik:

Pontus Pharma d.o.o.Sarajevo

Milana Preloga 12A \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 870 077 \ Faks: +387 33 870 062 \ e-pošta: dalila.imsirpasic@pontus-pharma.com

OPERIL P

OPERIL

SYNTHAVERSE S.A.

Uniwersytecka Street No. 10 \ Lublin 20-029 \ Poljska

Zastupnik:

CORAPHARM d.o.o.

Cara Lazara 22 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 433 820 \ Faks: +387 51 433 821 \ e-pošta: maja.savic@corapharm.rs

ONKO BCG 100

ABBVIE INC.

1 North Waukegan Road \ North Chicago, IL 60064 \ Sjedinjene Američke Države

Zastupnik:

AbbVie d.o.o.

Kolodvorska 12 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 033725916 \ Faks: 033725919 \ e-pošta: amra.brkic@abbvie.com

AQUIPTA

HUMIRA

MAVIRET

RINVOQ, tablete sa produženim

oslobađanjem, 30 mg

RINVOQ, tablete sa produženim

oslobađanjem, 45 mg

RINVOQ, tablete sa produženim

oslobađanjem, 30 mg

RINVOQ

SEVORANE

SURVANTA

VENCLYXTO

VISTABEL

ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4, Maslak-Sarıyer 34467 \ Istanbul \ Turska

Zastupnik:

Abdi Ibrahim BH d.o.o. Sarajevo

Tešanjaska 24A (Avaz Twist Tower) \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 550 200 \ Faks: +387 33 500 202 \ e-pošta: -

BARCA SR

BREQUAL

CORIVA

DEMAX

Proizvođači i njihovi zastupnici

DIAMOND
DOZYL EASY
EPIXX
EPIXX
FUARTE
JUVE
LIFTA
LIZERA
MASARU
NAVARIN XR
NOTUSS

ONCEAIR
POSAGIL
REBONE
RIVOKSAR
STAGE
TANFLEX 0,15%
TANFLEX FORT
TENOVIRAL
TILANTA
TIOPATI
TYOFLEX

ABELA PHARM D.O.O. Beograd

Viline Vode b.b., Palilula \ Beograd \ Srbija

Zastupnik:

Evropa Lijek Pharma d.o.o.

Vlakovo 252 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 77 43 00 \ Faks: +387 33 77 43 01 \ e-pošta: naida.bilalagic-pihura@elpharma.ba, amar.ramovic@elpharma.ba

BULAREN 250 mg

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Via Antonio Meucci, 36, Pisa (PI), CAP 56121 Hamlet \ Ospedaletto \ Italija

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta: medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

DIBASE 1.000 i.j.
DIBASE 2.000 i.j.

DIBASE 25.000 i.j.
DIBASE 6.000 i.j.

ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp. z.o.o.

Lutomierska 50, \ Pabianice \ Poljska

Zastupnik:

AptaPharma d.o.o. Banja Luka

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br.181d, \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 65 896 780 \ Faks: +387 51 492 295 \ e-pošta: milena.rakocevic@aptapharma.eu

Abiraterone Accord

BORTEZOMIB Accord

Evropa Lijek Pharma d.o.o.

Vlakovo 252 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 77 43 00 \ Faks: +387 33 77 43 01 \ e-pošta: naida.bilalagic-pihura@elpharma.ba, amar.ramovic@elpharma.ba

TEMOZOLOMID Accord

ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp.z.o.o

Tasmowa 7, 02-677 \ Varšava \ Poljska

Zastupnik:

AptaPharma d.o.o.Banja Luka

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br.181d, \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 65 896 780 \ Faks: +387 51 492 295 \ e-pošta:

milena.rakocevic@aptapharma.eu

ACCOFIL

Capecitabine Accord

CARBOPLATIN ACCORD

PELGRAZ

ZERCEPAC

Evropa Lijek Pharma d.o.o.

Vlakovo 252 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 77 43 00 \ Faks: +387 33 77 43 01 \ e-pošta: naida.bilalagic-

pihura@elpharma.ba, amar.ramovic@elpharma.ba

CISPLATINUM ACCORD

IRINOTECAN Accord

LENALIDOMID Accord

OXALIPLATINUM ACCORD

RIVAROXABAN ACCORD

RIVAROXABAN ACCORD

PharmaS d.o.o. Sarajevo

Maršala Tita 2, 71 000 Sarajevo \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 765 400 \ Faks: +387 33 765 401 \ e-pošta:

jasminka.mijatovic@pharmas.ba

AZACITIDINE Accord

CINACALCET ACCORDPHARMA

DOCETAXEL ACCORD

ACONITUM Private Limited Liability Company

Inovaciju g.4 \ Biruliškiu k. Kauno r.sav. \ Litvanija

Zastupnik:

AMSA PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo

Igmanska 38, Vogošća \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 580 739; +387 33 580 736 \ Faks: +387 33 580 740 \ e-pošta:

amar@amsal.ba

MEMOXA

ADALVO LIMITED

Malta Life Sciences Park Building 1, Level 4, Sir Temi Zammit Buildings \ San Gwann \ Malta

Zastupnik:

FARMALOGIST ALLBIX d.o.o. Bijeljina

Stefana Dečanskog 258 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 416 070 \ Faks: +387 55 416 075 \ e-pošta:

danijela.vjestica@farmalogistallbix.ba

DIMETEX

DIMETEX

Proizvođači i njihovi zastupnici

TICACOR

PharmaS d.o.o. Sarajevo

Maršala Tita 2, 71 000 Sarajevo \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 765 400 \ Faks: +387 33 765 401 \ e-pošta: jasminka.mijatovic@pharmas.ba

NEZALLIX

TERIFLUNOMID PharmaS 14 mg
FILMOM OBLOŽENE TABLETE

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.herica@rhei.life

ENZULID

ADAMED PHARMA S.A.

Mariana Adamkiewiczza 6A, 05-152 Pienkow \ Czosnow \ Poljska

Zastupnik:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 331 650 \ Faks: +387 51 331 623 \ e-pošta: infoBL@hemofarm.com

PRILINDA COMBO

PharmaS d.o.o. Sarajevo

Maršala Tita 2, 71 000 Sarajevo \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 765 400 \ Faks: +387 33 765 401 \ e-pošta: jasminka.mijatovic@pharmas.ba

TANCER

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.herica@rhei.life

PROSTULOSIN

ADAMED PHARMA SPOLKA AKCYJNA

Mariana Adamkiewiczza 6A, Pienkow \ Czosnow \ Poljska

Zastupnik:

Evropa Lijek Pharma d.o.o.

Vlakovo 252 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 77 43 00 \ Faks: +387 33 77 43 01 \ e-pošta: naida.bilalagic-pihura@elpharma.ba, amar.ramovic@elpharma.ba

MENDIAXON

ADIPHARM EAD

130 Simeonovsko shose Blvd. \ 1700 Sofia \ Bugarska

Zastupnik:

578 Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2026

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

NEOPERSEN

PERSEN forte

AFT PHARMACEUTICALS LIMITED

Level 1, Nielsen Centre 129, Hurstmere Road, Takapuna \ Auckland \ Novi Zeland

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta: medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

COMBOGESIC

ALEXION EUROPE SAS

103-105 rue Anatole France \ 92300 Levallois-Perret \ Francuska

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta: medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

ULTOMIRIS

ALKALOID AD Skopje

bul. Aleksandar Makedonski br. 12 \ 1000 Skopje \ Republika Severna Makedonija

Zastupnik:

Alkaloid d.o.o. Sarajevo

Isevića sokak 6 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: - \ Faks: - \ e-pošta: alkaloid@bih.net.ba; jelena.lalic@alkaloid.com.ba

ACIKLOVIR ALKALOID

ALDIZEM

ALKAFORMIN

ALMACIN

AMINOFILIN ALKALOID

AMLODIPIN ALKALOID

AMPICILIN ALKALOID

ANALGIN

AQUA AD INIECTABILIA ALKALOID

AVASTA plus

AVASTA

BETADINE

BLOKMAX DUO

BLOKMAX FORTE za djecu

BlokMax forte

BlokMAX Rapid

BlokMax za djecu

BlokMax

BRONLES

BULNEXO

BUPRENORFIN ALKALOID

CAFFETIN COLD

CAFFETIN COLDmax

CAFFETIN MENSTRUAL

CAFFETIN

CEFACTOR ALKALOID

CEFALEXIN ALKALOID

CHLORAMPHENICOL ALKALOID

Proizvođači i njihovi zastupnici

CINEDIL	MORPHINI	HYDROCHLORIDUM
CITERAL	ALKALOID	
CRICEA	MOXIRAL	
CRYPINEO	NAZOPASS	
DIAZEPAM ALKALOID	NEBREMEL	
EGLONYL FORTE	NIFUROKSAZID ALKALOID	
EGLONYL	Nodriga	
Fasindor	OMEZOL	
FELKARID	PAKSTON	
FLENTY	PANCEF	
FLIRKANO	PARACETAMOL ALKALOID	
FLONSENO	PROCULIN	
FLUOXETIN ALKALOID	PROPAFENON ALKALOID	
Fokleros	PTU	
FOXERO	Refidoro	
FUREXTIL	REGLAN	
GASTROGUARD MENTOL tablete za	RELIKA	
žvakanje sa ukusom mentola	RISSAR	
GLIBEDAL	ROPUIDO	
GLOFTRINID	RUFIXALO	
HEFEROL	SKOPRYL COMBO	
HIDROHLOROTIAZID Alkaloid	SKOPRYL PLUS	
HOLLESTA	SKOPRYL	
IBUPROFEN ALKALOID	SYNETRA	
KALCIUM KARBONAT ALKALOID	SYRENO	
LAMAL	TAMLOS DuoD	
LAPPOXO	TAMLOS	
LEFISYO	TIMOLOL ALKALOID	
LENALIDOMID ALKALOID	TINGORA	
LESTEDON	TOSYNAL	
LEXILIUM	TRAMADOL ALKALOID	
LIRTONEN	VASOFLEX	
LOSMORID	VERAPAMIL ALKALOID RETARD	
LOTAR	VERAPAMIL ALKALOID	
LYVAM	VITAMIN B1 ALKALOID	
MAPRAZAX	VITAMIN B12 ALKALOID	
MAZENID forte	YMANA	
MAZENID	ZANFEXA	
MEKSENA	ZEPIRA	
MENDILEX	ZYGLIP	
METADON ALKALOID	ZYTRON	

ALTAN PHARMACEUTICALS S.A.

Calle Colquide 6, portal 2, sprat 1, kancelarija D, Las Rozas \ Madrid \ Španija

Zastupnik:

FARMALOGIST ALLBIX d.o.o. Bijeljina

Stefana Dečanskog 258 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 416 070 \ Faks: +387 55 416 075 \ e-pošta:

daniijela.vjestica@farmalogistallbix.ba

ACICLOVIR Altan
COLISTIN ALTAN

COLISTIN ALTAN

AMGEN (Europe) GmbH

Suurstoffi 22 \ 6343 Risch-Rotkreuz \ Švajcarska

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta: medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

AMGEVITA

ARANESP

KANJINTI

PROLIA

VECTIBIX

AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo

Igmanska 38, Vogošća \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Zastupnik:

AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo

Igmanska 38, Vogošća \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 580 739; +387 33 580 736 \ Faks: +387 33 580 740 \ e-pošta: amar@amsal.ba

ADDAMO

ARIPREXA

ATTERA

DOTRAX

EPLECOR

EPROSTA

ESCITA

KLAVAMOX

MEMANTIN AMSAL

NEBICOR

PARACET FLU

PARACETAMOL AMSAL

RAPRIL

ROSSTAT

SOLITAM

TAMSAL

AMW GmbH

Birkerfeld 11 \ 83627 Warngau \ Njemačka

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

RESELIGO

ANABION SERVICES AND SOLUTIONS FZ-LLC

1201S, Twelfth Floor, Dubai Science Park (DSP), Towers Dubai Science Park \ Dubai \ Ujedinjeni Arapski Emirati

Zastupnik:

Co.Medprom d.o.o. Banja Luka

Nenada Kostića 24a \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 366 791 \ Faks: +387 51 366 790 \ e-pošta: medprom@teol.net

RITUXIMAB BIOCAD

Proizvođači i njihovi zastupnici

ANFARM HELLAS AP

4 Achaia Str&Trizinias Str Kifissia Attiki \ Atena \ Grčka

Zastupnik:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.heric@rhei.life

ZITHROTEL

ANFARM HELLAS S.A.

4 Achaia Str&Trizinias, Kifissia Attiki \ Atena 14564 \ Grčka

Zastupnik:

DOO Farmacija 2011 Bihać

Zagrebačka 2 \ Bihać \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 37 971 100 \ Faks: +387 37 971 106 \ e-pošta: info@farmacija 2011.ba, mediha@farmacija2011.ba

AMIKAN

VLOFINOX

ARISTIN-C

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.heric@rhei.life

CASPOFUNGIN ANFARM

Solezol

CLINDAMYCIN ANFARM

TIGECIKLIN ANFARM

LINEZAN

ANTIBIOTICE S.A.

1 Valea Lupului Street \ Iasi \ Rumunija

Zastupnik:

AptaPharma d.o.o.Banja Luka

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br.181d, \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 65 896 780 \ Faks: +387 51 492 295 \ e-pošta: milena.rakocevic@aptapharma.eu

AMOXIPLUS 1,2 g

AMPICILLIN ANTIBIOTICE

ANTIBIOTIC-RAZGRAD AD

68, Aprilsko Vastanie Blvd.,Office 201 \ 7200 Razgrad \ Bugarska

Zastupnik:

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885 \ e-pošta: merima.fatusic@unifarm.ba

IBUMENTHOL

APTA MEDICA INTERNATIONAL d.o.o.

Likozaarjeva ulica br. 6 \ Ljubljana \ Slovenija

Zastupnik:

582 Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2026

Pharmavision BH d.o.o.

Mladena Stojanovića 4 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina
Telefon: - \ Faks: +387 51 378 111 \ e-pošta: regaffairsba@phavis.com

AMOKSICILIN/KLAVULANSKA
KISELINA APTAPHARMA
AMPICILIN/SULBAKTAM AptApharma
CEFOTAKSIM APTAPHARMA
CEFOTAKSIM APTAPHARMA
CEFTAZIDIM APTAPHARMA

CEFTRIAKSON APTAPHARMA
CEFUROKSIM APTAPHARMA
ERTAPENEM APTAPHARMA
Imipenem/cilastatin AptApharma
MEROPENEM APTAPHARMA
VANKOMICIN APTAPHARMA

AQVIDA GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 89 \ 20355 Hamburg \ Njemačka

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta:
amela.dervisevic@zentiva.com

ZASSIDA

ARIMED İLAÇ SAN. VE TIC. A.Ş

Seyrantepe Mah. Altınay Cad. No:21/5, Kagithane \ Istanbul \ Turska

Zastupnik:

Abdi Ibrahim BH d.o.o. Sarajevo

Tešanjaska 24A (Avaz Twist Tower) \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 550 200 \ Faks: +387 33 500 202 \ e-pošta: -

CORIVA

ARVEN ILAC SAN. VE TIC.A.S.

Istinye Mahallesi Balabandere Caddesi No: 14 Sariyer - Istanbul \ 34460 Sariyer - Istanbul \ Turska

Zastupnik:

Delta Pharma d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Objekat A, 6. sprat \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina
Telefon: +38733296210 \ Faks: +38733296211 \ e-pošta: alma.avdagic@deltapharma-ba.com

ATRUS ARVOHALER

FRAVEN

AS GRINDEKS,

Krustpils 53 \ Riga \ Latvija

Zastupnik:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.herici@rhei.life

LENALIDOMIDE GRINDEKS

MYLDROX

AS KALCEKS

Krustpils iela 71 E \ Rīga LV-1057 \ Latvija

Zastupnik:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.heric@rhei.life

ATRAURIUM Kalceks

DEKSMETOMIDINE KALCEKS

DEKSTOPROFEN KALCEKS

ESKETAMIN Kalceks

Fentanil citrat Kalceks

FOLINSKA KISELINA KALCEKS

HIDROMORFON KALCEKS

NEIRATAX

Noradrenalin Kalceks

PIPERACILIN/TAZOBAKTAM

KALCEKS

ROCURIUM BROMIDE KALCEKS

SODIUM OXYBATE KALCEKS

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

3016 Lake Drive, Citywest Business Campus \ Dublin \ Irska

Zastupnik:

Clinres Farmacija d.o.o.

Alipašina 29 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 61 215 514 \ Faks: +387 33 922 410 \ e-pošta: lejla.spahic@clinres-farmacija.com

IMURAN

ASTELLAS IRELAND Co. Ltd

Killorglin \ Co.Kerry \ Irska

Zastupnik:

Clinres Farmacija d.o.o.

Alipašina 29 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 61 215 514 \ Faks: +387 33 922 410 \ e-pošta: lejla.spahic@clinres-farmacija.com

ADVAGRAF 0,5 mg

ADVAGRAF 1 mg

ADVAGRAF 3 mg

ADVAGRAF 5 mg

PROGRAF

ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.

Sylviusweg 62 \ 2333 BE Leiden \ Nizozemska

Zastupnik:

Clinres Farmacija d.o.o.

Alipašina 29 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 61 215 514 \ Faks: +387 33 922 410 \ e-pošta: lejla.spahic@clinres-farmacija.com

XTANDI

ASTRAZENECA AB

SE 151 85 Södertälje \ \ Švedska

584 Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2026

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta: medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

CALQUENCE

FORXIGA

IMFINZI

KOSELUGO

LYNPARZA

STRENSIQ

SYNAGIS

TAGRISSO

TRUQAP

ATNAHS PHARMA DENMARK APS

Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108, 5.tv DK-2300 København S \ København S \ Danska

Zastupnik:

Medicopharmacia d.o.o. Sarajevo

Lužansko polje br.7 Ilidža \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 625 \ Faks: +387 33 761 626 \ e-pošta: kemala.sabotic@medicoph.com

BONDRONAT

BONVIVA

ATNAHS PHARMA UK LTD

Sovereign House, Miles Gray Road, Basildon, Essex, SS14 3FR \ \ Velika Britanija

Zastupnik:

Medicopharmacia d.o.o. Sarajevo

Lužansko polje br.7 Ilidža \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 625 \ Faks: +387 33 761 626 \ e-pošta: kemala.sabotic@medicoph.com

KYTRIL

ROCALTROL

AZIENDE CHIMICHE RIUNITA ANGELINI FRANCESCO-A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70 \ Rim \ Italija

Zastupnik:

Remedia d.o.o. Sarajevo

Kranjčevićeva 37 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 033558451 \ Faks: 033558452 \ e-pošta: erduan.jazic@remedia.ba

TANTUM VERDE

TRITTICO retard

B.BRAUN Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1 \ Melsungen \ Njemačka

Zastupnik:

B.Braun Adria BH d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1, \ 71000 Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: - \ Faks: - \ e-pošta: anida.dedovic@bbraun.com

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 585

AMINOPLASMA B. Braun 10 % E
GLUKOZA 10% Braun
GLUKOZA 40% B. Braun
GLUKOZA 5% Braun
IBUPROFEN B. BRAUN 4 mg/mL
IBUPROFEN B. BRAUN 6 mg/mL

IZOTONIČNA OTOPINA NATRIJ-
KLORIDA 0,9% Braun
KALCIJ GLUKONAT 10% B. BRAUN
KALIJ HLORID 7,45% B. BRAUN
RINGEROVA OTOPINA BRAUN
SLOŽENA OTOPINA NATRIJ
LAKTATA BRAUN

BALKANPHARMA-RAZGRAD AD

68 Aprilsko Vastanie Blvd \ 7200 Razgrad \ Bugarska

Zastupnik:

Pharmavision BH d.o.o.

Mladena Stojanovića 4 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: - \ Faks: +387 51 378 111 \ e-pošta: regaffairsba@phavis.com

ACIKLOVIS
TRIO VISION

TOBRAVIS

BARD PHARMACEUTICALS LIMITED

Unit 191, Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW, Velika Britanija
\ \ Velika Britanija

Zastupnik:

MEDIS INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo

Ahmeta Muratbegovića br. 2 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 559 381 \ Faks: - \ e-pošta: emir.fazlic@medis.com

TARGINACT

BAXTER AG

Thurgauerstrasse 130 \ 8152 Glattpark (Opfikon) \ Švajcarska

Zastupnik:

Co.Medprom d.o.o. Banja Luka

Lenada Kostića 24a \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 366 791 \ Faks: +387 51 366 790 \ e-pošta: medprom@teol.net

ENDOXAN
EXTRANEAL
HOLOXAN
NUTRINEAL PD4 1,1%
PHYSIONEAL 40 Clear-Flex glukoza
1,36%w/v/13,6 mg/ml
PHYSIONEAL 40 Clear-Flex glukoza
2,27%w/v/22,7 mg/ml

PHYSIONEAL 40 Clear-Flex glukoza
3,86%w/v/38,6 mg/ml
PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% w/v
PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% w/v
PHYSIONEAL 40 glukoza 3,86% w/v
SEVOFLURAN BAXTER
UROMITEXAN

BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT

Kaiser-Wilhelm-Allee 1 \ 51 373 Leverkusen \ Njemačka

Zastupnik:

Bayer d.o.o. Sarajevo

Trg solidarnosti 2a \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 941 600 \ Faks: +387 33 941 620 \ e-pošta: regulatory.bosnia@bayer.com

ANDROCUR
ASPIRIN complex
ASPIRIN PLUS C FORTE
ASPIRIN plus C sa okusom naranče
ASPIRIN Plus C
ASPIRIN PROTECT 100
ASPIRIN
BEPANTHEN Plus
BETAFERON
CANESPOR
CANESTEN 1
CANESTEN 3
CANESTEN
DIANE 35
DOTAGRAF
EYLEA
Gadovist 1,0 mmol/ml otopina za
injekciju
GADOVIST
IBEROGAST
ILOMEDIN
JIVI 1000 IU

JIVI 2000 IU
JIVI 3000 IU
KERENDIA
LOGEST
MICROGYNON 30
MIRENA
NUBEQA
PRIMOLUT-NOR
PRIMOVIST
QLAIRA
RENNIE
RUPURUT
ULTRAVIST-300 otopina za injekciju ili
otopina za infuziju ili oralna otopina
ULTRAVIST-370 otopina za injekciju ili
otopina za infuziju ili oralna otopina
VENTAVIS
VERQUVO
XARELTO
YASMIN
YAZ

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

ul. Danica 5 \ Koprivnica \ Hrvatska

Zastupnik:

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5 a, Vogošća \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 00 387 33 426 975 \ Faks: +00 387 33 426 617 , +387 33 476 321/034 \ e-pošta: t.muratovic@farmavita.ba

BELODIN
BETIDEN GEL
CUTIBEL
LIDOKAIN BELUPO SPREJ
LORSILAN
LUPOCET FLU FORTE
LUPOCET FLU
LUPOCET TRIO
LUPOCET
MIROBACT mast
NEOFEN Combo
NEOFEN Plus

NEOFEN
ROJAZOL 20 mg/g krema
ROJAZOL 200 mg vagitoriji
SILYMARIN Belupo
SILYMARIN FORTE Belupo
SONA DUO
SONA
TAMOSIN DUO
UROFEM
ZOLTEX
Q-PIN

BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

Yenisehir Mah. Ozgur Sok. No.16-18 Atasehir \ Istanbul \ Turska

Zastupnik:

Proizvođači i njihovi zastupnici

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885, \ e-pošta: merima.fatusic@unifarm.ba

IBURAMIN COLD

KAFESIT

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125 \ 12489 Berlin \ Njemačka

Zastupnik:

BERLIN CHEMIE / Menarini BH d.o.o. Sarajevo

Hasana Brkića broj 2/II \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 715195 \ Faks: +387 33 715187 \ e-pošta: mjovic@berlin-chemie.com

ADENURIC 120

ADENURIC 80

BERLITHION 600 ED

BERLITHION

Bretaris Genuair

BRIMICA GENUAIR

CORVITOL 100

CORVITOL 50

DEFEVIX

DEXOMEN 25

DEXOMEN INJECT

ESPUMISAN LX

ESPUMISAN

FASTUM

FLAVAMED forte

FLAVAMED sirup

FLAVAMED

FLOSIN

LERCANIL 10

LERCANIL 20

LETROX 100

LETROX 50

LIOTON 1000

MANINIL 5

MENARTAN

MEZYM 10000

MEZYM 20000

NEBILET plus 12,5

NEBILET plus 25

NEBILET

PRAMISTAR

PROSTAMOL UNO

RANEXA

Roteas

SIOFOR 1000

SIOFOR 500

SIOFOR 850

SKUDEX

TRICAL

XADOS

ZOFECARD

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH

Turmstrasse 24 \ 6312 Steinhausen \ Švajcarska

Zastupnik:

Viatrix BH d.o.o.

Kolodvorska broj 12/3 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 033 725 932 \ Faks: +387 33 725 931 \ e-pošta: jasna.moralic@viatrix.com

ACOPAIR

AFORBE

ALDARA

ALLERGODIL

ARIXTRA

BANXIOL

BETASERC

BRUFEN EFFECT DUO

BRUFEN EFFECT RAPID

BRUFEN EFFECT

BRUFEN SR

BRUFEN

BUDELIN NOVOLIZER

COLOSPA retard

DAFORBIS

DALSY

DAROB mite

DYMISTA

ELIDEL
FRAXIPARINE
GLEROVA
GOPTEN
IGZELYM
INFLUVAC TETRA
INSPIRA
JAGLIX
KLACID i.v.
KLACID SR
KLACID
KREON 10000
KREON 25000
KREON 35 000
LEPONEX
LIPIDIL
LYRICA
MESTINON
NEURONTIN

NORVASC
OLICARD Retard
PHYSIOTENS
RANTUDIL forte
REVATIO
RHEUMON
RYTMONORM
SORTIS PLUS
SORTIS
SYNTOCINON
TOREM
VIAGRA
VIXARGIO
XALACOM
XALATAN
XANAX SR
XANAX
ZELDOX
ZOLOFT

BHARAT SERUMS AND VACCINES LTD.

17th floor Hoechst House, Nariman point \ Mumbai \ Indija

Zastupnik:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.heric@rhei.life

AMPHOTERICIN B Bharat

BIAL - PORTELA & CA,S.A.

A Av.Da Siderurgia Nacional 4745-457 S \ Mamede do Coronado \ Portugal

Zastupnik:

MEDIS INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo

Ahmeta Muratbegovića br. 2 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 559 381 \ Faks: - \ e-pošta: emir.fazlic@medis.com

ONGENTYS

BIEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Anittepe Mahallesi Turgut Reis Caddesi No:21 Tandogan Cankaya/Ankara \ \ Turska

Zastupnik:

INTRADE PHARM d.o.o. Sarajevo

Osik broj 26 \ Sarajevo, Ilidža \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 878 725 \ Faks: +387 33 878 726 \ e-pošta:

Sinka.intradepharm@gmail.com, sinka.@intradepharm.com.ba

EMFER

EMRAD

Proizvođači i njihovi zastupnici

BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Kaptanpasa Mahallesi, Zincirlikuyu Cad. No.184., 34440 Kasimpasa, Beyoglu \ Istanbul \ Turska

Zastupnik:

Tuzla-Farm d.o.o. Tuzla

Rudarska br.71 \ Tuzla \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387(0) 35 321 248, 321 200 \ Faks: +387 (0) 35 321 221 \ e-pošta: info@tuzlafarm.com

APRAZOL
ATEROZ
CORONIS
GLIFOR
MUSCOFLEX

SALMIMET
TILAC
TRAVAZOL
ZESPIRA

BIOCODEX

7 avenue Gallieni \ Gentilly \ Francuska

Zastupnik:

MEDIS INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo

Ahmeta Muratbegovića br. 2 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 559 381 \ Faks: - \ e-pošta: emir.fazlic@medis.com

ENTEROL

BIOCRYST IRELAND LIMITED

Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road \ Dublin 2 , D02HW77 \ Irska

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta: medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

ORLADEYO

BIOFARM Sp. z.o.o.

Walbrzyska 13 \ Poznan \ Poljska

Zastupnik:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 331 650 \ Faks: +387 51 331 623 \ e-pošta: infoBL@hemofarm.com

CERENORM

BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156 Sancaktepe \ Istanbul \ Turska

Zastupnik:

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885 \ e-pošta: merima.fatusic@unifarm.ba

Ciprofloxacina Biofarma
NEVOTEK

RICUS
BIOCETAM

BIOGEN INTERNATIONAL GmbH

Neuhofstrasse 30 \ 6340 Baar \ Švajcarska

Zastupnik:

MEDIS INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo

Ahmeta Muratbegovića br. 2 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 559 381 \ Faks: - \ e-pošta: emir.fazlic@medis.com

AVONEX
SPINRAZA

TECFIDERA
TYSABRI

BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.A.

Via De Ambrosiis 2 \ Novi Ligure \ Italija

Zastupnik:

Makpharm d.o.o.

Rajlovačka cesta 23, 71000 Sarajevo, BiH \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 568 388 \ Faks: +387 33 568 389 \ e-pošta:
romana.mandic@makpharm.ba, vigilance@makpharm.ba

TRENOLK

SanMed d.o.o. Banja Luka

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 175a, PR-7 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 051366791, kontakt telefon 065 269 050 \ Faks: 051366780 \ e-pošta:
office@sanmed.ba

AMIODARONE CLORIDRATO
BIOINDUSTRIA LIM
Atropina sulfato BIOINDUSTRIA L.I.M.
1 mg/ml
CIPROFLOXACINA BIOINDUSTRIA
L.I.M.

LEVOFLOXACINA BIOINDUSTRIA
L.I.M.
LIDOCAINA CLORIDRATO
BIOINDUSTRIA L.I.M.
NITROGLICERINA BIOINDUSTRIA
L.I.M.

BIONIKA PHARMACEUTICALS D.O.O. Skopje

Skupi 57 \ Skopje \ Republika Severna Makedonija

Zastupnik:

OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo

Pijača 14 A \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 777 277 \ Faks: 033777273 \ e-pošta: registracija@oktal-pharma.ba

ANTROLIN
ATOSIBAN

ATOSIBAN

BIOPHARMA PLASMA LLC

37-V Kyivska St., Bila Tserkva, Kyiv region, 09100 \ \ Ukrajina

Zastupnik:

DOO Farmacija 2011 Bihać

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 591

Proizvođači i njihovi zastupnici

Zagrebačka 2 \ Bihać \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 37 971 100 \ Faks: +387 37 971 106 \ e-pošta: info@farmacija 2011.ba,
mediha@farmacija2011.ba

ALBUMIN-BIOPHARMA
BIOVEN MONO

BIOVEN

BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED

\ \ Irska

Zastupnik:

Hercegovinalijek d.o.o. Mostar

Muje Pašića 4 \ Mostar \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 387 36 501 511, 508 \ Faks: +387 36 501 501 \ e-pošta:
lamija.nistovic@hercegovinalijek.ba

ABEVMY
FULPHILA
HULIO, otopina za injekciju u
napunjenoj sprici, 40mg / 0,8ml

HULIO, otopina za injekciju u
napunjenom penu, 40mg / 0,8mg
OGIVRI
SEMGLEE
YESINTEK

BIOTON S.A.

Staroscinska br.5 \ Varšava \ Poljska

Zastupnik:

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885 \ e-pošta:
merima.fatusic@unifarm.ba

GENSULIN M30
GENSULIN N

GENSULIN R

BLUEPHARMA-INDUSTRIA FARMACEUTICA, S.A.

Sao Martinho do Bispo, 3045-016 Coimbra \ \ Portugal

Zastupnik:

Proton med d.o.o. Banja Luka

Sime Šolaje 1A \ 78000 Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: - \ Faks: - \ e-pošta: regulatory@protonmed.ba, a.celjo@protonmed.ba

ESTRELA

BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG

Dr. Boehringer- Gasse 5-11 \ Beč \ Austrija

Zastupnik:

Boehringer Ingelheim BH d.o.o.

Grbavička 4 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 206 923 \ Faks: +387 33 206 921 \ e-pošta: masa.amrain@boehringer-
ingelheim.com

ACTILYSE
ATROVENT
JARDIANCE

METALYSE
SPIOLTO RESPIMAT
SPIRIVA RESPIMAT

SPIRIVA

BOSNALIJEK d.d.

Jukićeva 53 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Zastupnik:

Bosnalijek d.d.

Jukićeva 53 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 254 587 \ Faks: +387 33 814 263 \ e-pošta: SelmaDz@Bosnalijek.ba

ALERIX	FENIX
ALOPURINOL BOSNALIJEK	FLAMIX
ALTIOKS	FLUSETIN
AMINOL	FOLESSA
AMLODIL	FORDEX
AMLOPRESSIN PLUS	FUNZOL
AMLOPRESSIN	GENTAMICIN BOSNALIJEK
AMOXIBOS	HIBIBOS G
ANGINAL	HIBIBOS T
APIXA	HISTINAX
ARGEDIN	HYPRESSIN PLUS L
AZOMEX	HYPRESSIN PLUS
BETHAGEN	HYPRESSIN
BETHANAT	IZOSEPT D
BETHASAL	KAMFART
BILEXIN	KETOBOS
BOLEX Forte	KOFAN INSTANT
BOLEX	KVEPIN
BOSAURIN	LANIBOS
BOSNYL	LENOCOR
BOSPYRIN PROTECT	LEVEX
BOSPYRIN	LIDOPROCT
BOSTROMBIN	LODIX FORTE
BRONCHOBOS	LODIX
CIPROL	LOPRIL H plus
CITALEA	LOPRIL H
CLODIL	LOPRIL
DIABOS	LOSTOP
DIFEN	LUMINEL
DILATREND	LYSOBACT COMPLETE Spray s
DIPRESAN	aromom pepermint
DOLOREX	LYSOBACT DUO
DOXAT	LYSOBACT P SPRAY s aromom
DUOCLAV	banane
ENKORTEN	LYSOBACT Spray s aromom
ENTEROFURYL STOP	peperminta
ENTEROFURYL	LYSOBACT
EPIRON	LYSODERM
ESBESUL	MATHADOR
EXMAL	MELPAMID 1 mg
FAVISTAN	MELPAMID 2 mg
FENIX NEO	MELPAMID 3 mg

Proizvođači i njihovi zastupnici

MEMENTO	RIVER
MEROT	RODAVAN N
METROZOL	ROTIN
Mikoten	SERTAN
MONOCLAR	STOMATIDIN
NIRVAX	TENLOP H
NITROGLICEROL	TENLOP
NIZON	TENPRIL DUO
NOMIGREN	TENPRIL
NORMAVIL	TICADIL
ONTRIL	TOZAR
PARACETAMOL BOSNALIJEK	TRAMADOL BOSNALIJEK 50 mg
PHARYNGAL	kapsula, tvrda
PILFUD	TRAZEM
PROBILOL	TRYCCEF
PROMASS	ULCOSAN
PYLOMID	VENOSAN
RHINOBOSS	VERION DUO
RHINOSTOP HOT	VERION
RHINOSTOP	XILOZIN P
RINOACT P	XILOZIN
RINOACT	

BRACCO IMAGING S.p.A, Via Egidio Folli 50, 20134 Milano, Italija

\ \ Italija

Zastupnik:

Mark Medical d.o.o. Sarajevo

Radenka Abazovića br.5 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 722 550 \ Faks: +387 33 659 158 \ e-pošta: anela.misira@mark-medical.com

IOMERON

BRACCO S.p.A.

Vie E. Folli 50 \ Milano \ Italija

Zastupnik:

Mark Medical d.o.o. Sarajevo

Radenka Abazovića br.5 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 722 550 \ Faks: +387 33 659 158 \ e-pošta: anela.misira@mark-medical.com

IOPAMIRO 300

MULTIHANCE

IOPAMIRO 370

BRAWN LABORATORIES LIMITED

C-64, Second Floor, Lajpat Nagar-1, 110024 \ Delhi \ Indija

Zastupnik:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.herica@rhei.life

AMINOFILIN BRAWN

594 Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2026

BRAWN LABORATORIES LIMITED

C-64, Second Floor, Lajpat Nagar 1, Delhi \ Delhi \ Indija

Zastupnik:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.heric@rhei.life

ADRENALIN BRAWN

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

430 E. 29th Street, 14th Floor, New York, N.V. 10016 \ \ Sjedinjene Američke Države

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta: medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

OPDIVO

YERVOY

CARINOPHARM GmbH

Unter den Tannen 6 \ Eime \ Njemačka

Zastupnik:

SanMed d.o.o. Banja Luka

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 175a, PR-7 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 051366791, kontakt telefon 065 269 050 \ Faks: 051366780 \ e-pošta: office@sanmed.ba

URAPIDIL Carinopharm 25 mg

URAPIDIL Carinopharm 50 mg

CELLTRION Inc.

(Songdo-dong, 13.-6 13.1, 13-3), 23 Academy-ro, Yeonsu-gu \ 22014 Incheon \ Južna Koreja

Zastupnik:

OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo

Pijaćna 14 A \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 777 277 \ Faks: 033777273 \ e-pošta: registracija@oktal-pharma.ba

HERZUMA

VEGZELMA

REMSIMA

YUFLYMA

TRUXIMA

CELON PHARMA S.A.

Ogrodowa 2A, 05-092 \ Lomianki / Kielpin \ Poljska

Zastupnik:

Salvus BH d.o.o.

Tešanjaska 24 a \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 260 820 \ Faks: +387 33 260 821 \ e-pošta: eila.karovic@salvushealth.com

SALDISK

CENTURION ILAC SANAYI VE TIC. A.S.

Gayrettepe Mah. Hossohbet sokak No:6/2 Besiktas \ Istanbul \ Turska

Zastupnik:

Delta Pharma d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Objekat A, 6. sprat \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +38733296210 \ Faks: +38733296211 \ e-pošta: alma.avdagic@deltapharma-ba.com

PLANICID

TIGECID

RONIX

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, Ziegelhof 24, 17489

Greifswald, Njemačka

\ \ Njemačka

Zastupnik:

Clinres Farmacija d.o.o.

Alipašina 29 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 61 215 514 \ Faks: +387 33 922 410 \ e-pošta: lejla.spahic@clinres-farmacija.com

ZYPREXA

CHEPLAPHARM SCHWEIZ GMBH

Huebweg18-20 \ 4102 Binningen \ Švajcarska

Zastupnik:

Clinres Farmacija d.o.o.

Alipašina 29 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 61 215 514 \ Faks: +387 33 922 410 \ e-pošta: lejla.spahic@clinres-farmacija.com

ROACCUTANE

CHIESI PHARMACEUTICALS GmbH

Gonzagagasse 16/ 16 \ 1010 Beč \ Austrija

Zastupnik:

Providens d.o.o. Sarajevo

Rizaha Štetića 9/1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 033 559 635, hitni telefon 061/ 170 122 \ Faks: 033559636 \ e-pošta: mirna.losic.ramic@providens.org, nuspojave.bih@providens.org

BRAMITOB

FOSTER

CUROSURF

PEYONA

FOSTER 100 µg/6 µg

TRIMBOW

FOSTER NEXTHALER

CIPLA EUROPE

De Keyserlei 58-60 Box 19, 2018 Anvers \ \ Belgija

Zastupnik:

PharmaS d.o.o. Sarajevo

Maršala Tita 2, 71 000 Sarajevo \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 765 400 \ Faks: +387 33 765 401 \ e-pošta: jasminka.mijatovic@pharmas.ba

Ipratropijev bromid/salbutamol Cipla

COMBINO PHARM MALTA, LTD.

HF60 Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia BBG 3000 \ \ Malta

Zastupnik:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.heric@rhei.life

LAXOPRID

COOPER Pharmaceuticals S.A.

64 Aristovoulou Str. Athenes 1853 \ 11853 Athens \ Grčka

Zastupnik:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 331 650 \ Faks: +387 51 331 623 \ e-pošta: infoBL@hemofarm.com

FORTECA

COOPER S.A.

64 Aristovoulou Str. 11853 \ Atina \ Grčka

Zastupnik:

FARMALOGIST ALLBIX d.o.o. Bijeljina

Stefana Dečanskog 258 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 416 070 \ Faks: +387 55 416 075 \ e-pošta: danijela.vjestica@farmalogistallbix.ba

ANTIZOLID

TAVOCTAME

COSMO S.p.A.

Via Cristoforo Colombo 1, 20045 Lainate \ Milano \ Italija

Zastupnik:

Clinres Farmacija d.o.o.

Alipašina 29 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 61 215 514 \ Faks: +387 33 922 410 \ e-pošta: lejla.spahic@clinres-farmacija.com

CORTIMENT MMX

COVEX S.A.

Poligono Industrial Sur, Colmenar Viejo, No.25 \ Madrid \ Španija

Zastupnik:

Proizvođači i njihovi zastupnici

FARMALOGIST ALLBIX d.o.o. Bijeljina

Stefana Dečanskog 258 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 416 070 \ Faks: +387 55 416 075 \ e-pošta: danijela.vjestica@farmalogistallbix.ba

INNPOCETIN Forte

INNPOCETIN

CURIUM NETHERLANDS B.V.

Westerduinweg 3 \ LE Petten \ Nizozemska

Zastupnik:

INEL d.o.o

Polog bb \ Mostar \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36487 502 \ Faks: +387 36 487 346 \ e-pošta: marija@inel-mostar.ba

Sodium Iodide (I-131) Capsules T

ULTRA-TECHNEKOW FM

CURIUM NUKLEER TIP A.S.

Tübitak Mam Teknoparkı \ 41470 Gebze – Kocaeli \ Turska

Zastupnik:

INTRADE PHARM d.o.o. Sarajevo

Osik broj 26 \ Sarajevo, Ilidža \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 878 725 \ Faks: +387 33 878 726 \ e-pošta: Sinka.intradepharm@gmail.com, sinka.@intradepharm.com.ba

MON.FDG (¹⁸F)

MON.TEK⁹⁹Mo/^{99m}Tc GENERATOR

MON.IYOT-131

DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH

Zielstattstr. 48 \ Minhen \ Njemačka

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

OLMETEC Plus

SEVIKAR HCT

OLMETEC

SEVIKAR

DELPHARM ORLÉANS

5 Avenue de Concyr, 45071 Orléans CEDEX 2 \ \ Francuska

Zastupnik:

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885, \ e-pošta: merima.fatusic@unifarm.ba

OLYNTH

DEVA HOLDING A.S.

Halkali Merkez Mah.Basin Ekspres Cad.34303 No:1 Kucukcekmece \ Istanbul \ Turska

Zastupnik:

598 Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2026

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885 \ e-pošta: merima.fatusic@unifarm.ba

AMOKLAVIN-BID 400/57 mg FORTE

AMOKLAVIN-BID

ATAXIL

AZITRO

BRONTIO

CEFAKS

DEGASTROL

DEMEPRAZOL

DEMOKSIF 0,5%

DEVAPEN

DEVIT-3

DEVOXICAM

DIKLORON

DORTIMOL

DOXTADIN

FLOXILEVO

FOTEROL

FUROMID

FUSIDIX 1%

HYDMOXIA

IMATIS

LETRASAN

MONALIZ

OFTAMYCIN

PANDEV

REDICLON 0,1%

RESPIRO

RESPIRO-D

SEBRALER

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885, \ e-pošta: merima.fatusic@unifarm.ba

DEPORES 0.05%

DEVIT-3

DIKLORON

FLIXON

MOKSINE

SALRES

DIACO BIOFARMACEUTICI S.r.l.

Via Flavia 124 \ 34147 Trieste \ Italija

Zastupnik:

EXICO-Healthcare d.o.o.

Stara Cesta bb, Vogošća \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 580 330 \ Faks: +387 33 580 325 \ e-pošta: maida.goga@exico.ba

GLUKOZA 10% DIACO

GLUKOZA 5 % DIACO

GLUKOZA SA NATRIJ KLORIDOM

DIACO

NATRIJ KLORID DIACO

RINGER LAKTAT DIACO

DOLOGIET GmbH & Co. KG

Otto-von-Guericke-Str. 1 \ Sankt Augustin \ Njemačka

Zastupnik:

ELIKSIR d.o.o. POSUŠJE

Ante Starčevića bb \ Posušje \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 39 682 623 \ Faks: +387 39 682 624 \ e-pošta: esma.polimac@eliksir.ba

DOLGIT gel

DOLGIT krema

Dr FALK PHARMA GmbH

Leinenweber 5 \ Freiburg \ Njemačka

Zastupnik:

EWOPHARMA d.o.o. Sarajevo

Rajlovačka cesta 23 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 592 140 \ Faks: +387 33 592 145 \ e-pošta: info@ewopharma.ba

BUDOSAN

URSOFALK

SALOFALK

DR. A. & L. SCHMIDGALL GMBH & CO KG

Wolfganggasse 45-47 \ Beč \ Austrija

Zastupnik:

Viennapharm d.o.o.

Jezero 3 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 553 165 \ Faks: +387 33 553 167 \ e-pošta: office@viennapharm.com

OSADENT

Dr. Gustav Klein GmbH & Co.KG

Steinfeld 3 \ 77736 Zell am Harmerbasch \ Njemačka

Zastupnik:

Alpen Pharma d.o.o.

Husrefa Redžića 9 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 374 325 \ Faks: - \ e-pošta: vanja.arifovic@alpenpharma.com

INFLUCID

TONSILOTREN

SOLIDAGOREN

DR. GUSTAV KLEIN GMBH&CO. KG

Steinfeld 3 \ Zell am Harmersbach \ Njemačka

Zastupnik:

Alpen Pharma d.o.o.

Husrefa Redžića 9 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 374 325 \ Faks: - \ e-pošta: vanja.arifovic@alpenpharma.com

CINNABSIN

POLINOL

EAST AFRICAN INDIA OVERSEAS

Plot No. 1, Pharmacy, Selaqui, Dehradun, Uttarakhand, Dehradun 248011 \ Dehradun 248011 \ Indija

Zastupnik:

DOO Farmacija 2011 Bihać

Zagrebačka 2 \ Bihać \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 37 971 100 \ Faks: +387 37 971 106 \ e-pošta: info@farmacija 2011.ba, mediha@farmacija2011.ba

KE-RELIEF

EIRGEN PHARMA LIMITED

Westside Business Park, Old Kilmeaden Road \ Waterford \ Irska

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta:

amela.dervisevic@zentiva.com

BLASTOMAT

ELI LILLY Export S.A.

Chemin des Coquelicots 16 \ Vernier- Geneva \ Švajcarska

Zastupnik:

Eli Lilly B-H d.o.o.

Azize Šaćirbegović 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 263 670 \ Faks: +387 33 216 686 \ e-pošta:

arezina_bojana@network.lilly.com, snjezana.colic@network.lilly.com

ABASAGLAR

CIALIS

HUMALOG JUNIOR KwikPen

HUMALOG KwikPen

HUMALOG Mix 25 KwikPen

HUMALOG Mix 50 KwikPen

HUMALOG

HUMULIN M3

HUMULIN N

HUMULIN R

MOUNJARO KwikPen

MOUNJARO

OMVOH

TRULICITY

VERZENIOS

ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC.

Marathonos Ave. 95, 19009 Pikermi \ Attica \ Grčka

Zastupnik:

AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo

Igmanska 38, Vogošća \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 580 739; +387 33 580 736 \ Faks: +387 33 580 740 \ e-pošta:

amar@amsal.ba

SPYRO

TIOSAL

ENGELHARD ARZNEIMITTEL GmbH & Co.KG

Herzberstrasse 3, 61138 \ Niederdorfelden \ Njemačka

Zastupnik:

Salveo d.o.o.

Valtera Perića 22 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 033552905 \ Faks: 033552906 \ e-pošta: office-bih@salveo-pharma.com,

l.nedzibovic@salveo-pharma.com

PROSPAN akut

PROSPAN Liquid

PROSPAN sirup

SINOLPAN FORTE

SINOLPAN FORTE

SINOLPAN

TYROSUR

ERIOCHEM SA

Ruta 12-Km 452, Colonia Avellaneda, Departamento Parana \ Entre Rios \ Argentina

Zastupnik:

FARMALOGIST ALLBIX d.o.o. Bijeljina

Stefana Dečanskog 258 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 416 070 \ Faks: +387 55 416 075 \ e-pošta: danijela.vjestica@farmalogistallbix.ba

LECTRUM

EVER VALINJECT GmbH

Oberburgau 3 \ Unterach am Attersee \ Austrija

Zastupnik:

Medicopharmacia d.o.o. Sarajevo

Lužansko polje br.7 Ilidža \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 625 \ Faks: +387 33 761 626 \ e-pošta: kemala.sabotic@medicoph.com

Deksmedetomidin EVER Pharma

KABAZITAKSEL EVER PHARMA

EVER Neuro Pharma GmbH

Oberburgau 3 \ 4866 Unterach \ Austrija

Zastupnik:

Co.Medprom d.o.o. Banja Luka

Nenada Kostića 24a \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 366 791 \ Faks: +387 51 366 790 \ e-pošta: medprom@teol.net

CEREBROLYSIN

EXELTIS ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI

Istanbul Besiktas Etiler Kultur Mahallesi Nispetiye Caddesi No 56, Akmerkez B BL Kat. 6 D.574 \ Istanbul \ Turska

Zastupnik:

MEDIS INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo

Ahmeta Muratbegovića br. 2 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 559 381 \ Faks: - \ e-pošta: emir.fazlic@medis.com

MIKO-PENOTRAN

NEO-PENOTRAN Forte

EXTRACTUMPHARMA CO LTD.

IV körzet 6 \ Kunfehértó \ Mađarska

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

ZEFLAVON

602 Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2026

F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD

Grenzacherstrasse 124 \ CH-4058 Basel \ Švajcarska

Zastupnik:

ROCHE d.o.o.-ROCHE Ltd.

Zmaja od Bosne 7/II \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 568 450 \ Faks: +387 33 568 495 \ e-pošta: srdjan.lucic@roche.com

ACTEMRA
ALECENSA
AVASTIN
COLUMVI
COTELLIC
ENSPRYNG
EVRYSDI
GAZYVA
HEMLIBRA
HERCEPTIN
KADCYLA
LUNSUMIO
MABTHERA
MADOPAR

MIRCERA
OCREVUS 920 mg/23 ml
OCREVUS
PERJETA
PHESGO
POLIVY
PULMOZYME
RECORMON
ROZLYTREK
TECENTRIQ
VABYSMO
XOFLUZA
ZELBORAF

FAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U.

Avda. Leganés, 62, Alcorcon, 28923 Madrid \ \ Španija

Zastupnik:

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885, \ e-pošta: merima.fatusic@unifarm.ba

OLYNTH HA

FARMALIDER S.A.

C/Aragoneses 2, Alcobenedas \ Madrid \ Španija

Zastupnik:

Galenika d.o.o.

Vidovdanska b.b. \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 051 213190 \ Faks: 051 223191 \ e-pošta: dusanka.runic@galenika.rs.ba

Anbol Cardio

FARMA-TEK ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Serifali Mah. Bayraktar Bulvarı Beyan Sok. No: 12 Umraniye \ Istanbul \ Turska

Zastupnik:

Viennapharm d.o.o.

Jezero 3 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 553 165 \ Faks: +387 33 553 167 \ e-pošta: office@viennapharm.com

DERMIFIN

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo

Igmanska br. 5a \ 71320 Vogošća \ Bosna i Hercegovina

Zastupnik:

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5 a, Vogošća \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 00 387 33 426 975 \ Faks: +00 387 33 426 617 , +387 33 476 321/034 \ e-pošta:

t.muratovic@farmavita.ba

ABUXAR	LAXID
AFLODERM	LECANID
AGILLAS	LEVETIRACETAM Farmavita
AGNIS	LIPOSTAT
ALFADOX	LORDIAR
ALOPURINOL FARMAVITA	MARPAD COMBO
AMIODARON FARMAVITA	MEDAZOL
AMLODIPIN FARMAVITA	MISAR SR
AMORA	MISAR
ANDESART	MONLAST
ARIPRIZOL	MOXIFLOX
ARVIND	NEOFEN FORTE
ASKA pro	NEOFEN Rapid
AZOMICIN	NEOFEN
BELEPTIC	NIBEL
BELODERM	NOFLOX
BELOGENT	ORMIDOL
BELOSALIC	PAICOR
BEZIDIN	PINOX
CALIXTA	PORTALAK
CARDIOL	PROMAZIN FARMAVITA
CARVELOL	PROPAFENON FARMAVITA
CERSON	PROSPERA
CIFLOX	PROTECTA
CITRAM	Q-PIN
DUOTIN	REPPLE
ELYES	RIBAXAN
ERITROMICIN FARMAVITA	ROSIX COMBI
ESOMEPRAZOL FARMAVITA	ROSIX
FLUOXETIN FARMAVITA	ROSUXAN
FURSEMID forte	RUDAKOL
FURSEMID	SULPIRID FARMAVITA
GABINA	TAMOSIN
GITAS PLUS	TARGET PLUS
GITAS	TIRAMAT
HERPLEX	TOLDEX
IBUPROFEN FARMAVITA	TOMID
INDOMETACIN FARMAVITA	TYGROL
IRUMED	URUTAL 24 mg
IRUZID 10	URUTAL forte
IRUZID 20/25	URUTAL
IRUZID 20	VAIRA - V
KATENA	VAL Plus

VAL
VALICA COMBI
VALICA

VEXANA
ZARACET

FERRER INTERNATIONAL, SA

Gran Via Carlos III, 94, 08028 Barcelona \ \ Španija

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta: medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

TRINOMIA

FERRING GmbH

Wittland 11 \ 24109 Kiel \ Njemačka

Zastupnik:

Clinres Farmacija d.o.o.

Alipašina 29 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 61 215 514 \ Faks: +387 33 922 410 \ e-pošta: lejla.spahic@clinres-farmacija.com

MENOPUR
MINIRIN MELT

REKOVELLE
TRACTOCILE

FERRING INTERNATIONAL CENTER SA

Chemin de la Vergognausaz 50 \ Saint-Prex \ Švajcarska

Zastupnik:

Clinres Farmacija d.o.o.

Alipašina 29 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 61 215 514 \ Faks: +387 33 922 410 \ e-pošta: lejla.spahic@clinres-farmacija.com

MINIRIN

PENTASA

FERRING PHARMACEUTICALS BV

Polarisavenue 144 \ 2132 JX Hoofddorp \ Nizozemska

Zastupnik:

Clinres Farmacija d.o.o.

Alipašina 29 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 61 215 514 \ Faks: +387 33 922 410 \ e-pošta: lejla.spahic@clinres-farmacija.com

DECAPEPTYL DEPOT
DECAPEPTYL

MINIRIN
PENTASA

FISIOPHARMA-S.R.L.

Nucleo Industriale \ Palomonte (SA) CAP 84020 \ Italija

Zastupnik:

Proizvođači i njihovi zastupnici

DOO Farmacija 2011 Bihać

Zagrebačka 2 \ Bihać \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 37 971 100 \ Faks: +387 37 971 106 \ e-pošta: info@farmacija 2011.ba, mediha@farmacija2011.ba

MIOZAC

FRESENIUS KABI Austria GmbH

Hafnerstrasse 36 \ A-8055, Graz \ Austrija

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta: medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM Kabi 4 g/0,5 g

AMINOSTERIL N-HEPA 8%

AMINOVEN 10%

AQUA BIDESEST. „FRESENIUS“

BUSULFAN FRESENIUS KABI

IBUPROFEN KABI 400 mg otopina za infuziju

Imipenem/Cilastatin Kabi 500 mg/500 mg

IRINOTECAN KABI

KABIVEN PERIPHERAL 1000 kcal

KABIVEN PERIPHERAL 1400 kcal

KABIVEN PERIPHERAL 1700 kcal

KETOSTERIL

LEVOBUPIVAKAIN KABI 5 mg/mL

otopina za injekciju/infuziju

LIDOCAINE KABI 20 mg/mL

METRONIDAZOL Fresenius

NATRIJUM-HLORID KABI

NEODOLPASSE

OLEOVIT D3

PROPOFOL 1% MCT Fresenius

RINGEROV LAKTAT Fresenius Kabi otopina za infuziju

RINGEROVA OTOPINA Fresenius

Kabi otopina za infuziju

SMOFKABIVEN PERIPHERAL

SMOFlipid 20%

ZOLEDRONSKA KISELINA Fresenius Kabi

Pontus Pharma d.o.o.Sarajevo

Milana Preloga 12A \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 870 077 \ Faks: +387 33 870 062 \ e-pošta: dalila.imsirpasic@pontus-pharma.com

IDACIO

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH

Else-Kroner-Strasse 1 \ Bad Homburg v.d.H. \ Njemačka

Zastupnik:

Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo

Zmaja od Bosne 7-7A \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 033559182 \ Faks: 033559180 \ e-pošta: amra_omeragic@yahoo.com

BALANCE 1,5 % glukoze 1,25 mmol/L kalcija

BALANCE 1,5 % glukoze 1,75 mmol/L kalcija

BALANCE 2,3 % glukoze 1,25 mmol/L kalcija

BALANCE 2,3% glukoze 1,75 mmol/L kalcija

BALANCE 4,25 % glukoze 1,25 mmol/L kalcija

CAPD/DPCA 3 stay safe

CAPD/DPCA 17 stay safe

606 Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2026

CAPD/DPCA 19 stay safe
CAPD/DPCA 2 sleep safe
CAPD/DPCA 2 stay safe
CAPD/DPCA 4 sleep safe

CAPD/DPCA 4 stay safe
MULTIBIC 2 mmol/l kalija
MULTIBIC 3 mmol/l kalija

G.L. PHARMA GmbH

Schlossplatz 1 \ Lannach \ Austrija

Zastupnik:

Viennapharm d.o.o.

Jezero 3 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 553 165 \ Faks: +387 33 553 167 \ e-pošta: office@viennapharm.com

PRONERV

TROMBOPIRIN

G.POHL BOSKAMP GmbH & Co.KG

Kieler Strasse 11 \ Hohenlockstedt \ Njemačka

Zastupnik:

MEDIS INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo

Ahmeta Muratbegovića br. 2 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 559 381 \ Faks: - \ e-pošta: emir.fazlic@medis.com

GELOMYRTOL forte

NITROLINGUAL sprej

GALENICA S.A

Eleftherias street, 14564 Kifisia, Grčka \ \ Grčka

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

ZIDENAC

GALENIKA a.d. Beograd

Batajnički drum bb \ Beograd \ Srbija

Zastupnik:

Galenika d.o.o.

Vidovdanska b.b. \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 051 213190 \ Faks: 051 223191 \ e-pošta: dusanka.runic@galenika.rs.ba

AEROGAL
AMIKACIN GALENIKA
ANBOL CARDIO
APEXYR
ARTEFLUMID
ATOLIP
AZINOCIN
BACTRIM
BEDOXIN

BENSEDIN
BEVIPLEX
BISOPROLOL GALENIKA
BORTEGAZ
CHLORAMPHENICOL GALENIKA
CLOPIGAL
CORNILAT
DAKTANOL
DAMATON

Proizvođači i njihovi zastupnici

DEFRINOL DUO	LIDOKAIN 2% - ADRENALIN
DEFRINOL forte	GALENIKA
DEFRINOL	LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 1%
DEXAMETHASON-NEOMYCIN	LIDOKAIN-HLORID GALENIKA 2%
GALENIKA	LIRUX®
DEXASON	LONGACEPH
DIDERMAL	MISVENOL
DIKLOFEN	NAPROKSEN GALENIKA
DIMIGAL	NEBIGAL
DOVICIN	NEOZAPIN
DROKSIN	NOVALGETOL
DUTAMERA	OHB 12
ELMOPAG	Olire
ENAGAL	ORVAGIL
ENBECIN	OXAWAY
ERTAZNA	PALITREX
EZRUSTA	PARACETAMOL GALENIKA
FARIN	PENTREXYL
FLUFETAN	PRINORM
FLURBISEPT	PRONISON
GABAPREG	PROPRANOLOL GALENIKA
GALIEKS	PROTAMIN SULFAT GALENIKA
GALITIFEN	RINOFF
GALOSART PLUS	RIVAROX
GALOSART	RIVOTRIL
GARTYZ	ROXACET COLD
GENTAMICIN GALENIKA	ROZYFEN
GINO-DAKTANOL	RUSOVAS
GLAUMOL	SALTAPSA
GLIORAL	SINACILIN
HEPALPAN 1000	SINODERM N
HEPALPAN	SINODERM
HEPARIN GALENIKA	SOLTRIK
HYDROCORTISON GALENIKA	SPALMOTIL
HYDROCICLIN	SPIRONOLAKTON GALENIKA
KATOPIL	TEFOR
KLOMETOL	TELUKA
KSALOL	TESTOSTERON DEPO
LACOMDA	TIGILIN
LEFLOGAL	VENOSMIN
LIDOKAIN - HLORID GALENIKA	VITAMIN C GALENIKA
	VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA

GAP S.A.

Agissilaou str.46, Agios Dimitrios \ Attiki \ Grčka

Zastupnik:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Novaković bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 331 650 \ Faks: +387 51 331 623 \ e-pošta: infoBL@hemofarm.com

ISOSKIN

GE Healthcare AS

Nycoveien 2, P.O.Box 4220 Nydalen \ 0401 Oslo \ Norveška

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta:

medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

CLARISCAN

GE HEALTHCARE AS

Nycoveien 1, P.O. Box 4220 Nydalen, NO-0401 Oslo \ Oslo \ Norveška

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta:

medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

CLARISCAN

VISIPAQUE

OMNIPAQUE

GEDEON RICHTER PLC.

Gyomroi ut 19-21, Budimpešta \ \ Mađarska

Zastupnik:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 331 650 \ Faks: +387 51 331 623 \ e-pošta: infoBL@hemofarm.com

MOVYMA

GEISER PHARMA, S.L.U.

CL POL MUTILVA CALLE E 5 BJ MUTILVA, NAVARRA (31192), Španija \ \ Španija

Zastupnik:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 331 650 \ Faks: +387 51 331 623 \ e-pošta: infoBL@hemofarm.com

OROFAR AKUT

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş., (skraćeno GEN),

Mustafa Kemal Mah., 2119. Sok, No:3, D:2-3, 06520 Çankaya \ ANKARA \ Turska

Zastupnik:

Co.Medprom d.o.o. Banja Luka

Nenada Kostića 24a \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 366 791 \ Faks: +387 51 366 790 \ e-pošta: medprom@teol.net

Proizvođači i njihovi zastupnici

Genbutrol 15
Genbutrol 7,5

KOFEIN CITRAT GEN 20
KOFEIN CITRAT GEN 60

GENEPHARM S.A.

18th km Marathonos Avenue \ 15351 Pallini \ Grčka

Zastupnik:

Viennapharm d.o.o.

Jezero 3 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 553 165 \ Faks: +387 33 553 167 \ e-pošta: office@viennapharm.com

SORAGEN

SUNIGEN

GH GENHELIX S.A.

Julia Morros s/n, Parque Technologico 112, 24009 Leon \ \ Španija

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

ALYMSYS

GILEAD SCIENCES IRELAND UC

IDA Business and Technology Park, Carrigtohill \ Co. Cork \ Irska

Zastupnik:

Medicopharmacia d.o.o. Sarajevo

Lužansko polje br.7 Ilidža \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 625 \ Faks: +387 33 761 626 \ e-pošta: kemala.sabotic@medicoph.com

EPCLUSA

TRUVADA

EVIPLERA

GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED

12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24 YK11 \ \ Irska

Zastupnik:

Evropa Lijek Pharma d.o.o.

Vlakovo 252 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 77 43 00 \ Faks: +387 33 77 43 01 \ e-pošta: naida.bilalagic-pihura@elpharma.ba, amar.ramovic@elpharma.ba

AUGMENTIN

AVAMYS

AVODART

CALGEL

COMBIVIR

DERMOVATE

DOVATO

DUODART

ENGERIX B za djecu

ENGERIX B za odrasle

FLIXONASE

FLIXOTIDE Inhaler

IMIGRAN

INFANRIX - IPV

INFANRIX Hexa

INFANRIX IPV + Hib

KIVEXA

LACIPIL

LAMICTAL

PRIORIX

RELVAR ELLIPTA
REQUIP MODUTAB
REQUIP
ROTARIX
SERETIDE Diskus
SERETIDE inhaler
SEROXAT

TIVICAY
TRIUMEQ
VENTOLIN inhaler
VENTOLIN
WELLBUTRIN XR
ZEFFIX

**GLAXOSMITHKLINE-CONSUMER
Felelossegu Tarsasag**

Magyarország

Korlatolt

Csorsz utca 43 \ 1124 Budapest \ Mađarska

Zastupnik:

Clinres Farmacija d.o.o.

Alipašina 29 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 61 215 514 \ Faks: +387 33 922 410 \ e-pošta: lejla.spahic@clinres-farmacija.com

PANADOL EXTRA

PANADOL

**GLENWOOD Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Pharmazeutische Erzeugnisse (Glenwood GmbH)**

Arabellastrasse 17 \ 81925 Minhen, \ Njemačka

Zastupnik:

Evropa Lijek Pharma d.o.o.

Vlakovo 252 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 77 43 00 \ Faks: +387 33 77 43 01 \ e-pošta: naida.bilagic-pihura@elpharma.ba, amar.ramovic@elpharma.ba

PERSANTIN

GOODWILL PHARMA DOO ZA TRGOVINU, USLUGE, EXPORT-IMPORT SUBOTICA

Segedinski put 80, Subotica 24000 \ Subotica \ Srbija

Zastupnik:

GOODWILL PHARMA D.O.O. Bijeljina

Stefana Dečanskog 258 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 416 071 \ Faks: +387 55 416 075 \ e-pošta: andrea.salcinovic@goodwillpharma.org

PENTIAX

GRUNENTHAL GmbH

Zieglerstrasse 6 \ Aachen \ Njemačka

Zastupnik:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 331 650 \ Faks: +387 51 331 623 \ e-pošta: infoBL@hemofarm.com

Proizvođači i njihovi zastupnici

PALEXIA SR

PALEXIA

TRANSTEC 35 µg/h

TRANSTEC 52,5 µg/h

TRANSTEC 70 µg/h

ZALDIAR 37,5 mg/325 mg

GUERBET

B.P. 57400, F-95943 Roissy CdG Cedex \ Roissy \ Francuska

Zastupnik:

PHARMACOL INTERNATIONAL d.o.o.

Gundulićeva br. 94 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 491 145 \ Faks: +387 51 491 146 \ e-pošta: office.bih@pharmacol-int.com

DOTAREM

OPTIRAY 300

OPTIRAY 350

XENETIX

GUFIC BIOSCIENCES LIMITED

1st to 4th floor, S.M.House, 11 Sahakar road, Ville Parle (East), Mumbai 400057, Indija \ Indija

Zastupnik:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.heric@rhei.life

VANCOLIXIN

HALEON HUNGARY KFT

Csorsz utca 43, 1124 Budapest \ \ Mađarska

Zastupnik:

Clinres Farmacija d.o.o.

Alipašina 29 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 61 215 514 \ Faks: +387 33 922 410 \ e-pošta: lejla.spahic@clinres-farmacija.com

FENISTIL 1mg/mL oralne kapi

FENISTIL gel

PANADOL BABY

PANADOL Forte Optizorb

PANADOL OPTIZORB

THERAFLU Max plus C

VOLTAREN Emulgel 1%

VOLTAREN FORTE 2%

HEMOFARM A.D. Vršac

Beogradski put b.b. \ Vršac \ Srbija

Zastupnik:

Hemofarm proizvodnja farmaceutske proizvoda d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 331 650 \ Faks: +387 51 331 623 \ e-pošta: infoBL@hemofarm.com

BRONHOKLIR SIRUPI BRŠLJAN

CAFFEBOL

CORTIAZEM RETARD

DILCORAN 80

ERYNORM

FAMOTIDIN HF

FEBRICET

FOMELA

GASTROPERIDON

GENTOKULIN

HEPATHROMBIN

HEXTEND

IBUMAX 2%
IBUMAX 4 %
INDAPRES
LAKTULOZA HF
LORAZEPAM HF
MAROCEN
METHYLERGOMETRIN
MUCODYNE
MYCOSEB
NAFAZOL
NEODEKSACIN
NYSTATIN HF
OMNITUS forte
OMNITUS
OTOL H
PANTHENOL

POVIDON JOD HF
PRESSING
RAPTEN
RINASEK
SILDENA
SINEDOL
SNUP 0,05%
SNUP 0,1%
SNUP D
STANICID
TAITA
TIMADREN
TRECAR
VITAMIN AD
XEPAR
ZYMBAKTAR

HEMOFARM koncern A.D.

Beogradski put b.b. \ Vršac \ Bosna i Hercegovina

Zastupnik:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 331 650 \ Faks: +387 51 331 623 \ e-pošta: infoBL@hemofarm.com

METOTEN

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Zastupnik:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 331 650 \ Faks: +387 51 331 623 \ e-pošta: infoBL@hemofarm.com

AGLIKEM
AMINOSOL 10%
AMINOSOL 15%
AMOKSICILIN HF
APERTO
AXONIN
AZARAN
BARIOS
BROMAZEPAM HF
CEFALEKSIN HF
CEFAPAN
CEFEPIM HF
CENOMAR
CHOLIPAM
CITRALES
CORNELIN

CORNEPRIL
DATUST DUO
DATUST
DIAZEPAM HF
DIKLOFENAK HF
DOKSICIKLIN HF
DOLISTA DUO
DOLISTA
DOLPIRINN
ELMASTAN
ERITROMICIN HEMOFARM
FINASTERID HEMOFARM
FLUCONAL
FLUNISAN
GENTAMICIN HF
GLIMEPIRID HF

Proizvođači i njihovi zastupnici

GLUCOSI INFUNDIBILE 10%	PANTOPRAZOL Hemofarm
GLUCOSI INFUNDIBILE 5%	PARAVANO DUO
GRIPPOSTAD COMPLEX	PARAVANO
HARTMANOV rastvor	PHENOBARBITON HF
HEMOMYCIN	POROXIFEN
HEMOPRES	PRAZEPAM HEMOFARM
HEPASOL 8%	PRESOLOL
HIDROKORTIZON HF	PRILENAP H
HYPOLIP	PRILENAP HL
IBUMAX DUO	PRILENAP
IBUPROFEN HF	PRILINDA DUO
INDIVIL MET	PRILINDA PLUS
INDIVIL	PRILINDA
IRBENIDA H	PROPAFEN
IRBENIDA HL	RAPTEN - K
IRBENIDA	RAPTEN DUO
JARAMERA	RAPTEN forte
KARBAPIN	RAPTEN
LARGOCILIN	RESPEKT
LATRIGIL	RIVAROKSABAN HF
LEMOD-SOLU	SAURUS
LEVETIRACETAM HF	SIDATA
LORAZEPAM HF	STARTINA
MANITOL HF 10% E	TADALAFIL HF
MANITOL HF 20%	TENSEC
MAROCEN	TICAGREX
METHYLDOPA HF	TRAMADOL HF
MIDOL PROTECT 75	TREANA
MIDOL PROTECT	TREFERO
MILENOL	TREGONA D
MONIZOL	TROMBOMELT
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE	VAZOTAL
COMPOSITUM (RINGER RASTVOR)	VERAPAMIL HF
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE	YANIDA COMBO
PANCILLIN	YANIDA H
PANKLAV 2X	YANIDA HL
PANKLAV forte	YANIDA TRIO
PANKLAV	YANIDA
PANTHENOL	ZENIX

HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co.KG

Liebigstrasse 1 – 2, 65438 Flörsheim am Main \ \ Njemačka

Zastupnik:

GOODWILL PHARMA D.O.O. Bijeljina

Stefana Dečanskog 258 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 416 071 \ Faks: +387 55 416 075 \ e-pošta:
andrea.salcinovic@goodwillpharma.org

ARLEVERT

HETERO EUROPE S.L.

Viladecans Business Park, "Edificio Australia", c/Antonio Machado 78 \ 08840 Viladecans
\ Španija

Zastupnik:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.heric@rhei.life

ABESINE

ICN Polfa Rzeszow S.A.

ul. Przemysłowa 2 \ Rzeszow \ Poljska

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta:
medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

CARDIOPIRIN GR

ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.

Veysel Karani Mah. Colakoglu Sk. No. 10, 34885 Sancaktepe \ Istanbul \ Turska

Zastupnik:

Tuzla-Farm d.o.o. Tuzla

Rudarska br.71 \ Tuzla \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387(0) 35 321 248, 321 200 \ Faks: +387 (0) 35 321 221 \ e-pošta:
info@tuzlafarm.com

ALECAST
ALFAZAN
ALRINAST
CEFDIA
DEXIREN
FORTEVIR

HIVERAC
LEPTICA
LIVERCOL
OVERACT
PANOCER
VILDABET

IMMEDICA PHARMA AB

Solnavägen 3H 113 63 Stockholm \ \ Švedska

Zastupnik:

PTD `MGM FARM` d.o.o.

311. Lahke brigade 97 \ Kakanj \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 32 771 770/778 \ Faks: +387 32 771 777, +387 32 771 789 \ e-pošta:
azra.pacariz.@mgmfarm.ba

BETOPTIC S

INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GmbH

Von-Humboldt-Str.1, D- 64646 Heppenheim (Bergstrasse) \ Bergstrasse \ Njemačka

Zastupnik:

Proizvođači i njihovi zastupnici

CORAPHARM d.o.o.

Cara Lazara 22 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 433 820 \ Faks: +387 51 433 821 \ e-pošta: maja.savic@corapharm.rs

FOMICYT

INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE 'VINČA', INSTITUT OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU, UNIVERZITET U BEOGRADU

ul Mike Petrovića Alasa 12-14 \ 11000 Beograd-Vinča \ Srbija

Zastupnik:

Medicom d.o.o. Bijeljina

Save Šumanovića 89 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 416 500, +387 55 416 600 \ Faks: +387 55 416 055 \ e-pošta: office@medicomb.net

Natrijum jodid - Na131I kapsule za terapiju

UNIVERZALNI
GENERATOR (UREĐAJ SA PRIBOROM) 99Mo/99mTc

INSTITUTO GRIFOLS S.A.

Poligone Levante, Can Guasch 2, 08150 Parets del Valles \ Barcelona \ Španija

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta: medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

ALBUTEIN 200 g/l

ALBUTEIN 50 g/l

FANHDI 100 i.j. FVIII/120 i.j. VWF po ml

FANHDI 25 i.j. FVIII/30 i.j. VWF

FANHDI 50 i.j. FVIII/60 i.j. VWF

INJECT CARE PARENTERALS PVT. LTD.

PLOT, NO. 130, GIDC, SILVASSA ROAD, VAPI, Valsad, Gujarat, 396195 \ \ Indija

Zastupnik:

DOO Farmacija 2011 Bihać

Zagrebačka 2 \ Bihać \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 37 971 100 \ Faks: +387 37 971 106 \ e-pošta: info@farmacija2011.ba, medija@farmacija2011.ba

PHARMOX CV

SOLICILLIN

JADRAN - Galenski laboratorij d.d.

Svilno 20 \ Rijeka \ Hrvatska

Zastupnik:

FARMIS d.o.o. Sarajevo

Igmanska b.b. \ Vogošća - Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 580 923 \ Faks: +387 33 580 934 \ e-pošta: lejda.uzunovic@farmis.ba

GLAUMAX

JADRAN-Galenski Laboratorij d.o.o.

Igmanska bb \ Vogošća-Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 580 940 \ Faks: - \ e-pošta: mirza.besirovic@jglpharma.com

AKNET Duo
AKNET
BETAZON
BIMANOX
CARBOMED
DOLOKAIN gel
DORZOL
DRAMINA
ESCONTRAL direkt
ESCONTRAL
FOLACIN
FUNGILAC

FUNGISOL
HEPAN gel
KALIJ KLORID JADRAN
LATANOX
MERALYS COMB
MERALYS HA
MERALYS
MOKSACIN
ROZAMET
SLAM
TIMALEN
VIZOL

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30 \ B-2340 Beerse \ Belgija

Zastupnik:

GLOSARIJ CD D.O.O. SARAJEVO

Rajlovačka 14 b \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: - \ Faks: - \ e-pošta: info@glosarijcd.ba

VELCADE

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885, \ e-pošta: merima.fatusic@unifarm.ba

VISIKLEAR

VISINE Classic

JANSSEN-CILAG Kft.

Nagyenyed 8-14 \ 1123 Budimpešta \ Mađarska

Zastupnik:

GLOSARIJ CD D.O.O. SARAJEVO

Rajlovačka 14 b \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: - \ Faks: - \ e-pošta: info@glosarijcd.ba

DARZALEX
DUROGESIC
EPREX
ERLEADA
IMBRUVICA
PONVORY

REMICADE
RISPOLEPT CONSTA
SIMPONI
TREMIFYA
TREVICTA
XEPLION

JOINT STOCK COMPANY LEKHIM-KHARKIV

36, Severyna Pototskoho St., Kharkiv, Kharkiv region, 61115 \ \ Ukrajina

Proizvođači i njihovi zastupnici

Zastupnik:

DOO Farmacija 2011 Bihać

Zagrebačka 2 \ Bihać \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 37 971 100 \ Faks: +387 37 971 106 \ e-pošta: info@farmacija 2011.ba, mediha@farmacija2011.ba

VODA ZA INJEKCIJU LEKHIM

JSC OLPHA

Rupnicu Iela 5 \ Olaines novads, Olaine \ Latvija

Zastupnik:

APOMEDICAL d.o.o.

Vreoce br. 33 \ Ilidža-Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 033771701 \ Faks: 033771707 \ e-pošta: sonja.jerkic@apomedical.ba

NEOMIDANTAN

KEDRION S.p.A.

Localita ai Conti SNC CAP 55051, Frazione Castelvecchio Pascoli \ Barga (LU) \ Italija

Zastupnik:

PHARMA - MAAC d.o.o. Sarajevo

Bačići 7 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 77 04 80 \ Faks: +387 33 770 499 \ e-pošta: office@pharmamaac.com

AIMAFIX

EMOCLOT

Ig VENA

IMMUNOHbs

IMMUNORHO

TETANUS GAMMA

UMAN ALBUMIN

KERN PHARMA S.L.

Polígono Industrial Colón II Venus, 72, 08228 Terrassa (Barcelona) \ \ Španija

Zastupnik:

MEDIS INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo

Ahmeta Muratbegovića br. 2 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 559 381 \ Faks: - \ e-pošta: emir.fazlic@medis.com

ALDACTONE

KLOSTERFRAU BERLIN GmbH

Motzener Str.41 \ Berlin \ Njemačka

Zastupnik:

Evropa Lijek Pharma d.o.o.

Vlakovo 252 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 77 43 00 \ Faks: +387 33 77 43 01 \ e-pošta: naida.bilagic-pihura@elpharma.ba, amar.ramovic@elpharma.ba

NEO-ANGIN bez šećera

NEO-ANGIN

OCTEANGIN

KRAS d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Laktaši

Ljevcanska 43 \ Laktaši \ Bosna i Hercegovina

618 Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2026

Zastupnik:

KRAS d.o.o.

ulica Ljevičanska broj 43 \ Laktaši \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 53 22 64 \ Faks: +387 51 53 22 64 \ e-pošta: info@kras.ba

MEDICINSKI KISEONIK KRAS

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto

Šmarješka cesta 6 \ Novo mesto \ Slovenija

Zastupnik:

KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo

Džemala Bijedića 125 A \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 720 550 \ Faks: +387 33 720 555 \ e-pošta: azra.tahirovic@krka.biz

ABOXOMA	ECANSYA
ACLEXA	EFLORAN
AMIOKORDIN	ELICEA
AMLESSA	ELISKARDIA
AMLESSANEO	EMANERA
AMLEWEL	ENAP
AMLEWELNEO	ENAP-H
AMPRIL HD	ENAP-HL 20
AMPRIL HL	ENAP-HL
AMPRIL	ETOXIB
APAUrin	EVEROLIMUS KRKA
ARYZALERA	EZOLETA
ASENTRA	FINPROS
ATIXARSO	FLEBAVEN
ATORIS COMBI	FLOSTERON
ATORIS	FROMILID UNO
AZIBIOT	FROMILID
B-COMPLEX	GARAMYCIN
BETAKLAV	GLICLADA SR
BILOBIL forte	GLICLADA
BILOBIL intense 120 mg	GLYPVILO
BILOBIL	HALOPERIDOL KRKA DEPO
BLOXAN	HALOPERIDOL KRKA
CALMESAN	HELEX SR
CIPRINOL	HELEX
CORYOL	HERBION bršljan
DAGRAFORS	HERBION islandski lišaj
DALERON	HERBION sirup od bokvice
DASSELTA	HERBION sirup od jagorčevine
DEKENOR	HICONCIL
DEXAMETHASON Krka	IFIRMACOMBI
DOLNADA	IRACOR
DORETA	KAMIREN
DULSEVIA	KAPTOPRIL KRKA
DUOVIT	KARBIS
DUTRYS	KVENTIAX SR

Proizvođači i njihovi zastupnici

KVENTIAX	SEPTANAZAL ZA DJECU
LANZUL	SEPTANAZAL ZA ODRASLE
LETIZEN	SEPTOLETE TOTAL cola
LEVALOX	SEPTOLETE TOTAL eukaliptus
LEXAURIN	SEPTOLETE TOTAL limun i đumbir
LORISTA H	SEPTOLETE TOTAL limun i med
LORISTA HD	SEPTOLETE TOTAL limun i zova
LORISTA	SEPTOLETE TOTAL
LORTANDA	SOBYCOMBI
MAYMETSI	SOBYCOR
MAYSIGLU	SULFASALAZIN KRKA EN
MEAXIN	TADILECTO
MEMANDO	TANYZ ERAS
MIRZATEN	TANYZ ERAS
MODITEN DEPO	TANYZ
MODITEN	TENOX
MOLOXIN	TEOTARD
MONKASTA	TOLUCOMBI
NAKLOFEN DUO	TOLURA
NAKLOFEN	TORECAN
NALGESIN FORTE	TORENDO Q-Tab
NALGESIN S	TORENDO
NOLICIN	TRAMADOL KRKA
NOLPAZA CONTROL	ULCAMED
NOLPAZA	ULTOP
OPRYMEA	VALAROX
PANATUS FORTE	VALOMINDO
PANATUS	VALSACOMBI
PENTILIN	VALSACOR
PIKOVIT	VALTRICOM
PREGABIO	VASILIP
PRENESSA	VITAMIN D3 Krka
PRENESSANEO	VIZARSIN
PRENEWEL	WAMLOX
PRENEWELNEO	XERDOXO
RAMEAM	YASNAL
ROLPRYNA SR	ZALASTA Q-Tab
ROSWERA COMBI	ZALASTA
ROSWERA	ZULBEX
ROXAMPEX	ZYLLT
ROXIPER	

KWIZDA PHARMA GmbH

Effingergasse 21 \ Beč \ Austrija

Zastupnik:

Viennapharm d.o.o.

Jezero 3 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 553 165 \ Faks: +387 33 553 167 \ e-pošta: office@viennapharm.com

BISOCOR
BRONCHOSTOP pastile protiv kašlja
BRONCHOSTOP Sine sirup protiv
kašlja

BRONCHOSTOP sirup protiv kašlja
BRONCHOSTOP sprej za usnu
sluznicu
CEREBRYL

KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V

Bloemlaan 2, 2132NP Hoofddorp \ Hoofddorp \ Nizozemska

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta:

medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

CRYSVITA

L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SOCIETA DI ESERCIZIO- S.P.A.

Strada Statale 67, Frazione Granatieri, Scandicci \ Firenze \ Italija

Zastupnik:

Providens d.o.o. Sarajevo

Rizaha Štetića 9/1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 033 559 635, hitni telefon 061/ 170 122 \ Faks: 033559636 \ e-pošta:

mirna.losic.ramic@providens.org, nuspojave.bih@providens.org

ORAMORPH

LABIANA PHARMACEUTICALS S.L.U.

Corbera de Llbreget (Barcelona)27-31 \ Barcelona \ Španija

Zastupnik:

GOODWILL PHARMA D.O.O. Bijeljina

Stefana Dečanskog 258 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 416 071 \ Faks: +387 55 416 075 \ e-pošta:

andrea.salcinovic@goodwillpharma.org

FOSTRON

LABORATOIRE HRA Pharma

200 Avenue de Paris, 92320 Châtillon \ Pariz \ Francuska

Zastupnik:

Makpharm d.o.o.

Rajlovačka cesta 23, 71000 Sarajevo, BiH \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 568 388 \ Faks: +387 33 568 389 \ e-pošta:

romana.mandic@makpharm.ba, vigilance@makpharm.ba

ELLAONE

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL

22 Avenue Aristide Briand, 94110 \ Arcueil \ Francuska

Zastupnik:

Hercegovinalijek d.o.o. Mostar

Muje Pašića 4 \ Mostar \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 387 36 501 511, 508 \ Faks: +387 36 501 501 \ e-pošta:

lamija.nistovic@hercegovinalijek.ba

IDEOS

PHLEBODIA

Proizvođači i njihovi zastupnici

POLYGYNAX
TOT`HEMA

TOTYLEM

LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL S.A.S.

3 rue du Bourg L"Abbe \ 75003 Pariz \ Francuska

Zastupnik:

MEDIS INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo

Ahmata Muratbegovića br. 2 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 559 381 \ Faks: - \ e-pošta: emir.fazlic@medis.com

UTROGESTAN

LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T.

Via Cavour 70 \ Mede \ Italija

Zastupnik:

Hercegovinalijek d.o.o. Mostar

Muje Pašića 4 \ Mostar \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 387 36 501 511, 508 \ Faks: +387 36 501 501 \ e-pošta: lamija.nistovic@hercegovinalijek.ba

AKINETON

KALINOR

LABORATORIO REIG JOF RE S.A.

Gran Capitan 10, 08970 Sant Joan Despi, Barselona \ Barselona \ Španija

Zastupnik:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.herici@rhei.life

METASPON

LABORATÓRIOS ATRAL, S.A.

Rua da Estação, n.ºs 1 e 1A, 2600 726 \ Castanheira do Ribatejo-Lisabon \ Portugal

Zastupnik:

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885, \ e-pošta: merima.fatusic@unifarm.ba

NEOCEF

LABORATORIOS BASI-INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.

Parque Industrial Manuel Lourenco Ferreira, lote 15, 3450-232 Mortagua \ Portugal

Zastupnik:

Pharmavision BH d.o.o.

Mladena Stojanovića 4 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: - \ Faks: +387 51 378 111 \ e-pošta: regaffairsba@phavis.com

ENTIX

Salvus BH d.o.o.

Tešanjaska 24 a \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 260 820 \ Faks: +387 33 260 821 \ e-pošta: eila.karovic@salvushealth.com

LOKOSOL, gel, 10 mg / g

LABORATORIOS CINFA S.A.

Poligono Areta 10 \ 31620 Navarra \ Španija

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

FLEVENOL

LABORATORIOS FARMALAN S.A.

Calle La vallina s/n, Erdifacio 2, Poligono Industrial Navatejera, Villaquilambre \ Leon \ Španija

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

VASTALOMA

LABORATORIOS LEON FARMA S.A.

La Vallina s/n. Poligono Industrial Navatejera, Villaquilambre \ Leon \ Španija

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

DUTAPROST Combo

DUTAPROST

LABORATORIOS LICONSA S.A.

Alcala de Henares, Calle Dulcinea \ Madrid \ Španija

Zastupnik:

ALVEAD PHARM d.o.o., Sarajevo

Tešanjaska 24a \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: - \ Faks: - \ e-pošta: office @alveadpharm.com

ABIREX

PROTON SYSTEM d.o.o. Banja Luka

Stepe Stepanovića br. 183, Banja Luka \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 623

Proizvođači i njihovi zastupnici

Telefon: + 38765 328-450 \ Faks: - \ e-pošta: emina.ibric@proton.ba

RABEZOL

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

TIALERA

LABORATORIOS NORMON S.A.

Ronda de Valdecarrizo 6, 28760, Tres Cantos \ Madrid \ Španija

Zastupnik:

AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo

Igmanska 38, Vogošća \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 580 739; +387 33 580 736 \ Faks: +387 33 580 740 \ e-pošta: amar@amsal.ba

LARTEXA

FARMALOGIST ALLBIX d.o.o. Bijeljina

Stefana Dečanskog 258 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 416 070 \ Faks: +387 55 416 075 \ e-pošta: danijela.vjestica@farmalogistallbix.ba

EsoNor

Tigeciklin NORMON

PANTONOR

Krajinagroup d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 926 760 \ Faks: +387 51 926 761 \ e-pošta: bogdan.sikic@krajinagroup.com

DENTASTAZIN

MEDIMPEX d.o.o.

Igmanska 38 \ Vogošća \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 476 444 \ Faks: +387 33 476 401 \ e-pošta: dijala@medimpex.ba

METILPREDNIZOLON NORMON

LABORATORIOS SALVAT, S.A.

C/Gall 30-36, Esplugues de Llobregat, 08950 Barcelona \ \ Španija

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta: medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

CETRAXAL PLUS

CETRAXAL

LABORATORIOS SERRA PAMIES S.A.

Ctra. Castellvell, 24, Tarragona \ Reus \ Španija

Zastupnik:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karadorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.heric@rhei.life

MIDAZOLAM Serra Clinic

LABORMED-PHARMA S.A.

Bd. Theodor Pallady nr. 44B, sector 3 \ Bukurešt \ Rumunija

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

INDAPAMID LABORMED

TIOLIZEN

LABORMED-PHARMA S.A.

Sector 3, B-dul Theodor Pallady, Nr. 44 B \ Bukurešt \ Rumunija

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

KATHESIN
OREBRITON

TRIMETACOR MR
VINORELBIN LABORMED

LES LABORATOIRES SERVIER

50, rue Carnot \ 92284 Suresnes Cedex \ Francuska

Zastupnik:

Hercegovinalijek d.o.o. Mostar

Muje Pašića 4 \ Mostar \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 387 36 501 511, 508 \ Faks: +387 36 501 501 \ e-pošta: lamija.nistovic@hercegovinalijek.ba

COSYREL
DETRALEX
LIPERTANCE
LONSURF
NORPREXANIL 10 mg/10 mg tableta
NORPREXANIL 10 mg/5 mg tableta
NORPREXANIL 5 mg/10 mg tableta

NORPREXANIL 5 mg/5 mg tableta
PREDUCTAL MR
PREDUCTAL
PREXANIL A
PREXANIL COMBI A 10 mg/2,5 mg
PREXANIL COMBI A 5 mg/1,25 mg
TRIPLIXAM

LG CHEM LTD

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Koreja \ Seoul \ Južna Koreja

Zastupnik:

Proizvođači i njihovi zastupnici

PHARMA - MAAC d.o.o. Sarajevo

Bačići 7 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 77 04 80 \ Faks: +387 33 770 499 \ e-pošta: office@pharmamaac.com

EUVAX B

LIQVOR CJSC

7/9 Kochinyan St, 0089 Yerevan \ Yerevan \ Armenija

Zastupnik:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.herici@rhei.life

SODIUM BICARBONATE LIQVOR

LISAPHARMA SpA

Via Licinio 11 \ Erba \ Italija

Zastupnik:

SanMed d.o.o. Banja Luka

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 175a, PR-7 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 051366791, kontakt telefon 065 269 050 \ Faks: 051366780 \ e-pošta: office@sanmed.ba

ACURMIL

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG

Lohmannstraße 2, 56626 Andernach \ \ Njemačka

Zastupnik:

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885, \ e-pošta: merima.fatusic@unifarm.ba

NICORETTE INVISIPATCH

LUSOMEDICAMENTA-SOCIEDADE TECNICA FARMACEUTICA S.A.

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B-Queluz de Baixo \ 2730- 055 Barcarena \ Portugal

Zastupnik:

EWOPHARMA d.o.o. Sarajevo

Rajlovačka cesta 23 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 592 140 \ Faks: +387 33 592 145 \ e-pošta: info@ewopharma.ba

ISOPRINOSINE

MAKPHARM d.o.o.

Trnjanska cesta 37/1 \ Zagreb \ Hrvatska

Zastupnik:

Makpharm d.o.o.

Rajlovačka cesta 23, 71000 Sarajevo, BiH \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

626 Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2026

Telefon: +387 33 568 388 \ Faks: +387 33 568 389 \ e-pošta: romana.mandic@makpharm.ba, vigilance@makpharm.ba

FEZEA

MANUFACTURING PACKAGING FARMACA (MPF) B.V.

Neptunus 12 \ 8448CN Heereveen \ Nizozemska

Zastupnik:

EWOPHARMA d.o.o. Sarajevo

Rajlovačka cesta 23 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 592 140 \ Faks: +387 33 592 145 \ e-pošta: info@ewopharma.ba

CEJEMLY

McNeil AB

Norrbroplatsen 2 \ SE-251 09 Helsingborg \ Švedska

Zastupnik:

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885, \ e-pošta: merima.fatusic@unifarm.ba

Nicorette Freshmint

NICORETTE

MEDICAIR BIOSCIENCE LABORATORIES S.A.

10 Larisis Street, \ 15351 Pallini \ Grčka

Zastupnik:

ICM d.o.o. Bijeljina

Donja Ljeljenča 045 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 227 055 \ Faks: +387 55 227 055 \ e-pošta: icmdoo@gmail.com

VIOPLEX-T

MEDIS d.o.o. Ljubljana

Brnčičeva ulica 1, 1231 Ljubljana -Črnuče \ Slovenija

Zastupnik:

MEDIS INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo

Ahmeta Muratbegovića br. 2 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 559 381 \ Faks: - \ e-pošta: emir.fazlic@medis.com

ROSACTA

MEDOCHEMIE LTD

Constantinoupoleos 1-10 \ Limasol \ Kipar

Zastupnik:

FARMALOGIST ALLBIX d.o.o. Bijeljina

Stefana Dečanskog 258 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 416 070 \ Faks: +387 55 416 075 \ e-pošta: daniijela.vjestica@farmalogistallbix.ba

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 627

ARCHIFAR

PROTON SYSTEM d.o.o. Banja Luka

Stepe Stepanovića br. 183 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: + 38765 328-450 \ Faks: - \ e-pošta: emina.ibric@proton.ba

ABEMOT

MENARINI SAGLIK VE ILAC SANAYII TIC. A.S.

Maslak Mah. Sumer Sok. No: 4 Maslak Office Building (MOB) Kat: 7-8 Maslak, Saryier \ Istanbul \ Turska

Zastupnik:

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885 \ e-pošta: merima.fatusic@unifarm.ba

IESPOR

MAXIPENEM

MERCK HEALTHCARE KGaA

Frankfurter Strasse 250 \ 64293 Darmstadt \ Njemačka

Zastupnik:

GLOSARIJ CD D.O.O. SARAJEVO

Rajlovačka 14 b \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: - \ Faks: - \ e-pošta: info@glosarijcd.ba

BAVENCIO

CETROTIDE

CONCOR COR

CONCOR

CRINONE

ERBITUX

EUTHYROX

GLUCOPHAGE XR

GLUCOPHAGE

GONAL-F 150

GONAL-f

LUVERIS

MAVENCLAD

OVITRELLE

PERGOVERIS

REBIF

SAIZEN

MERCK SHARP & DOHME BV

Waarderweg 39 \ 2031 BN Haarlem \ Nizozemska

Zastupnik:

Merck Sharp & Dohme BH d.o.o.

Tešanjaska 24a \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 592 125 \ Faks: +387 33 592 126 \ e-pošta: nina.kale@msd.com

DELSTRIGO

GARDASIL 9

GARDASIL

ISENTRESS

JANUVIA

KEYTRUDA

M-M-RVAXPRO

PIFELTRO

PNEUMOVAX 23

RECARBRIO

ROTATEQ

VARIVAX

VAXNEUVANCE

WINREVAIR

ZERBAXA

MERUS LABS LUXCO II S.a.R.L.

208, Val des Bons Malades \ Luxembourg \ Luksemburg

Zastupnik:

Evropa Lijek Pharma d.o.o.

Vlakovo 252 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 77 43 00 \ Faks: +387 33 77 43 01 \ e-pošta: naida.bilalagic-pihura@elpharma.ba, amar.ramovic@elpharma.ba

SINTROM

MERZ PHARMA AUSTRIA GmbH

Guglgasse 17 \ Beč \ Austrija

Zastupnik:

MEDIS INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo

Ahmeta Muratbegovića br. 2 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 559 381 \ Faks: - \ e-pošta: emir.fazlic@medis.com

HÄDENSA

MERZ PHARMACEUTICALS GmbH

Eckenheimer Landstrasse 100 \ 60318 Frankfurt/Main \ Njemačka

Zastupnik:

MEDIS INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo

Ahmeta Muratbegovića br. 2 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 559 381 \ Faks: - \ e-pošta: emir.fazlic@medis.com

BOCOUTURE

Salveo d.o.o.

Valtera Perića 22 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 033552905 \ Faks: 033552906 \ e-pošta: office-bih@salveo-pharma.com, l.nedzibovic@salveo-pharma.com

CONTRACTUBEX

MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD

Banjički put 62, 11090 Beograd-Rakovica \ \ Srbija

Zastupnik:

Messer Tehnoplín d.o.o

Rajlovačka b.b \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 953 106, 33 953 100 \ Faks: +387 33 953 129 \ e-pošta: vildana.mesanovic@messergroup.com

AZOT SUBOKSID Messer

Proizvođači i njihovi zastupnici

MESSER TEHNOPLIN d.o.o.

Rajlovačka bb. \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Zastupnik:

Messer Tehnoplín d.o.o

Rajlovačka b.b \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 953 106, 33 953 100 \ Faks: +387 33 953 129 \ e-pošta:

vildana.mesanovic@messergroup.com

MEDICINSKI KISIK Messer

MEDICINSKI KISIK Messer

MSN LABS Europe Limited

KW20A, Corradino Park \ Paola, PLA 3000 \ Malta

Zastupnik:

PharmaS d.o.o. Sarajevo

Maršala Tita 2, 71 000 Sarajevo \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 765 400 \ Faks: +387 33 765 401 \ e-pošta:

jasminka.mijatovic@pharmas.ba

SUGAMMADEX MSN

ACTINE

AXEBAN

BOSUTINIB MSN

CABAZITAXEL MSN

DIMETILFUMARAT MSN

ELTROMBOPAG MSN

FINGOLIMOD MSN

FIRSSAMO

PIRFENIDON MSN

POSAKONAZOL MSN

SUNITINIB MSN

THALADEF

MUNDIPHARMA DC B.V.

Leusderend 16, 3832 RC Leusden \ \ Nizozemska

Zastupnik:

MEDIS INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo

Ahmeta Muratbegovića br. 2 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 559 381 \ Faks: - \ e-pošta: emir.fazlic@medis.com

FLUTIFORM

MYLAN GERMANY GmbH

Lütticher Strasse 5 \ Troisdorf \ Njemačka

Zastupnik:

Viatrix BH d.o.o.

Kolodvorska broj 12/3 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 033 725 932 \ Faks: +387 33 725 931 \ e-pošta: jasna.moralic@viatrix.com

AZACITIDIN Mylan

BUPRENORFIN / NALOKSON MYLAN

DABIGATRAN Mylan

EVEROLIMUS MYLAN

VANCOMYCIN MYLAN

MYLAN GERMANY GmbH

Benzstrasse 1, Bad Homburg, Hesse, 61352 \ \ Njemačka

Zastupnik:

Viatrix BH d.o.o.

Kolodvorska broj 12/3 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

630 Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2026

Telefon: 033 725 932 \ Faks: +387 33 725 931 \ e-pošta: jasna.moralic@viatris.com

PRASUGREL Mylan

N.V. ORGANON

Kloosterstraat 6, 5349 AB \ Oss \ Nizozemska

Zastupnik:

Organon BH d.o.o.

Tešanjaska 24 a \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: - \ Faks: - \ e-pošta: sejla.catovic-jasarevic@organon.com

ARCOXIA

DIPROGENTA

ELOCOM

FOSAMAX T

LIPEX

SINGULAIR junior

SINGULAIR mini

SINGULAIR

TRIDERM

NANO FANAVARAN DAROUEI ALVAND (NanoAlvand)

No.1462, Pharmaceutical Incubation Center, Avicenna Tech.Park of Tehran University of Medical Sciences \ Tehran \ Iran

Zastupnik:

3 STARS PHARMA D.o.o.. Bijeljina

1 maja \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 689 970, +387 66 706 638 \ Faks: - \ e-pošta: dragana.jeremic@3starspharma.com

CARBONATIN

NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH

Andrzej Soltan 7, \ Poljska \ Poljska

Zastupnik:

INEL d.o.o

Polog bb \ Mostar \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 36487 502 \ Faks: +387 36 487 346 \ e-pošta: marija@inel-mostar.ba

IodoPol

POLTECHNET

NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg

Gornji Mamići bb, Kočerin \ Široki Brijeg \ Bosna i Hercegovina

Zastupnik:

Natura Pharm d.o.o. Široki Brijeg

Gornji Mamići bb, Kočerin \ Široki Brijeg \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 39 852 -115/116,117 \ Faks: +387 39 852 114 \ e-pošta: blago.kvesic@natura-pharma.ba

ALPINOL PLUS

ALPINOL

ALZAM

CILOSTA

DENZIL

KALIJEV KLORID NATURA PHARM

KARBOCISTEIN NATURA PHARM

KLOPIDEX

Proizvođači i njihovi zastupnici

KOLESTAN
MOTRIX
NATFORMIN
PHARMADON
PHARMAFLU

PRESONAT
ROSUPRIL
SARGIN
SOMNIS
TENSIS

NEURAXPHARM PHARMACEUTICALS S.L.

Avinguda de Barcelona, 69, 08790 Sant Joan Despi (Barcelona) \ 08790 Sant Joan Despi (Barcelona) \ Španija

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta: medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

NOZINAN

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:14 Ümraniye \ 34768 İstanbul \ Turska

Zastupnik:

NOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo

Hasiba Brankovića 9 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 770 633 \ Faks: +387 33 770 644 \ e-pošta: registracija@nobel.com.ba; Aida.Djerzic@nobel.com.ba

ANTAX
CO-IRDA
DAPALIF
DUXET
ESOM I.V.
ESRAM
ETOL SR
EXABEL
IRDA
LINATIN Met
LINATIN Met
LINATIN
LIPOFEN SR
Masipah
MELOX fort
MELOX

MEXIA
MISOL
MIVUX
MYCOCUR
PARLIN
PRATIN
PULCET
SEFPOTEC
SINEGRA
TISINON
TIYOZID, tableta, 8 mg
TIYOZID
TRAKTUS
TYLOL HOT C
VESIFIX

NOBEL İLAC SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Buyukdeniz Cad No 14 \ Umraniye, Istanbul \ Turska

Zastupnik:

NOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo

Hasiba Brankovića 9 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 770 633 \ Faks: +387 33 770 644 \ e-pošta: registracija@nobel.com.ba; Aida.Djerzic@nobel.com.ba

ABIZOL
AKSEF

ANZIBEL pastile sa okusom meda i limuna

ANZIBEL pastile sa okusom mentola
AZAX
CO-IRDA
DEKSALGIN
Eksaban
ERTINOB
ETOL FORT
Geltro
HERNOVIR
KONVERIL plus
KONVERIL
LANSOPROL
LEBEL
LORDES
MELOX
MYCOCUR
NEXETIN
NITINAB
OLFREX
OMEPRAZID

PAGAMAX
PAXIBAN
PULCET
RANOBEL
RETOMIN
SIPROBEL
SITABEL MET
SITABEL
SUNUBIS
TEOKAP SR
TICASA
TIZOLES
TYLOL COLD SYRUP
TYLOL HOT D
TYLOL HOT LIQUID DAY
TYLOL HOT Pediatric
TYLOL HOT
TYLOLFEN HOT
VIRENTE

NORGINE B.V.

Antonio Vivaldistraat 150 \ 1083 HP Amsterdam \ Nizozemska

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta:
medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

MOVIPREP

PLENVU

NOUCOR HEALTH, S.A.

Avinguda Cami Reial,51-57,8184 Palau-solita i Plegamans \ Barselona \ Španija

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta:
amela.dervisevic@zentiva.com

DILVAS

RUPAFIN

NOVARTIS PHARMA Services AG

Lichtstrasse 35 \ Bazel \ Švajcarska

Zastupnik:

Novartis BA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 56 32 71 \ Faks: +387 33 22 69 88 \ e-pošta:
amra.hadziabdic_deljkovic@novartis.com

ATECTURA Breezhaler

AZARGA

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 633

Proizvođači i njihovi zastupnici

AZOPT	REVOLADE
BEOVU	SANDIMMUN NEORAL
CO-DIOVAN	SANDOSTATIN LAR
COSENTYX	SANDOSTATIN
DIOVAN	SCEMBLIX
DUOTRAV	SEEBRI BREEZHALER
ENERZAIR BREEZHALER	SIMBRINZA
EUCREAS	SPEXOTRAS
EXELON	TAFINLAR
FEMARA	TASIGNA
GALVUS	TEGRETOL CR
JAKAVI	TEGRETOL
KESIMPTA	TOBRADEX
KISQALI	TOBREX
LAMISIL	TRAVATAN
LEQVIO	TRILEPTAL
LUCENTIS	Ultibro Breezhaler
MAXIDEX	UPERIO
MAXITROL	VIGAMOX
MAYZENT	VOLTAREN forte
MEKINIST	VOLTAREN rapid
MYFORTIC	VOLTAREN retard
NEVANAC	VOLTAREN
ONBREZ Breezhaler	VOTRIENT
OPATANOL	XOLAIR
PIQRAY	

NOVO NORDISK A/S

Novo Alle 1 \ Bagsvaerd \ Danska

Zastupnik:

Novo Nordisk Pharma d.o.o.

Trg Solidarnosti broj 2 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 821 930 \ Faks: +387 33 821 931 \ e-pošta: nqzk@novonordisk.com

Actrapid FlexPen	NovoSeven
ESPEROCT	OZEMPIC
FIASP FlexTouch	REFIXIA
GLUCAGEN HYPOKIT	RYBELSUS
INSULATARD FlexPen	RYBELSUS
LEVEMIR	RYBELSUS
Mixtard 30 FlexPen	RYZODEG
NovoEight	TRESIBA
NOVOMIX 30 FLEXPEN	VICTOZA
NOVORAPID FLEXPEN	XULTOPHY

OCTAPHARMA AG

Seidenstrasse 2 \ Lachen \ Švajcarska

Zastupnik:

Remedia d.o.o. Sarajevo

Kranjčevićeva 37 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 033558451 \ Faks: 033558452 \ e-pošta: erduan.jazic@remedia.ba

ALBUNORM 20%
ALBUNORM 5%
CUTAQUIG
FIBRYGA
NUWIQ
OCTAGAM

OCTANATE LV
OCTANATE
OCTANINE F
OCTAPLEX 500 IU
WILATE

ORIFARM GENERICS A/S

Energivej 15, 5260 Odense S, Danska \ Energivej 15, 5260 Odense S, Danska \ Danska

Zastupnik:

PROTON SYSTEM d.o.o. Banja Luka

Stepe Stepanovića br. 183, Banja Luka \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: + 38765 328-450 \ Faks: - \ e-pošta: emina.ibric@proton.ba

FAKTU

PANACEA BIOTEC PHARMA LIMITED

B-1 Ext./A-27, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi - 110 044
\ \ Indija

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta:
medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

NIMULID MD
NIMULID Transgel

NIMULID

PANPHARMA S.A.

Z.I.du Clairay \ Luitre \ Francuska

Zastupnik:

SanMed d.o.o. Banja Luka

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 175a, PR-7 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 051366791, kontakt telefon 065 269 050 \ Faks: 051366780 \ e-pošta:
office@sanmed.ba

DOBUTAMINE PANPHARMA
FENTANYL PANPHARMA
HEPARIN Natrijum Panpharma
IMIPENEM CILASTATINE
PANPHARMA
MEROPENEM Panpharma

MIDAZOLAM Panpharma
PANCURONIUM Panpharma
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM
PANPHARMA
THIOPENTAL PANPHARMA

PFIZER Inc.

235 East 42 Street \ New York \ Sjedinjene Američke Države

Zastupnik:

PFIZER BH d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Proizvođači i njihovi zastupnici

Telefon: +387 33 296 201 \ Faks: +387 33 296 200 \ e-pošta:
andrea.marjanovic@pfizer.com

GENOTROPIN

XELJANZ

PFIZER INC.

66 Hudson Boulevard East \ New York, NY 10001-2192 \ Sjedinjene Američke Države

Zastupnik:

PFIZER BH d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 296 201 \ Faks: +387 33 296 200 \ e-pošta:
andrea.marjanovic@pfizer.com

AROMASIN

BeneFIX

BOSULIF

CARBOPLATIN Pfizer

CIBINQO

CORTEF

CRESEMBA

DEPO MEDROL

ELIQUIS

ELREXFIO

ENBREL

FRAGMIN

IBRANCE

INLYTA

LINCOCIN

LORVIQUA

MEDROL

METHOTREXATE Pfizer

NGENLA

NIMENRIX

NYVEPRIA

PAXLOVID

PREPIDIL

PREVENAR 20

ReFacto AF

RUXIENCE

SALAZOPYRIN EN

SUTENT

TRAZIMERA

TYGACIL

VFEND

VYDURA

VYNDAQEL meka kapsula

XALKORI

XELJANZ

ZAVICEFTA

ZIRABEV

PFIZER LUXEMBOURG SARL

51 Avenue J.F. Kennedy. L-1855 \ Luxembourg \ Luksemburg

Zastupnik:

PFIZER BH d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 296 201 \ Faks: +387 33 296 200 \ e-pošta:
andrea.marjanovic@pfizer.com

DALACIN C

DIFLUCAN

PHARMACARE PREMIUM LTD.

HHF 003, Hal Far Industrial Estate \ Birzebbugia, BBG 3000 \ Malta

Zastupnik:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.herici@rhei.life

LIBURADONE

TERIMIDANE

VEROBICINE

636 Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2026

Viennapharm d.o.o.

Jezero 3 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 553 165 \ Faks: +387 33 553 167 \ e-pošta: office@viennapharm.com

FRONTIENT

PHARMADA ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Inonu Mah. Kayisdagi Cad. Dem Plaza B Blok N.172 Giris, Atasehir \ Istanbul \ Turska

Zastupnik:

LICENTIS DOO Sarajevo

Garovci bb, Hadžići \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 428 445/480 \ Faks: +387 33 428 481 \ e-pošta: mia@licentis.ba

ATRASYL
CEFRIDEM
DEMROSE

GRATRYL
MIDOLAM
VAMYCIN

PHARMAMED d.o.o. Travnik

Dolac na Lašvi, b.b. \ Travnik \ Bosna i Hercegovina

Zastupnik:

PHARMAMED d.o.o. Travnik

Dolac na Lašvi bb \ Travnik \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 30 515 005 / 006 \ Faks: +387 30 515 007 \ e-pošta: qc@pharmamed.ba

HERBIFIT HEDERIN sirup

IbuDIRECT

PHARMANOVA d.o.o.

Industrijska 8 \ Obrenovac \ Srbija

Zastupnik:

Evropa Lijek Pharma d.o.o.

Vlakovo 252 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 77 43 00 \ Faks: +387 33 77 43 01 \ e-pošta: naida.bilalagic-pihura@elpharma.ba, amar.ramovic@elpharma.ba

AVARICON

PHARMAS D.O.O.

Radnička cesta 47, Zagreb \ \ Hrvatska

Zastupnik:

PharmaS d.o.o. Sarajevo

Maršala Tita 2, 71 000 Sarajevo \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 765 400 \ Faks: +387 33 765 401 \ e-pošta: jasminka.mijatovic@pharmas.ba

BLOCETTA

PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED

Lampousas 1 \ 1095 Nicosia \ Kipar

Zastupnik:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 637

Proizvođači i njihovi zastupnici

Evropa Lijek Pharma d.o.o.

Vlakovo 252 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 77 43 00 \ Faks: +387 33 77 43 01 \ e-pošta: naida.bilalagic-pihura@elpharma.ba, amar.ramovic@elpharma.ba

ABIRATERONE PHARMASCIENCE
BOSENTAN PHARMASCIENCE
NILOTINIB PHARMASCIENCE

PAZOPANIB PHARMASCIENCE
SUNITINIB PHARMASCIENCE
TERIFLUNOMIDE PHARMASCIENCE

PHARMASWISS d.o.o.

Batajnički drum 5 A \ Beograd \ Srbija

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta: medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

DICLOFENAC PHARMASWISS
DICLO Rapid
MONOPRIL PLUS

MONOPRIL
RAPIDOL S

PHARMATHEN S.A.

Dervenakion 6 \ 15351 Pallini, Attiki \ Grčka

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

ALVODRONIC
ALVOLAMID T

BRINZUNO
VORAMOL

PHARMAVISION EUROPE LTD.

Alexander Makedonski 4. \ 1612 Sofija \ Bugarska

Zastupnik:

Pharmavision BH d.o.o.

Mladena Stojanovića 4 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: - \ Faks: +387 51 378 111 \ e-pošta: regaffairsba@phavis.com

BRINZOVIS
DORZOVIS COMBO
MOXIVISION

TOBRAVIS COMBO
TRAVOVIS

PHARMIDEA SIA

Ulica 4 Rupnicu, Olaine, Olaine okrug, LV-2114, Letonija \ \ Latvija

Zastupnik:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 331 650 \ Faks: +387 51 331 623 \ e-pošta: infoBL@hemofarm.com

DEKSMEDETOMIDIN PHARMIDEA

638 Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2026

PHAROS MT LTD.

HF 62X ,Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia \ Birzebbugia BBG \ Malta

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta:

amela.dervisevic@zentiva.com

NILOTINIB ZENTIVA

PAZOPANIB ZENTIVA

NILOTINIB ZENTIVA

PHYTOPHARM KLEKA S.A.

Kleka 1, 63-040 Nowe Miasto \ Nad Warta \ Poljska

Zastupnik:

Alpen Pharma d.o.o.

Husrefa Redžića 9 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 374 325 \ Faks: - \ e-pošta: vanja.arifovic@alpenpharma.com

PELARIA

PIERREL S.P.A.

Strada Statale Appia, 7 Bis 46/48 - 81043 Capua (CE) \ \ Italija

Zastupnik:

PTD `MGM FARM` d.o.o.

311. Lahke brigade 97 \ Kakanj \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 32 771 770/778 \ Faks: +387 32 771 777, +387 32 771 789 \ e-pošta:

azra.pacariz.@mgmfarm.ba

ORABLOC

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25 \ 10000 Zagreb \ Hrvatska

Zastupnik:

PLIVA d.o.o.Sarajevo

Trg heroja br.10 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 723 544 \ Faks: +387 33 653 986 \ e-pošta: selma.suljovic@pliva.ba

ANDOL 100

ANDOL C

ANDOL GR 100

ANDOL GR 75

ANDOL

ATREMIA

AVIOMARIN

AVOMIT

BAZETHAM

BETRION

BIKALUTAMID Pliva 50 mg

BISOLEX F

BISOLEX

BORTEZOMIB PLIVA

DEFERASIROKS PLIVA

DINAMICO

DOXORUBICIN Pliva 2 mg/ml

DUSTER

ENAZIL 10 mg

ENAZIL 20 mg

ENAZIL 5 mg

FLUDARABIN Pliva

FULVESTRANT PLIVA

GASTAL

Proizvođači i njihovi zastupnici

GEONISTIN	PLIVATINIB
GLUFORMIN 1000 mg	PLIVIT D3
GLUFORMIN 850 mg	PRAXITEN 15
KALCIJEV FOLINAT Pliva 10 mg/ml	PRAZINE
KLAVOCIN BID	PRILEN Plus
MAXFLU	PRILEN
MEMANTIN Pliva	QVAR AUTOHALER
MONOPIN	SUMAMED 1200
MOSTRAFIN	SUMAMED FORTE
OLANDIX	SUMAMED
OPTIMON HCT	SUNITINIB PLIVA
OPTIMON	SYNOPEN
OXALIPLATIN Pliva 5 mg/ml	TONOCARDIN
Paclitaxel Pliva 6 mg/ml	TRIXIN
PLIBEX	VELAFAX XL
PLICET Rapid	VELAFAX
PLIMYCOL	VILPIN
PLIMYCOL	ZIPANTOLA PROTECT
PLIVADON	ZIPANTOLA

Pontus Pharma d.o.o.Sarajevo

Milana Preloga 12A \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 870 077 \ Faks: +387 33 870 062 \ e-pošta: dalila.imsirpasic@pontus-pharma.com

HEPTANON

POLFARMEX S.A.

Jozefow 9 \ Kutno \ Poljska

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta: medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

MEGOXI

POLICHEM S.A.

Val Fleuri 50 \ Luxembourg \ Luksemburg

Zastupnik:

Remedia d.o.o. Sarajevo

Kranjčevićeva 37 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 033558451 \ Faks: 033558452 \ e-pošta: erduan.jazic@remedia.ba

MACMIROR COMPLEX

POLIFARMA ILAC SAN ve TIC.A.S.

Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Yolu No:9, Halkali \ Istanbul \ Turska

Zastupnik:

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885, \ e-pošta: merima.fatusic@unifarm.ba

Natrij hlorid POLIFLEKS 0,9% rastvor
za infuziju
PARACEROL
POLGYL

TEIKOPOL
TYGEPOL
ZYGOSIS

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "Pharmaceutical Firm Darnytsia"

13 Boryspilska Street \ Kyiv \ Ukrajina

Zastupnik:

DOO Farmacija 2011 Bihać

Zagrebačka 2 \ Bihać \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 37 971 100 \ Faks: +387 37 971 106 \ e-pošta: info@farmacija 2011.ba, mediha@farmacija2011.ba

FLUCONAZOLE-Darnytsia
FUROSEMIDE-Darnytsia
Metronidazole-Darnytsia

MOXIFLOXACIN-DARNYTSIA
PROZERIN

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ON THE PRODUCTION OF INSULIN „INDAR"

5, Zroshuvalna Str., Kyiv 02099 \ \ Ukrajina

Zastupnik:

DOO Farmacija 2011 Bihać

Zagrebačka 2 \ Bihać \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 37 971 100 \ Faks: +387 37 971 106 \ e-pošta: info@farmacija 2011.ba, mediha@farmacija2011.ba

HEPARIN-Indar

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčska 377/1 Michle \ 140 00 Praha 4 \ Češka Republika

Zastupnik:

PRO.MED. BH d.o.o.

Višnjik br. 24 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: linija za pozive +387 33 22 24 23 \ Faks: +387 33 22 24 24 \ e-pošta: info@promed.ba, azra.fajic@promedcs.com

AMBROSAN
CIFLOXINAL
FANISAN FORTE
FANISAN
INDAP

ITOMED
MONOSAN
URSONORM
URSOSAN
YLPIO

QILU PHARMA Spain SL

Paseo de la Castellana,40-8a \ 28 046, Madrid \ Španija

Zastupnik:

Proizvođači i njihovi zastupnici

FARMALOGIST ALLBIX d.o.o. Bijeljina

Stefana Dečanskog 258 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 416 070 \ Faks: +387 55 416 075 \ e-pošta: danijela.vjestica@farmalogistallbix.ba

CEFAZOLIN QILU
CEFEPIM QILU
CEFTRIAKSON Qilu

IRINOTEKAN QILU
OKSALIPLATIN QILU

QUALIX PHARMA S.L.

c/Botanica 137, L Hospitalet de Llobregat, Barselona 08908 \ \ Španija

Zastupnik:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 331 650 \ Faks: +387 51 331 623 \ e-pošta: infoBL@hemofarm.com

ACEDOL

RAFARM S.A.

12 Korinthou Str., 15451 Neo Psihico \ Atena \ Grčka

Zastupnik:

Proton med d.o.o. Banja Luka

Sime Šolaje 1A \ 78000 Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: - \ Faks: - \ e-pošta: regulatory@protonmed.ba, a.celjo@protonmed.ba

REXTOL

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED

103-105 Bath Road \ Slough, Berkshire SL 1 3 UH \ Velika Britanija

Zastupnik:

Ataco d.o.o. Mostar

Kralja Tomislava L4 \ Mostar \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 394 191 \ Faks: +387 51 394 202 \ e-pošta: natasa.atlagic@ataco-bih.com

NUROFEN za djecu jagoda
STREPSILS Cool
STREPSILS limun bez šećera
STREPSILS med i limun

STREPSILS mentol i eukaliptus
STREPSILS narandža sa vitaminom C
STREPSILS plus

RECORDATI Industria Chimica & Farmaceutica S.p.A.

Via Civitali 1. \ Milano \ Italija

Zastupnik:

Clinres Farmacija d.o.o.

Alipašina 29 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 61 215 514 \ Faks: +387 33 922 410 \ e-pošta: lejla.spahic@clinres-farmacija.com

ELIGARD

LOMEXIN

REMEDICA LIMITED

Aharon Street, Limassol Industrial Estate, 3056 \ Limassol \ Kipar

Zastupnik:

FARMALOGIST ALLBIX d.o.o. Bijeljina

Stefana Dečanskog 258 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 416 070 \ Faks: +387 55 416 075 \ e-pošta:

danjela.vjestica@farmalogistallbix.ba

AMOXICILLIN REMEDICA

AREMED

ATENOLOL REMEDICA

CARBAMAZEPINE REMEDICA

RETARD

CEFALEXIN REMEDICA

CHLORPROMAZINE Remedica

CLOZAPINE REMEDICA

DOXYCYCLINE REMEDICA

Entevirem

ERITHROMYCIN REMEDICA

EXATRON

EXEDRAL

FUROSEMIDE REMEDICA

IBUPROFEN REMEDICA

IMUPRIN

KAPTOPRIL REMEDICA

KLONAZEPAM REMEDICA

METOTREKSAT REMEDICA

NIFEDIPINE-RETARD REMEDICA

PENOPEN

PREGABALIN REMEDICA

RASAGILINE Remedica

REMABIRAT

TAMOXIFEN REMEDICA

TENOFOVIR Remedica

REYOUNG PHARMACEUTICAL Co. Ltd.

No. 1, Ruiyang Road, Yiyuan Country, Shandong Province \ \ Kina

Zastupnik:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.herici@rhei.life

Cefazolin Reyoung

ROMPHARM COMPANY SRL

Eroilor 1A, Oras Otopeni, Judetul Ilfov 075100 \ \ Rumunija

Zastupnik:

Pharmavision BH d.o.o.

Mladena Stojanovića 4 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: - \ Faks: +387 51 378 111 \ e-pošta: regaffairsba@phavis.com

TOBRAVIS COMBO

TOBRAVIS

RONTIS HELLAS S.A.

\ 38 Sorou Str., Marousi, 15125 Atina \ Grčka

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta:

amela.dervisevic@zentiva.com

FITAXYL

ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A.

Julian Camarillo 35 \ 28037 Madrid \ Španija

Zastupnik:

Hercegovinalijek d.o.o. Mostar

Muje Pašića 4 \ Mostar \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 387 36 501 511, 508 \ Faks: +387 36 501 501 \ e-pošta: lamija.nistovic@hercegovinalijek.ba

CRUSIA 10000 IU (100 mg)/1 ml
rastvor za injekciju u napunjenoj šprici
CRUSIA 2000 IU (20 mg)/0,2 ml rastvor
za injekciju u napunjenoj šprici
CRUSIA 4000 IU (40 mg)/0,4 ml rastvor
za injekciju u napunjenoj šprici

CRUSIA 6000 IU (60 mg)/0,6 ml rastvor
za injekciju u napunjenoj šprici
CRUSIA 8000 IU (80 mg)/0,8 ml
rastvora za injekciju u napunjenoj šprici

ROWA PHARMACEUTICALS Ltd

Newtown, Bantry \ Co.Cork \ Irska

Zastupnik:

Medical Intertrade d.o.o. Sarajevo

Tvornička 3 \ 71210 Ilidža - Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 761 335 \ Faks: +387 33 761 336 \ e-pošta: komerciala@medical-intertrade.ba

ROWACHOL

ROWATINEX

RUĐER MEDICOL CIKLOTRON d.o.o.

Bijenička cesta 54 \ Zagreb \ Hrvatska

Zastupnik:

Medicom d.o.o. Bijeljina

Save Šumanovića 89 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 416 500, +387 55 416 600 \ Faks: +387 55 416 055 \ e-pošta: office@medicomb.net

FDG-RMC

S.A.L.F.-S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO

Via Marconi 2, 24069 \ Cenate Sotto (BG) \ Italija

Zastupnik:

DOO Farmacija 2011 Bihać

Zagrebačka 2 \ Bihać \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 37 971 100 \ Faks: +387 37 971 106 \ e-pošta: info@farmacija 2011.ba, medih@farmacija2011.ba

DOPAMINE S.A.L.F.
LIDOCAINE 2% S.A.L.F.

PARACETAMOL S.A.L.F.

S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L.

1A Eroilor Street, Otopeni Ilfov \ Rumunija

Zastupnik:

Pharmavision BH d.o.o.

644 Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2026

Mladena Stojanovića 4 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina
Telefon: - \ Faks: +387 51 378 111 \ e-pošta: regaffairsba@phavis.com

DIKLOVIS

S.C.Zentiva S.A.

B-dul. Theodor Pallady, nr. 50 sector 3, \ Bukurešt \ Rumunija

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

XANIRVA

SAKAR HEALTHCARE LTD

406, Silver Oaks Comm. Complex, Opp. Arun Society, Paldi \ Ahmedabad-380 007, Gujarat \ Indija

Zastupnik:

DOO Farmacija 2011 Bihać

Zagrebačka 2 \ Bihać \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 37 971 100 \ Faks: +387 37 971 106 \ e-pošta: info@farmacija 2011.ba, mediha@farmacija2011.ba

DOCEKAR-80

PENTOKAR

SAKLOVIR

VANKAR 1000

VANKAR 500

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D.

Veroškova 57 \ Ljubljana \ Slovenija

Zastupnik:

Sandoz d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 812 \ Faks: +387 33 295 813 \ e-pošta: aida.pavlovic@sandoz.com

TILOBRASTIL, 90 mg

ABATIXENT

ABIRATERON SANDOZ

ACIPAN

AirBuFo Forspiro

AirFluSal Forspiro

ALTUXERIN

ALTUXERIN

ALTUXERIN PLUS

ALTUXERIN

AMLOPIN 10 mg

AMLOPIN 5 mg

AMLOPIN COMBO

AMOKSIKLAV SANDOZ 2X

AMYZOL

ANASTRAZE

ANGAL S

ANGAL

BANEONIN

BIKALUTAMID SANDOZ

BINOCRIT

BIVACYN

BYOL

CEFPODOXIM SANDOZ

CISPLATIN Sandoz

CLOZAPIN SANDOZ

DICLAC 5%

DICYNONE

DIMTRUZIC

DOCETAXEL Sandoz

Proizvođači i njihovi zastupnici

DOXORUBICIN Sandoz	LEUPROSTIN 3,6 mg
EBETREXAT	LEUPROSTIN 5 mg
EDEMID FORTE	LINEX forte
EDEMID	LINEX
EDICIN	METHOTREXAT SANDOZ
ELANIX COMBO	MOMETAZON SANDOZ
ELANIX	NAKOM
ENALAPRIL HCT Sandoz	OMNITROPE
ENALAPRIL SANDOZ 10 mg	OSPEN K 1 MIU
ENALAPRIL SANDOZ 20 mg	OSPEN 750
EPIRUBICIN Sandoz	OSPEN K 1,5 MIU
ETOPOSID Sandoz	PACLITAXEL Sandoz
EXODERIL	Rabeprazol Sandoz
FERAPPLIC	RIXATHON
FERRUM SANDOZ 100 mg	RUNAPLAX
FLONIDAN	RUPILIP
FLUIMUKAN AKUT	SALBUAL
FLUIMUKAN PLUS	SANVAL
FLUIMUKAN za djecu	SORAFENIB SANDOZ
FULVESTRANT SANDOZ	SPASMEX forte
GEMCITABIN Sandoz	STINDAB
HYRIMOZ	TEREBYO
IVABRADIN SANDOZ	TILOBRASTIL, 90 mg
KETONAL DUO	TILOBRASTIL, 60 mg
KETONAL forte	TYRUKO
KETONAL SPRINT	XICLAV 1,2 g
KETONAL	XICLAV 2X
KLIMICIN	XICLAV
LEKADOL plus C	ZARZIO
LEKADOL	ZINNAT

SANECA PHARMACEUTICALS

Nitrianska 100 \ Hlohovec 920 27 \ Slovačka

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta:
amela.dervisevic@zentiva.com

APRIXA

SANOFI PASTEUR

14 Espace Henry Vallee \ 69007 Lion \ Francuska

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta:
medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

DULTAVAX

VAXIGRIP TETRA

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

82 Avenue Raspail \ Gentilly \ Francuska

Zastupnik:

AMICUS PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 257 810 \ Faks: +387 33 257 829 \ e-pošta:

medinfo.bih@swixxbiopharma.com, regulatory.bih@swixxbiopharma.com

ALDURAZYME

AMARYL

APIDRA SOLOSTAR

ARAVA

AUBAGIO

CEREZYME

CLEXANE

CORDARONE

DEPAKINE CHRONO 300

DEPAKINE CHRONO 500

DEPAKINE

DUOPLAVIN

FABRAZYME

HEXAXIM

IMOVAX DT ADULT

JEVTANA

LANTUS

LEMTRADA

MYOZYME

PENTAXIM

PLAVIX

PRALUENT

SULIQUA SoloStar

TAVANIC

TETAVAX

TETRAKIM

TOUJEO

TRITACE

TRITAZIDE

ZALTRAP

SANOFI-AVENTIS Groupe

54 rue La Boetie \ Pariz \ Francuska

Zastupnik:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 331 650 \ Faks: +387 51 331 623 \ e-pošta: infoBL@hemofarm.com

ALLEGRA

BISOLVON

BUSCOPAN

DULCOLAX

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş

Istinye Mahallesi Balabandere Caddesi No:14 \ Sariyer, Istanbul \ Turska

Zastupnik:

Delta Pharma d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Objekat A, 6. sprat \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +38733296210 \ Faks: +38733296211 \ e-pošta: alma.avdagic@deltapharma-ba.com

VENOMIA

SANTEN OY

Niittyhaankatu 20 \ Tampere \ Finska

Zastupnik:

MEDIS INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo

Ahmeta Muratbegovića br. 2 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Proizvođači i njihovi zastupnici

Telefon: +387 33 559 381 \ Faks: - \ e-pošta: emir.fazlic@medis.com

COSOPT
SAFLUTAN

TRUSOPT

**SCIENTIFIC INDUSTRIAL CENTRE `BORSHCHAHIVSKIY
CHEMICAL PHARMACEUTICAL PLANT` PUBLIC JOINT-STOCK
COMPANY**

Building 17 Myru Street \ 03134 Kijev \ Ukrajina

Zastupnik:

DOO Farmacija 2011 Bihać

Zagrebačka 2 \ Bihać \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 37 971 100 \ Faks: +387 37 971 106 \ e-pošta: info@farmacija 2011.ba,
mediha@farmacija2011.ba

ARYTMIL
CEBOPIM
CEFAZOLIN-BCPP
CEFTRIAZONE-BCPP

CEFUROXIME-BCPP
IMIBACID
MEROBOCID
ZACEF

SEID.S.A.

Carretera de Sabadell a Granollers, km 150018185 Llica \ Barselona \ Španija

Zastupnik:

FARMALOGIST ALLBIX d.o.o. Bijeljina

Stefana Dečanskog 258 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 416 070 \ Faks: +387 55 416 075 \ e-pošta:
danijela.vjestica@farmalogistallbix.ba

DARSTIN
OESTRACLIN

SEIDIGESTAN

SEJMET PHARMACEUTICALS SL

Camino Labiano 45 B, Multiva Alta \ Navarra \ Španija

Zastupnik:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 331 650 \ Faks: +387 51 331 623 \ e-pošta: infoBL@hemofarm.com

OROFAR AKUT

SHENZHEN TECHDOW PHARMACEUTICAL Co. Ltd.

No.1 Rongtian South, Kengzi Sub-district, Pingshan New District, 518122, Shenzhen \ \
Kina

Zastupnik:

Delta Pharma d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1, Objekat A, 6. sprat \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +38733296210 \ Faks: +38733296211 \ e-pošta: alma.avdagic@deltapharma-
ba.com

INHIXA

SHILPA MEDICARE LIMITED

Plot No s S-20 to S-26, Pharma SEZ, TSIIC, Green Industrial Park, Polepally (V),
Jadcherla (M), Maha \ Telangana 509 301 \ Indija

Zastupnik:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.herici@rhei.life

THALIDINE

SHULKE & MAYR GmbH

Seidengasse 9 \ Beč \ Austrija

Zastupnik:

OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo

Pijačna 14 A \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 777 277 \ Faks: 033777273 \ e-pošta: registracija@oktal-pharma.ba

OCTENISEPT

SKYMAP PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED

302, Narmada Block-5, Pocket D-6, Vasant Kunj, New Delhi, South West Delhi, DL,
110070, Indija \ New Delhi \ Indija

Zastupnik:

DOO Farmacija 2011 Bihać

Zagrebačka 2 \ Bihać \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 37 971 100 \ Faks: +387 37 971 106 \ e-pošta: info@farmacija 2011.ba,
mediha@farmacija2011.ba

PHARMCORTI

TRANEXSOL

SLAVIAMED D.O.O. BEOGRAD

Bulevar oslobođenja 97, Beograd-Voždovac \ Beograd \ Srbija

Zastupnik:

Pharmavision BH d.o.o.

Mladena Stojanovića 4 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: - \ Faks: +387 51 378 111 \ e-pošta: regaffairsba@phavis.com

DIUNORM

ROXIMISAN

KANAZOL

SUMATRIPTAN SLAVIAMED

SOL S.p.A.

Via Borgazzi 27 \ Monza \ Italija

Zastupnik:

`TGT` a.d. Laktaši

Nikole Pašića 28, Trn \ Laktaši \ Bosna i Hercegovina

Telefon: - \ Faks: - \ e-pošta: -

Azot suboksid SOL

SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GmbH

Industriestrasse 3, 34212 Melsungen \ \ Njemačka

Zastupnik:

SanMed d.o.o. Banja Luka

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 175a, PR-7 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina
Telefon: 051366791, kontakt telefon 065 269 050 \ Faks: 051366780 \ e-pošta:
office@sanmed.ba

NIMOSAN

SOPHARMA AD

Iliensko Shose No 16 \ Sofija \ Bugarska

Zastupnik:

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885 \ e-pošta:
merima.fatusic@unifarm.ba

AMIKACIN SOPHARMA

ATROPIN SOPHARMA

BUSCOLYSIN

CARSIL

DIGOXIN SOPHARMA

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885, \ e-pošta:
merima.fatusic@unifarm.ba

ISOCOR

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta:
amela.dervisevic@zentiva.com

PERSEN

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18 \ 61118 Bad Vilbel \ Njemačka

Zastupnik:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 51 331 650 \ Faks: +387 51 331 623 \ e-pošta: infoBL@hemofarm.com

ABIRATERON STADA

AGLIKEM XR

AXITINIB STADA

AZACITIDIN STADA

BISOPROLOL HF

BORTEZOMIB STADA

BRIVAX

BUDEKORT

ENZALUTAMID STADA

ETRAGA

FEBRICET

FLAVOTHROMBIN FORTE

FORTECA

FULAIR

GRIPPOSTAD C
GRIPPOSTAD topli napitak
HUKYNDRA
IBUMAX Direct
IDIKA
LAVRENA
LESCIT
MEMORION
MEROPENEM STADA
Metformin HF
MIDAZOLAM HF
MIRACALM
NILOTINIB STADA
OYAVAS
PALLORIN COMBO
PALLORIN

PANTOPRAZOL STADA
Pazopanib STADA
RAPTEN FORTE 2% gel
RESPIREX
SAURUS COMBO
SILETRIS
SORAFENIB STADA
SPIRTOS
SUNITINIB STADA
TAMSOLIN
TERIFLUNOMID Stada
UZPRUVO
VERTO
VITOPRIL H
VITOPRIL
VORTIFLEX

STRIDES PHARMA (Cyprus) LIMITED

Julia House, 1st Floor Themistokli Dervi 3 \ Nicosia \ Kipar

Zastupnik:

PharmaS d.o.o. Sarajevo

Maršala Tita 2, 71 000 Sarajevo \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 765 400 \ Faks: +387 33 765 401 \ e-pošta: jasminka.mijatovic@pharmas.ba

VANKOMICIN PharmaS

SWISS PARENTERALS LIMITED.

Office No. 62, 6th Floor, Titanium, Corporate Road, Prahladnagar Ahmedabad, Ahmetabad Gujarat 380015 \ \ Indija

Zastupnik:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karađorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +387 33 974 142 \ e-pošta: vahida.herici@rhei.life

HALO-SWISS
PDSOLONE

PDSOLONE 40 mg
SWISSCILLIN

SYNTHON B.V.

Microweg 22, 6545 CM \ Nijmegen \ Nizozemska

Zastupnik:

ALVEAD PHARM d.o.o., Sarajevo

Tešanjaska 24a \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: - \ Faks: - \ e-pošta: office @alveadpharm.com

ALMIK

CORAPHARM d.o.o.

Cara Lazara 22 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Proizvođači i njihovi zastupnici

Telefon: +387 51 433 820 \ Faks: +387 51 433 821 \ e-pošta: maja.savic@corapharm.rs

SUNICOR

FARMALOGIST ALLBIX d.o.o. Bijeljina

Stefana Dečanskog 258 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 416 070 \ Faks: +387 55 416 075 \ e-pošta: danijela.vjestica@farmalogistallbix.ba

ERGOTROMB

POMERGOLID

PharmaS d.o.o. Sarajevo

Maršala Tita 2, 71 000 Sarajevo \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 765 400 \ Faks: +387 33 765 401 \ e-pošta: jasminka.mijatovic@pharmas.ba

BORTEZOMIB PHARMAS

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

BICAPROST

NERIDE

PELIMERA

REMUREL

VORTEMYEL

ZEOKS

SYNTHON HISPANIA S.L.

Castelló 1 Polígono Las Salinas \ Sant Boi de Llobregat, Barselona \ Španija

Zastupnik:

AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o. Sarajevo

Igmanska 38, Vogošća \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 580 739; +387 33 580 736 \ Faks: +387 33 580 740 \ e-pošta: amar@amsal.ba

DIASEV

TAKEDA GmbH

Byk-Gulden-Straße 2 \ 78 467 Konstanz \ Njemačka

Zastupnik:

Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o. Sarajevo

Vrbanja 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 033941641 \ Faks: 033802520 \ e-pošta: emina.mahmutovic@takeda.com

CONTROLOC

TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG

Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark-Opfikon \ Zurich \ Švajcarska

Zastupnik:

Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o. Sarajevo

Vrbanja 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

652 Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2026

Telefon: 033941641 \ Faks: 033802520 \ e-pošta: emina.mahmutovic@takeda.com

ADCETRIS
ALUNBRIG
ENTYVIO
FRUZAQLA
HUMAN ALBUMIN 200g/l TAKEDA
IMMUNATE 1000 IU FVIII/750 IU VWF

IMMUNATE 500 IU FVIII/375 IU VWF
LIVTENCITY
NINLARO
REPLAGAL
VIPDOMET
VIPIDIA

TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, Ireland Branch

Block 3 Miesian Plaza, 50-58 Baggot Street Lower, Dublin 2, D02, Y754 \ \ Irska

Zastupnik:

Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o. Sarajevo

Vrbanja 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 033941641 \ Faks: 033802520 \ e-pošta: emina.mahmutovic@takeda.com

ELAPRASE
FIRAZYR

TAKHZYRO
VPRIV

TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLFA” SPÓŁKA AKCYJNA

2 A.Fleminga Str.03-176 \ Varšava \ Poljska

Zastupnik:

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885 \ e-pošta: merima.fatusic@unifarm.ba

SYNTARPEN

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885, \ e-pošta: merima.fatusic@unifarm.ba

OXYCORT

TECNIMEDE SOCIEDADE Tecnici Medicinal S.A.

Rua da Tapada Grande,No 2 Abrunheira 2710-089 \ Sintra \ Portugal

Zastupnik:

ALVEAD PHARM d.o.o., Sarajevo

Tešanjaska 24a \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: - \ Faks: - \ e-pošta: office @alveadpharm.com

SOLIX

TECNIMEDE SOCIEDADE Tecnici Medicinal S.A.

Rua da Tapada Grande,No 2 Abrunheira 2710-089 \ Sintra \ Portugal

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 653

Proizvođači i njihovi zastupnici

Zastupnik:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 331 650 \ Faks: +387 51 331 623 \ e-pošta: infoBL@hemofarm.com

TIGECYCLIN HF

TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

Busweg 1, 2031 DA \ Haarlem \ Nizozemska

Zastupnik:

PLIVA d.o.o.Sarajevo

Trg heroja br.10 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 723 544 \ Faks: +387 33 653 986 \ e-pošta: selma.suljovic@pliva.ba

ATORVOX

ABELCET lipid complex

AJOVY

AKSITINIB Teva

ARMISARTE

ATORVOX

BOSUTINIB Teva

BRALTUS

CARBOPLASIN

COPAXONE

DIMETILFUMARAT TEVA

DIMETILFUMARAT TEVA

DUONASE

DuoResp Spiromax

DUSTER DUO

FOROBEC

IRINOTESIN

LAXADIN

LENALIDOMID TEVA

MINKONTI

NILOTINIB Teva

NINTEDANIB PLIVA

NINTEDANIB TEVA

OKTREETID TEVA

OLFEN

RISSET

SCLEFIC

SORAFENIB TEVA

TACFORIUS

ZOLEDRONSKA KISELINA TEVA

TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.

Piet Heinkade 107, 1019 GM \ Amsterdam \ Nizozemska

Zastupnik:

PLIVA d.o.o.Sarajevo

Trg heroja br.10 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 723 544 \ Faks: +387 33 653 986 \ e-pošta: selma.suljovic@pliva.ba

ERLOTINIB TEVA

FINGOLIMOD TEVA

PALIPERIDON Teva

Pazopanib Teva

PHEZAM

THE MENTHOLATUM COMPANY LIMITED

1 Redwood Avenue, Peel Park Campus \ East Kilbride \ Velika Britanija

Zastupnik:

OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo

Pijačna 14 A \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 777 277 \ Faks: 033777273 \ e-pošta: registracija@oktal-pharma.ba

DEEP HEAT RUB

DEEP RELIEF

THERAMEX HQ UK LIMITED

50 Broadway, 5th Floor \ London SW1H 0BL \ Velika Britanija

Zastupnik:

MagnaPharm BH d.o.o.

Marka Marulića br.2 \ Sarajevo - Novo Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 65 285 035 \ Faks: - \ e-pošta:

officebih@magnapharm.eu, marijana.sehovac@magnapharm.eu

DUPHASTON

TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED

Troikaa House Commerce House-1, Satya Marg Bodakdev, Ahmedabad \ Gujarat \ Indija

Zastupnik:

LICENTIS DOO Sarajevo

Garovci bb, Hadžići \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 428 445/480 \ Faks: +387 33 428 481 \ e-pošta: mia@licentis.ba

MIDAZOLAM TROIKAA

PROPOFOL TROIKAA

ONDANSETRON TROIKAA

UCB Pharma S.A.

Allee de la Recherche 60 \ Brisel \ Belgija

Zastupnik:

MEDIS INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo

Ahmeta Muratbegovića br. 2 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 559 381 \ Faks: - \ e-pošta: emir.fazlic@medis.com

KEPPRA

UFAR d.o.o. Beograd

Lipovički put 308b \ Beograd-Barajevo \ Srbija

Zastupnik:

Evropa Lijek Pharma d.o.o.

Vlakovo 252 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 77 43 00 \ Faks: +387 33 77 43 01 \ e-pošta: naida.bilalagic-

pihura@elpharma.ba, amar.ramovic@elpharma.ba

KALII CHLORIDI UFAR

UNIMED PHARMA spol. s.r.o.

Orieškova 11 \ Bratislava \ Slovačka

Zastupnik:

Tuzla-Farm d.o.o. Tuzla

Rudarska br.71 \ Tuzla \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387(0) 35 321 248, 321 200 \ Faks: +387 (0) 35 321 221 \ e-pošta:

info@tuzlafarm.com

OPALERG

UNIFLOX 0,3%

UNICLOPHEN 0,1%

UNILAT

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 655

Proizvođači i njihovi zastupnici

UNITIMOLOL 0,5 %

UNION-MEDIC DOO NOVI SAD

Arhimandrita Jovana Rajića 2 \ 21 000 Novi Sad \ Srbija

Zastupnik:

ICM d.o.o. Bijeljina

Donja Ljeljenča 045 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 227 055 \ Faks: +387 55 227 055 \ e-pošta: icmdoo@gmail.com

AMINOFILIN UNION

VANTIVE GMBH

Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark (Opfikon) \ Ciriš \ Švajcarska

Zastupnik:

Co.Medprom d.o.o. Banja Luka

Nenada Kostića 24a \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 366 791 \ Faks: +387 51 366 790 \ e-pošta: medprom@teol.net

DIANEAL PD4

VEFA ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM Sirketi

Beylikduzu Osb Mahallesi Cadde No:3/2 \ Beylikduzu - Istanbul \ Turska

Zastupnik:

Tuzla-Farm d.o.o. Tuzla

Rudarska br.71 \ Tuzla \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387(0) 35 321 248, 321 200 \ Faks: +387 (0) 35 321 221 \ e-pošta: info@tuzlafarm.com

METFORIX

VEM ILAC SANAYI VE TICARET ANONIM Sirketi

Maslak Mahallesi AOS 55. Sokak 42 Maslak A Blok Sit No: 2/134 \ Sariyer, Istanbul \ Turska

Zastupnik:

DOO Farmacija 2011 Bihać

Zagrebačka 2 \ Bihać \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 37 971 100 \ Faks: +387 37 971 106 \ e-pošta: info@farmacija 2011.ba, mediha@farmacija2011.ba

EPILEM

PROMIN

TYGEX

UPADIL

Krajinagroup d.o.o. Banja Luka

Novakovići bb \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 926 760 \ Faks: +387 51 926 761 \ e-pošta: bogdan.sikic@krajinagroup.com

Lidofast

Tuzla-Farm d.o.o. Tuzla

Rudarska br.71 \ Tuzla \ Bosna i Hercegovina

656 Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2026

Telefon: +387(0) 35 321 248, 321 200 \ Faks: +387 (0) 35 321 221 \ e-pošta: info@tuzlafarm.com

CORTAIR

PROGAS

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885 \ e-pošta: merima.fatusic@unifarm.ba

ASIRAX

FLOTIC

LINEDOR

LOVETROX

PERFOSE

UNIKORT

VANCOMAX

VOMEPRAM

VORAZYR

VENIPHARM S.A.S.

4,Bureaux de la Colline \ Saint-Cloud \ Francuska

Zastupnik:

SanMed d.o.o. Banja Luka

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 175a, PR-7 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 051366791, kontakt telefon 065 269 050 \ Faks: 051366780 \ e-pošta: office@sanmed.ba

ENOXAPARIN LEDRAXEN

VENUS PHARMA GmbH

Am-Bahnhof, 1-3 \ Werne \ Njemačka

Zastupnik:

CORAPHARM d.o.o.

Cara Lazara 22 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 433 820 \ Faks: +387 51 433 821 \ e-pošta: maja.savic@corapharm.rs

Bortezomib Venus

DOCETAXEL VENUS

GEMCITABINE VENUS

MEROPENEM VENUS

Pontus Pharma d.o.o.Sarajevo

Milana Preloga 12A \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 870 077 \ Faks: +387 33 870 062 \ e-pošta: dalila.imsirpasic@pontus-pharma.com

CEFTRIAKSON Pontus

VERISFIELD Single Member S.A.

8 Vironos str., GR-152 31 Halandri \ \ Grčka

Zastupnik:

FARMALOGIST ALLBIX d.o.o. Bijeljina

Stefana Dečanskog 258 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Proizvođači i njihovi zastupnici

Telefon: +387 55 416 070 \ Faks: +387 55 416 075 \ e-pošta: daniela.vjestica@farmalogistallbix.ba

KLINDAVAG

OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo

Pijačna 14 A \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 777 277 \ Faks: 033777273 \ e-pošta: registracija@oktal-pharma.ba

STULIPOR

VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY

9th km National road Trikala-Larisa, Taxiarches \ 42100 Trikala \ Grčka

Zastupnik:

Tuzla-Farm d.o.o. Tuzla

Rudarska br.71 \ Tuzla \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387(0) 35 321 248, 321 200 \ Faks: +387 (0) 35 321 221 \ e-pošta: info@tuzlafarm.com

GLUKOZA 5% VIOSER
MANNITOL 20% VIOSER
METRONIDAZOL VIOSER

MOXIFLOXACIN VIOSER
NATRIJ HLORID 0,9% VIOSER
RINGER LAKTAT VIOSER

VUAB Pharma a.s.

Vltavska 53 \ 25263 Roztoky \ Češka Republika

Zastupnik:

SanMed d.o.o. Banja Luka

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 175a, PR-7 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 051366791, kontakt telefon 065 269 050 \ Faks: 051366780 \ e-pošta: office@sanmed.ba

SUXAMETHONIUM CHLORID VUAB
100 mg

WAVE PHARMA LIMITED

Ground Floor,Cavendish House,389 Burnt Oak Broadway \ Edgware HA8 5AW \ Velika Britanija

Zastupnik:

RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina

Karadorđeva 24, lokal 2 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 66 765 814 \ Faks: +38733 974 142 \ e-pošta: vahida.heric@rhei.life

FUNITRAL

WELCURE REMEDIES

1, Nahan Road, Kala Amb, Sirmaur \ Himachal Pradesh, 173030 \ Indija

Zastupnik:

DOO Farmacija 2011 Bihać

Zagrebačka 2 \ Bihać \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 37 971 100 \ Faks: +387 37 971 106 \ e-pošta: info@farmacija 2011.ba, mediha@farmacija2011.ba

658 Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2026

SUCCINEX-M

WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ş.

15 Temmuz Mah.Camiyolu Cad. No:50, Güneşli, Bağcılar \ Istanbul \ Turska

Zastupnik:

World Medicine Bosnia d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ 71000 Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: ++387 33 295 558 \ Faks: ++387 33 295 559 \ e-pošta: ajla.catovic@worldmedicine.ba

BAGEDA
CULENTO
DUSKONAL
FLUTEL
LATASOPT

NORMATIN
PALLADA
SERTOGEN
SPYLACTON
ULSEPAN

WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.KG

Flugfeld-Allee 24 \ 71034 Böblingen \ Njemačka

Zastupnik:

WÖRWAG PHARMA d.o.o. Banja Luka

Mladena Stojanovića br. 26 \ Banja Luka \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 308 940 \ Faks: +387 51 308 940 \ e-pošta: milica.glisic@woerwagpharma.rs, katarina.djordjevic@woerwagpharma.rs

MILGAMMA 100
MILGAMMA N

THIOGAMMA 600 Oral

XELLIA PHARMACEUTICALS ApS

Dalslandsgade 11 \ DK-2300 Copenhagen \ Danska

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

ALVOBAC

ZADA Pharmaceuticals d.o.o.

Bistarac Donji bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Zastupnik:

ZADA pharmaceuticals d.o.o.

Bistarac Donji bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 551 140 \ Faks: +387 35 551 150 \ e-pošta: sandra.isabegovic@zada.ba

ANAXAL
ANTARZA
APIKSABAN ZADA
ASA ZADA

ATENZIO PLUS
ATENZIO
AVADIL
AZID

Proizvođači i njihovi zastupnici

BENEFIT	LORAMIN
BLOCOR	MALCOVIR
CIPROZAD	MELCAM
CORRIGO	METOCOR
DAFEN	MOXI
DAMAR	NIFURAN
DELOR	PARACETAMOL ZADA
DIAMELL	PAROXAL
DOLAP	RHINOZAD
ENOX	RONDO
ESSO	SMART
FILEX	SPAZMOL
FOLIK	SPILOK
GLUCONORM	TAZIN
HYPERIL Plus	TINAZOL
HYPERIL	TOPIRIN
KADRIL PLUS	VEDICOR
KADRIL	VILDANORM PLUS
KLOMID	ZAPIN
LIPTIN	ZASAN
LISETRA	ZOLPAN
LOPRESS	

ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

Pelplińska 19, Starogard Gdański, 83-200 \ \ Poljska

Zastupnik:

GOODWILL PHARMA D.O.O. Bijeljina

Stefana Dečanskog 258 \ Bijeljina \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 55 416 071 \ Faks: +387 55 416 075 \ e-pošta: andrea.salcinovic@goodwillpharma.org

BLISSERIGO

MEMALIS

ZAMBON S.P.A.

Via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso \ Milano \ Italija

Zastupnik:

Remedia d.o.o. Sarajevo

Kranjčevićeva 37 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: 033558451 \ Faks: 033558452 \ e-pošta: erduan.jazic@remedia.ba

FLUIMUCIL 100

FLUIMUCIL 600

FLUIMUCIL 200

MONURAL

ZDRAVLJE A.D.Leskovac

Vlajkova 199 \ Leskovac \ Srbija

Zastupnik:

PLIVA d.o.o.Sarajevo

Trg heroja br.10 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 723 544 \ Faks: +387 33 653 986 \ e-pošta: selma.suljovic@pliva.ba

LOPERAMID ZDRAVLJE

ZDRAVLJE AD LESKOVAC

Vlajkova 199 \ Leskovac \ Srbija

Zastupnik:

Viennapharm d.o.o.

Jezero 3 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 553 165 \ Faks: +387 33 553 167 \ e-pošta: office@viennapharm.com

BROMOKRIPTIN ZDRAVLJE

ZENTIVA S.A.

Bucuresti Sectorul 3, Str. Theodor Pallady Nr.50 \ Bukurešt \ Rumunija

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

FINGOLIMOD ZENTIVA
FOKUSIN

METFORMIN Zentiva

ZENTIVA, k.s.

Praha 10-Dolni Mecholupy, U kabelovny 130, PSČ 102 37 \ \ Češka Republika

Zastupnik:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1 \ Sarajevo \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 295 809 \ Faks: +387 33 295 810 \ e-pošta: amela.dervisevic@zentiva.com

DOLOXIB
JAZETA NOVUM
LOPRIDAM
PRIAMLO

ROSUCARD
TEZEO HCT
TEZEO
ZEVESIN

ZOREX PHARMA d.o.o. ŠABAC

Beogradski put 9 \ Šabac \ Srbija

Zastupnik:

UNIFARM d.o.o. Lukavac

Bistarac, Magistralni put bb \ Lukavac \ Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 369 880 \ Faks: +387 35 369 875/885 \ e-pošta: merima.fatusic@unifarm.ba
JODOKOM

LISTA ZABRANJENIH SREDSTAVA ZA 2026. godinu

Lista zabranjenih sredstava (LZS) predstavlja međunarodni standard kojeg donosi Svjetska agencija za borbu protiv dopinga u sportu (engl. *World Anti-Doping Agency, WADA*) najmanje jedanput godišnje još od 2004. godine. Značaj postojanja i objavljivanja LZS jeste, između ostalog, da se sportisti, kao i svo njihovo pomoćno medicinsko osoblje, upoznaju koje su to supstance zabranjene, te čije prisustvo u uzorku krvi ili urina sportiste povlači moguće odgovarajuće zdravstvene i pravne posljedice na sportistu, njegovu karijeru i njegovo osoblje.

U poglavljima LZS se nalaze razvrstane supstance, kao i metode prema grupama čija je primjena zabranjena samo na takmičenju, na takmičenju i izvan takmičenja, te one čija je primjena zabranjena u pojedinim sportovima.

Takođe određene supstance su označene kao „specifične“ čime se ukazuje na mogućnost da je njihovo unošenje bilo nenamjerno ili ne sa svrhom poboljšanja performansi sportiste. Navedena podjela je uspostavljena zbog različitih pravnih implikacija na sportistu (što tačnijeg određivanja individualne odgovornosti).

Sportista ima pravo da bude bolestan i da se razboli, te ukoliko njegovo liječenje zahtjeva korištenje nekog od sredstava sa LZS, pristupa se podnošenju Zahtjeva za terapijskim izuzećem (engl. *Therapeutic Use Exemptions, TUE*), nadležnom tijelu za borbu protiv dopinga u sportu (Agencija za antidoping kontrolu BiH).

Ukoliko je navedeni zahtjev opravdan, odlukom Odbora za terapijska izuzeća, sportisti biva dozvoljeno da koristi navedena sredstva u svrhu liječenja svoga stanja.

Lista zabranjenih sredstava za 2026. godinu je dostupna na internet stranici Agencije za antidoping kontrolu <https://www.ada.gov.ba/index.php/bs/antidoping/lista-zabranjenih-sredstava>, a nadamo se da će objavljivanje ove Liste i u Registru lijekova doprinijeti zdravlju sportista, kao i njihovom adekvatnijem liječenju od strane medicinskih profesionalaca. Lista zabranjenih sredstava se po jedanaeseti put objavljuje u Registru lijekova, kao zajednički projekat Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i Agencije za antidoping kontrolu BiH.

LISTA ZABRANJENIH SREDSTAVA (2026)

S0. NEODOBRENE SUPSTANCE

ZABRANJENE UVIJEK (NA TAKMIČENJU I IZVAN TAKMIČENJA)

Sve zabranjene supstance u ovoj klasi su specifične supstance.

Bilo koja farmakološka supstanca na koju se ne odnosi niti jedan od sljedećih dijelova Liste i koja trenutno nema odobrenje bilo kojeg državnog regulatornog zdravstvenog tijela za terapijsku upotrebu kod ljudi (npr. lijekovi u pretkliničkom ili kliničkom razvoju ili lijekovi čiji je razvoj obustavljen, dizajnerski lijekovi, supstance odobrene samo za veterinarsku upotrebu) uvijek je zabranjena.

Ova klasa pokriva mnoge različite supstance uključujući, ali ne ograničavajući se na BPC-157, 2,4-dinitrofenol (DNP), ryanodine receptor-1-calstabin kompleks stabilizatori [npr. S-107, S48168 (ARM210)] i troponin aktivatori (npr. reldesemtiv i tirasemtiv).

S1. ANABOLIČKA SREDSTVA

ZABRANJENA UVIJEK (NA TAKMIČENJU I IZVAN TAKMIČENJA)

Sve zabranjene supstance u ovoj klasi su nespecifične supstance.

Anabolička sredstva su zabranjena.

S1.1. ANABOLIČKI ANDROGENI STEROIDI (AAS)

Kada se primjenjuju egzogeno, uključujući, ali ne ograničavajući se na: 1-Androstenediol (5 α -androst-1-ene-3 β , 17 β -diol), 1-Androstenedione (5 α -androst-1-ene-3,17-dione), 1-Androsterone (3 α -hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one), 1-Epiandrosterone (3 β -hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one), 1-Testosterone (17 β -hydroxy-5 α -androst-1-en-3-one), 4-Androstenediol (androst-4-ene-3 β , 17 β -diol), 4-Hydroxytestosterone (4,17 β -dihydroxyandrost-4-en-3-one), 5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione), 7 α -Hydroxy-DHEA, 7 β -Hydroxy-DHEA, 7-Keto-DHEA, 11 β -Methyl-19-nortestosterone, 17 α -Methylepithiostanol (epistane), 19-Norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol), 19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione), Androst-4-ene-3,11,17-trione (11-ketoandrostenedione, adrenosterone), Androstanolone (5 α -dihydrotestosterone, 17 β -hydroxy-5 α -androst-3-one), Androstenediol (androst-5-ene-3 β ,17 β -diol), Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione), Bolasterone, Boldenone, Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione), Calusterone, Clostebol, Danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17 α -ol), Dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one), Desoxymethyltestosterone (17 α -methyl-5 α -androst-2-en-17 β -ol and 17 α -methyl-5 α -androst-3-en-17 β -ol), Dimethandrolone (7 α ,11 β -Dimethyl-19-nortestosterone), Drostanolone, Epiandrosterone (3 β -hydroxy-5 α -androst-17-one), Epi-dihydrotestosterone (17 β -hydroxy-5 β -androst-3-one), Epitestosterone, Ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17 α -ol), Fluoxymesterone, Formebolone, Furazabol (17 α -methyl [1,2,5] oxadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androst-17 β -ol), Gestrinone, Mestanolone, Mesterolone, Metandienone (17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one), Metenolone, Methandriol, Methasterone (17 β -hydroxy-2 α ,17 α -dimethyl-5 α -androst-3-one), Methyl-1-testosterone (17 β -hydroxy-17 α -methyl-5 α -androst-1-en-3-one), Methylclostebol, Methyldienolone (17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9-dien-3-one), Methylnortestosterone (17 β -hydroxy-17 α -methylestr-4-en-3-one), Methyltestosterone, Metribolone (methyltrienolone, 17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9,11-trien-3-one), Mibolone, Nandrolone (19-nortestosterone), Norboletone, Norclostebol (4-chloro-17 β -ol-estr-4-en-3-one), Norethandrolone, Oxabolone, Oxandrolone, Oxymesterone,

Oxymetholone, Prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3 β -hydroxyandrost-5-en-17-one), Prostanazol (17 β -[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'-H-pyrazolo[3,4:2,3]-5 α -androstane), Quinbolone, Stanazolol, Stenbolone, Testosterone, Tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18ahomo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-one), Tibolone, Trenbolone (17 β -hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one), Trestolone (7 α -Methyl-19-nortestosterone, MENT) i druge supstance slične hemijske strukture ili sličnih bioloških efekata uključujući njihove estere.

S1.2. DRUGA ANABOLIČKA SREDSTVA

Uključujući, ali ne ograničavajući se na: Clenbuterol, osilodrostol, ractopamine, selektivne modulatore androgenih receptora [SARMs, npr. andarine, enobosarm (ostarine), LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23 i YK-11], zeranol i zilpaterol.

S2. PEPTIDNI HORMONI, FAKTORI RASTA, SLIČNE SUPSTANCE, I MIMETICI ZABRANJENI UVIJEK (NA TAKMIČENJU I IZVAN TAKMIČENJA)

Sve zabranjene supstance u ovoj klasi su nespecifične supstance.

Sljedeće supstance, i druge supstance slične hemijske strukture ili sličnih bioloških efekata, su zabranjene:

S2.1. Eritropoetini (EPO) i agensi koje utječu na eritropoezu

Uključujući, ali ne ograničavajući se na:

S2.1.1 Agoniste eritropoietinskih receptora, npr. darbepoetini (dEPO); eritropoietini (EPO); proizvodi koji sadrže EPO [npr. EPO-Fc, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)]; supstance koje oponašaju EPO i supstance koje ih sadrže (npr. CNTO-530, peginesatide, pegmolesatide).

S2.1.2 Aktivatore hipoksijom induciranih faktora (HIF), npr. cobalt; daprodustat (GSK1278863); IOX2; molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon.

S2.1.3 GATA inhibitore, npr. K-11706.

S2.1.4 Inhibitori signala transformirajućeg faktora rasta (TGF- β), npr. luspaterecept; sotatercept.

S2.1.5 Urođeni agonisti receptora popravka, npr. asialo EPO; karbamilirani EPO (CEPO).

S2.2. Peptidni hormoni i faktori koji djeluju na njihovo otpuštanje:

S2.2.1 Peptidi koji stimuliraju testosteron kod muškaraca, uključujući, ali ne ograničavajući se na: horionski gonadotropin (CG), luteinizirajući hormon (LH), hormon koji oslobađa hormon rasta (GnRH, gonadorelin) i njegovi analozi agonisti (npr. buserelin, deslorelin, goserelin, histrelin, leuprorelin, nafarelin i triptorelin), kisspeptin i njegovi analozi agonisti.

S2.2.2 Kortikotropini i faktori koji djeluju na njihovo otpuštanje, npr. corticorelin i tetracosactide.

S2.2.3 Hormon rasta (GH), njegovi analozi i fragmenti uključujući, ali ne ograničavajući se na:

- Analoge hormona rasta, npr. lonapegsomatropin, somapacitan i somatogon
- Fragmente hormona rasta, npr. AOD-9604 i hGH 176-191

S2.2.4 Faktori koji oslobađaju hormon rasta, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

- Hormon koji oslobađa hormon rasta (GHRH) i njegovi analozi (npr. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin i tesamorelin)
- Sekretagogi hormona rasta (GHS) i njegovi mimetici [npr. anamorelin, capromorelin, ibutamoren (MK-677), ipamorelin, lenomorelin (ghrelin), macimorelin i tabimorelin]

-
- peptide koji djeluju na otpuštanje hormona rasta (GHRPs) [npr. alexamorelin, examorelin (hexarelin), GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 i GHRP-6]

S2.3. Faktori rasta i modulatori faktora rasta

Uključujući, ali ne ograničavajući se na: faktore rasta fibroblasta (FGFs), hepatocitni faktor rasta (HGF), Insulinu slični faktor rasta-1 (IGF-1, mecasermin) i njegovi analozi, mehaničke faktore rasta (MGFs), Trombocitni faktor rasta (PDGF), Thymosin- β 4 i njegovi derivati, npr. TB-500, Vaskularni endotelijalni faktor rasta (VEGF) i druge faktore rasta ili modulare faktora rasta koji utiču na sintezu/razlaganje proteina mišića, tetiva ili ligamenata, vaskularizaciju, korištenje energije, regenerativni kapacitet ili promjenu tipa vlakana.

S3. BETA-2 AGONISTI

ZABRANJENI UVIJEK (NA TAKMIČENJU I IZVAN TAKMIČENJA)

Sve zabranjene supstance u ovoj klasi su specifične supstance.

Svi selektivni i neselektivni beta-2 agonisti, uključujući njihove optičke izomere, su zabranjeni. Uključujući, ali ne ograničavajući se na: Arformoterol; Fenoterol; Formoterol; Higenamine; Indacaterol; Levosalbutamol; Olodaterol; Procaterol; Reproterol; Salbutamol; Salmeterol; Terbutaline; Tretoquinol (trimetoquinol); Tulobuterol; Vilanterol. Osim:

- Inhaliranog salbutamola: maksimalno 1600 mikrograma tokom 24 sata u podijeljenim dozama, koje ne smiju prelaziti 600 mikrograma tokom 8 sati počevši od primjene bilo koje doze;
- Inhaliranog formoterola: maksimalna doza od 54 mikrograma tokom 24 sata u podijeljenim dozama koje ne smiju premašiti 36 mikrograma tokom 12 sati počevši od primjene bilo koje doze;
- Inhaliranog salmeterola: maksimalno 200 mikrograma tokom 24 sata tokom 24 sata u podijeljenim dozama ne smiju premašiti 100 mikrograma tokom 8 sati počevši od primjene bilo koje doze;
- Inhaliranog vilanterola: maksimalno 25 mikrograma tokom 24 sata.

NAPOMENA:

Koncentracija salbutamola u urinu većoj od 1000 ng/ml ili formoterola većoj od 40 ng/ml nije u skladu s terapijskom primjenom supstance i smatrat će se nepovoljnim analitičkim nalazom (AAF) ukoliko sportista ne dokaže putem kontrolirane farmakokinetičke studije, da je nepovoljan rezultat posljedica terapijske doze (inhalacijom) u granicama gore navedenih maksimalnih doza.

S4. HORMONI I MODULATORI METABOLIZMA

ZABRANJENI UVIJEK (NA TAKMIČENJU I IZVAN TAKMIČENJA)

Zabranjene supstance u klasama S4.1 i S4.2 su specifične supstance. Supstance u klasama S4.3 i S4.4 su nespecifične supstance.

Sljedeći hormoni i modulatori metabolizma su zabranjeni:

S4.1. Inhibitori aromataze

Uključujući, ali ne ograničavajući se na: 2-Androstenol (5 α -androst-2-en-17-ol), 2-Androstenone (5 α -androst-2-en-17-one), 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one (α -naphthoflavone; 7,8-benzoflavone), 3-Androstenol (5 α -androst-3-en-17-ol), 3-Androstenone (5 α -androst-3-en-17-one), 4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo), Aminoglutethimide, Anastrozole, Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione),

Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane), Exemestane, Formestane, Letrozole, Testolactone.

S4.2. Anti-estrogene supstance (anti-estrogeni i selektivni modulatori estrogenskih receptora (SERMs))

Uključujući, ali ne ograničavajući se na: Bazedoxifene, Clomifene, Cyclofenil, Elacestrant, Fulvestrant, Ospemifene, Raloxifene, Tamoxifen, Toremifene.

S4.3. Supstance koje sprečavaju aktivaciju aktivinskog receptora IIB

Uključujući ali ne ograničavajući se na: Activin A-neutralizirajuća antitijela; agoniste aktivin receptora IIB kao što su: lažni aktivin receptori (npr. ACE-031); Anti-aktivin receptor IIB antitijela (npr. bimagrumab); inhibitore myostatina kao što su: Agensi koji reduciraju ili sprečavaju ekspresiju miostatina; Myostatin-vezujući proteini (npr. follistatin, myostatin propeptide); Myostatin-neutralizirajuća antitijela (npr. apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).

S4.4. Metabolički modulatori:

S4.4.1. Aktivatori AMP-aktivirane protein kinaze (AMPK), npr. 5-N,6-N-bis(2-fluorophenyl)-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazine-5,6-diamine (BAM15), AICAR, mitohondrijalni otvoreni okvir za čitanje 12S rRNA-c (MOTS-c); Delta agonisti receptora aktivacije proliferacije peroksisoma (PPAR δ), npr. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) ocatna kiselina (GW1516, GW501516) i Rev-erba agonisti, npr. SR9009, SR9011.

S4.4.2. Insulini i insulin-mimetici (npr. S519, S597)

S4.4.3. Meldonium

S4.4.4. Trimetazidine

S5. DIURETICI I MASKIRNI AGENSI

ZABRANJENI UVIJEK (NA TAKMIČENJU I IZVAN TAKMIČENJA)

Sve zabranjene supstance u ovoj klasi su specifične supstance.

Svi diuretici i maskirni agensi su zabranjeni, uključujući sve optičke izomere, npr. d- i l-gdje je relevantno, su zabranjeni.

Uključujući, ali ne ograničavajući se na:

- Diuretici kao što su: Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlortalidone; etacrynic acid; furosemide; indapamide; metolazone; spironolactone; thiazides, npr. bendroflumethiazide, chlorothiazide i hydrochlorothiazide; torasemide; triamterene; xipamide.
- Vaptani, npr. conivaptan, mozavaptan, tolvaptan;
- Plasma ekspanderi za intravensku primjenu kao što su: Albumin, dextran, hydroxyethyl skrob, mannitol;
- Desmopressin;
- Probenecid;

i druge supstance slične hemijske strukture ili bioloških efekata.

Osim:

- Drospirenone; pamabrom; i topička oftalmološka upotreba inhibitora karboanhidraze (npr. dorzolamide, brinzolamide);
- Lokalna primjena felypressina u dentalnoj anesteziji.

NAPOMENA:

Prisustvo u uzorku sportiste, uvijek ili na takmičenju, bilo koje količine supstanci podložnih određivanju graničnih vrijednosti, kako je primjenljivo: formoterola, salbutamola, cathine, ephedrine, methylephedrine i pseudoephedrine, zajedno s diuretikom ili sredstvom za maskiranje (osim lokalne oftalmičke primjene inhibitora karboanhidraze ili lokalne primjene felypressina u dentalnoj anesteziji), smatrat će se nepovoljnim analitičkim

nalazom (AAF), osim ako sportista nema odobreno izuzeće za terapijsku upotrebu (TUE) za tu supstancu, kao dodatak uz odobrenje za diuretik ili sredstvo za maskiranje.

ZABRANJENE METODE

ZABRANJENE UVIJEK (NA TAKMIČENJU I IZVAN TAKMIČENJA)

Sve zabranjene metode u ovoj klasi su nespecifične, osim metoda u M2.2. koje su specifične metode.

M1. MANIPULACIJA KRVlju I KRVNIM KOMONENTAMA

Zabranjeno je sljedeće:

M1.1. Davanje ili ponovno uvođenje bilo koje količine autologne, alogene (homologne) ili heterologne krvi ili produkata crvenih krvnih ćelija bilo kojeg porijekla u kardiovaskularni sistem. Vađenje krvi ili krvnih sastojaka (uključujući aferezu), osim ako se ne provodi u 1) analitičke svrhe, uključujući medicinske testove ili doping kontrolu, ili u 2) svrhe doniranja u centru za prikupljanje akreditiranom od strane nadležnog regulatornog tijela zemlje u kojoj posluje.

M1.2. Vještačko povećanje unosa, transporta ili opskrbe kisikom. Uključujući, ali ne ograničavajući se na: Perfluorirane hemijske supstance; efaproxiral (RSR13); voxelator i modificirane produkte hemoglobina (npr. zamjene za krv na bazi hemoglobina i proizvodi sa mikroenkapsuliranim hemoglobinom, isključujući dodatni kisika inhalacijom).

M1.3. Bilo koji oblik intravaskularne manipulacije krvlju ili krvnim komponentama fizikalnim ili hemijskim sredstvima.

M1.4. Korištenje sustava ili opreme za ponovno udisanje ugljičnog monoksida, osim ako se ne provodi kao dijagnostički postupak pod nadzorom medicinskog ili znanstvenog stručnjaka.

M2. HEMIJSKA I FIZIČKA MANIPULACIJA

Zabranjeno je sljedeće:

M2.1. Neovlašteno manipuliranje ili pokušaj neovlaštenog manipuliranja uzorcima prikupljenih tokom doping kontrole s ciljem promjene njihove intaktnosti i validnosti. Uključujući, ali ne ograničavajući se na: zamjenu uzoraka i/ili njihovo falsificiranje (npr. dodavanje proteaza u uzorak).

M2.2. Intravenske infuzije i/ili injekcije volumena većeg od ukupno 100 ml u razdoblju od 12 sati, osim ako se opravdano primjenjuju tokom bolničkog liječenja, hirurških procedura ili kliničkih dijagnostičkih ispitivanja.

M3. GENSKI I ĆELIJSKI DOPING

Sljedeće metode, koje imaju potencijal poboljšanja sportskih performansi, su zabranjene: M3.1. Primjena nukleinskih kiselina ili analoga nukleinskih kiselina koje mogu mijenjati sekvencu genoma i/ili mijenjati ekspresiju gena bilo kojim mehanizmom. To uključuje, ali nije ograničeno na tehnologiju uređivanja gena, prigušivanje gena i tehnologije prijenosa gena.

M3.2. Primjena normalnih ili genetski modificiranih ćelija ili ćelijskih komponenti (npr. jezgre i organele poput mitohondrija i ribosoma).

S6. STIMULANSI

ZABRANJENI NA TAKMIČENJU

Sve zabranjene supstance u ovoj kategoriji su specifične supstance, osim onih iz kategorije S6.A, koje su nespecifične supstance.

Supstance zloupotrebe u ovom dijelu: kokain i metilendioksimetamfetamin (MDMA/“ecstasy”).

Svi stimulansi, uključujući sve optičke izomere (npr. d- i l- ako je relevantno), su zabranjeni.

Stimulansi uključuju:

S6.A. Nespecifične stimulanse: Adrafinil, Amfepramone, Amfetamine, Amfetaminil, Amiphenazole, Benfluorex, Benzylpiperazine, Bromantan, Clobenzorex, Cocaine, Cropropamide, Crotetamide, Fencamine, Fenetylline, Fenfluramine, Fenproporex, Fladrafinil (2-[Bis(4-fluorophenyl) methylsulfinyl]-N-hydroxyacetamide), Flmodafinil (2-[Bis(4-fluorophenyl) methylsulfinyl]acetamide), Fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)], Furfenorex, Hydradinil (fluorenol), Lisdexamfetamine, Mefenorex, Mephentermine, Mesocarb, Metamfetamine(d-), p-methylamfetamine, Modafinil, Norfenfluramine, Phenimetrazine, Phentermine, Prenylamine, Prolintane.

Stimulans koji nije izričito naveden u ovom dijelu smatra se specifičnom supstancom.

S6.B. Specifične stimulanse

Uključujući, ali ne ograničavajući se na: 2-phenylpropan-1-amine (β-methylphenylethylamine, BMPEA), 3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine), 4-Fluoromethylphenidate, 4-Methylhexan-2-amine (1,3-dimethylamylamine, 1,3 DMAA, methylhexaneamine), 4-Methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine), 5-Methylhexan-2-amine (1,4-dimethylamylamine, 1,4-dimethylpentylamine, 1,4-DMAA), Benzfetamine, Cathine**, Cathinone i njegovi analozi, npr. mephedrone, methedrone, i α-pyrrolidinovalerophenone, Dimetamfetamine (dimethylamphetamine), Ephedrine***, Epinephrine**** (adrenaline), Etamivan, Ethylphenidate, Etilamfetamine, Etilefrine, Famprofazone, Fenbutrazate, Fencamfamin, Heptaminol, Hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine), Isometheptene, Levmetamfetamine, Meclofenoxate, Methylenedioxymethamphetamine, Methylephedrine***, Methyl-naphthidate [(±)-methyl-2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate], Methylphenidate, Midodrine, Nikethamide, Norfenefrine, Octodrine (1,5-dimethylhexylamine), Octopamine, Oxilofrine (methylsynephrine), Pemoline, Pentetrazol, Phenethylamine i njegovi derivati, Phenmetrazine, Phenpromethamine, Propylhexedrine, Pseudoephedrine*****, Selegiline, Sibutramine, Solriamfetol, Strychnine, Tenamfetamine (methylenedioxymphetamine), Tesofensine, Tuaminoheptane i druge supstance sa sličnom hemijskom strukturom ili sličnim biološkim efektom (efektima).

Osim:

- Clonidine, guanfacine;

- Derivata imidazola za dermatološku, nazalnu, oftalmološku ili otološku upotrebu (npr. brimonidine, clonazoline, fenoxazoline, indanazoline, naphazoline, oxymetazoline, tetryzoline, tramazoline, xylometazoline) i stimulansa uključenih u Monitoring program za 2026. godinu*.

* Bupropion, caffeine, nicotine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol, i synephrine: ove supstance su uključene u Monitoring program za 2026. godinu, i ne smatraju se zabranjenim supstancama.

** Cathine (d-norpseudoephedrine) i njegov l-isomer: zabranjen ako mu je koncentracija u urinu veća od 5 mikrograma po mililitru.

*** Ephedrine i methylephedrine zabranjeni su ako je njihova pojedinačna koncentracija u urinu veća od 10 mikrograma po mililitru.

**** Epinephrine (adrenaline): nije zabranjena lokalna primjena (npr. nazalna, oftalmološka ili istovremena primjena s lokalnim anestetikima)

***** Pseudoephedrine: zabranjen kada je njegova koncentracija u urinu veća od 150 mikrograma po mililitru.

S7. NARKOTICI

ZABRANJENI NA TAKMIČENJU

Sve zabranjene supstance u ovoj klasi su specifične supstance.

Supstanca zloupotrebe u ovom dijelu: diamorphine (heroin).

Sljedeći narkotici, uključujući sve optičke izomere, npr. d- i l- gdje je primjenjivo, su zabranjeni: Buprenorphine, Dextromoramide, Diamorphine (heroin), Fentanyl i njegovi derivati, Hydromorphone, Methadone, Morphine, Nicomorphine, Oxycodone, Oxymorphone, Pentazocine, Pethidine, Tramadol.

S8. KANABINOIDI

ZABRANJENI NA TAKMIČENJU

Sve zabranjene supstance u ovoj klasi su specifične supstance.

Supstanca zloupotrebe u ovom dijelu: tetrahydrocannabinol (THC).

Svi prirodni i sintetički kanabinoidi su zabranjeni, npr.

- U kanabisu (hašiš, marihuana) i proizvodima od kanabisa
- Prirodni i sintetski tetrahydrocannabinoli (THCs)
- Sintetski kanabinoidi koji oponašaju efekte THC-a

Osim:

- Cannabidiol.

S9. GLUKOKORTIKOIDI

ZABRANJENI NA TAKMIČENJU

Sve zabranjene supstance u ovoj klasi su specifične supstance.

Svi glukokortikoidi su zabranjeni kada se primjenjuju bilo kojim injekcijskim, oralnim (uključujući oromukozni (npr. bukalni, gingivalni, sublingvalni)) ili rektalnim putem.

Uključujući ali ne ograničavajući se na: Beclometasone, Betamethasone, Budesonide, Ciclesonide, Cortisone, Deflazacort, Dexamethasone, Flunisolide, Fluocortolone, Fluticasone, Hydrocortisone, Methylprednisolone, Mometasone, Prednisolone, Prednisone, Triamcinolone acetone.

Ostali načini primjene (uključujući inhalacijski i lokalni: dentalno-intrakanalni, dermalni, intranazalni, oftalmološki, otološki i perianalni) nisu zabranjeni kada se koriste u dopuštenim dozama propisanim od proizvođača i u terapijskim indikacijama.

P1. BETA-BLOKATORI

SUPSTANCE ZABRANJENE U POJEDINIM SPORTOVIMA

Sve zabranjene supstance u ovoj klasi su specifične supstance.

Beta-blokatori zabranjeni su samo na takmičenju u sljedećim sportovima, a također i van takmičenja gdje je to označeno (*):

- Streljaštvo (WA)*
- Automobilizam (FIA)
- Bilijar (sve discipline) (WCBS)
- Pikado (WDF)
- Golf (IGF)

-
- Mini – golf (WMF)
 - Streljaštvo (ISSF, IPC)*
 - Podvodni sportovi (CMAS)* u svim poddisciplinama ronjenja na dah, podvodnog ribolova i streljaštva.

* Također zabranjeni i van takmičenja

Uključujući, ali ne ograničavajući se na: Acebutolol, Alprenolol, Atenolol, Betaxolol, Bisoprolol, Bunolol, Carteolol, Carvedilol, Celiprolol, Esmolol, Labetalol, Metipranolol, Metoprolol, Nadolol, Nebivolol, Oxprenolol, Pindolol, Propranolol, Sotalol, Timolol.

VAŽNO

Službeni tekst Liste zabranjenih sredstava na bosanskom jeziku održavat će Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine u skladu s Listom na engleskom jeziku, koju održava Svjetska antidoping agencija (WADA). U slučaju bilo kakve neusaglašenosti između engleske i verzije na bosanskom jeziku, mjerodavna je engleska verzija koja se nalazi na web stranici Svjetske antidoping agencije.

Lista stupa na snagu 1. januara 2026. godine

PRILOG 1. OBRAZAC ZA PRIJAVU SUMNJE NA NEŽELJENU REAKCIJU LIJEKA

Datum prijave	Datum nultog dana (samo za pravne osobe)			
*PODACI O IZVJESTITELJU (navedite vaše ime, prezime ili naziv pravne osobe, zanimanje, ustanovu zaposlenja, adresu, kontakt telefon, adresu elektronske pošte)				
Inicijali	Spol	*PODACI O PACIJENTU Datum rođenja	Dob	Tjelesna masa, visina
*OPIS SUMNJE NA NEŽELJENU REAKCIJU LIJEKA (opišite što se dogodilo, kakva neželjena reakcija se javila, kako se liječila neželjena reakcija, napišite ukoliko sumnjate na interakciju lijeka ili nedjelotvornost lijeka)				
POVIJEST BOLESTI PACIJENTA (ukoliko raspolazete podacima upišite povijest bolesti, alergije, jesu li pacijenti trudnice ili dojilje, zadnji datum menstruacije...)				
Označite ako je neželjena reakcija dovela do jednog od sljedećeg ☐ smrt ☐ životna ugroženost ☐ primitak u bolnicu ili produženje bolničkog liječenja ☐ invalidnosti/nesposobnosti ☐ kongenitalne anomalije/prirođene mane ☐ medicinski značajnog ozbiljnog stanja pacijenta				
Ishod neželjene reakcije ☐ nastupio oporavak ☐ oporavak u tijeku ☐ i dalje traje ☐ oporavak s posljedicama ☐ smrt ☐ nepoznato				
*LIJEK ILI LIJEKOVI POD SUMNJOM (upišite zaštićeni i nezaštićeni naziv lijeka, farmaceutski oblik, jačinu, način primjene, režim doziranja, nositelja dozvole, broj serije, datum početka i završetka korištenja lijeka; za cjepiva dodatno napišite mjesto primjene, datum valjanosti)				
LIJEK ILI LIJEKOVI U ISTOVREMENOJ PRIMJENI (napišite sve lijekove koje pacijent primjenjuje, a za koje ne sumnjate da su doveli do reakcije koju opisujete)				
ISPITIVANJA I POSTUPANJA (napišite sve rezultate laboratorijskih ispitivanja o kojima imate saznanja)				
OCJENA UZROČNO-POS LJEDIČNE VEZE ☐ sigurna ☐ vjerojatna ☐ moguća ☐ nije vjerojatna ☐ uvjetna ☐ nije moguće procijeniti				

***Zvezdicom označeni i osjenčani dijelovi predstavljaju obvezne podatke!**Ispunjen obrazac pošaljite na adresu elektronske pošte ndl@almbih.gov.ba

